Un nombre chromosomique de base : nouveau pour le genre Thesium L. (Santalaceae)

Autor(en): Favarger, Claude

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles

Band (Jahr): 89 (1966)

PDF erstellt am: **28.04.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-88957

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

UN NOMBRE CHROMOSOMIQUE DE BASE, NOUVEAU POUR LE GENRE *THESIUM* L. (SANTALACEAE)

par

CLAUDE FAVARGER

AVEC 2 FIGURES

Le genre Thesium a été quelque peu délaissé jusqu'ici par les cytologistes. Modilewski (1928), au cours d'une étude embryologique sur The sium intermedium Schrader $^1 = T$. linophyllon L. p. p. compte 34-35 chromosomes sur les cellules de l'albumen, et en conclut que l'espèce doit posséder n=12. Schulle (1933) consacre une étude à l'anatomie, à la morphologie et à l'embryologie de Thesium montanum Ehrh. = T. bavarum Schrank. Il pense pouvoir affirmer que le nombre des bivalents, observés dans les jeunes anthères, est de 12 (n = 12); « Die Zahl der Bivalenten dürfte 12 betragen », écrit-il, et il fait remarquer plus loin, comme l'avait déjà noté Modilewski (op. cit.), à propos de son matériel, que l'étude caryologique est rendue difficile en raison des faibles dimensions du noyau et des chromosomes. Rutishauser (1936-1937) a étudié le développement des organes floraux, la microsporogénèse et l'embryologie de Thesium rostratum M. et K. 2. Dans les cellules mères des microspores, au stade de la métaphase I, il compte avec précision n=13. Sur une espèce indienne : Thesium wightianum Wall., Rao (1942) a déterminé le nombre zygotique 2 n = 20. Enfin, à ces numérations, il convient d'ajouter celles qui n'ont pas été publiées par leurs auteurs, à savoir : 2 n = 12 pour Thesium alpinum L. (MATTICK in Tischler 1950) et 2 n = 14 pour Thesium linophyllon L. (Baksay in Löve et Löve 1961).

De cette rapide revue bibliographique, il ressort qu'aucune étude cytotaxinomique n'a été entreprise sur le genre *Thesium* au moyen des techniques modernes. D'autre part, les comptages de Modilewski et de Schulle sont approximatifs et appellent de sérieuses réserves.

² Plantes récoltées dans le canton de Schaffhouse.

¹ L'auteur écrit : *T. intermedium* L., dans le titre de l'article en russe, ce qui paraît bien être une erreur de nomenclature !

Les nombres gamétiques qui, pour le genre *Thesium*, semblent aujourd'hui assurés, sont $n=6^{\circ}$, 7, 10 et 13. Trois de ces nombres, à savoir 6, 7 et 13 sont considérés par Löve et Löve (1961) comme nombres de base pour les espèces de l'Europe centrale et nord-occidentale.

Au cours de l'été 1965, nous avons eu l'occasion de récolter, dans les environs de Ceillac (Hautes-Alpes françaises), le *Thesium divaricatum* Jan. dans des prairies sèches, sur les collines gypseuses dominant le hameau de La Clapière à 1700 m d'altitude. D'après Braun-Blanquet (1961) l'espèce fait partie des caractéristiques de l'alliance *Stipeto-Poion carniolicae* et de la sous-alliance *Lavandulo-Artemision*. Des boutons floraux ont été fixés sur place et l'étude cytologique en fut entreprise à notre retour à Neuchâtel.

Sur plusieurs mitoses des pièces florales nous avons compté 2 n = 8 (fig. 1). Les chromosomes sont de taille assez uniforme. A la métaphase I, on observe 4 bivalents (fig. 2). Il est donc possible d'affirmer que le *Thesium divaricatum* possède le nombre gamétique n = 4, qui est en




Fig. 1. Thesium divaricatum Jan. Mitose de pièce florale, 2 n = 8.

Fig. 2. The ium divaricatum Jan. Métaphase I (de profil), n = 4.

même temps le nombre de base le plus faible qui ait été mis en évidence jusqu'ici dans les Santalacées. Ce résultat nous paraît d'autant plus intéressant qu'un nombre de base aussi faible n'a été constaté jusqu'ici que dans un petit nombre de famille d'Angiospermes. D'autre part le Thesium divaricatum, espèce méditerranéenne, possède un nombre chromosomique inférieur à celui des espèces d'Europe centrale qui ont été étudiées à ce point de vue.

L'étude cytotaxinomique du genre *Thesium* sera poursuivie dans notre laboratoire et nous serons reconnaissant de recevoir du matériel (plantes vivantes ou graines) des espèces d'Europe.

 $^{^{\}rm l}$ Il conviendrait toutefois de vérifier le nombre 2 n=12 chez Thesium alpinum, car M^me MATTICK n'a pas publié de dessin.

Résumé

Le Thesium divaricatum Jan. possède le nombre gamétique n=4 et le nombre zygotique 2 n=8. Le nombre de base x=4 est le plus faible qui ait été observé jusqu'ici dans le genre Thesium et dans la famille des Santalaceae.

Zusammenfassung

Bei Thesium divaricatum Jan. konnte Verfasser die gametische Zahl n=4 und die zygotische Zahl 2n=8 bestimmen. Die Grundzahl x=4 ist die niedrigste die man bisher in der Gattung Thesium und in der Familie Santalaceae hat feststellen können.

Summary

The species Thesium divaricatum Jan. has the gametic number n=4 and the zygotic number 2 n=8. The basic number x=4 is the lowest which has been observed till now in the genus Thesium and in the family Santalaceae.

BIBLIOGRAPHIE

- LÖVE, Askell and LÖVE, Doris. (1961). Chromosome numbers of Central and Northwest European plant species. *Opera Botanica* 5, 581 pp.
- Modilewski, I. (1928). Die embryologische Entwicklung von Thesium intermedium. Bull. Jard. bot. Kieff 7-8: 65-70, 12 fig.
- Rao, L. N. (1942). Studies in the Santalaceae. *Ann. Bot.*, Lond. n. s. 6: 151 175, 4 pl., 57 fig.
- RUTISHAUSER, A. (1936-1937). Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen an Thesium rostratum M. et K. Mitt. Naturforsch. Ges. Schaffhausen 13: 25-47, 5 fig.
- Schulle, H. (1933). Zur Entwicklungsgeschichte von Thesium montanum Ehrh. Flora N. F. 27 (Bd 127): 140-184, 13 fig.
- Tischler, G. (1950). Die Chromosomenzahlen der Gefässpflanzen Mitteleuropas. 263 pp., S-Gravenhage.