Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **49 (1913)**

Heft 180

PDF erstellt am: **14.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Vol. XLIX N° 180 1913

LISTE DES TERMITES INDO-MALAIS

AVEC

l'indication du nombre des articles des antennes dans les trois castes,

PAR

E. BUGNION

Les antennes des termites s'accroissent d'ordinaire par divisions successives du troisième article. Une antenne formée de 11 articles au moment de la naissance devra, si le nombre définitif est 16, diviser son troisième article cinq fois ; si le nombre définitif est 19, le troisième article se divisera huit fois et ainsi de suite [1].

Le nombre des articles des antennes n'est, chez les termites adultes, pas absolument fixe dans chaque espèce. Les différences observées proviennent de ce que tel individu fait (dans certaines circonstances) une division de plus, tel autre une division de moins que le type habituel. Ou bien

[1] Certains insectes amétaboles présentent, à partir de la sortie de l'œuf, un allongement des antennes beaucoup plus considérable que les termites. J'ai compté par exemple chez *Blatta americana* (commune à Ceylan) 37 articles au sortir de l'œuf (chez la petite Blatte blanche longue de 4 1/2 mm., déjà assez agile) et 166 chez l'adulte ♂. Il ne m'a toutefois pas été possible de vérifier si l'allongement des antennes de la blatte se fait, comme chez les termites, par divisions successives du troisième segment.