

# **Cerasus erzincanica (Rosaceae) : a new species from Turkey**

Autor(en): **Yildirimli, .**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique =  
international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **48 (1993)**

Heft 1

PDF erstellt am: **31.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879642>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Cerasus erzincanica (Rosaceae), a new species from Turkey

Ş. YILDIRIMLI

## ABSTRACT

YILDIRIMLI, Ş. (1993). *Cerasus erzincanica* (Rosaceae), a new species from Turkey. *Candollea* 48: 115-118. In English, English and French abstracts.

*Cerasus erzincanica* Ş. Yıldırımlı (Rosaceae) from Eastern Anatolia is described and illustrated as a new cherry species belonging to the tribe *Pruneae*.

## RÉSUMÉ

YILDIRIMLI, Ş. (1993). *Cerasus erzincanica* (Rosaceae), une nouvelle espèce de Turquie. *Candollea* 48: 115-118. En anglais, résumés anglais et français.

Une nouvelle espèce de cerisier (tribu *Pruneae*) d'Anatolie Orientale est décrite et illustrée: *Cerasus erzincanica* Ş. Yıldırımlı.

**KEY-WOROS:** Cherry — *Cerasus erzincanica* — ROSACEAE — Flora — Turkey.

During an expedition to the province of Erzincan in Eastern Anatolia in May 1981, I collected a natural *Cerasus* (cherry) specimen. At first, I identified it as *C. angustifolia* (Spach) Browicz (BROWICZ, 1972). Then, I remarked that this species was characterized by having a splitting bark, whereas all Turkish *Cerasus* species have not got a splitting bark. The splitting bark is typical in *Armeniaca* (apricot) and *Persica* (peach). It is the unique specimen in the genus *Cerasus* in Turkey by having a splitting bark. This and the other features soon showed that the plant was undescribed (BROWICZ, 1972; KOMAROV, 1941; RECHINGER, 1969).

## **Cerasus erzincanica** Ş. Yıldırımlı, spec. nov. (Fig. 1, 2).

**Type:** Türkiye. B7 Erzincan: Kemah, Eriç, Tuztaş Deresi, Munzur Dağları, 1200-1500 m, 18.5.1981, Ş. Yıldırımlı 4267 (holo.: HUB; iso.: G).

Haec species inter omnibus Cerasis speciebus cortice fissili insigni et affinis *C. angustifolio* (Spach) Browicz sed foliis tenuioribus et papyraceioribus; pedicellis 6-8 mm longis (non ca. 2 mm longis); sepalis 4 mm longis (non 2 mm longis) et 1/2 and 2/3 (non 1/3) calycis tubos superantibus.

Frutice inermi vel arbor parva, rami griseo-brunnei, cortice fissili. Surculi juvenes glabri. Stipulae subulatae, bini, persistentes, 7-10 mm longi. Folia et flores fasciculati. Petioli ca. 3 mm longi. Folia juvenia supra in facie glabra viridia; infra in facie albo-viridula, lanata et decalvata. Folia matura 3-6 × 0.5-1 cm, elliptica vel linear-elliptica, tenuiora, papyraceiora, viridia, margines arcte serrata. Pedicellis 6-8 mm longi. Flores fasciculati, 1-2, ca. 10 mm longi; hypanthia ca. 6 mm longa, cylindrica; sepala 4 mm longa, viridia et 1/2 ad 2/3 calycis tubos superantia. Petala ignota. Ovaria et styli glabra. Drupae ignotae.



Fig. 1. — *Cerasus erzincanica* §. Yıldırımlı (Rosaceae).




Fig. 2. — Distribution of *Cerasus erzincanica* S. Yıldırımlı in Turkey.

Dikensiz çalı veya küçük ağaç. Kabuk gri-kahverengi, boyuna yarık yarık. Genç sürgünler tüysüz. Kulakçıklar bizsi, çift, kalıcı, 7-10 mm boyunda. Yapraklar ve çiçekler demetsi. Yaprak sapları yaklaşık 3 mm boyunda. Genç yapraklar üstte tüysüz ve yeşil; altta yünsü tüylü, zamanla tüysüz. Olgun yapraklar  $3-6 \times 0.5-1$  cm, gözsü-şeritsiye değişken, çok ince kâğıtsı, yeşil; kenarları testere dişli. Çiçek sapları 6-8 mm boyunda. Çiçekler demetsi, 1-2, yaklaşık 10 mm boyunda; hipantiyum 6 mm boyunda, silindirsi; çanak yapraklar 4 mm boyunda, yeşil ve kaliks tüpünün 1/2 ilâ 2/3'ü kadar. Taç yapraklar bilinmiyor. Yumurtalık ve uzantısı tüysüz. Meyva bilinmiyor.

Unarmed shrub or small tree. Bark grey-brown, longitudinally splitting. Young shoots glabrous. Stipules subulate, paired, persistent, 7-10 mm long. Leaves and flowers fascicled. Petioles ca. 3 mm long. Young leaves glabrous, green above; whitish-green, lanate and become glabrous beneath. Mature leaves  $3-6 \times 0.5-1$  cm, elliptic to linear-elliptic, very thin, papery, green; margins closely serrate. Pedicels 6-8 mm long. Flowers fascicles, 1-2, ca. 10 mm long, hypanthium 6 mm long, cylindrical; sepals 4 mm long, green and 1/2 to 2/3 as long as the calyx tube. Petals unknown. Ovary and style glabrous. Drupe unknown.

Endemic to Turkey. Irano-Turanian element.

This new species among all species of *Cerasus* in Turkey by having a splitting bark is remarkable and closely related to *C. angustifolia*, but it differs by very thin and papery leaves; 6-8 mm long pedicels; 4 mm long sepals and with exceeding 1/2 to 2/3 of the tube of the calyx.

The genus *Cerasus* Duhamel consists of 10 species in Turkey including the new species. The new species is locally called "kuşüzümü" meaning "birdgrape", because of its red fruits.

In order to ameliorate cultivated cherries, it is very important to investigate the genetic sources from agronomic point of view for the creation of new forms. This new species provide perhaps a way of handling genetic diversity and taking the best of these resources for genetic improvement.

#### REFERENCES

- BROWICZ, K. (1972). *Cerasus* Duhamel. In: DAVIS, P. H., *Flora of Turkey and the East Aegean Islands* 4: 12-19. Edinburgh.  
 KOMAROV, V. L. (Ed.) (1941). *Cerasus* Juss. *Flora U.R.S.S.* 10: 547-575.  
 RECHINGER, K. H. (Ed.) (1969). *Flora Iranica. Rosaceae* 1, 66: 187-202.