Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 1 (1951)
Heft: 12

Artikel: Chasses à la lampe à Binningen (Bâle Campagne). Troisième suite
Autor: Bros, Emmanuel de
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1042276

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

nen Behältern notwendig macht.

Die Flöhe sind in medizinischer Hinsicht von Bedeutung. Es würde zu weit führen, diese Seite hier eingehend zu beleuchten; indessen soll bemerkt werden, dass sie als Ueberträger von verschiedenen Krankheiten bei Mensch und Tier verantwortlich gemacht werden müssen. Menschen- und Hundefloh können die Pest übertragen. Die beim Flohstich entstehenden Quaddeln sind für den Menschen in der Regel sehr schmerzhaft und die Rötung bleibt längere Zeit bestehen. Zwar treten auch hier individuelle Verschiedenheiten in der Reaktion zutage, doch kann gesagt werden, dass der Floh im allgemeinen eine "typische Quaddel", d.h. eine sehr eng begrenzte und stark erhabene, runde Rötung verursacht.

Die grösste Anfälligkeit zeigen naturgemäss die Unterschenkel, wo in der Regel der Ansprung erfolgt. Eine weitere vom Floh bevorzugte Stelle am Menschen ist die Gürtelgegend. Die Uebertragung der Flöhe auf Mensch und Tier erfolgt am häufigsten durch Kontakt mit einem befallenen Individuum. Sauberes, hygienisches Wohnen und die Reinhaltung der Haustiere, wie sie mit den modernen Insekticiden ohne weiteres möglich ist, schliessen eine "Flohplage" aus.

Adresse des Verfassers: R. Wyniger, Lavaterstr.54, Birsfelden.

Chasses à la lampe à Binningen (Bâle-Campagne)

(Troisième suite)

Par Emmanuel de Bros

En attendant le résultat d'un élevage en cours pour relater avec mon excellent conseiller Imhoff ce que nous savons de la belle Catephia alchymista Schiff. - aux couleurs et au nom également dignes de Bâle (-Ville !) - je grouperai aujourd'hui quelques renseignements sur divers Lépidoptères présentant un certain intérêt parce que considérés comme migrateurs.

Heliothis peltigera Schiff. Un exemplaire le 4.7.50.

Selon Vorbrodt (I, p. 409), il s'agit d'une espèce méridionale et migratrice qui ne doit être fixée que dans le sud de la Suisse, en Valais et peut-être dans le Jura.

Dans un travail très complet et précieux pour la connaissance des espèces méridionales (sporadiques, migratrices ou fixées) de

nos régions, "Note préliminaire sur diverses espèces méridionales rencontrées dans la région de Genève (Bull. Soc. lép. Ge., 7, 1, 8-53, septembre 1932), M. Rehfous (p. 25) pense que "cette espèce n'est pas indigène aux environs de Genève, où elle paraît se rencontrer comme migratrice régulière, mais d'une fréquence très variable selon les années". Je tiens à exprimer ici toute ma reconnaissance à cet auteur, car c'est lui qui m'a guidé dans mes débuts et éveillé chez le collectionneur que j'étais l'intérêt particulier pour les questions faunistiques. Il a publié encore une "Deuxième note" (Bull. Soc. entom. Suisse 23, 4, 417-431, 9.12.50), nouvelle mine de renseignements exacts sur ces espèces intéressantes.

Mythimna (Leucania auct.) vitellina Hb. Deux exemplaires tout frais le 11.9.51.

Vorbrodt (I. p. 352) mentionne Liestal (Leuth.). Seiler (2e. suppl., p. 6): "21.7.07 im Ebenrain gefg. (Müller). Am 4.9.20 von der Weid." Peyerimhoff (p. 87) "Bâle 1 ex. (Sulger)." Fischer (3e partie, p. 32): "Mulhouse, juillet-octobre". Reutti (p.81): "Bei Waldshut, Basel etc. im September, selten."

Laphygma exigua Hb. Un exemplaire le 26.10.49.

Cette Caradrina rare chez nous est mentionnée dans le Suppl. de Peyerimhoff (p.162) comme ayant été prise à la lampe à Bâle en mai par Knecht. Fischer (3e partie, p. 60) indique Mulhouse et St Louis, juin-août. Reutti (p. 81) ne fait que citer Peyerimhoff. Seiler n'en parle pas. Vorbrodt (I. p. 355) indique Bâle (Mory). Rehfous (le note, p. 24) considère cette espèce comme migratrice, se maintenant à Genève par immigration. "Les échantillons d'octobre sont évidemment la descendance de ceux de juillet et août".

Cidaria (Orthonama) obstipata Fabr. (Larentia fluviata Hb.) Un ♂ frais le 26.5.51. et 1 autre ♂ frais le 11.11.51. (deux dates vraiment extrêmes).

Cette petite Géomètre brune, dont le dimorphisme sexuel est très marqué, semble bien plus rare ici que les espèces précédentes.

Vorbrodt (II, p. 73): "Ein durchaus südlicher, in ununterbrochener Generationsfolge erscheinender Falter, der... in Mitteleuropa regelmässig als Zugvogel erscheint, unserem Winter aber nicht widersteht. Von Juli bis Oktober. ... Ich muss annehmen, dass der Falter bei uns auch im Freien zur Entwicklung gelangt. ... Der Eiablage eines am 15.8.08 bei Dübendorf gefangenen ♀ entstammende Räupchen

erzog Dr. Corti mit Galium und erhielt bereits am 3.10. die Falter dieser Sommerbrut." Au Suppl. II, p. 640, mention d'un exemplaire très frais capturé au début de novembre 1913 près de Bruggen. Peyerimhoff ignore cette espèce. Fischer (4e partie, p. 33) : "Dornach, 12.8.32 (Ozorski)". Reutti (p. 148): "Ein Stück von Bischoff bei Ettlingen gefangen". Seiler (2e suppl., p. 13, 1923): "2 Ex., das eine am 5.6., das andere am 1.12.13 gefangen; wurden durch Vorbrodt bestimmt". Rehfous (le note, p. 27) relève qu'aucun exemplaire printanier n'a été signalé aux environs de Genève et que certains échantillons sont d'une fraîcheur telle qu'il n'est guère possible de les considérer comme des émigrés; il partage donc l'opinion de Vorbrodt.

Nomophila noctuella Schiff. Plusieurs exemplaires très variables de ce grand "micro" brun foncé aux allures de phrygane : 13.7. et 17.8.51; 29.10.51 (tout frais).

Comme pour Plusia gamma L., il doit s'agir d'une espèce indigène renforcée par l'arrivée d'immigrants certaines années favorables où elle se multiplie exagérément. Vorbrodt (II, p. 332): "Bis in den Spätherbst. Häufig auch zum Licht fliegend". Reutti (p. 170): "Ueberall gemein, Juli bis Oktober, und überwintert bis Mai".

Mesographe martialis Gn. (Pionea ferrugalis Hb.). Plusieurs exemplaires frais de cette Pyraustina rougeâtre: 15.7.50; 17.10.50; 29.10.51. Vorbrodt (II, p. 335): "An trockenen, warmen Orten, selten. Mai - Oktober. Raupe polyphag". Reutti (p. 167): "Ueberlingen, Freiburg, Lahr, Durlach etc. Juli - Oktober". Selon le Catalogue Lhomme, espèce commune partout en France. Rehfous, dans sa le note (p.41) relève qu'elle est répandue sur tout le plateau suisse, très commune à Genève, jusqu'à l'intérieur de la ville, volant de mai à octobre et, pour quelques individus, encore en novembre. Il la considère comme fixée à Genève. En serait-il de même à Bâle?

Pour répondre à cette question, il me faudrait être établi et chasser depuis bien plus longtemps à Bâle. Je tiens à le souligner en terminant : ces notes sur mes captures et les renseignements bibliographiques que j'ai réunis ne sont pas un résultat, permettant déjà certaines conclusions générales, comme les deux magistraux exposés de M. Rehfous. Je les considère plutôt comme un "appât" pour attirer d'autres observateurs, contradicteurs ou confirmateurs, ou comme un "prologue" pour éveiller l'intérêt envers les problèmes que

pose encore notre faune locale. On aurait en effet bien tort de la croire connue parce qu'il s'agit des environs d'une grande ville où s'agitent une quarantaine d'entomologistes conscients et organisés, dont une quinzaine de lépidoptéristes, tous amateurs!

(à suivre)

Adresse de l'auteur: E. de Bros "La Fleurie" Binningen

Bericht über die Monatssitzung vom 8. Oktober 1951. Im Mittelpunkt dieser Sitzung stand ein Vortrag mit Demonstrationen "Ueber die Biologie der Termiten", gehalten von unserem Mitglied und Spezialisten auf diesem Gebiet, Herrn PD. Dr. Lüscher. 31 Mitglieder und als Gast die Gemahlin des Referenten fanden sich im Hörsaal des Tropeninstitutes ein, wohin die Sitzung diesmal verlegt worden war. Nach einer herzlichen Begrüssung durch den Direktor des Institutes, Herrn Prof. Dr. R. Geigy, erfreute uns der Vortragende mit ungemein interessanten Einzelheiten aus dem Leben dieser gefürchteten Tropenbewohner. Er versäumte dabei nicht, immer wieder darauf hinzuweisen, wie viele Rätsel in der Biologie der Termiten noch der Lösung harren. Auch die Bekämpfung gibt noch viele Probleme auf, die angesichts der gewaltigen Termitenschäden in den Tropen intensiv bearbeitet werden müssen. Anhaltender Beifall und eine ausgiebige Diskussion bezeugten dem Referenten das Interesse, das seine Ausführungen gefunden hatten.

Im geschäftlichen Teil beglückwünschte Herr Wyniger unser verdientes Ehrenmitglied, Herrn Wilhelm Schmid, zu seinem 80. Geburtstag. Ferner konnte er die Aufnahme von 5 neuen Mitgliedern bekannt geben, die von der Versammlung ausnahmslos gebilligt wurde. Es handelt sich um die Herren Emil Galli, Basel, Dr. R. Speich, Basel und Louis Zimmermann aus Mülhausen als ordentliche Mitglieder sowie die Herren Heinertz und Leppert, beide in Basel, als Jungmitglieder.

Um 22.15 siedelten die meisten Anwesenden in unser Stammlokal über, wo ein Schlummerbecher bei reger Unterhaltung den genussreichen Abend schloss.

S.

Bericht über die Monatssitzung vom 12. November 1951. Zur Eröffnung der Verhandlungen konnte Präsident Wyniger 24 Mitglieder willkommen heissen. Unser Kassier liess sich wegen Erkrankung entschuldigen. Nach Genehmigung des letzten Protokolls gab Herr Wyniger bekannt, dass der neue Bibliothekkatalog nunmehr der Vollendung entgegengeht und voraussichtlich im Dezember an die Mitglieder verteilt werden kann.

Als neues Passivmitglied wurde Herr Dr. E. Reitter in München in die EGB aufgenommen.

Anschliessend berichtete Herr Wyniger in einem interessanten Kurzreferat "Einiges über die Verbreitung und Biologie der Flöhe". Das durch einige Skizzen und ein mikroskopisches Präparat ergänzte Referat wird in unsern "Mitteilungen" erscheinen. Es sei hier deshalb lediglich die merkwürdige Tatsache festgehalten, dass der früher so häufige Menschenfloh, Pulex irritans L., heute in der Schweiz