Entomologische Notizen

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **18 (1968)**

Heft 1

PDF erstellt am: **01.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Entomologische Notizen

MELITAEA AURINIA ROTT. ALTITUDE MAXIMALE

Raphy Rappaz

VORBRODT écrit (p. 47): "Es erreicht im Wallis bei Jeur-Brûlée (s/Branson - Fully, Réd.) ca. 1500 Höhe, ohne von der typischen Form abzuweichen (WULLSCHLEGEL)".

VERITY écrit à ce propos (p. 68): "The interesting form frigescens, intermediate on both surfaces between true aurinia and glaciegenita (merope auct. nec de Prunn.) I have described from a female collected by WULLSCHLEGEL is probably from Jeur-Brûlée, 1500 m, above Branson, as VORBRODT says the latter collector had found true aurinia in that locality".

Or je suis allé à Jeur-Brûlée - une montée de 3 heures à pied qui réclame une certaine dose d'enthousiasme - le 22 juin 1966 et j'y ai capturé 5 exemplaires (3 ♂♂ 2 ♀♀) de l'espèce: ce sont tous des aurinia Rott. typiques, et non pas une forme intermédiaire "frigescens" entre aurinia Rott. et glaciegenita Vty. comme la ♀ décrite par VERITY d'après un exemplaire de WULLSCHLEGEL "probablement" (? !) de Jeur-Brûlée. Ainsi que l'a écrit VORBRODT, aurinia Rott. typique monte donc bien en Valais jusqu'à 1500 m environ, ce qui est du reste confirmé par une série d'aurinia Rott. capturés à Crans s/Sierre (alt. 1460 m) le 16 et le 22 mai 1948 et sur la piste de bob de Montana (alt. 1450 m) le 11 juin 1949 par mon collègue DE BROS.

Adresse de l'auteur: Raphy Rappaz
Café de Paris
Avenue de France
1950 Sion

Einige Beobachtungen am Isteiner Klotz 1967

Unsere Gesellschaft hat sich als gemeinsames Exkursionsziel für 1967 den Isteiner Klotz gewählt - auf Grund der sehr interessanten Angaben über die Insekten dieses warmen und trockenen Gebietes am Nordufer des Rheines in der badischen Nachbarschaft.

Unser Kollege PETER HUNZIKER beobachtete dort am 9. April schon folgende Arten:

Leptidea sinapis L.	♂	1 St.
Anthocaris cardamines L.	♂	in Anzahl
Pieris napi L.	♂♀	in Anzahl
Gonepteryx rhamni L.	♂♀	in Anzahl
Nymphalis io L.		in Anzahl
" polychloros L.		1 St.
Aglais urticae L.		mehrfach
Araschnia levana L. gen. vern. levana L.		in Anzahl

Am 1. Juli wurden am Nordeingang des Tunnels von den Herren E. WELLAUER, O. CHRISTEN und E. de BROS am Licht folgende Noctuiden beobachtet oder gefangen (wegen Platzmangel verzichten wir hier auf die anderen Familien).

Scotia segetum Schiff.
" exclamationis L.
" ipsilon Hfn.
Ochropleura plecta L.
Eugnorisma depuncta L.
Noctua pronuba L.
" comes Hb.
Amathes c-nigrum L.
" triangulum Hfn.
Anaplectoides prasina Schiff.
Polia bombycina Hfn. (advena Schiff.)
" nebulosa Hfn.
Mamestra persicariae L.
" oleracea L.
Hadena rivularis F. (cucubali Schiff.)
Mythimna conigera Schiff.
" pallens L.
" sicula Tr. ssp. scirpi Dup.
Cucullia verbasci L.
Apatele psi L.
" (Hyboma) strigosa Schiff.
Cryphia (Euthales) algae F.
" (Bryoleuca ravula Hb.
" " domestica Hfn. (perla Schiff.)
" (Bryophila) muralis Forst.
Rusina ferruginea Esp.(umbratica Goeze)
Euplexia lucipara L.
Ipimorpha subtusa Schiff.
Enargia ypsillon Schiff. (fissipuncta Haw.)
Calymnia pyralina Schiff.
Apamea scolopacina Esp.
Oligia latruncula Schiff.
Hoplodrina alsines Brahm
" blanda Schiff. (taraxaci Hb.)
" respersa Schiff.
Caradrina morpheus Hfn.
Agrotis venustula Hb.
Pyrrhia umbra Hfn.
Jaspidia pygarga Hfn. (fasciana auct.)
Eustrotia olivana Schiff. (argentila Hb.)
Emmelia trabealis Scop.
Rivula sericealis Scop.
Zanclognatha tarsipennalis Tr.
" tarsicrinalis Kn.

E. de Bros