Zeitschrift: Hebamme.ch = Sage-femme.ch = Levatrice.ch = Spendrera.ch

Herausgeber: Schweizerischer Hebammenverband

Band: 103 (2005)

Heft: 9

Rubrik: Aktuell

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



In den Deutschweizer

«L'Enfant endormi»

Die marokkanische Regisseurin Yasmine Kassari setzt in ihrem Film «L'Enfant endormi» einen uralten Mythos in Bilder um, den des «Schlafenlassens» des Fötus im Mutterleib, um die Geburt zu verzögern. Die Gründe für diesen Brauch sind vielfältig: Es kann sein, dass eine werdende Mutter keine unverzügliche Geburt wünscht, weil sie schon zu viele Kinder hat. Es kann auch sein. dass sie Witwe ist oder eine abgewiesene Frau, nicht wieder heiratet. Oder eben, wie im Fall von Zeinab, der Hauptfigur des Films, dass der Vater des Kindes im Ausland lebt und dort auf eine bessere Zukunft hofft, während die Frau seine Rückkehr abwarten möchte, um das Kind in die Welt zu setzen. Das Schlafenlassen geschieht in Kenntnis aller Betroffenen, betont Yasmine Kassari, es stelle für niemanden ein Problem dar und «die Männer tragen genausoviel dazu bei wie die Frauen.»

Nur eine Frau konnte diese Geschichte wohl mit dieser Sensibilität erzählen und mit dem Gespür für die kleinen Details im marokkanischen Frauenalltag.

Voraussichtlich ab 22. ev. 29. September in Zürich, Basel und Bern, später an anderen Orten in den Kinos. www.trigon-film.org

Kaiserschnitt in Schweizer Spitälern

29 Prozent aller Geburten

In den Schweizer Spitälern erfolgte im Jahre 2003 fast jede dritte Geburt durch Kaiserschnitt. Wie eine Analyse des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigt, sind die regionalen Unterschiede erheblich. In gewissen Regionen lässt sich jede zweite Frau per Kaiserschnitt entbinden, in anderen Regionen hingegen wird weniger als eines von zehn Kindern per Kaiserschnitt geboren. Auch von Spital zu Spital variiert der Anteil an Sectiogeburten zum Teil beträchtlich.

Gemäss der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser begaben sich im Jahre 2003 rund 67000 Frauen zum Gebären ins Spital. 29,2 Prozent von ihnen hatten einen Kaiserschnitt (2002: 27,5 Prozent, 2001: 26,3 Prozent). Im internationalen Vergleich übertrifft die Rate für das Jahr 2003 beispielsweise diejenige von Deutschland (25,5%) und gehört europaweit zu den höchsten.

In bestimmten Regionen wird fast doppelt so oft ein Kaiserschnitt durchgeführt wie im schweizerischen Durchschnitt. So hatten beispielsweise in den Regionen Zollikerberg, Herrliberg und Küsnacht im Kanton Zürich vier von zehn Frauen einen Kaiserschnitt. In der Region Riedholz SO, in der Region Binningen BL, in der Region Schattdorf UR oder in der Region Stein AG war es sogar jede zweite Frau. Diesen stehen Regionen wie die Surselva oder das Puschlav GR gegenüber, in denen weniger als jedes zehnte Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht wird.

Höheres Alter und längerer Spitalaufenthalt

Frauen mit Kaiserschnittgeburt sind mit 31,4 Jahren im Durchschnitt eineinhalb Jahre älter als Frauen mit einer Spontangeburt. Auch bleiben Frauen nach Sectio durchschnittlich fast drei Tage länger im Spital, nämlich 8,6 Tage, im Vergleich zu den 5,8 Tagen der Frauen ohne Sectio. Die ambulanten Geburten wurden während der ganzen Analyse nicht berücksichtigt. Etwa ein Drittel der Frauen mit Kaiserschnitt kamen als Notfälle ins Spital.

Doppelt so teuer wie Spontangeburten

Im Weiteren wurde untersucht, ob privat- und halbprivat Versicherte eine höhere Kaiserschnittrate aufweisen. Ein solcher Zusammenhang konnte nur in den Kantonen Nidwalden, Basel-Stadt und Zürich festgestellt werden, nicht aber für die gesamte Schweiz. Der Anteil an Sectiogeburten war in den Privatspitälern mit 40 Prozent deutlich höher als in den öffentlichen Spitälern mit 26 Prozent. Die Kosten eines Kaiserschnittes ohne Komplikationen sind rund doppelt so hoch wie die einer Normalgeburt.

Bundesamt für Statistik Pressemitteilung 12. August 2005, www.statistik.admin.ch

(Fast) mitten in Bern

Sitzungszimmer zu vermieten

Die neue Geschäftsstelle des SHV am Rosenweg 25C in Bern verfügt über ein attraktives ruhiges Sitzungszimmer mit Blick ins Grüne, Hellraumprojektor, Flipchart, Magnetwand, Kaffeemaschine und beguem Platz für 12 (ev. einige mehr) Personen. Es kann für Fr. 50.- (Halbtag) bzw. Fr. 100.- (ganzer Tag) inkl. Gerätebenützung und Kaffee gemietet werden.



Reservationen: info@hebamme.ch, Tel. 031 332 63 40.

Hebammenkongress Montreux 11./12. Mai 2006

Aufruf zur Posterpräsentation



Das Poster ist ein zunehmend anerkanntes Medium, um nicht publizierte eigene Studienresultate oder klinische bekannt zu Innovationen machen. Das Kongress-OK lädt Sie dazu ein. Interessantes aus Ihrem beruflichen Umfeld mit einem Poster vorzustellen. Idealmass eines Posters: 120 x 180 cm.

Die Poster bleiben während der ganzen Kongressdauer ausgestellt. Die Autorinnen sind am 12. Mai während der Vormittagspause anwesend. Die beiden besten Poster können dank zwei von SW/CA gesponserten Preisen prämiert werden:

> Fr. 1000.-1. Preis: 2. Preis: Fr. 500.-

Postertitel, Autorin(nen), Kontaktadresse sowie eine schriftliche Zusammenfassung auf D, F oder I (max. 250 Wörter) sollten bis zum 28. Februar

2006 an Anne Burkhalter geschickt werden (anne.burkhalter@bluewin.ch).

Yvonne Meyer

Nützliche Referenzen für Konzept und Einsetzung eines Posters:

- Lanzon S, Goulet C, Faucher B, L'affiche: un choix judicieux pour la communication scientifique, l'infirmière du Québec, juillet-aoùt 1997, p. 31-37.
- Alean P, Poster-Präsentationen in Forschung und Lehre Poster-Präsentationen, Arbeitstelle für Hochschuldidaktik. AfH. Universität Zürich, www.afh.unizh.ch/dienst/veranstalt/mittag/pdf/Poster_ Praesentationen.pdf (consulté 01.08.05)
- Poster Presentation of Research Work tips and guidelines, University of Newcast-le upon Tyne, UK, http:// lorien.ncl. ac.uk/ming/Dept/Tips/present/posters.htm (consulté 01.08.05).

Masterarbeit

Medienkompetenz bei Hebammen in der D-CH

Im Rahmen ihres Pädagogikstudiums an der Universität Paris Nord untersuchte die Hebamme An Ackaert Kössler die Medienkompetenz der in der Deutschschweiz lebenden Hebammen. Ziel der als Masterarbeit eingereichten Studie war es, das Potenzial an Medienkompetenz im Hinblick auf die neuen medialen Berufsanforderungen zu analysieren und daraus inhaltliche und strategische Empfehlungen für die zukünftige Hebammenausbildung zu formulieren. Ein der «Schweizer Hebamme» 1/2002 beigelegter Fragebogen wurde von 468 Hebammen beantwortet. Dass die Medienkompetenz allgemein und berufsspezifisch gefördert werden muss, findet grosse Zustimmung. Der Grossteil der Hebammen bewerten Basiscomputerkenntnisse als «mässig». Kenntnisse Internet und der Krankenhaus-Informationssysteme chen nicht einmal dieses Niveau. Interesse wäre vorhanden, aber Zeit- und Übungsmangel sind wichtige Hindernisse. Die Veränderungen im beruflichen Umfeld sind erkannt und werden grundsätzlich begrüsst, aber auch kritisch hinterfragt.

An Ackaert Kössler, Medienkompetenz bei Hebammen in der Deutschschweiz. Standortbestimmung und Perspektiven für die Hebammenausbildung. Masterarbeit Universität Paris Nord, Abteilung für Pädagogik in den Gesundheitswissenschaften. Dezember 2004.

Die Arbeit ist abrufbar unter: www.azi.ch>e-learning>links In Zürich

Ina May Gaskin



Die bekannte Hebamme und Autorin aus den USA (s. H.ch 3/05) kommt in die Schweiz. Es erwartet uns ein umfangreiches Referat, Filmmaterial sowie genügend Zeit für Fragen.

Datum: Dienstag, 8. Nov.

05, 9.30 bis 16 Uhr

Ort: Aula des Bildungszentrums für

Erwachsene, Riesbachstrasse 11,

8008 Zürich. Kosten: SFr. 130.–

(inkl. Mittagessen)

Tageskasse für Kurzent-

schlossene: SFr. 150.– (ohne Mittagessen)

Weitere Informationen und Anmeldeangaben auf www.doula.ch. Anmeldefrist bis 15. Oktober.

Hebammenforschung

16. Forschungs – Workshop

28./29.Oktober 2005 Kolpinghaus Fulda

Forschende Hebammen stellen ihre Arbeiten vor. Mit: Ans Luyben, Mechthild Gross, Katja Stahl, Simone Kirchner u.v.a.

Anmeldungen bei der Hebammengemeinschaftshilfe (HGH e.V.) Stichwort «16. Forschungsworkshop», Gartenstr. 26, 76133 Karlsruhe Frau Nold Telefon: 0721/98 18 923

Seminargebühren: BDH Mitglieder 55.–€, Nichtmitglieder 85.–€, Schülerinnen/Studentinnen: 30.–€

Überweisung des Betrages an die Sparkasse Karlsruhe: KTO 91 29 073, BLZ 660 501 01.

Mehr Infos auf www.bdh.de>Wir über uns>Hebammengemeinschaftshilfe.

Aus dem Programm:

- Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
- Aufgabenfelder der Hebamme im Rahmen der Betreuung von Familien aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen
- Einfach schwanger Wie erleben Frauen die Risikoorientierung in der ärztlichen Schwangerenvorsorge in Deutschland?
- Vorläufige Ergebnisse einer Studie über Schwangerschaftsbetreuung in Europa
- Fehl- oder Totgeburt als biografischer Einschnitt im Frauen/Leben: der Einfluss von Trauer auf Kinderwunsch und Lebensplanung.

Geplante Sectio bei BEL

Kein Vorteil gegenüber natürlicher Geburt

Studienergebnisse Wenige wurden unter Geburtshelfern und Hebammen heftiger diskutiert als die Studie von Hannah et al aus dem Jahre 2000 um den besten Geburtsmodus bei Beckenendlage am Termin [1]. Das Ergebnis dieser international durchgeführten prospektiv-randomisierten Studie lautete, dass der geplante Kaiserschnitt der Vaginalgeburt vorzuziehen sei. Viele Kliniker und internationale Fachverbände übernahmen darauf Empfehlungen in ihrer klinischen Praxis, obwohl besonders die methodischen Mängel der Studie kritisiert wurden.

Vier Jahre später publizierte die gleiche internationale Studiengruppe eine Followup Studie der erfassten Kinder [2]. Ziel der Studie war es herauszufinden, ob der geplante Kaiserschnitt bei BEL am Termin das Risiko eines Todes oder neurologischer Entwicklungsverzögerungen bis zum Alter von 2 Jahren reduzieren kann.

Von insgesamt 1159 Kindern wurden 923 in 85 verschiedenen Zentren im Alter von 2 Jahren nachuntersucht. Das Mortalitätsrisiko oder das Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen war für die Gruppe nach Plansectio nicht anders als für die Gruppe nach vaginaler Geburt. Die Schlussfolgerung lautet, dass die geplante Sectio bei BEL am Termin das Risiko für die

genannten Komplikationen nicht vermindert.

Die gleiche Studiengruppe publizierte einen weiteren Beitrag, der sich mit dem Follow-up der Mütter 2 Jahre nach der Geburt beschäftigte [3]. Die Arbeitsgruppe fand keine signifikanten Unterschiede zwischen den Müttern, die natürlich oder mit Kaiserschnitt geboren hatten. Dies bezog sich auf Parameter wie Stilldauer, Schmerzen, Inkontinenz, urogenitale, menstruelle oder sexuelle Probleme. Dies bedeutet u.a., dass die geplante Sectio keinen protektiven Wert bezüglich der Vermeidung von Folgen einer vaginalen Geburt (z.B. Harninkontinenz) besitzt, was in der bisher publizierten Literatur häufig unterstellt wurde.

- [1] Hannah ME et al. for the Term Breech Trial Collaborative Group: Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Lancet 2000; 356: 1375–1383.
- [2] Whyte H et al. for the 2-year infant follow-up Term Breech Trial Collaborative Group: Outcomes of children at 2 years after planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: The International Randomized Term Breech Trial. Am Obstet Gynecol 2004; 191: 864–871.
- [3] Hannah M et al. for the 2-year maternal follow-up Term Breech Trial Collaborative Group: Maternal outcomes at 2 years after planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: The International Randomized Term Breech Trial. Am Obstet Gynecol 2004; 191: 917–927.

S. auch: Krause M: Geplante Sectio bei BEL am Termin: kein Vorteil gegenüber der vaginalen Geburt. Die Hebamme 2005: 18: 70–74.