

Typus I. Phanerogamen

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern**

Band (Jahr): - **(1875)**

Heft 878-905

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ingenieur in Bern, — *Guthnick*, gew. Apotheker in Bern. — *Hügli*, Kantonsbuchhalter in Bern, — *Hunziker*, Pfarrer in Lauenen, — *Imobersteg*, Pfarrer in Eggiwyl, — *Kern*, Oberförster in Interlaken, — *Lagger*, Dr. med. in Freiburg, — *Leresche*, gew. Pfarrer in Château-d'Oex, — *Lindt*, Apotheker in Bern, — *Matthys*, Pfarrer in Adelsboden, — *Maurer*, Lehrer in Weissenbach, — *Meissner*, gew. Professor in Basel, — *Muret*, Dr. jur. in Lausanne, — *Rätzer*, Pfarrer in Gadmen, — *Rhiner*, Botaniker in Schwyz, — *Rothenbach*, Lehrer in Bern. — *v. Rütte*, Pfarrer in Radelfingen, — *Schneider*, Apotheker in Basel, — *Staufffer*, Oberförster in Thun, — *Sterki*, Dr. med. in Bern, — *Tièche*, Lehrer in Bern, — *Ziegler*, Dr. med. in Bern.

Typus I. Phanerogamen.

Klasse I. Angiospermen.

Reihe A. Dicotyledonen.

1. Ranunculaceen.

Clematis. Waldrebe.

* *Vitalba L.* In Hecken und Gebüsch, an sonnigen Abhängen der unteren Region ziemlich verbreitet. Von Thun bis Meiringen stellenweise sehr häufig! Beatenberg bis c. 1050^m! Brienz bis c. 1000^m! — Auf Gneiss bei äusser Urweid (Hasli)!

Bern. Mittheil. 1875.

Nr. 875.

Atragene. Alpenrebe.

alpina L. In der Klus bei Boltigen (in der Enge) in vereinzelt Exemplaren von den Kalkfelsen herabhängend, 1872 von Lehrer Ubert gefunden. — Ausserdem in der Schweiz in den Alpen von Chateau-d'Oex (Leresche nach Christ) und in Graubünden vorkommend.

Thalictrum. Wiesenraute.

•• *aquilegifolium* L. An schattigen, etwas feuchten Orten, in Gebüsch, von der Ebene bis über die Baumgrenze stellenweise häufig, z. B.: Burgfluh bei Wimmis! Zwischen Brienz und Meiringen! Rosenlauri (Brunner), Saxeten! Mürren am Weg zum Brünli bis gegen 2000^m! — Auf Gneiss bei Innerkirchen! Inner Urweid! Ammerten im Hintergrund des Lauterbrunnenthals!

foetidum L. An Felsblöcken in der Klus bei Kandersteg! Thalberg an der Stockhornkette.

minus L. (nach Koch). An Kalkfelsen und in Geröllen hin und wieder. Am Eingang in das Simmenthal (Brown), Thalberg an der Stockhornkette (Trachsel), Ganterischalp (Hügli). Trachsellaunen, in Kalkgeröllen! Schönbalm im Trümletenthal (Rothenbach), Grindelwald am Fuss des Wetterhorns (Christener).

Anmerkung. *T. simplex* L. (*T. galioides* Nestl.) unweit der nördlichen Gebietsgrenze auf der Rossweid bei Thun (Schläfli).

Anemone. Windröschen.

* *Hepatica* L. (*Hepatica triloba* Chaix). Leberblume. In Wäldern und Gebüsch, von der Ebene bis in die mittlere Region, stellenweise sehr häufig, z. B. im Aarthal von Thun bis Meiringen! Im Lauterbrunnenthal bis gegen die Mettlenalp c. 1600^m (Rothenbach). Kanderthal, häufig beim blauen See! Obersimmenthal am Fuss des Bäderhorns bei Boltigen bis in die Nähe der Waldgrenze (Maurer).

vernalis L. Auf Alpenweiden der mittleren und höheren Region ziemlich verbreitet, z. B.: Ralligstöcke! Faulhorn (Brunner), Stockhornkette! u. a. O. — Fehlt dem Jura.

narcissiflora L. Auf Weiden der mittleren und oberen Region, stellenweise sehr häufig! Gemmenalpgrat! Schynige Platte! Mürren! Stockhornkette! u. a. O. — Zuweilen bis zur Buchengrenze herab (Wengen bei c. 1300^m!)

alpina L. Auf Weiden und steinigen Orten der mittleren und oberen Region häufig; stellenweise bis unter die Buchengrenze herabsteigend (Wengen bei 1200^m!) — *Var. sulfurea*. Vorzugsweise auf quarzreicher Unterlage. Am Faulhorn. Kl. Scheideck! Schynige Platte! Lauberhorn! Häufig ob Mürren. Oberhalb der Bachalp (Brown), Sanetsch (Gaudin).

baldensis L. Gemmi, am Lämmerengletscher (Vulpius). — Eine Pflanze der südlicheren Alpenkette.

* *nemorosa* L. In lichten Wäldern, in Gebüsch und Baumgärten der unteren Region gemein; stellenweise bis in die mittlere Region.

•• *ranunculoides* L. In Gebüsch, an etwas feuchten Orten, selten. Meiringen (Brunner). An der Saane bei Saanen (Christeler).

Ranunculus. Hahnenfuss.

* *aquatilis* L. (*var. paucistamineus* Tausch.) (Koch Syn. Ed. 2.) In stehendem und langsam fließendem Wasser hin und wieder. Pohlerenmoos bei Blumenstein! Spiez! Interlaken! Weissensee am Ballenberg bei Brienz! Gräben am Fuss des Ballenberges (mit schwimmenden Blättern)! — Im Ganterischsee bei 1575^m! (Maurer, Hügli).

glacialis L. Auf Geröll- und Schutthalden der höheren Alpen an etwas feuchten Stellen von c. 2300^m bis zur Schneegrenze häufig. In günstigen Sommern auch an weit höheren, vorübergehend vom Schnee entblößten Standorten beobachtet: Oberaarhorn bei 3400^m (Lindt). Schreckhorn bei 3600^m (Escher, Girard, Desor, nach Studer, Panorama von

Bern). Jungfrau und Finsteraarhorn bis gegen 4000^m, und noch auf dem Gipfel des Finsteraarhorns (4275^m) in vollkommenen Exemplaren im September 1872 von Apotheker Lohmeier und im September 1873 von Dr. Calberla gefunden (s. Jahrbuch des Schweizer Alpenclub VIII, p. 530; IX, p. 531). — In Grönland bis zum 72.°

alpestris L. An feuchten oder beschatteten Stellen der oberen Region häufig, selten im oberen Theil der mittleren Region.

Anmerkung. Die auf dem Briener Rothhorn und Giffhorn bei Saanen angegebene *R. Traunfellneri* Hoppe ist zu *R. alpestris* zu ziehen. Der ächte *R. Traunfellneri* scheint der Schweiz zu fehlen.

•• *aconitifolius* L. An feuchten Orten, auf Wiesen und Weiden, an Bächen von der Ebene bis in die obere Region, stellenweise häufig.

parnassifolius L. Auf Felstrümmern der Gemmi (Brown), Sanetsch (Gaud.), Oldenhorn (Gaud. Fl. helv., vol. VII). — Häufiger in den Waadtländer- und Walliser Alpen.

pyrenæus L. An etwas feuchten Orten der höheren Region, selten: Gipfel des Männlichen 2345^m (Rothenbach). Am felsigen Ufer des Sägisthalsees 1938^m (Tièche). Am Uebergang vom Aargletscher nach dem Urbachthal (Ziegler).

* *Flammula* L. An Sumpfgräben von der Ebene bis in die mittlere Region stellenweise häufig, z. B.: Stockenthal! Spiezmoos! Faulensee bei Ringgenberg! Meiringen (Brunner)— Schwefelbergbad bei 1400^m (Hügli). — In kleineren, schmalblättrigen Formen *R. reptans* ähnlich.

•• *reptans* L. Auf feuchtem Sandboden zwischen Därligen und Weissenau (Hügli).

•• *Lingua* L. Häufig in einem Graben im Faulenseemoos bei Spiez!

* *auricomus* L. Auf feuchten Wiesen, in Hecken der unteren Region stellenweise häufig, z. B.: Reutigen (Hügli), Wimmis! Spiez! Därligen! Meiringen (Brunner).

montanus Willd. Auf Weiden und im Geröll der Alpen und Voralpen häufig, stellenweise bis in die untere Region. — *Var. gracilis (R. gracilis Schleich.)* an steinigten, trockenen Orten der höheren Region ziemlich häufig. — *Var. major (R. Gouani Willd.)*. Faulhorn. Engstlenalp (Fischer-Ooster). *Villarsii D.C.* Auf Alpenweiden hin und wieder, z. B.: Stockhornkette am Leiterengrat. Kl. Scheideck (Rothenbach).

* *acer L.* Auf Wiesen und Weiden, von der Ebene bis in die obere Region gemein. — Gipfel des Männlichen (2345^m)!

•• *lanuginosus L.* An feuchten, waldigen Abhängen häufig, seltener in der oberen Region, z. B.: Nünenen (Trachsel).

nemorosus D.C. In Wäldern und auf Weiden der Voralpen hin und wieder, z. B.: an der Nordseite der Stockhornkette und im Sefinenthal (Fischer-Ooster), Meiringen (Brunner).

* *repens L.* An Wegen, auf Grasplätzen der Ebene und Voralpen häufig.

* *bulbosus L.* Auf etwas trockenen Grasplätzen der unteren Region stellenweise häufig.

* *arcensis L.* Auf Aeckern, im Getreide, selten. Thun (Dietrich).

Anmerkung. R. sceleratus L. an gedüngten Stellen, selten und vorübergehend. Oberhalb Hilterfingen (Brown). —

R. rutæfolius L. unweit der östl. Gebietsgrenze am Schönengiebel zwischen dem Brienzer Rothhorn und Lungern (Rhiner).

Ficaria. Scharbockskraut.

* *verna Huds. (Ranunculus Ficaria L.)* In Hecken und Gebüsch der unteren Region stellenweise häufig, z. B.: Thun! Spiez! Interlaken! Justisthal bis 1190^m!

Caltha. Dotterblume.

* *palustris L.* An Bächen und Gräben gemein; von der Ebene bis in die obere Region, z. B.: Grimsel! Kl. Scheideck (2069^m)!

Trollids. Trollblume.

•• *europæus L. Ankenbälli.* Auf feuchten Wiesen und Weiden der Voralpen häufig und bis in die höhere Region auf-

steigend, z. B.: Gipfel des Männlichen (2345^m)! Brienzer Rothhorn (2351^m)! — Stellenweise bis an den Fuss der Berge herabsteigend, z. B. Reutigenmoos! u. a. O.

Aquilegia. Akelei.

* *vulgaris* L. *Schweizerhose*. In Gebüsch an steinigen Orten und an trockenen Abhängen der unteren Region häufig, besonders *var. atrata* (*A. atrata* Koch.).

alpina L. An felsigen Orten der mittleren und oberen Region selten. Am Wellhorn bei Rosenlauri (Brunner); in der Nähe der Bettenalp am Wege von Iseltwald auf's Faulhorn (Brown), Gasterenthal am Alpetligletscher (Fischer-Ooster), Gemmi (Brown), Kiley an der Niesenkette (Maurer), Laubhorn bei Lenk (Meissner), Rawyl (Maurer). Am Geltengletscher bei Lauenen (Gaudin).

Delphinium. Rittersporn.

elatum L. (*D. intermedium* Ait.) An felsigen Orten der mittleren und oberen Region selten. Niesen (Aretius), in neuerer Zeit daselbst nicht wieder gefunden. Justisthal (Brown). Ueber Iseltwald zwischen 1300 und 1600^m (Guthnick). An schattigen Felswänden der Oltscherenalp! Oberhalb Rosenlauri und am Schwarzhorn (Brunner), Grindelwald am Wetterhorn (Christener), Mürren am Fuss des Brünlihorns. Im Tannenwalde am Weg zur Gemmi oberhalb Kandersteg (Prof. Brunner). An der Nordseite des Bürglen über dem Ganterischsee (Maurer).

Anmerkung. *D. Ajacis* L. als Zierpflanze cultivirt und in der Nähe der Häuser zuweilen verwildert, z. B. im Ried bei Thun!

Aconitum. Eisenhut.

Napellus L. Auf Geröllhalden und Weiden der Alpen häufig, besonders auf gedüngten Stellen in der Nähe der Sennhütten. Stellenweise bis in die Thäler herabsteigend.

Stoerkianum Rb. In Gebüsch, auf Weiden hin und wieder. Auf dem Kies der Kander bei Wimmis (Bamberger, nach

Rhiner). Niesen (Fischer-Ooster). Wahlalp am Stockhorn (Guthnick).

variegatum L. (*A. rostratum* Gaud.) Wie vorige. Niesen (Brown), Lattreienalp im Hintergrund des Suldtals (Vulpius), Saanen (von Rütte), Ganterisch und Stockhorn (Brown).

paniculatum Lam. (incl. *A. hebegynum* D.C. Gaud. und *A. cernuum* Rb.) Wie vorige: Giessbach. Rosenlaur (Brunner), Oberhasli! Grindelwald. Trachsellaunen! Schiltthal bei Mürren (Vulpius), Kandersteg (Shuttleworth, nach Rhiner), Gemmi (Gaudin), Saanen (Leresche), Stockhornkette.

•• *Lycotomum* L. In Gebüsch, an feuchten, waldigen Abhängen von der Waldgrenze bis an den Fuss der Berge häufig.

Anmerkung. Die Aconitum Arten sind zahlreichen, zum Theil als eigene Arten beschriebenen Abänderungen unterworfen, welche noch näher zu beobachten sind.

Actæa. Christophskraut.

•• *spicata* L. In Wäldern und Gebüsch der unteren Region hin und wieder. Grüsisberg bei Thun (Brown), Moosfluh bei Reutigen (Vulpius), Schwarzenmatt bei Boltigen! Unspunnen! Meiringen und Rosenlaur (Brunner) u. a. O.

Anmerkung. *Helleborus foetidus* L., im Jura gemein, scheint dem Oberland zu fehlen.

2. Berberideen.

Berberis. Sauerdorn.

* *vulgaris* L. *Erbsele*. In Hecken und Gebüsch der unteren Region ziemlich häufig; seltener in der mittleren Region, z. B. Stufensteinalp bei c. 1600^m (v. Rütte). — Auf Gneiss bei Sichelauenen!

3. Nymphaeaceen.

Nymphaea. Seerose.

* *alba* L. Häufig im Faulensee bei Ringgenberg!

Anmerkung. *Nuphar luteum* Sm. findet sich unweit der nördlichen Gebietsgrenze im Uebischi- und Amsoldingensee.

4. Papaveraceen.

Papaver. Mohn.

alpinum L. Im Geröll der höheren Region, selten. Gadmenschluh (Brunner), Brienzer Rothhorn (Hegetschweiler, Flora der Schweiz), Nordabhang der Spiegelgerten bei Zweisimmen (Gempeler). Am Fuss des Ganthorns bei St. Stephan (Imobersteg). — Gummfluh bei Saanen (ausserhalb der Gebietsgrenze).

* *Rhoeas* L. Auf Aeckern unter dem Getreide hin und wieder, z. B.: Thun, Oberhofen, Simmenthal (Maurer). Lauterbrunnen (Rhiner), Meiringen (Brunner).

* *dubium* L. Ebenso, z. B.: Oberhofen, Spiez! Meiringen (Brunner).

Chelidonium. Schöllkraut.

* *majus* L. Auf Schutt, in Hecken, an Mauern in der Nähe der Häuser häufig und stellenweise bis zur Buchengrenze aufsteigend. Glunten bei Beatenberg 1200^m! Gimmelwald 1300^m! — Auf Gneiss bei äusser Urweid (Hasli)! und Stechelberg im Lauterbrunnenthal!

5. Fumariaceen.

Corydalis. Lerchensporn.

* *cava* Schweigg. In Hecken und Obstgärten der unteren Region stellenweise häufig, z. B. Einigen! Spiez! Därligen (Dietrich).

fabacea Pers. Auf steinigem Weiden, selten: Justisthal an der südlichen Thalseite bei c. 1300^m (Vulpius). An der Stockhornkette an mehreren Stellen: Günzenen und Nüschleten (Vulpius), mittlerer Thalberg (Trachsel), Bunschneren am nördlichen Fuss des Niederhorns bei Boltigen (Maurer).

Anmerkung. *Corydalis lutea* D.C. verwildert an Mauern am Hünibach bei Thun.

Fumaria. Erdrauch.

* *officinalis* L. Auf cultiv. Boden, auf Schutt in der unteren Region häufig.

6. Cruciferen.

Nasturtium. Brunnenkresse.

- * *officinale* R. Brw. In der unteren Region, in Gräben und kleinen Bächen ziemlich häufig, z. B.: Spiez! Faulensee bei Ringgenberg! Winkel bei Innerkirchen! u. a. O.
- * *palustre* D.C. Auf Torfsümpfen der unteren Region, z. B.: Reutigenmoos (Brown), Meiringen (Brunner).

Barbaræa.

- * *vulgaris* R. Brw. An Gräben, auf Schutt der unteren Region hin und wieder, z. B. Reutigen. Meiringen (Brunner).

Turritis.

- *glabra* L. An steinigen Stellen der unteren Region selten. Gündlischwand im Lütschenthal (Imobersteg), Innerkirchen (Brunner).

Arabis. Gänsekraut.

- alpina* L. An feuchten, steinigen Orten, im Geröll der Alpenbäche, häufig von der oberen Region bis an den Fuss der Berge.
- sagittata* D.C. An steinigen Orten der unteren Region, selten. Am Eingang des Simmenthals und bei Ralligen (Brown).
- *hirsuta* Scop. An trockenen, steinigen Orten der unteren Region hin und wieder.
- ciliata* Koch (*A. alpestris* Rb. *A. arcuata* Shuttlew.) An steinigen Orten von der unteren bis in die obere Region. Wagnerenschlucht bei Interlaken (Hügli). Zwischen Eisenfluh und Sulsalp bei 1800^m (Fischer-Ooster), Steinberg im Lauterbrunnenthal (Brown), Meiringen und Rosenlauri (Brunner), Gemmi (Brown). Nicht selten an der Stockhornkette, z. B.: Nüenen (Brügger), Stockhorn (Fischer-Ooster). — Hohgant (Imobersteg).
- serpyllifolia* Vill. An felsigen Orten, selten. Schafloch im Justisthal (Fischer-Ooster), Gasterenclaus (Vulpus).

Turrita L. Auf Schutthalden der Simmenfluh bei Wimmis (Vulpius). An Kalkfelsen und Geröllhalden in der Wagnerenschlucht bei Interlaken! — Im Jura ziemlich verbreitet.

pumila Jacq. An felsigen Orten der höheren Region hin und wieder, z. B.: Hohgant (Imobersteg), Ralligstöcke (Fischer-Ooster), Burgfeld bei Beatenberg! Engstlenalp (Fischer-Ooster), Urnenalp im Urbachthal (auf Gneiss), Wellhorn und Fuss der Engelhörner (Brunner), Faulhorn (Brown), Dreispitz und Schwalmeren (Bamberger). Am Oeschenensee! Gemmi (Brown), Niesenhorn bei Lauenen (v. Rütte), Stockhorn (Vulpius).

bellidifolia Jacq. An feuchten Stellen der mittleren und oberen Region hin und wieder, z. B.: Justisthal (Vulpius), Engstlenalp (Fischer-Ooster), Breitenbodenalp bei Rosenlani! Faulhorn am Bachalpsee (Brown), Lattreienalp an der Schwalmeren (Vulpius), Mürren (Vulpius), Gemmi über Schwarrenbach (Brown), Niesenhorn bei Lauenen (v. Rütte). — Selten in der unteren Region (herabgeschwemmt), z. B. an der Simme bei Weissenbach (Maurer).

caerulea Hænke. An felsigen, etwas feuchten Stellen der höheren Alpen ziemlich selten: Wildgerst (Brunner). Zwischen Faulhorn und Schwarzhorn (Brown), Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster), Schilthorn am rothen Herd! Gemmi (Brown), Albristhorn bei Lenk (Meissner), Rawyl unweit des Sees und am Oldenhorn (Leresche). — Auch auf Gneiss: Grimsel (Brown).

Cardamine. Schaumkraut.

alpina Willd. An felsigen Orten der höheren, seltener der mittleren Region ziemlich häufig, z. B.: Hohstollen am Hasliberg! Susten! Grimsel (Brown), Urnenalp im Urbachthal! Wildgerst (Brunner), Faulhorn (Brown), Suleck (Fischer-Ooster), Männlifuh an der Niesenkette (Fischer-Ooster), Gemmi (Brown).

resedifolia L. Wie vorige, vorzugsweise auf quarzhaltigem Gestein, z. B.: Grimsel! Urbachthal! Gadmen! Faulhorn

(Brown), Ammerten im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Gasteren (Vulpius).

impatiens L. An steinigem, etwas schattigen Orten der unteren Region, stellenweise häufig, z. B.: Merligen (Christener), Zaun bei Meiringen! Unterhalb Guttannen (Rhiner). Zwischen Meiringen und Rosenlauri (Brunner), Grindelwald (Guthnick), Lauterbrunnen! Kandergrund! Simmenthal bei der Wimmisbrücke! und bei Erlenbach (Brown), Klus bei Boltigen (Lereche), Saanen (v. Rütte).

* *silvatica Link.* An Bächen und feuchten, schattigen Orten der unteren Region hin und wieder. Sigriswyl! Wagnerenschlucht bei Interlaken! Rosenlauri (Brunner).

* *hirsuta L.* Auf cultivirtem Boden hin und wieder. Thun! Oberhofen! Interlaken! Meiringen (Brunner).

* *pratensis L.* Auf etwas feuchten Wiesen häufig; stellenweise bis in die höhere Region, z. B.: Wengernalp bei 1885^m! Fallbodenhubel an der Kl. Scheideck bei 2160^m (Rothenbach).

* *amara L.* An Gräben und Bächen stellenweise häufig; von der Ebene bis in die mittlere Region, z. B. Waldeckallmend bei Beatenberg (1350^m)!

Dentaria. Zahnwurz.

•• *digitata Lam.* An waldigen Abhängen, in Schluchten hin und wieder, z. B.: Oberhofen (Fischer-Oster), Giessbach! Rosenlauri (Brunner)! Gasterenclaus bei Kandersteg (Vulpius), Boltigen (Maurer). Burgfluh bei Wimmis! Am Fuss der Stockhornkette bei Reutigen, Blumenstein u. a. O.

Sisymbrium. Rauke.

* *officinale Scop.* In der unteren Region, an Wegen, im Geröll, auf Schutt in der Nähe der Häuser, gemein.

Sophia L. Unter überhängenden Felsen am Oeschenensee, am Weg zur Oeschenenalp (c. 1600^m)! Schönbalm im Trümmletenthal bei c. 1470^m (Rothenbach). — Eine Pflanze der wärmeren Schweiz.

* *Alliaria Scop.* (*Alliaria officinalis* Andr.) In der unteren Region, an Wegen, in Hecken hin und wieder, z. B.: Hilterfingen (Brown), Goldiwyl! Gunten! Merligen! Interlaken! Meiringen (Brunner), Weissenbach bei Boltigen (Maurer).

* *Thalianum Gaud.* Auf Aeckern und mageren Grasplätzen der unteren Region, ziemlich selten. Goldiwyl bei Thun! Gunten und Merligen (Hügli), Innerkirchen (Brunner).

Brassica. Kohl.

* [*oleracea* L. Kohl. Kabis.] In mehreren Varietäten cultivirt; stellenweise noch in der mittleren (Mürren bis 1630^m)! und im unteren Theil der höheren Region (Engstlenalp, 1839^m, Stein im Gadmenthal, 1868^m) gedeihend.

* [*Rapa* L. Weisse Rübe.] Wie vorige. Kl. Scheideck (2069^m)! Grimsel (Kasthofer). — *Var. campestris.* Meiringen (Rhiner).

* [*Napus* L. Raps] In der unteren Region hin und wieder cultivirt.

Sinapis. Senf.

* *arvensis* L. Auf Aeckern der unteren und mittleren Region häufig, z. B. Mürren bei 1640^m!

Erucastrum. Rempe.

• *obtusangulum* Rb. An steinigen Orten der unteren Region ziemlich selten. Lauterbrunnen, am Weg nach Mürren! Meiringen (Guthnick), Kandersteg gegen den Oeschenensee (Fischer-Ooster), Saanen (Hügli).

• *Pollichii* Schp. et Spenn. Wie vorige. Zwischen Brienz und Meiringen!

Alyssum. Steinkraut.

* *calycinum* L. An steinigen Orten der unteren Region selten. Thun! Geröllhalden am Eingang des Simmenthals bei der Wimmisbrücke!

Anmerkung. *A. Wulfenianum* Bernh., Gemmi, (Bernoulli nach Gremlin) — wahrscheinlich Alpenform von *A. montanum* L., ist noch näher zu prüfen.

Lunaria. Mondviole.

rediviva L. In Gebüschcn der unteren Region selten: Kirchet bei Meiringen (Brown, Brunner), Rosenlaur und beim Weissenburgbad (Guthnick), Blumenstein im Fallbachtobel und im Sulzigraben (Vulpius).

Petrocallis. Steinschmüchel.

pyrenaica R. Brw. Auf den äusseren Kalkalpenketten, an vereinzeltcn, felsigen Standorten der höheren Region: Hohgant (Schläfli, Fankhauser), Stockhorn, in Felsritzen des Gipfels ziemlich häufig! Nünenen (Fankhauser), angeblich auch am Ganterisch (Trachsel). Gipfel der Gumfluh bei Saanen (Leresche). — Diese zierliche Pflanze tritt durch die ganze Alpenkette an vereinzeltcn Standorten auf und findet sich auf den Pyrenäen wieder.

Draba. Hungerblümchen.

aizoides L. An felsigen Orten der mittleren und oberen Region stellenweise häufig, z. B. Stockhorn! Nünenen (Trachsel), Faulhorn! u. a. O. — An einzelnen Stellen auch in der unteren Region, z. B. am Eingang des Simmenthals bei Wimmis (Brown), Klus bei Boltigen (Hügli), Saanen unter den Dorfflühen (v. Rütte).

lomentosa Wahl. An Felsen der höheren Region hin und wieder, z. B. Faulhorn (Brown), Schilthorn und Brünlihorn bei Mürren (Vulpius), Suleck! Schwalmeren (Bamberger), Lat-treienalp und Spiggengrund (Vulpius), Gemmi (Brown), Ganterisch (Trachsel), Sigriswyler-Rothhorn! — Selten tiefer, z. B. beim Rosenlauibad (Brunner) — Eine durch grössere, schneeweisse Blüten ausgezeichnete Form (*D. nivea* Saut. Flora 1855, p. 622) auf dem Rawyl (Vulpius).

frigida Saut. Wie vorige. Telliflüh bei der Engstlenalp (Fischer-Ooster), Grimsel (Brown), bei den Leitern im Urbachthal (Lindt), Faulhorn! Kalli am Vieschergletscher (Fischer-Ooster), Lauberhorn (Rothenbach). Am Grat zwischen der

Gemmi und dem Ueschenenthal (Vulpius), Niesen (Brown), Männlifluh und Rawyl (Fischer-Ooster), Gifferhorn bei Saanen. *Traunsteineri Hoppe.* In der höheren Region selten. — Suleck (Fischer-Ooster), Schwalmeren (Bamberger nach Rhiner), Rawyl (Vulpius).

Johannis Hort. (D. nivalis Gaud.) Wie vorige: Oberaarhorn, bei 3400^m (Lindt.), Faulhorn (Brunner), Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (v. Rütte), Schilthorn! Gemmi (Bamberger), Kiley (Bamberger) und Männlifluh an der Niesenkette (Fischer-Ooster), Gifferhorn bei Saanen!

Wahlenbergii Hartm. (D. fladnizensis et sclerophylla Gaud.) Wie vorige: Faulhorn! Suleck (Vulpius), Lat-treienalp (Vulpius), Gemmi (Gaud. Flor. helv.), Rawyl (Vulpius), Gifferhorn bei Saanen! Männlifluh an der Niesenkette (Fischer-Ooster).

incana L. (D. contorta Ehrh.) An Kalkfelsen der Süd- und Westseite des Ganterisch (1600^m—1900^m), von Dr. Trachsel entdeckt, auch von Vulpius und Leresche gefunden. — Soll auch an der Kaisereck vorkommen (Leresche); weiter westlich an der Körblifluh (Gremli). — Eine in Mitteleuropa sehr seltene, auch in den arktischen Ländern vorkommende Art.

* *verna L. (Erophila E. Mey.)* Auf Aeckern der unteren Region ziemlich selten. Hilterfingen! Spiez! Meiringen (Brunner).

Cochlearia. Löffelkraut.

officinalis L. An Quellen und Bächen selten. Horneckalp im Eriz (Dietrich). Früher häufig in Eriz, aber durch starke Ausbeutung meist ausgerottet (Trog, nach Rhiner). Justisthal (Brown), Rosenlauri (Brunner). In einer Quelle oberhalb des Ganterischsees und am Ufer desselben bei 1575^m (Maurer, Hügli). An einer kalten Quelle nordöstlich vom Schwefelbergbad (Muret).

- *saxatilis* Lam. (*Kerneria* Rb.) An Kalkfelsen der unteren und mittleren Region ziemlich häufig, z. B. am Eingang des Simmenthals bei Wimmis! Zwischen Merligen und Neuhaus! — Selten in der oberen Region: Moräne des Eiger-gletschers (Rothenbach).

Camelina. Leindotter.

- *sativa* Crantz. Auf Aeckern, besonders im Lein, hin und wieder — Schiltwald ob Lauterbrunnen, in Weizenäckern bei 1300^m!

dentata Pers. Wie vorige: Kandersteg (Guthnick), Saanen (v. Rütte.)

Thlaspi. Täschelkraut.

- * *arvense* L. Auf Aeckern und Wiesen von der Ebene bis in die mittlere Region hin und wieder, z. B.: Reichenbach im Frutigthal! Meiringen (Brunner), Wengen bei 1400^m!

* *perfoliatum* L. Wie vorige. Thun!

alpestre L. Gsteig bei Saanen (Vulpus). — Häufig bei Chateau d'Oex (Rapin).

rotundifolium Gaud. Im Geröll und Schutt der höheren Alpen ziemlich verbreitet, z. B.: Wellhorn bei Rosenlaur (Brunner), Dossenhorn, auf Gneiss (Lindt), Faulhorn! Suleck! Seinenfurke! Oeschenengrat! Gemmi u. Niesen (Brown), Männli-fluh (Fischer-Ooster). — Geröllhalden am Fuss der Gemshorn zwischen Ochsen und Bürglen (Hügli). Stellenweise weit über der Schneegrenze, z. B. am Schneeshorn an der Jungfrau c. 3000^m (Fellenberg). — Selten unterhalb der Baumgrenze, z. B.: am Weg von der Gemmenalp nach dem Justisthal bei c. 1630^m (Fischer-Ooster).

Biscutella. Brillenschote.

laevigata L. An felsigen Orten der mittleren und höheren Region der Kalkalpen ziemlich häufig. — Stellenweise bis in die Täler herabsteigend, so im Geröll der Kien bei Kienthal! An der Kander mündung (Brown). — Dem Jura fehlend.

Hutchinsia.

alpina R. Brw. An steinigem, etwas feuchten Orten der oberen Region gemein. — Stellenweise weit über die Schneelinie emporsteigend, z. B. Schneehorn an der Jungfrau bei c. 3000^m (Fellenberg). — Selten in der mittleren und unteren Region, z. B. Schwefelberg bei 1600^m (Hügli). Im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei c. 1000^m! — Auch auf Gneiss, z. B. Grimsel (Christener). — Im Jura nur auf den höchsten Gipfeln des südwestl. Theils.

Capsella. Hirtentäschel.

* *Bursa pastoris* Mönch. Auf Wiesen und cultivirtem Boden gemein; von der Ebene bis über die Baumgrenze aufsteigend. Mürren (1636^m)! Wengernalp bei 1876^m (Rothenbach). Am Faulhorn (Martins). — Auf Gneiss bei Inner Urweid!

Aethionema. Steintäschel.

saxatile R. Brw. Auf Kalkgeröllen der mittleren und unteren Region im Gebiete des Kander- und Simmenthales: Im unteren Gasterenthal! Gasterenclaus (Vulpius). Herabgeschwemmt in einzelnen Colonien auf dem Kies der Kander- und Mieschfluh! Am Fuss der Mieschfluh bei St. Stephan, c. 1800^m (Imobersteg). An der Simme bei Zweisimmen (Meissner), Weissenbach (Maurer). — Eine (auch an vereinzelten Standorten im Tessin, Wallis und im südlichen Jura vorkommende) südeuropäische Pflanze.

Raphanus. Rettig.

* [*sativus* L.] In Gärten cultivirt.

* *Raphanistrum* L. (*Raphanistrum Lampsana* Gärtner.)

Auf Aeckern hin und wieder, z. B. Thun! Spiez! Zuweilen bis in die mittlere Region: Obersimmenthal (Maurer).

Anmerkung. Vereinzelt und vorübergehend angesiedelt:

Rapistrum rugosum All. Thun! — *Neslea paniculata*

Desv. Unterbach bei Meiringen (Brunner). — *Isatis*

tinctoria L. Meiringen (Brunner), Reichenbach im Simmenthal (Maurer). — *Diplotaxis muralis* D. C. auf Kiesboden, selten (Brown). — *Lepidium campestre* R. Brw. An cultivirten Orten (Brown)

7. Cistineen.

Helianthemum. Sonnenröschen.

Fumana Mill. Auf sonnigen Kalkfelsen am Thunersee, zwischen Neuhaus und der Beatenhöhle (Brown)! ebenso bei Meiringen (Brunner)! — Eine Pflanze der wärmeren Schweiz.

oelandicum Wahl. (*var. glabrum et var. hirtum* Koch). An steinigen Orten der mittleren und höheren Region ziemlich verbreitet, z. B. Ralligstöcke (Fischer-Ooster), Rosenloui (Brunner), Kl. Scheideck (Rothenbach), Faulhorn (Martins), Mürren (Vulpius), Gemmi (Gaud.).

* *vulgare* Gärtn. An steinigen Orten von der Ebene bis in die höhere Region gemein, bes. *var. grandiflorum* Koch.

8. Violarieen.

Viola. Veilchen.

•• *palustris* L. Auf sumpfigen Weiden, bes. auf Torfboden, bis in die obere Region stellenweise häufig, z. B. Wengernalp bei 1885^m! Grimsel, auf Torfboden unweit des Spitals!

* *hirta* L. In Hecken und Gebüschern der unteren und mittleren Region häufig. — *Var. alba* bei Meiringen (Brunner).

* *odorata* L. In Hecken und Gebüschern der unteren Region häufig.

•• *arenaria* D.C. An Ufern, selten. Bei Därligen (Dietrich).

* *silvestris* Lam. In Wäldern und Gebüschern der unteren und mittleren Region häufig.

•• *canina* L. Auf Weiden und Heideplätzen hin und wieder. — *Var. ericetorum*, Grüsisberg bei Thun.

•• *biflora* L. An schattigen Stellen, am Grunde feuchter Felsen, in der mittleren und höheren Region stellenweise häufig.

— An einzelnen Stellen bis in die Ebene herabsteigend, z. B. an der Burgfluh bei Wimmis! Kanderdüngung!

* *tricolor* L. *Stiefmütterchen*. Auf Aeckern und Wiesen der Ebene und Voralpen gemein. — In vielen Varietäten.

lutea Sm. (*V. grandiflora* Huds.) Auf Wiesen und Weiden der mittleren und oberen Region stellenweise häufig: Hohstollen, Joch (Fischer-Ooster). Häufig auf Wiesen bei Mürren! Trüttlisberg zwischen Lenk und Lauenen (Vulpus). Auf der Stockhornkette ziemlich verbreitet: Wallopalp! Bürglen (Leresche), Ochsen und Nünenen (Brügger), Gantersch (Vulpus), Stockhorn! Sohlhorn (Vulpus). — Fehlt dem Jura.

calcarata L. Auf Alpenweiden der höheren Region, auf den meisten Alpen gemein; in mehreren Varietäten. — Im Jura auf einigen Gipfeln des südwestl. Theils.

cenisia L. Im Geröll der höheren Alpen, ziemlich selten: Schwarzhorn am blauen Gletscher! Wildgerst (Brunner), Wengernalp am Rothstock und an der Moräne des Eiger-gletschers (Rothenbach), Schilthorn am rothen Herd! Dreispitz (Brown), Glütschalp an der Schwalmeren und Lobhorn (Vulpus), Gemmi am Lämmerengletscher (Brown), Oeschenensee (in Freunden)! Am Uebergang von Ueschenen nach Adelboden (Vulpus). Alpen von Lauenen und Gsteig (Vulpus). —

Anmerkung. *V. mirabilis* L., nach Brown unweit der nördl. Gebietsgränze. (Rossweid bei Thun, in Hecken bei Thierachern, Kandergrien), wurde in neuerer Zeit nicht mehr gefunden. — Die Angabe von *V. collina* an der Simmenfluh bei Wimmis bedarf der Bestätigung.

9. Resedaceen.

Reseda.

•• *lutea* L. An warmen, steinigen Orten der unteren Region hin und wieder, z. B. Thun! Neuhaus im Geröll des Lom-bachs! Goldei bei Interlaken!

- *luteola* L. Ebenso: Bei der Beatushöhle (Brown), Goldei bei Interlaken! Meiringen (Brunner).

10. Droseraceen.

Drosera. Sonnentau.

- * *rotundifolia* L. Auf Torfmooren der unteren Region ziemlich selten. Reutigenmoos! Waldeck bei Beatenberg bei 1200^m! Saanenmööser (Maurer).
- *longifolia* Hayne. (*D. anglica* Huds.) Auf Sumpfboden in der unteren und mittleren Region hin und wieder. Pohlerenmoos bei Blumenstein! Faulenseemoos bei Spiez! Grimsel auf Torf im Spitalboden c. 1825^m! Sumpf auf dem Bruchberg bei Boltigen (Maurer).

Parnassia.

- * *palustris* L. Auf Sumpfboden und feuchten Weiden von der Ebene bis in die höhere Region häufig.

11. Polygaleen.

Polygala. Kreuzblume.

- * *vulgaris* L. Auf trockenen Grasplätzen, an Waldrändern von der Ebene bis in die obere Region gemein.
- *comosa* Schk. Wie vorige, aber seltener, z. B. zwischen Brienz und Meiringen (Hügli), Obersimmenthal (Maurer).
- depressa* Wend. Bei Thun (Fischer-Ooster). — Eine in den Voralpen und im Jura an zerstreuten Standorten vorkommende Pflanze.
- * *amara* L. Auf Sumpfwiesen häufig. — *Var. alpestris* (*P. alpestris* Rb.) auf Alpenweiden.
- *Chamaebuxus* L. In lichten Wäldern, an steinigen Abhängen häufig; vom Fuss der Berge bis in die höhere Region, z. B. Wengernalp am Eigergletscher 1920^m (Rothenbach). — Im nördlich vorliegenden Hügelland am Gurnigel und im Kandergrien bei Thun, weiter nördlich nur noch herabgeschwemmt. — Im Jura selten.

12. Caryophyllen.

a. Sileneen.

Gypsophila. Gypskraut.

- *repens* L. An kiesigen Orten, im Geröll der Bäche von der höheren Region bis an den Fuss der Berge häufig. — Mit den Flüssen bis in die Ebene herabgeschwemmt.

Dianthus. Nelke.

silvestris Wulf. An Felsen von der Ebene bis in die höhere Region stellenweise häufig; vorzugsweise auf Kalkstein, z. B. zwischen Neuhaus und Sundlauenen! Goldei bei Interlaken! Wetterhorn am Gleckstein 2300^m (Lindt), Stockhornkette am Leiterengrat zwischen Ganterisch und Nünenen (Trachsel), Wandelifuh bei Boltigen (Maurer) und am Weg zur Wallopalp! u. a. O. — Auf Nagelfuh am Jakobshubel bei Thun (Brown). Gr. Scheideck (Brown). Auf Gneiss an Felsköpfen bei Innerkirchen!

- *superbus* L. An steinigen Orten, in Gebüsch von der unteren bis in die obere Region, hin und wieder; auf Nagelfuh und Kalkstein, z. B. häufig am Grüsisberg und bei Hilterfingen (Brown). An der Stockhornkette an mehreren Stellen, Stockhorn bei 2000^m (Fischer-Ooster) u. a. O.

Anmerkung. *D. barbatus* L. Verwildert am Grüsisberg bei Thun (Fischer-Ooster).

Saponaria. Seifenkraut.

- * *officinalis* L. An Hecken, Mauern und Waldrändern an wärmeren Stellen der unteren Region, hin und wieder, z. B. Thun! Interlaken! u. a. O.
- *ocymoides* L. An steinigen Orten, im Geröll an sonnigen Abhängen der unteren Region, stellenweise häufig, z. B.: am Eingang des Simmenthals bei Wimmis! Spiez! Zwischen Merligen und Neuhaus! Goldei bei Interlaken! Meiringen (Brunner) u. a. O.

Anmerkung. *Vaccaria parviflora* Mönch. (*Saponaria Vaccaria* L.) hin und wieder im Getreide: Meiringen (Brunner), Obersimmenthal (Maurer).

Silene. Leimkraut.

* *nulans* L. An Wegen und steinigen Orten von der Ebene bis zur Waldgrenze ziemlich häufig. — Mettlenalp (bei Wengernalp) 1700^m! — Auf Gneiss am Eingange des Urbachthals! und bei Trachsellaunen!

* *inflata* Sm. Auf Wiesen und Weiden gemein; bis in die obere Region aufsteigend, z. B. Kl. Scheideck (2069)! Obere Oeschenenalp (2300)! Am Faulhorn Gipfel (Martins).

quadrifida L. An felsigen Orten hin und wieder. Grüenberg zwischen Eriz und Habkern (Imobersteg), Hohgant (Schläfli), Grindelwald am Eiger (Christener). An der First im oberen Suldthal! Gemmi (Brown), Alpen von Gsteig und Launen (Leresche). Stockhornkette an der Nünenen (Brügger) und an der Tschingelfuh (Trachsel). — Im Jura am Reculet.

rupestris L. Auf sandigem Boden und quarzhaltigem Gestein (Gneiss, Quarzsandstein, Eisenstein) vom Fuss der Berge bis in die höhere Region, stellenweise häufig, z. B. Hohgant (Schläfli). Auf erratischem Schutt auf dem Kirchet bei Meiringen! Oberhasli von Innerkirchen bis auf die Grimsel! Gaden- und Urbachthal! Gr. Scheideck! Faulhorn über Grindelwald! Am Wengernalpweg oberhalb Wengen! Annerten im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Gasteren! Gemmi über Schwarrenbach (Brown). — Im Jura am Passwang.

acaulis L. Auf Erde, in Felsritzen und auf Blöcken der oberen Region ~~überall~~ häufig, stellenweise weit über die Schneelinie aufsteigend, z. B. bei der Clubhütte am Eiger, 2800^m (Lindt), Schreehorn an der Jungfrau, 3350^m (Fellenberg). Selten unterhalb der Waldgrenze: Mettlenalp (bei Wengernalp) bei c. 1700^m! Im Geröll am Fuss des un-

teren Grindelwaldgletschers bei c. 1000^m! — Fehlt dem Jura.

Anmerkung. *S. gallica* L. Auf Aeckern, selten (mit fremdem Samen eingeführt), z. B. im Lein bei Beatenberg! *Silene noctiflora* L. (*Melandryum* Fr.) Wie vorige: Oberhofen (Guthnick), Weissenbach bei Boltigen (Maurer).

Viscaria. Pechnelke.

alpina Fr. (*Lychnis* L.) Bisher nur in den Bergen oberhalb Kienthal (Dick, Haller En. plant.) und auf der Gemmi am Lämmerengletscher (Brown) gefunden. — Eine Pflanze der südlicheren Alpenketten.

Lychnis. Lichtnelke.

* *Flos cuculi* L. Auf feuchten Wiesen der Ebene und Voralpen gemein. — Schwefelberg bei 1400^m (Hügli).

Melandryum.

* *album* Garcke (*Lychnis vespertina* Sibth.) Auf Aeckern, an Wegen der unteren Region hin und wieder. Thun! Interlaken! u. a. O. — Viel häufiger im nördlich vorliegenden Hügelland.

* *rubrum* Garcke (*Lychnis diurna* Sibth.) Auf feuchten Wiesen und Weiden der Voralpen häufig; stellenweise bis an den Fuss der Berge, z. B. auf Wiesen bei Unspunnen! Auch in der höheren Region, z. B. Kl. Scheideck an gedüngten Stellen, 2070^m!

Agrostemma. Kornrade.

* *Githago* L. Im Getreide, stellenweise häufig. Thun! Spiez! Guttannen bei 1050^m! Beatenberg, 1300^m!

b. **Alsineen.**

Sagina. Mastkraut.

* *procumbens* L. Auf Aeckern, an Mauern und Wegen häufig; von der Ebene bis in die obere Region, z. B. Gemmenalhorn, 2064^m!

saxatilis Wimmer (*S. Linnæi* Presl. *Spergula saginoides* L.) An etwas feuchten Stellen der Alpen und Voralpen hin und wieder, z. B. Rosenlaur (Fischer-Ooster), Faulhorn (Martins), Wengernalp! Ochsen (Trachsel).

Spergula. Spark.

* *arvensis* L. Auf Aeckern, unter dem Getreide, ziemlich häufig. Wengen bis c. 1450^m!

Spergularia.

•• *rubra* Presl. (*Lepigonum* Wahl.) Auf sandigem Boden im Gneissgebiet, selten. Zwischen Guttannen und Handeck (Fankhauser), Räterichsboden zwischen Handeck und Grimsel (Guthnick).

Alsine. Miere.

laricifolia Wahl. An felsigen Orten der höheren Region, selten: Stufensteinalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals, auf Gneiss (Fischer-Ooster), Trachsellaunen (Guthnick), Gemmi (Gaud. Flor. helv.).

verna Bartling. An steinigen Orten der mittleren und oberen Region gemein.

Cherleri Fenzl. (*Cherleria sedoides* L.) An felsigen Orten der höheren Region ziemlich verbreitet und stellenweise weit über die Schneelinie aufsteigend; auf verschiedenem Gestein. — Fehlt dem Jura.

Anmerkung. *A. Villarsii* Mert. Koch, nach Haller in der Klus bei Kandersteg, wurde in neuerer Zeit nicht wieder gefunden. — Eine (auch dem Wallis fehlende) Pflanze der südlicheren Alpenketten.

Mehringia.

muscosa L. In steinigen Wäldern, an schattigen Felsblöcken und Mauern der unteren und mittleren Region häufig, besonders auf Kalkstein.

polygonoides Mert. et Koch. Auf steinigen Weiden, im Geröll der höheren Alpen, stellenweise häufig, z. B. Engstlen-

Alp. Rosenloui (Brunner), Faulhorn (Martins), Trümmletenthal am Fuss des Mönch! Suleck! Gemmi und Niesen (Brown) u. a. O. — Eine Var. mit fast sitzenden Blüthen auf der Schwalmeren (Fischer-Ooster).

* *trinervia* Clairv. In Hecken, an Waldrändern, in der Nähe der Häuser; von der Ebene bis in die mittlere Region, z. B. Mürren 1630^m!

Arenaria. Sandkraut.

* *serpyllifolia* L. An Mauern und Wegen, auf Aeckern in der unteren Region häufig. — Wengen bei 1300^m!

ciliata L. An Felsen und steinigen Orten der mittleren und oberen Region gemein. — Stellenweise bis an den Fuss der Berge, z. B. im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers, 1000^m! Vereinzelt im Strassenkies zwischen Leissigen und Spiez! — Im Jura selten.

biflora L. Auf quarzhaltigem Gestein der höheren Alpen, selten: Susten (Bamberger), Windeck am Triftgletscher! Grimsel (Guthnick). Am Unteraargletscher (Girard nach Desor), Urnenalp im Urbachthal! Berge bei Rosenloui (Brunner), Zäsenberghorn am Grindelwalder Eismeer (Fellenberg), Faulhorn (Martins).

Stellaria. Sternmiere.

cerastoides L. (*Cerastium trigynum* Vill.) An etwas feuchten Orten der höheren Region hin und wieder. Engstlenalp (Fischer-Ooster), Susten (Prof. Brunner), Grimsel (Vulpis), Faulhorn! Wengernalp! Männlifuh an der Niesenkette (Fischer-Ooster), Oldenhorn (Leresche).

•• *nemorum* L. An feuchten, schattigen Stellen der unteren und mittleren Region, hin und wieder, z. B.: Schwefelberg 1400^m (Hügli), Gemmi oberhalb Kandersteg, Bürglialp im Kienthal bei c. 1620^m! Trachsellaunen! Wengwald bei Wengen! Rosenloui (Brunner).

* *media* Vill. Auf cultivirtem Boden, in Gärten und Aeckern, in der Nähe der Häuser gemein. — Auch in den Alpen, z. B.: Mettlenalp (bei Wengernalp) bei 1700^m! Am Faulhorn-gipfel (Martins).

* *graminea* L. In Hecken, auf Aeckern, an Wegen der unteren und mittleren Region gemein. — Wengen im Getreide bis c. 1450^m!

.. *uliginosa* Murr. In feuchten Wäldern, an Wegen und Gräben hin und wieder, von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Wengernalp bei 1885^m!

Malachium. Weichkraut.

* *aquaticum* Fries. An Gräben und sumpfigen Stellen, besonders auf Torfboden, stellenweise häufig, z. B.: Thun! Reutigenmoos! Brienz! Sulwald ob Eisenfluh! Hahneckwald bei Wengernalp (Rothenbach).

Cerastium. Hornkraut.

.. *glomeratum* Thuill. Auf Aeckern hin und wieder. — Waldeck bei Beatenberg bei 1200^m!

* *triviale* Link. Auf cultivirtem Boden gemein; bis in die höhere Region aufsteigend, z. B. Kl. Scheideck, an gedüngten Stellen, 2069^m!

latifolium L. Im Geröll der höheren Alpen stellenweise häufig, z. B. Grimsel (Seringe), Faulhorn! Suleck! Gemmi (Brown). — Stellenweise weit über die Schneelinie: Oberaarhorn bei 3400^m (Lindt), Schneehorn an der Jungfrau bei c. 3000^m (Fellenberg). — *Var. glaciale* (*C. glaciale* Gaud.) Auf den höheren Alpen hin und wieder.

alpinum L. An steinigen Orten der höheren Region, hin und wieder. Gemmi (Seringe), Ganterisch (Vulpinus), Nünenen (Trachsel), Stockhorn (Seringe). — In den N. Polarländern bis zum 80°.

- * *arvense* L. An Wegen und Waldrändern, hin und wieder.
— *Var. strictum* auf Weiden und an steinigen Orten der
mittleren und oberen Region gemein.

c. **Sclerantheen.**

Scleranthus. Knäuel.

- * *annuus* L. Auf sandigen Aeckern der unteren Region hin
und wieder, z. B. Oberhasli an mehreren Stellen! — Beaten-
berg bei 1260^m!

13. Lineen.

Linum. Lein.

- * [*usitatissimum* L. *Lein. Flachs.*] Häufig cultivirt. Stellen-
weise bis in die mittlere Region, z. B. Beatenberg bis 1336^m!
Lauenen bis über 1500^m (Hunziker), Mürren bis 1640^m!

alpinum Jacq. *var. montanum* Koch. (*L. montanum*
Schleich.) Auf Alpenweiden des westlichen Gebietes, sel-
ten. Am Leiterengrat zwischen Ganterisch und Nünenen
(Trachsel), Südseite des Ganterisch (Brügger), Bürglen (Vul-
pius). — Oldenhorn (Vulpus), Sanetsch (Brown).

- * *catharticum* L. Auf mageren Wiesen und Weiden, von der
Ebene bis in die obere Region gemein. — N. Abhang des
Männlichen bei c. 2000^m! — Auf Granitsand bei Trachsel-
lauenen!

14. Malvaceen.

Malva. Malve.

- *Alcea* L. An Wegen und Hecken der unteren Region selten.
Meiringen (Brunner).
- * *moschata* L. An Wegen und Hecken hin und wieder, z. B.
Thun! Hilterfingen, Reutigen, Wimmis (Brown), Simmen-
thal an mehreren Stellen.
- * *silvestris* L. An Wegen, auf Schutt in der unteren Region:
Thun! Oberhofen! Ringgenberg! u. a. O.
- * *vulgaris* Fr. (*M. neglecta* Wallr.) An Mauern, auf Schutt
in der Nähe der Häuser ziemlich häufig; Wengen bei 1300^m!
— Oberhasli auf Gneiss!

Althæa. Eibisch.

* [*officinalis* L.] In Gärten häufig cultivirt.

15. Tiliaceen.

Tilia. Linde.

* *grandifolia* Ehrh. (*T. platyphylla* Scop.) *Sommerlinde*.

In der unteren Region hin und wieder, meist in einzelnen Exemplaren in der Nähe der Häuser. — Wengen bei 1200^m!

* *parvifolia* Ehrh. (*T. ulmifolia* Scop.) *Winterlinde*. Wie vorige. Häufig auf dem Brünig (Brown).

16. Hypericineen.

Hypericum. Hartheu.

* *perforatum* L. Auf Wiesen und Weiden der unteren und mittleren Region gemein.

* *humifusum* L. An Wegen, auf Aeckern und Heideplätzen der unteren Region hin und wieder, z. B. Thun (Brown), Spiez! Meiringen (Brunner). — Beatenberg bei 1200^m!

* *quadrangulum* L. An feuchten Stellen, von der Ebene bis in die obere Region hin und wieder. — Mürren in der Nähe der Holzgränze! Stockhorn (Fischer-Ooster).

* *tetrapterum* Fries. An feuchten Stellen, hin und wieder.

•• *montanum* L. In lichten Wäldern und Gebüsch von der Ebene bis zur Buchengrenze stellenweise häufig, z. B. Wimmis! Interlaken! Lauterbrunnenthal! Beatenberg! u. a. O.

•• *hirsutum* L. An feuchten Stellen, in Gebüsch, an Gräben, in der unteren Region hin und wieder! Zwischen Wimmis und Reutigen!

17. Acerineen.

Acer. Ahorn.

* *Pseudoplatanus* L. *Bergahorn*. Einzeln und in lichten Beständen von der Ebene bis in die mittlere Region häufig! In vielen Alpenthälern in der Nähe und z. Thl. oberhalb der Buchengrenze in kräftigen Exemplaren gesellig auf-

tretend. — Oberhasli bis c. 1000^m! Wengen und Saxeten über 1300^m! Alpiglen zwischen Grindelwald und der Kl. Scheideck bei c. 1580^m! Gadmenthal bis 1600^m (Rätzer).

* *platanoides* L. *Spitzahorn*. *Lenne*. In der unteren Region hin und wieder, meist angepflanzt, z. B. Thun! Interlaken! Grindelwald (Guthnick), Lenk (Meissner).

* *campestre* L. *Feldahorn*. *Massholder*. An Waldrändern, Gebüsch und Hecken, von der Ebene bis zur Buchengrenze häufig. — Beatenberg bei der Kirche (1150^m)!

18. Hippocastaneen.

Aesculus. Rosskastanie.

* [*Hippocastanum* L.] In der unteren Region hin und wieder cultivirt. Beatenberg beim Pfarrhause ein kräftiges Exemplar bei 1148^m!

19. Ampelideen.

Vitis. Weinstock.

[*vinifera* L.] An geschützten, sonnigen Lagen am Thunersee stellenweise (in Weinbergen) cultivirt: Thun, Hilterfingen, Oberhofen, Gunten (bis c. 720^m ansteigend), Merligen. In geringerer Ausdehnung am westlichen Ufer: Im Ghei zwischen Einigen und Spiez. Am Südabhang des Spiezberges und bei Faulensee. — Ausserhalb dieser Bezirke wird der Weinstock noch hin und wieder in wärmeren Lagen am Spalier gezogen.

20. Geraniaceen.

Geranium. Storchschnabel.

•• *phæum* L. (*var. lividum* Koch. *G. lividum* L'Hérit.) In Gebüsch, auf Wiesen und Grasplätzen, besonders im westlichen Gebiet an vereinzelt Stellen häufig: Thalberg an der Stockhornkette (Lehrer Langhans), Waldried bei Oberwyl (Maurer). Am Weg von der Boltigenklus zur Wallopalp von 1300^m—1670^m stellenweise sehr häufig! Am Fuss

des Niesen bei Wimmis (Brown), Kandergrund (Vulpus), Gemmi über Kandersteg (Brown). — Faulhorn über Iseltwald (Brown).

- *silvaticum* L. Auf Wiesen und Weiden der Voralpen gemein; oft bis an den Fuss der Berge, z. B. bei Wimmis! Spiez! Därligen! Wilderswyl! u. a. O. Auch an etwas feuchten Stellen der oberen Region, z. B. Gipfel des Männlichen 2345^m!
- * *palustre* L. An feuchten Orten der unteren Region, in Hecken und an Gräben hin und wieder, z. B. am Bächihölzli bei Thun (Brown), Stockenthal! Unteres Lauterbrunnenthal! Häufig zwischen Brienz und Meiringen! u. a. O.
- *sanguineum* L. Auf sonnigen Kalkfelsen und Geröllhalden, in Gebüsch und lichtigem Wald im wärmeren Theil der unteren Region stellenweise sehr häufig, z. B. zwischen Merligen und Neuhaus! Goldei bei Interlaken! Brienz! Innerkirchen (Brunner). An sonnigen Felsen zwischen Reichenbach und Wallopalp (Maurer)!
- * *pyrenaicum* L. In Hecken, an Mauern und steinigen Orten der unteren und mittleren Region häufig; stellenweise bis gegen die Waldgrenze aufsteigend. Mettlenalp (bei Wengernalp) 1700^m! Bärwengi am Männlichen 1820^m!
- * *pusillum* L. In der unteren Region an Mauern, an Wegen, auf Schutt, hin und wieder, z. B. Thun! Meiringen (Brunner).
- * *dissectum* L. In der unteren Region auf Aeckern, im Getreide, ziemlich häufig.
- * *columbinum* L. Ebenso.
- *molle* L. An Wegen und Mauern der unteren Region hin und wieder, z. B. Hilterfingen (Brown), Spiez! Interlaken!
- * *Robertianum* L. An schattigen Mauern und Felsen, im Geröll der unteren und mittleren Region häufig; seltener in der oberen Region, z. B. Wengernalp am Eigergletscher (Rothenbach). — Auf Gneiss bei Trachsellauen und im Oberhasli! —

Erodium. Reiherschnabel.

- .. *cicutarium* L'Hérit. An sonnigen, steinigen Orten in der Goldei bei Interlaken! selten.

21. Balsamineen.

Impatiens. Springkraut.

- .. *Noli-tangere* L. In der unteren Region an feuchten, schattigen Orten, im Geröll stellenweise häufig, z. B. Thun gegen Steffisburg! Burgfluh bei Wimmis! Niesen oberhalb Heustrich! Hondrichberg bei Spiez! Wagnerenschlucht bei Interlaken! Geröll der Lütschine oberhalb Lauterbrunnen! Brienz! Ob.-Hasli zwischen Innerkirchen und Urweid! Saanen u. a. O.

Anmerkung. *I. parviflora* D. C. Häufig an der Brücke bei Weissenburg (Hügli)! — Aus Asien stammend, an mehreren Stellen in Mittel- und Nord-Europa verwildert; auch in der Schweiz an mehreren Standorten beobachtet.

22. Oxalideen.

Oxalis. Sauerklee.

- * *Acetosella* L. In Wäldern der unteren und mittleren Region gemein. — Mettlenalp (bei Wengernalp) bis c. 1800^m! — Auf Gneiss bei Trachsellauen! und Handeck!

Anmerkung. *O. stricta* L. Häufig auf einem Acker am Fuss des Jakobshubels bei Thun! — Aus N.-Amerika stammend.

23. Celastrineen.

Evonymus. Spindelbaum.

- * *europæa* L. In Hecken, an Waldrändern der unteren Region hin und wieder.

24. Rhamneen.

Rhamnus. Wegdorn.

- * *cathartica* L. *Kreuzdorn.* In Gebüsch, an Ufern der unteren Region ziemlich häufig; bis gegen die Buchengrenze

aufsteigend. Häufig an sonnigen Felsen zwischen Neuhaus und Sundlauenen!

alpina L. An felsigen Abhängen, auf Geröllhalden hin und wieder. Bei der Beatenhöhle! Eingang des Simmenthals bei Wimmis! Günzenen (Vulpius). Klus bei Boltigen! Oberhalb der Blankenburg bei Zweisimmen (Rhiner).

pumila L. An steinigen Abhängen, in Felsritzen von der unteren bis in die obere Region hin und wieder, z. B. Ralligstöcke (Fischer-Ooster). Meiringen und Rosenlaur (Brunner), Faulhorn (Guthnick), Wengernalp am Eiger- gletscher (Rothenbach), Stufensteinalp im Lauterbrunnenthal c. 1600^m (v. Rütte), Wandelifuh bei Boltigen (Hügli), Südseite des Stockhorns (Brown, Guthnick).

* *Frangula* L. (*Frangula Alnus* Mill.) *Faulbaum*. In Gebüsch, an Ufern, von der Ebene bis gegen die Buchengrenze ziemlich häufig. — Beatenberg bei 1250^m!

25. Papilionaceen.

Genista. Ginster.

.. *sagittalis* L. (*Cytisus* Koch). An sonnigen Waldrändern, selten. Meiringen (Brunner). Zwischen Saanen und Abläntschen (v. Rütte). — Häufig im Jura.

Cytisus.

alpinus Mill. Im Tschertschisthal bei Saanen (v. Rütte). — Eine Pflanze der südwestl. Schweiz.

Ononis. Hauhechel.

* *spinosa* L. An Wegen, auf Weiden, in der unteren Region gemein.

* *repens* L. (*O. procurrens* Wallr.) Ebenso. Wengen bei 1300^m!

Anmerkung. *O. rotundifolia* L., nach Suter (Gaud. Flor. helv.) auf der Gemmi, wahrscheinlich am Südabhang (ausserhalb der Gebietsgrenze).

Anthyllis. Wundklee.

- * *Vulneraria* L. Auf Wiesen und Weiden gemein; von der Ebene bis in die höhere Region.

Medicago. Schneckenklee.

- * [*sativa* L. *Luzerne*]. In der unteren Region häufig cultivirt.
- * *lupulina* L. Auf Grasplätzen der unteren und mittleren Region gemein. — Am Männlichen bei 1800^m!

Melilotus. Honigklee.

- * *macrorrhizus* Pers. An Gräben und etwas feuchten Stellen der unteren Region hin und wieder.
- * *albus* Desr. An steinigten Orten der unteren Region stellenweise häufig, z. B. Thun! Wilderswyl! Lütschenthal!
- * *officinalis* Desr. (*M. arvensis* Wallr.) Ebenso: Thun! Interlaken! Brienz! Auf Gneiss bei Urweid (Ob.-Hasli)!

Trifolium. Klee.

- * *pratense* L. Auf Wiesen und Weiden von der Ebene bis in die obere Region gemein. — Gipfel des Männlichen 2345^m! Am Faulhorn (Martins). — *Var. nivale*, Grimsel, im Aargerröll! u. a. O.
- * *medium* L. An Waldrändern, in Gebüsch der unteren und mittleren Region häufig.
- rubens* L. An sonnigen, felsigen Orten, in Gebüsch der unteren Region: Am Thunersee zwischen Neuhaus und Merligen! (von der Normalform durch zottig behaarte Stengel und Blattstiele abweichend). Lütschenthal (Brown). Zwischen Meiringen und Innerkirchen!
- * *arvense* L. In der unteren Region auf Aeckern, an Wegen, selten. Thun!
- * *fragiferum* L. Auf Sumpfwiesen, längs der Wege und Gräben, ziemlich selten. Reutigenmoos bei Glütsch! Neuhaus! Bönigen! Moosrain bei Ringgenberg!
- alpinum* L. Auf Weiden der oberen und theilweise auch der mittleren Region ziemlich verbreitet und stellenweise

sehr häufig, z. B. Hohstollen am Hasliberg! Oberhasli oberhalb der Handeck! und am Unteraargletscher (Girard nach Desor). Rosenlauri (Brunner), Faulhorn unterhalb der Bachalp, bis in die Waldregion c. 1700^m herab! Wetterhorn am Gleckstein 2250—2300^m (Lindt), Wengernalp bis gegen Wengen (c. 1400^m) herab. Mürren, häufig am Weg nach Gummelen! Bondalp im Kienthal! Gemmi (Gaud.), Bühlberg bei Lenk! Sanetsch und Trüttlisberg (Leresche), Niesen (Vulpius). — Auf den äusseren Kalkketten selten. Stockhorn (Gaud. Flor. helv.) — Unterhalb der Buchengrenze zwischen Falcheren und Zaun (bei Meiringen) c. 1150^m! — Fehlt dem Jura.

•• *montanum* L. Auf Weiden, an Wegen der unteren und mittleren Region gemein.

* *repens* L. Auf Grasplätzen von der Ebene bis in die höhere Region gemein. — Gipfel des Männlichen, 2345^m!

pallescens Schreb. Am Unteraargletscher (Girard nach Desor).

caespitosum Reyn. An etwas feuchten Stellen, im Geröll der mittleren und oberen Region, häufig, stellenweise auch tiefer, z. B. im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei c. 1000^m!

badium Schreb. Auf Weiden und Grasplätzen der mittleren und oberen Region ziemlich häufig; stellenweise in der unteren Region, z. B. im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei c. 1000^m!

* *agrarium* L. (*T. aureum* Poll.) In der unteren Region, an Wegen, auf Aeckern hin und wieder, z. B. Därligen! Meiringen (Hügli), Oberhasli!

* *procumbens* L. (*T. campestre* Schreb.) Auf Wiesen, an Wegen, hin und wieder.

* *minus* Relhan. (*T. filiforme* Koch). An feuchten Grasplätzen hin und wieder. Meiringen (Brunner).

Lotus. Schotenklee.

* *corniculatus* L. Auf Grasplätzen von der Ebene bis in die obere Region gemein.

* *uliginosus* Schkuhr. An sumpfigen Stellen der unteren Region, hin und wieder. Stockenthal! Zwischen Goldiwyl und Teufenthal! Meiringen (Brunner).

Tetragonolobus. Spargelerbse.

* *siliquosus* Roth. Auf etwas feuchten Grasplätzen der unteren Region, stellenweise häufig, z. B. Reutigenmoos! Kanderermündung! Obersimmenthal (Rhiner), Interlaken Brienz! u. a. O.

Robinia. Robinie, Akazie.

* [*Pseudacacia* L.] In der unteren Region, bei Häusern, an Strassen und Dämmen häufig cultivirt.

Phaca. Berglinse.

frigida L. An felsigen Orten der oberen Region stellenweise häufig, z. B. Wellhorn bei Rosenlauri (Brunner), Faulhorn! Trümmletenthal am Fuss des Mönch! Mürren am Fuss des Brünlihorns! Trachsellaunen! Lattreienalp an der Schwalmeren (Vulpius). Niesen, Kiley und Männlifuh an der Niesenkette. Rawyl (Vulpius). Stockhornkette auf der Wallopalp und am Bürglen (Maurer), Ganterisch und Nünenen (Trachsel) u. a. O.

alpina Wulf. In Geröllen »im Eisboden« bei Grindelwald (Christener), Kienthal (Gaud. Fl. helv.), Grimsel (Girard).

australis L. Auf Alpenweiden der oberen Region ziemlich verbreitet, z. B. Brienzer Rothhorn! Faulhorn (Guthnick), Lattreienalp (Vulpius). Niesen und Männlifuh (Fischer-Ooster). Bürglen (Vulpius), Ganterisch (Trachsel) u. a. O.

astragalina D.C. Wie vorige. Stellenweise in die Thäler herabsteigend, z. B. im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers c. 1000^m! — Die Phaca-Arten fehlen dem Jura.

Oxytropis. Spitzkiel.

Halleri Bunge. (*O. uralensis* D.C.) An vereinzelt Stellen der höheren Region des östlichen und westlichen Gebiets: Brienzergrat in der Nähe des Tannhorns (Imobersteg),

Hohstollen (Dr. Fankhauser), Gadmen (Jaggi). — Häufiger auf der Stockhornkette: Leiterengrat und Ganterisch (Vulpus), Morgetengrat gegen Bürglen (Vulpus), Ochsen (Trachsel, Maurer), Widdergalm (Imobersteg), Rothenkasten (Maurer).

campestris D.C. Auf Weiden und im Geröll der mittleren und oberen Region häufig; auf verschiedenem Gestein. — Stellenweise in die Thäler herabsteigend, z. B. an der Lütschine im unteren Lauterbrunnenthal, an der Kander- mündung, u. a. O. — *Var. caerulea* am Schwarzhorn und Faulhorn (Guthnick). — Fehlt dem Jura.

lapponica Gaud. Auf steinigem Weiden der höheren Alpen, selten: Faulhorn und Gemmi (Muret), Nordseite des Lötsch- passes in der Nähe des Gletschers (Leresche).

montana D.C. Auf Weiden der oberen Region häufig. — Stellenweise herabgeschwemmt, z. B. an der Lütschine zwischen Zweilütschinen und Sandweid! an der Kander bei Heustrich (Hügli). — Eine durch etwas kürzere Frucht- träger, längere Kelchzähne und dichtere Behaarung der *O. cyanea* Bieb. sich nähernde Form findet sich in den Alpen von Rosenloui (Brunner) und auf der Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (v. Rütte). — Im Jura kommt *O. montana* auf einigen Gipfeln der südwestl. Kette vor.

Astragalus. Tragant.

•• *glycyphyllus* L. In lichten Wäldern und Gebüschern der unteren Region, ziemlich selten. Zwischen Thun und Hilter- fingen (Brown). Zwischen Reutigen und Stocken! Simmen- thal (Maurer), Kienthal!

Anmerkung. *A. depressus* L. und *A. aristatus* L'Hérit., an mehreren Stellen der Alpen von Chateau d'Oex vor- kommend, sind im Kt. Bern bisher nicht nachgewiesen.

Coronilla. Kronwicke.

•• *Emerus* L. In Wäldern, besonders an bewaldeten, felsigen Abhängen der unteren Region, stellenweise häufig, z. B.

zwischen Thun und Neuhaus, an mehreren Stellen! Am Beatenberg bis c. 1000^m! Am Eingang des Simmenthals bei Wimmis! Zwischen Spiez und Leissigen! Goldei bei Interlaken! Meiringen (Brunner) u. a. O. — Häufig im Jura. *vaginalis* Lam. An felsigen Orten, im Geröll, ziemlich selten; von der unteren bis in die höhere Region. Sigriswylgrat (Vulpius), in Geröll an der Simmenfluh bei Wimmis! am Oeschenenbach bei Kandersteg! Lattreienalp (Bamberger), Grindelwald am Fuss des Wetterhorns (Fischer-Ooster.) — Häufiger im Jura.

•• *varia* L. Bei Brienz, am Fussweg nach dem Brünig (Brown).

Hippocrepis. Hufeisenklee.

* *comosa* L. Auf trockenen Grasplätzen, an sonnigen Abhängen, gemein. Von der Ebene bis in die obere Region, z. B. am Eigergletscher bei 1980^m (Rothenbach).

Hedysarum. Süssklee.

obscurum L. An felsigen Abhängen der höheren Region ziemlich verbreitet und stellenweise häufig, z. B. Ralligstöcke (Fischer-Ooster), Stockhorn! Niesen (Vulpius), Suleck! Faulhorn! Am Unteraargletscher (Girard) u. s. w. — Dem Jura fehlend.

Onobrychis. Esparsette.

* *sativa* Lam. (*O. viciifolia* Scop.) In der unteren Region häufig cultivirt. — *Var. montana.* (*O. montana* D.C.) auf Weiden der mittleren und oberen Region häufig.

Vicia. Wicke.

•• *silvatica* L. In lichten Wäldern, an steinigen Orten der unteren und mittleren Region stellenweise häufig, z. B. Gsteig bei Interlaken! Lütschenthal! Wengen! Simmenthal an mehreren Stellen. Zwischen Wimmis und Reutigen! Stockenthal (Brown). — Meiringen (Brunner).

* *Cracca* L. In Hecken, an Wegen, gemein; von der Ebene bis in die mittlere Region; z. B. Wengen bei 1400^m!

Gerardi D. C. Ziemlich häufig am bewaldeten, felsigen Ab-

hang zwischen Merligen und Neuhaus! bis gegen Beatenberg und Waldeck aufsteigend!

* *sepium* L. In Hecken, an Waldrändern der unteren und mittleren Region, häufig. N. Abhang des Männlichen bei 1700^m! Am Bürglen und Ganterisch bis über die Waldgrenze (Maurer). — *Var. angustifolia* Koch. Ralligstöcke, Obersimmenthal (Fischer-Ooster), Ganterischalp bei 1900^m (Hügli).

* *sativa* L. Auf Aeckern der unteren Region hin und wieder. Spiez!

* *hirsuta* Koch. Auf Aeckern hin und wieder. Brienz (Rhiner), Wengen im Getreide bis c. 1450^m!

* *tetrasperma* Mönch. Auf Aeckern, selten. Eichbühl bei Thun (Fischer-Ooster).

Anmerkung. *V. dumetorum* L., unweit der nördl. Gebietsgrenze bei Buchholz (Vulpius). Bei den Ruinen von Jagdburg (Brown).

Faba.

* [*vulgaris* Mönch. (*Vicia Faba* L.) *Ackerbohne*]. Auf Aeckern, oft unter Kartoffeln, häufig cultivirt. Wengen bei 1300^m!

Pisum. Erbse.

* *sativum* L. Häufig cultivirt. Oberhasli bis Guttannen 1050^m! Beatenberg bis 1290^m! Adelboden und Lauenen bis 1500^m.

Lathyrus. Platterbse.

* *pratensis* L. In Hecken und Gebüsch der unteren und mittleren Region häufig. Wengen bei 1400^m!

•• *silvestris* L. An Waldrändern der unteren Region hin und wieder, z. B. Thun in der Kohleren! Teufenthal! Beatenberg am Weg nach Merligen (1140^m)! Brünig (Brunner), Meiringen (Hügli).

heterophyllus L. In Kalkgeröllen der Wandelifuh am Fuss des Kienhorns bei Boltigen (Maurer).

- * *vernus Bernhardi* (*Orobus L.*) Bisher nur am Hümbach bei Thun (Hügli) und bei Schwarzenmatt im Simmenthal (Maurer) gefunden. — Im Hügelland der Gegend von Bern und im Jura häufig.
- * *macrorrhizus Wimm.* (*Orobus tuberosus L.*) In Wäldern und Gebüsch, am Grösisberg bei Thun (Fischer-Ooster).
- * *luteus Grenier* (*Orobus L.*) An der Stockhornkette, selten: An der Südseite des Sohlhorns bei c. 1950^m (Vulpus), Ochsen (Guthnick), Kaisereck (Lagger). An der Sieglerenfluh am südl. Fuss des Niederhorns bei Boltigen, unterhalb der Waldgrenze (Gempeler.)
- * *niger Wimm.* (*Orobus L.*) An Waldrändern der unteren Region, selten. Oberhalb Hilterfingen und Oberhofen (Fischer-Ooster). Zwischen Oberhofen und Gunten (Vulpus), Kienberg am Eingang des Habkernthales oberhalb der Brücke! — Häufiger im Jura.

Phaseolus. Bohne.

- * [*vulgaris L.*] In der unteren Region häufig cultivirt.
- * [*multiflorus Lam.*] Ebenso.

26. Amygdaleen.

Persica. Pfirsich.

- [*vulgaris Miller.*] In warmen Lagen der unteren Region hin und wieder cultivirt. In Weinbergen im Ried bei Thun!

Prunus. Pflaume.

- * *spinosa L.* *Schwarzdorn. Schlehe.* In Gebüsch, an Waldrändern der unteren Region gemein. Selten in der mittleren Region, z. B. im Simmenthal an mehreren Stellen (Maurer).
- * [*insititia L. Pflaumenbaum.*] In der unteren Region cultivirt.
- * [*domestica L. Zwetschenbaum.*] Ebenso.
- * *avium L.* *Süsskirsche.* In Wäldern der unteren Region hin und wieder. — Häufig cultivirt. In geschützten, sonnigen

Lagen bis an die Buchengrenze, z. B. bei Beatenberg, Wengen bis c. 1300^m! Adelboden, c. 1350^m (Matthys), auch im Obersimmenthal an mehreren Orten bis über 1300^m (Maurer). — Im Oberhasli nur bis Guttannen (1050^m)!

* [*Cerasus L. Saure Kirsche.*] Hin und wieder cultivirt.

* *Padus L. Ahlkirsche.* In Wäldern der unteren Region hin und wieder.

[*Laurocerasus L. Kirschlorbeer.*] An geschützten, sonnigen Stellen längs des Thunersees zwischen Thun und Merligen stellenweise cultivirt.

27. Rosaceen.

Spiraea. Spierstaude.

* *Aruncus L. (Aruncus silvester Kosteletzky.)* An waldigen Abhängen, in Schluchten der unteren Region ziemlich häufig.

* *Ulmaria L. (Ulmaria pentapetala Gilib.)* An feuchten Stellen, an Hecken und Gräben, in der unteren Region häufig; auch auf Gneiss, z. B. Urbachthal!

Dryas. Dryade.

octopetala L. An felsigen Stellen, im Geröll der höheren Region häufig; stellenweise auch in der mittleren und unteren Region, z. B. auf Weiden unterhalb Kandersteg! Im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei c. 1000^m! In einzelnen Kolonien im Kies der Lütshine, Kander, Simme. — Im Jura nur auf den Gipfeln des südwestl. Theiles. — In den N. Polarländern bis zum 79^o.

Geum. Nelkenwurz.

* *urbanum L.* In Hecken und Gebüsch der unteren Region häufig. Wengen bei 1300^m! Auf Gneiss bei Trachselauenen!

* *rivale L.* Auf feuchten Wiesen, an Bächen und Gräben der unteren Region gemein; selten in der mittleren und höheren Region, z. B. Gümmlen bei Mürren c. 1800^m! Oberbergalp im Sefinenthal, 1900^m!

reptans L. (*Sieversia* Spr.) An felsigen Orten der höheren Alpen in der Nähe der Schneelinie stellenweise häufig, z. B. am Unteraargletscher (Girard nach Desor), Wildgerst (Brunner). Faulhorn! An der Schwarzeneck am Westabhang des Schreckhorns bei 2780^m, mit *Ranunculus glacialis* u. a. die letzte Grenze der Vegetation bildend (Lindt). Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster), Schwalmeren (Vulpus), Sefinenfurke! Oeschenengrat! Gemmi (Brown), Oldenhorn (Leresche), Albristhorn in der Niesenkette (Fischer-Ooster).

montanum L. (*Sieversia* Spr.) Auf Weiden der höheren Region gemein, seltener in der mittleren Region, z. B. oberhalb Wengen bei 1400^m!

Rubus.

* *Idæus* L. *Himbeerstrauch*. In lichten Wäldern und Gebüsch bis zur Waldgrenze häufig. — Unterhalb Wengernalp bei 1830^m (Rothenbach).

* *fruticosus* L. *Brombeerstrauch*. In Wäldern und Gebüsch, in Hecken der unteren Region häufig. — Von den zahlreichen, in neuerer Zeit meist als besondere Arten aufgefassten Abänderungen (vergl. *Fischer-Ooster Rubi bernenses* 1867, und *Gremlı Beiträge zur Flora der Schweiz* 1870) sind bis jetzt im Oberlande folgende nachgewiesen: *R. suberectus* Anderson, in der unteren Region bis c. 1150^m, z. B. Beatenberg (Fischer-Ooster). — *R. thyrsoideus* Wimm. (*R. candicans* Weihe.), bei Thun (Focke). — *R. tomentosus* Willd., an sonnigen Abhängen der unteren Region ziemlich verbreitet, z. B. Thun! Beatenberg! Rugen bei Interlaken! u. a. O. — *R. discolor* Weihe et Nees, in Hecken und Lichtungen der Wälder häufig. — *R. vestitus* Weihe et Nees, Thun, Interlaken (Focke). — *R. vulgaris* Weihe et Nees, bei Oberhofen (Fischer-Ooster). — *R. glandulosus* Bell. in Wäldern gemein. — *R. foliosus* Weihe et Nees, Interlaken (Focke). — *R. corylifolius* Sm.

häufig zwischen Thun und Hilterfingen (Fischer-Ooster). — *R. althææfolius* Host. Eichbühl bei Thun (Fischer-Ooster).

Anmerkung. Von Hybriden sind beobachtet: *R. tomentosus* × *vestitus*. Interlaken (Focke). — *R. cæsius* × *vestitus* Interlaken (Focke). — *R. cæsius* × *candicans* bei Thun (Focke).

- * *cæsius* L. An Wegen, Waldrändern, an steinigen Orten, in Gebüsch der unteren Region.
- *saxatilis* L. In Wäldern, an steinigen Orten der unteren und mittleren Region ziemlich verbreitet und stellenweise häufig, z. B. Beatenberg! Meiringen (Brunner), Rosenlauri! Lauterbrunnenthal! Mürren, bis 1800^m! Kienthal! Kandergrund! Simmenthal (Maurer). — Selten in der oberen Region, z. B. am Eigergletscher bei 1950^m (Rothenbach).

Fragaria. Erdbeere.

- * *vesca* L. In lichten Wäldern und Gebüsch der unteren und mittleren Region häufig. — An der »weissen Fluh« am Eigergletscher bei 1950^m (Rothenbach).

Comarum. Siebenfingerkraut.

- *palustre* L. Auf Torfmooren, von der Ebene bis in die höhere Region hin und wieder. Teufenthal bei Thun! Engstlenalp (Fischer-Ooster), Grimsel (im Spitalboden)! Bruchberg bei Boltigen (Maurer), Saanen (Leresche).

Potentilla. Fingerkraut.

- * *anserina* L. An etwas feuchten Stellen, an Wegen und Gräben der unteren Region ziemlich häufig, z. B. Spiez! Interlaken! Meiringen (Brunner). — Adelboden c. 1300^m!
- *argentea* L. An steinigen Orten der unteren Region, ziemlich selten. Innerkirchen! Mühlethal (Rhiner). Wengen 1200^m! Trachsellauen (Fischer-Ooster), Weissenbach im Simmenthal (Maurer).
- * *reptans* L. An etwas feuchten Stellen, an Wegen und Gräben der unteren Region häufig.

* *Tormentilla Sibth.* (*Tormentilla erecta L.*) In lichten Wäldern, auf Heideplätzen, Weiden und Torfmooren, von der Ebene bis in die obere Region gemein. — Gemmenalphorn bei 2064^m!

aurea L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen gemein. — Stellenweise bis in die untere Region, z. B. Justisthal, vereinzelt bis c. 1000^m! — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel.

alpestris Hall. fil. (*P. salisburgensis Hænke*). Auf Weiden der Alpen und Voralpen ziemlich häufig.

* *verna L.* Auf trockenen Grasplätzen, an Waldrändern der unteren und mittleren Region gemein.

grandiflora L. An felsigen Orten der oberen und mittleren Region stellenweise häufig, z. B. Steinalp bei Gadmen! Am Unteraargletscher (Girard nach Desor), Urbachthal! Faulhorn! Männlichen! Suleck! Gasteren am Alpetligletscher (Vulpius), Kiley an der Niesenkette (Brown).

minima Hall. fil. An steinigen Orten der höheren Region, hin und wieder. Sigriswyler Rothhorn und Geissberg bei Engstlenalp (Fischer-Ooster), Wellhorn (Brunner), Kalli am Vieschergletscher (Fischer-Ooster), Schwalmeren (Bamberger), Schilthorn (Imobersteg), Lattreienalp am Wasmi (Vulpius). Häufig auf der Gemmi (Brown) und am Grat zwischen Schwarrenbach und Ueschenen (Vulpius). Gifferhorn bei Saanen (Imobersteg).

frigida Vill. An steinigen Orten der höheren Alpen, selten. Am Unteraargletscher (Girard nach Desor), Garzen bei Rosenloui (Brunner), Faulhorn (Martins), Lötschpass!

* *Fragariastrum Ehrh.* An Wegen und Waldrändern der unteren und mittleren Region häufig.

Anmerkung. *P. opaca L.* An sonnigen Abhängen am Grüsisberg bei Thun und bei Wimmis (Guthnick), wurde in neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

Sibbaldia. Sibbaldie.

procumbens L. Auf steinigem Weiden der höheren Region, stellenweise häufig, vorzugsweise auf quarzhaltigem Gestein, z. B. Grimsel! Urnenalp im Urbachthal! Faulhorn (Brown), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Niesen (Vulpus), Oldenhorn (Leresche). — Vereinzelt bis in die untere Region, z. B. im Geröll bei der gesprengten Fluh unterhalb Guttannen (c. 800^m)! — Im Jura selten.

Alchemilla. Sinau, Frauenmantel.

* *vulgaris* L. *Thaumantel*. Auf Wiesen und Weiden gemein; von der Ebene bis in die obere Region, z. B. Kl. Scheideck, 2069^m! — *var. subsericea* häufig in der mittleren und oberen Region.

pubescens Koch. Auf Alpenweiden hin und wieder. Am Grat zwischen Ganterisch und Nünönen und auf der Schwalmere (Fischer-Ooster), Laucherfluh am Eigergletscher, 2250^m (Rothenbach).

fissa Schumm. An etwas feuchten Stellen der höheren Region hin und wieder, z. B. Engstlenalp (Fischer-Ooster). Am Unteraargletscher (Girard nach Desor), Faulhorn (Brown). Am Eigergletscher und auf der Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Rothenbach), Dürrenberg im Kienthal (Fischer-Ooster), Fermelthal bei St. Stephan (Imobersteg). Stockhornkette am Bürglen, Ganterisch und Nünönen (Trachsel).

alpina L. *Silberklee*, *Hasenklee*. Auf Weiden der mittleren und oberen Region gemein. Nicht selten an schattigen Felsblöcken und im Geröll bis an den Fuss der Berge, z. B. in der Schlucht des Hünibaches bei Thun! Därligen! Unspunnen! u. a. O. — Auf Gneiss im Ob.-Hasli und bei Trachsellauenen! — *A. alpina* × *vulgaris* bei Grindelwald (Christ.), Kl. Scheideck (Rothenbach).

pentaphyllea L. An etwas feuchten, spät vom Schnee entblössten Stellen der höheren Region, stellenweise häufig,

z. B. Grimsel! Faulhorn! Schilthorn! Obere Oeschenenalp!
Gemmi (Brown), Kiley an der Niesenkette (Brown), Rawyl
(Meissner), Oldenalp (Leresche) u. a. O.

Sanguisorba. Wiesenknopf.

* *officinalis* L. Auf nassen Wiesen, stellenweise häufig, z. B.
bei der Kanderemündung! Zwischen Neuhaus und Weissenau!
Hahnenmööser zwischen Lenk und Adelboden von 1500^m
bis 1800^m!

Poterium. Becherblume.

* *Sanguisorba* L. (*Sanguisorba minor* Scop.) Auf trockenen
Wiesen, an Wegen; häufig, von der Ebene bis in die mitt-
lere Region. — Wengen bei 1400^m!

Agrimonia. Odermennig.

* *Eupatoria* L. An Wegen und Waldrändern der unteren
und mittleren Region hin und wieder.

Rosa. Rose.

Diese Gattung bietet in ähnlicher Weise wie *Rubus*
grosse Schwierigkeiten für die Bestimmung und Begrenzung
der Arten. Im Folgenden ist die neueste Monographie: Die
Rosen der Schweiz, von *Dr. H. Christ*, 1873, zu Grunde
gelegt.

•• *cinnamomea* L. Bei Thun (Brown). — Häufig an der Aare
zwischen Thun und Bern.

•• *alpina* L. In Gebüsch und lichten Wäldern vom Fuss der
Berge bis gegen die Baumgrenze, bes. die *Var. pyrenaica*
(*R. pyrenaica* Gouan).

pimpinellifolia L. In Gebüsch, an sonnigen Abhängen
bei Oberhofen und Merligen (Fischer-Ooster). Im unteren
Justisthal!

mollissima Fries. Sigriswyl (Fischer-Ooster).

pomifera Herrmann. *Var. recondita* (*R. recondita* Puget)
in der unteren und mittleren Region hin und wieder: Rallig-
stöcke (Fischer-Ooster), Schwendi ob Stechelberg und Gim-

melwald im Lauterbrunnenthal (Schneider). — *Var. Grenieri* (*R. Grenieri Desegl.*) im Justisthal (Fischer-Ooster). *spinulifolia Dematra*. Am Thunersee, oberhalb Ralligen (Fischer-Ooster).

•• *tomentosa* Sm. In Hecken und Gebüsch der unteren und mittleren Region hin und wieder. Oberhofen (Fischer-Ooster). Oberhalb Sigriswyl (Brown). Zwischen Spiez und Leissigen! Rugen bei Interlaken (Fischer-Ooster), Mittholz im Kanderthal (Rhiner), Simmenthal bei c. 800^m (F. Burkhardt nach Christ), in mehreren Formen. — *Var. subglobosa Baker* (*R. subglobosa Sm.*) Därligen (Burkhardt nach Christ). — *Var. cristata Christ*, Därligen (Burkhardt nach Christ), Grindelwald am unteren Gletscher und an der Faulhornkette zwischen 1300—1600^m (Christ).

•• *rubiginosa* L. in Hecken bei Hilterfingen (Brown). — *Var. comosa* (*R. comosa Ripart.*) Grindelwald (Christ).

micrantha Sm. Simmenthal bei c. 800^m (F. Burckhardt, nach Christ). — *Var. vallesiaca* (Christ). (*R. vallesiaca Lager et Puget*), Gsteigwyl bei Interlaken!

sepium Thuill. Merligen (Fischer-Ooster), Trachsellaunen (Schneider). — *Var. arvatica Christ*. (*R. arvatica Puget*), Neuhaus (Christ).

graveolens Grenier. — *Var. Jordani Christ*. (*R. Jordani Desegl.*) Gimmelwald bei Mürren (Schneider), Mürren (Alioth nach Christ). Trachsellaunen (Godet). Simmenthal bei c. 800^m (F. Burckhardt, nach Christ).

•• *tomentella Léman*. — *Var. tyrolensis Christ*. (*R. tyrolensis Kerner*). Diese bisher nur aus dem Tyrol bekannte Form fand F. Burckhardt im Simmenthal bei Weissenburg, Oberwyl und Boltigen (Christ).

abietina Grenier. Neuhaus (Christ), Schwendi im oberen Lauterbrunnenthal (Schneider), Mürren (Alioth, nach Christ). Grindelwald (Christ). Simmenthal bei c. 800^m (F. Burkhardt, nach Christ).

* *canina* L. (*p. part.*) In Hecken und Gebüsch der unteren Region häufig. — *Var. lutetiana Léman* (*R. canina*

- vulgaris Godet) häufig in den Alpenthälern bis über 800^m (Christ), z. B. Därligen! Leissigen! Spiez! u. a. O. — *Var. dumalis* (*R. dumalis* Bechstein) Därligen!
- Reuteri* Godet. (*R. rubrifolia* v. *pinnatifida*, Gaud. *Fl. helv.*) Grindelwald und bis herab nach Neuhaus (Christ). Simmenthal, bei c. 800^m (F. Burckhardt, nach Christ). — *Var. Seringei* Christ. Grindelwald (Christ).
- rubrifolia* Vill. In lichten Wäldern und Gebüschern der unteren und mittleren Region stellenweise häufig, z. B. Rosenloui! Grindelwald! Wengen! Mürren! Beatenberg! u. a. O. — *Var. jurana* Gaud. Grindelwald (Christ).
- *dumetorum* Thuill. — *Var. Thuillieri* Christ. Simmenthal bei c. 800^m (F. Burckhardt, nach Christ).
- salævensis* Rapin. — *Var. adunca* Christ, zwischen Stechelberg und Trachsellauenen nicht selten (Godet).
- *coriifolia* Frin. *Var. frutetorum* (*R. frutetorum* Besser) in den Alpenthälern verbreitet (Christ). Hünibach bei Thun (Fischer-Ooster), Grindelwald in Hecken (Christ). — *Var. subcollina* Christ, am Thunersee zwischen Spiez und Leissigen!
- * *arvensis* L. In Hecken, an Waldrändern der unteren Region ziemlich häufig. — *Var. repens* (*R. repens* Scop.) am Thunersee (Christ). — *Var. atrata* Christ. Neuhaus, am Weg nach dem Beatusbade!

28. Pomaceen.

Cratægus. Weissdorn.

- * *Oxyacantha* L. In Hecken und Gebüschern der unteren Region häufig.
- * *monogyna* Jacq. Ebenso.

Cotoneaster. Steinmispel.

- *vulgaris* Lindl. Auf Kalkfelsen an waldigen Abhängen der unteren und mittleren Region hin und wieder, z. B. am Thunersee zwischen Merligen und Neuhaus! Rugen bei Interlaken! Kandersteg (Brown).

- *tomentosa* Lindl. Wie vorige und zum Theil an denselben Standorten. — Hünibach bei Thun (Brown).

Mespilus. Mispelbaum.

- [*germanica* L.] In der unteren Region hin und wieder cultivirt. Am Spiezberg!

Pirus.

- * *communis* L. *Birnbaum*. Die wilde Stammform hin und wieder in Wäldern. Am Grüsisberg und im Stockenthal (Brown). — In zahlreichen Varietäten cultivirt. In geschützten Lagen gedeihen weniger empfindliche Sorten stellenweise noch im obersten Theil der unteren Region, z. B. bei Beatenberg bis über c. 1200^m! Lauenen (am Spalier) bei 1260^m! (Hunziker).
- * *Malus* L. *Apfelbaum*. Wie vorige. — Beatenberg c. 1200^m! Gadmenthal bis 1300^m (Rätzer). Adelboden (Holzapfel) bis c. 1350^m (Matthys). — Im Aarthal bis Guttannen!

Aronia. Felsenmispel.

- *rotundifolia* Pers. (*Amelanchier vulgaris* Mönch). An felsigen Orten der unteren Region, stellenweise häufig, z. B. am Thunersee zwischen Gunten und Neuhaus! Rugen bei Interlaken! Giessbach! Meiringen (Brunner). Am Eingang des Simmenthals bei Wimmis! Kandergrund! Obersimmenthal (Maurer) u. a. O.

Sorbus. Eberesche.

- * *aucuparia* L. (*Pirus Gærtn*). *Vogelbeerbaum. Gürmsch*. In Wäldern und in der Nähe der Häuser, vereinzelt von der Ebene bis über die Waldgrenze. Mürren bei 1700^m! Wengernalp am Eigergletscher (Rothenbach). Im Aarthal bis c. 1600^m!
- scandica* Fries. (*Pirus Babingt*.) Vereinzelt und selten. Spiezfluh (Fischer-Ooster).
- * *Aria Crantz* (*Pirus Ehrh*.) *Mehlbeerbaum*. In lichten Wäldern, an felsigen Abhängen der unteren und mittleren Region häufig. Bei Wengen und Beatenberg bei 1300^m als starke Bäume.

torminalis Crantz. (*Pirus* Ehrh.) Grüsisberg und am Hüni-
bach bei Thun (Fischer-Ooster).

Chamcemespilus Crantz. (*Pirus* Ehrh.) An felsigen Orten
der oberen und im angrenzenden Theil der mittleren Re-
gion, hin und wieder. Sigriswyler Rothhorn! Rosenloui
(Brunner). Zwischen Breitlauenen und der Schynigen Platte!
Kl. Scheideck! Sulwald ob Eisenfluh! Mürren! Lattreienalp
(Vulpus), Oeschenenthal (Fischer-Ooster), Nünenen (Trach-
sel), Stockhorn (Brown) u. a. O.

Anmerkung. *S. Aria* × *aucuparia* (*S. hybrida* L.), an
der Spiezfluh (Fischer-Ooster).

29. Onagrarien.

Epilobium. Weidenröschen.

* *spicatum* Lam. (*E. angustifolium* Koch). In lichten Wäl-
dern und Gebüschern der unteren und mittleren Region.
Wengen bei 1400^m! Ob.-Haslithal bis c. 1600^m!

•• *rosmarinifolium* Hænke. (*E. Dodonæi* Vill.) An steinigen
Orten, im Geröll der Bäche, in der unteren und mittleren
Region hin und wieder, z. B. Kohlerenschlucht bei Thun!
am Guntenbach bei Sigriswyl! Goldei bei Interlaken! Zwi-
schen Brienz und Meiringen! Kleines Kienthal! Kandersteg
(Brown) u. a. O.

Fleischeri Hochst. Im Geröll der Alpenbäche von der oberen
Region bis in die Täler herab, stellenweise häufig, z. B.
im Ob.-Hasli! Im Geröll am Fuss des unteren Grindelwald-
gletschers! Am Schmadribach! und an der Lütschine bis
unterhalb Zweilütschinen! Kienthal! Gasteren! an der Kan-
der bei Mühlenen! und an der Kandermündung! an der
Simme oberhalb der Wimmisbrücke! u. a. O.

* *hirsutum* L. An Gräben und feuchten Orten der unteren
Region ziemlich selten. Stockenthal! Balmholz am Thuner-
see (Brown), Meiringen (Brunner).

- * *parviflorum* Schreb. (*E. molle* Lam.) an feuchten Orten der unteren und mittleren Region.
- * *montanum* L. In Wäldern der unteren und mittleren Region häufig. — *Var. collinum* (*E. collinum* Gmel.) am Weg von Reusch nach der Oldenalp (Leresche).
- * *palustre* L. An sumpfigen Stellen der unteren und mittleren Region, besonders auf Torfboden. Reutigenmoos u. a. O.
- * *roseum* Schreb. Wie vorige.
- trigonum* Schrank. (*E. alpestre* Rb.) An feuchten Stellen der Voralpen hin und wieder. Nordabhang der Stockhornkette (Bamberger). Wallopalp bei 1700^m! Ralligstöcke (Fischer-Ooster). Zwischen Lauterbrunnen und Mürren! Rosenlauri (Brunner).
- origanifolium* Lam. (*E. alsinæfolium* Vill.) An Bächen und schattigen Stellen, von der unteren bis in die obere Region nicht selten, z. B. Stockhorn, Ralligstöcke, Faulhorn (Fischer-Ooster), Kl. Scheideck! Zwischen Lauterbrunnen und Mürren c. 1000^m! Rosenlauri (Brunner). Urbachthal! Engstlenalp (Fischer-Ooster).
- alpinum* L. An nassen Stellen der oberen Region, ziemlich häufig.

Oenothera. Nachtkerze.

- * *biennis* L. An steinigen Orten, an Ufern der unteren Region hin und wieder, z. B. Goldei bei Interlaken! Am Fuss des Ballenberg bei Brienz (Hügli). — Aus N.-Amerika stammend.

Circaea. Hexenkraut.

- * *lutetiana* L. In Wäldern und Gebüschern der unteren Region.
- *intermedia* Ehrh. An feuchten, schattigen Stellen der unteren Region, hin und wieder, z. B. Burgfluh bei Wimmis! Lauterbrunnenthal! Iseltwald (Guthnick), Meiringen (Brunner)! Brünig (Brown).
- *alpina* L. An feuchten, schattigen Orten der Voralpen, stellenweise häufig! Blume! Niesen (Brown), Kandersteg! Wengen! Rosenlauri (Brunner) u. a. O.

30. Halorageen.

Myriophyllum. Tausendblatt.

- *spicatum* L. Im Thunersee bei Spiez! Häufig in der Aare bei Interlaken! und im Faulensee bei Ringgenberg!

Anmerkung. *M. verticillatum* L. und *Ceratophyllum demersum* L. unweit der nördl. Gebietsgrenze im Uebischisee.

31. Hippurideen.

Hippuris. Tannenwedel.

- *vulgaris* L. In stehendem Wasser im Pohlerenmoos bei Blumenstein!

32. Callitrichineen.

- * *verna* L. In Gräben und Teichen von der Ebene bis in die höhere Region, hin und wieder, Kl. Scheideck bei c. 2000^m!

Anmerkung. Bei genauerer Untersuchung dürften noch andere (nur an den reifen Früchten mit Sicherheit bestimmbare) Arten gefunden werden.

33. Lythrarieen.

Lythrum. Weiderich.

- * *Salicaria* L. An Gräben und auf Sumpfwiesen der unteren Region gemein. Sehr häufig zwischen Brienz und der Wylerbrücke u. a. O.

34. Tamariscineen.

Myricaria.

- *germanica* Desv. Im Geröll der Flüsse, stellenweise häufig. An der Aare von Innerkirchen bis zum Brienersee! und oberhalb Interlaken! An der Lütchine von Lauterbrunnen bis zur Mündung hin und wieder. Am Lombach bei Neuhaus! an der Kander bei Reichenbach, Heustrich und an der Mündung! Längs der Simme an mehreren Stellen, Lenk, Grubenwald, Wyler (Maurer). — Mit der Aar, Emme, Sense bis weit in das Hügelland herabreichend.

35. Portulaceen.

Portulaca. Portulak.

- * *oleracea* L. Auf cultivirtem Boden, als Gartenunkraut, zwischen Steinen in der Nähe der Häuser, hin und wieder. Thun bei der Kirche!

36. Crassulaceen.

Sedum. Fettkraut.

- maximum* Sut. An felsigen Orten, in Geröllen hin und wieder. Am Thunersee zwischen Merligen und Neuhaus! An Felsköpfen bei Ringgenberg! Ballenberg bei Brienz! Latterbach im Simmenthal (Brown).
- *purpurascens* Koch. Wie vorige. Hilterfingen (Fischer-Ooster), Ringgenberg und Ballenberg bei Brienz (auf Kalkstein)! Wengen (auf Eisenstein) bei 1400^m! Guttannen (auf Gneiss)!
- *Fabaria* Koch. Oberhalb Hilterfingen (Fischer-Ooster), Saanenmööser (v. Rütte).
- *villosum* L. Auf sumpfigen Waldwiesen, selten. Bei Heiligenschwendi oberhalb Thun an mehreren Stellen und zwischen Sigriswyl und dem Fuss des Rothorns (Brown), Wengernalp (Rothenbach), Bruchalp zwischen Boltigen und Abläntschen bei 1500^m (Hügli).
- atratum* L. Auf steinigen Weiden, an Felsblöcken der höheren Region häufig. — Auf Gneiss, Schiefer und Kalkstein.
- annuum* L. (*S. saxatile* Wigg.) An Felsblöcken und Mauern von der unteren bis zur oberen Region, auf Gneiss, Granit, Eisenstein, stellenweise häufig, z. B. im Guttannen- und Gadmenthal! Bachalp am Faulhorn (Brown), Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster). Lauterbrunnen! Wengen! Mürren! Gasteren (Vulpus). — Fehlt dem Jura.
- *album* L. An Felsblöcken, Mauern und im Geröll, von der Ebene bis in die obere Region häufig; auf verschiedenem

Gestein. — Im Hügelland des Molassegebietes selten, häufig im Jura.

dasyphyllum L. An Mauern und Felsblöcken der unteren und mittleren Region gemein.

* *acre* L. An Mauern, auf kiesigen Stellen und mageren Wiesen der unteren Region hin und wieder, z. B. Interlaken! Spiez!

* *sexangulare* L. (nach Koch). (*S. boloniense* Lois.) Wie vorige. Thun, und an Weinbergmauern bei Oberhofen (Fischer-Ooster), Meiringen (Brunner).

repens Schleich. (*S. alpestre* Vill.) An steinigen Orten der höheren Region, selten. Faulhorn (Guthnick), Wengernalp (Rothenbach), Gemmi über dem Daubensee (Guthnick). — Fehlt dem Jura.

reflexum L. An sonnigen Kalkfelsen der Stockhornkette: Wandeliflüh bei Schwarzenmatt (Maurer)! Weissenburgbad! Günzenen (Brown). — Häufig im Jura.

Anmerkung. *Rhodiola rosea* L. (*Sedum Rhodiola* D. C.) nach Gaud. Flor. helv. am Jochpass, wurde in neuerer Zeit nicht mehr gefunden. — Eine Pflanze der südlicheren Alpenketten.

Sempervivum. Hauswurz.

•• *tectorum* L. An Felsen und Mauern von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. häufig an Kalkfelsen zwischen Neuhaus und Sundlauenen! Am Sägisthalsee! Am Eiger-gletscher bei 2100^m (Rothenbach) u. a. O.

Mettenianum Schnittspahn und Lehmann (*Flora* 1855). Gneissfelsen bei Innerkirchen! Auf Eisenstein bei Wengen oberhalb der Hunnenflüh! Auf Kalkfelsen bei Ringgenberg am Brienersee!

montanum L. An Felsblöcken und steinigen Orten der höheren Region ziemlich häufig. — Auf verschiedenem Gestein. — Dem Jura fehlend.

flagelliforme Fisch. (*Flora* 1855). Dürrenberg im Kienthal! Oeschenenalp bei 1600^m! (und wohl noch anderwärts).

arachnoideum L. Auf quarzhaltigem Gestein der mittleren und oberen Region, stellenweise häufig. Mürren! Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster), Wengernalp! Grimsej (Brown).

Döllianum Lehm. (*Flora* 1850.) Auf Gneissfelsen bei Innerkirchen (Lehmann)! Faulhorn (Brunner).

Anmerkung. Von den zahlreichen neu aufgestellten Arten lassen sich ohne Zweifel bei genauerer Untersuchung noch mehrere ermitteln.

37. Grossularieen.

Ribes.

* *Grossularia* L. (*incl. R. uva crispa* L.) *Stachelbeere*. In Hecken und Gebüschern der unteren Region. Häufig cultivirt; Beatenberg bei 1150^m!

•• *alpinum* L. In Gebüschern und lichten Wäldern der unteren und mittleren Region, stellenweise häufig, z. B. Stockenthal (Brown), Kandergrund! Kienthal! Beatenberg bei 1290^m! Rosenlauri (Brunner) u. a. O.

* [*rubrum* L. *Johannisbeere*.] Häufig cultivirt. — Beatenberg 1150^m! Adelboden 1357^m (Matthys). — Von Trachsel an der Tschingelfluh (Stockhornkette) citirt. — In neuerer Zeit nirgends wild gefunden.

petraeum Wulf. An der Westseite der Nünenen bei c. 2000^m (Fankhauser), und an Felsen der Nordseite des Bürglen über dem Ganterischsee (Maurer).

38. Saxifrageen.

Saxifraga. Steinbrech.

Cotyledon L. An Gneissfelsen im Oberhasli, von der unteren bis in die obere Region, stellenweise häufig: Zwischen Gadmen und der Steinalp! Inner Urweid! Handeck! Urnenalp am Gauligletscher! — Eine für das Gneissgebiet der Centralalpen charakteristische Pflanze.

Aizoon Jacq. An Felsen und Felsblöcken, vorzugsweise auf Kalkstein; vom Fuss der Berge bis über die Schneelinie gemein. — Auf Nagelfluh in der Schlucht des Hünibaches! und Guntenbaches (Brown).

•• *mutata L.* An feuchten Felsen der unteren Region, besonders auf Nagelfluh. Ziemlich häufig bei Oberhofen und in den Schluchten des Hünibaches und Guntenbaches! Faulhorn (Brunner).

cæsia L. An Felsen der mittleren und oberen Region, vorzugsweise auf Kalkstein, stellenweise häufig, z. B. Ralligstöcke! Gemmenalphorn und Niederhorn! Am Wellhorn bei Rosenlauri (Brunner), Gleckstein am Wetterhorn bei 2300^m (Lindt), Laucherfluh bei Wengernalp (Rothenbach), Trümmletenthal am Fuss des Mönch! Roththal an der Jungfrau! Felsen am Oeschenensee! Gasterenclus bei Kandersteg! Gemmi! Engstligenalp (v. Rütte), Rawyl (Imobersteg), Oldenhorn! Spielgarten (Imobersteg), Gsür an der Niesenkette (Imobersteg), Nünenen und Ganterisch (Trachsel), Stockhorn! — Stellenweise in die Thäler herabgeschwemmt, z. B. am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei 1000^m! Vereinzelt an der Lütschine zwischen Sandweid und Zweilütschinen c. 700^m!

oppositifolia L. In Felsritzen, im Geröll und Schutt der höheren Alpen häufig; auf verschiedenem Gestein. Stellenweise weit über die Schneelinie emporsteigend, z. B. Oberaarhorn bei 3400^m (Lindt), Schneehorn an der Jungfrau bei 3350^m (Fellenberg). — Weniger verbreitet in den niedrigeren, äusseren Ketten: An der Stockhornkette am Rothenkasten und Bürglen (Maurer), Ganterisch (Vulpus), Nünenen (Trachsel), — Niesen (Brown), Sigriswyler Rothhorn! — Stellenweise auch in der mittleren und unteren Region, z. B. Schwefelberg bei 1500^m (Hügli), Justisthal (Vulpus). Im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei 1000^m! und vereinzelt Colonien im Geröll der Lütschine zwischen Sandweid und Zweilütschinen, c. 700^m! — Im Jura nur

auf den höchsten Gipfeln des südwestl. Theils. — In den N. Polarländern sehr verbreitet, bis zum 81°. — Das Vorkommen der *Var. Rudolphiana* (*S. Rudolphiana* Hornsch.) im Oberlande bedarf der Bestätigung.

biflora L. Im westlichen Gebiet, im feuchten Felsgeröll in der Nähe der Schneelinie, selten: Albrist (Fischer-Ooster), Oldenhorn (v. Rütte). — Eine Pflanze der südlicheren Alpenketten.

Kochii Hornung. Im Geröll in der Nähe der Schneelinie hin und wieder, z. B. Furtwangpass bei Guttannen! Suleck! Schilthorn! Schwalmeren (Vulpus), Lattreienalp (Vulpus), Oeschenengrat! Lötschpass! Gemmi! Rawyl und Oldenhorn (Leresche).

Anmerkung. Nach Engler (Monographie der Gatt. *Saxifraga* 1872) enthält die *S. Kochii* der Herbarien theils eine ächte Art (*S. macropetala* Kerner), theils verschiedene Hybriden zwischen *S. oppositifolia* und *S. biflora*, es sind daher diese Pflanzen einer wiederholten Prüfung zu unterwerfen.

aspera D. C. An Felsen und steinigen Orten der mittleren und oberen Region hin und wieder, besonders auf Gneiss und Eisenstein. — *Var. elongata* Gaud. (*S. aspera* L.) Bachalp am Faulhorn (Guthnick), Scheideck und Grimsel (Gaud. Fl. helv.) — *Var. S. bryoides* L. Häufiger als vorige und höher emporsteigend: Grimsel! Windeck am Triftgletscher! Urnenalp im Urbachthal! Finsteraarhorn, über 4000^m (Lindt, Jahrbuch des Schweizer. Alpenclub Vol. VIII.), Faulhorn! Vieschergrat über dem oberen Grindelwalder-Eismeer, c. 3000^m (Fellenberg), Kl. Scheideck! Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Schwalmeren (Fischer-Ooster), Gasteren (Vulpus), Gemmi (Brown), Niesen (Brown).

•• *aizoides* L. An feuchten, steinigen Orten, an Quellen, im Geröll der Bäche, vom Fuss der Berge bis in die obere

Region gemein. — Mit den Flüssen bis in die Ebene herabgeschwemmt. — In den N. Polarländern bis zum 80°.

stellaris L. An feuchten Orten, an Bächen und Quellen der mittleren und oberen Region häufig; auf verschiedenem Gestein. — *Var. robusta* Engler (*S. Clusii* Koch, non *Gouan*) an feuchten Gneissfelsen im östlichen Gebiet stellenweise häufig. Handeck! Gadmenthal! — Die ächte *S. Clusii* ist eine Pflanze des westlicheren Europa.

cuneifolia L. An feuchten, schattigen Felsen und Felsblöcken der unteren und mittleren Region stellenweise häufig, auf Gneiss und Kalkstein. Häufig im Guttannen- und Gadmenthal! Kirchet bei Meiringen! Brünig, Rosenlauithal (Brunner), Gasterenclus (Vulpus), Gemmi über Kandersteg (Brown). — Am westl. Fuss des Widderfeld an der Hohgantkette (Imobersteg). — Fehlt dem Jura.

muscoides Koch. (*S. moschata* Engler. *Monogr.*) An Felsen und steinigen Orten der höheren Region sehr häufig, auf verschiedenem Gestein, bis weit über die Schneegrenze aufsteigend, z. B. am Finsteraarhorn über 4000^m (Lindt, im Jahrbuch des Schweiz. Alpenclub Vol.VIII.). Selten in der mittleren Region. — Im Jura auf einigen Gipfeln der südwestlichen Kette. — *Var. vulgaris* (*S. muscoides* Wulf.) die verbreitetste Form. — *Var. glandulosa* (*S. moschata* Wulf.) ebenfalls ziemlich verbreitet. — *Var. compacta* Mert. et Koch auf höheren Alpen: Wellhorn bei Rosenlauri (Fellenberg), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Fischer-Ooster). — *Var. S. atropurpurea* Sternb., ebenso. Engstlenalp (Fischer-Ooster).

exarata Vill. Auf höheren Alpen, selten. Susten (Guthnick). Alpen von Rosenlauri (Brunner), Schwarzhorn (Stud. Lohmeier), Zäsenberg am unteren Grindelwaldgletscher (Christener). Gasterenthal am Gletscher (Fischer-Ooster). — Vorwiegend den südlicheren Alpenketten angehörend.

planifolia Lap. (*S. muscoides* All.) Wie vorige. Am Unteraargletscher (Girard nach Desor). Faulhorn, an der Süd-

westseite des Gipfels (Guthnick, Brunner). Schwalmeren (Bamberger), Lattreienalp und Oldenhorn (Vulpius).

Seguieri Spreng. Auf höheren Alpen hin und wieder. Faulhorn (Brown). An Felsen des Kalli am Grindelwalder-Eismeer (Fischer-Ooster). Am Eiger in der Nähe der Clubhütte, 2800^m (Lindt). Am Aargletscher (Schärer).

androsacea L. Auf steinigen Weiden und Felsblöcken der höheren Region gemein.

cernua L. Am Nordabhang des Sanetsch unter überhängenden Felsen, in wenigen Exemplaren (Leresche). Eine in der Schweiz sehr seltene, ausser dem angegebenen Standort noch an einer Stelle der südlichen Abdachung der Gebirgskette, in den Alpen von Lens gefundene Pflanze. — In Spitzbergen und Grönland bis zum 80°.

•• *rotundifolia L.* An feuchten, schattigen Stellen, in Wäldern und Gebüschern der unteren und mittleren Region, häufig.

Anmerkung. *S. tridactylites L.*, in der Nähe der nördl. Gebietsgrenze an der Aare bei Thun (Brown). — Die Angabe von *S. stenopetala Gaud.* auf dem Faulhorn beruht auf einem Irrthum (Christener). — Von hybriden Zwischenformen wurden im Oberlande gefunden: *S. mutata* × *aizoides Girtanner*, auf Nagelfluh in den Schluchten des Hünibaches und Guntenbaches. — *S. caesia* × *aizoides Engler* (*S. patens Gaud.*) am Oldenhorn bei 2900^m (v. Rütte). — *S. oppositifolia* × *biflora Engler* (*S. spuria Kerner*) an der Sefinenfurke (Hieronymus).

Chrysosplenium. Milzkraut.

* *alternifolium L.* An Bächen und feuchten Orten der Wälder in der unteren und mittleren Region gemein. — Selten in der oberen Region, in der Nähe der Sennhütten, z. B. Wixihütten auf der Wengernalp 1876^m (Rothenbach), Olt-scherenalp bei den Oberfeldhütten 1853^m!

Anmerkung. *C. oppositifolium L.*, unweit der nördl. Gebietsgrenze im Heimberg bei Thun (Brown).

39. Umbelliferen.

Sanicula. Sanikel.

* *europæa* L. In feuchten Wäldern der unteren Region häufig.
— Beatenberg bei 1260^m!

Astrantia. Sterndolde.

minor L. Auf Grasplätzen und Felsblöcken von der unteren bis in die obere Region stellenweise sehr häufig. N.-Abhang der Ralligstöcke (Fischer-Ooster), Beatenberg bei 1200^m! Häufig am Niederhorn und Gemmenalphorn bis 2000^m! Aarthal vom Kirchet bis auf die Grimsel häufig! Urbachthal bis zur Urnenalp! Gadmenthal! Faulhorn! Kastenstein am Grindelwaldgletscher, 2362^m (Lindt). Von Wengen (1300^m) bis zur Wengernalp! Trachsellauen von c. 1000^m bis zur Oberhornalp, 2000^m! Mürren! Im oberen Suldthal! Untere Bundalp im Kienthal! Hintergrund des Gasterenthals (Vulpius). Von Kandersteg bis zur Gemmi! Oldenalp (Leresche)! Niesen, am Ahorni (Vulpius). — Fehlt dem Jura.

major L. Auf Wiesen und Weiden der Voralpen sehr häufig; seltener in der höheren Region, z. B. Wengernalp am Eiger-gletscher, 1950^m (Rothenbach). — Stellenweise bis in die Täler herabsteigend, so im Stockenthal! Burgholz bei Wimmis! Am Thunersee längs des südwestl. Ufers von Spiez bis Därligen stellenweise häufig! Unspunnen! Gsteig! Reichenbach bei Meiringen (Brunner) u. a. O. — Auch im südlichen und mittleren Jura verbreitet.

Anmerkung. *Eryngium alpinum* L. nach Aretius am Niesen, wurde in neuerer Zeit nicht wieder gefunden. Der Standort am Jochpass liegt ausserhalb des Gebiets. — *Cicuta virosa* L. unweit der nördlichen Gebietsgrenze auf dem Schmidmoos bei Amsoldingen.

Apium. Selleri.

* [*graveolens* L.] In Gemüsegärten cultivirt.

Petroselinum. Petersilie.

* [*sativum* Hoffm.] Wie vorige.

Trinia.

vulgaris D. C. Auf Kalkfelsen am Eingang des Simmenthals bei Wimmis. — Eine Pflanze der westlichen und südlichen Schweiz.

Aegopodium. Geissfuss.

* *Podagraria* L. *Baumtropfen*. In Hecken, an Wegen, in der Nähe der Häuser, gemein. Wengen bei 1300^m!

Carum. Kümmel.

* *Carvi* L. Auf etwas feuchten Wiesen und Weiden, von der Ebene bis in die höhere Region gemein. Kl. Scheideck, 2069^m! Am Faulhorn Gipfel (Martins).

Pimpinella. Biebernell.

* *magna* L. In Gebüsch, auf Wiesen und Weiden von der Ebene bis in die obere Region gemein. — *Var. rosea* häufig auf Alpenweiden.

* *Saxifraga* L. Wie vorige, doch mehr an trockeneren Standorten.

Berula. Berle.

* *angustifolia* Koch. In Gräben der unteren Region, hin und wieder, z. B. Reutigenmoos! Spiez!

Anmerkung. *Sium latifolium* L. unweit der nördlichen Gebietsgrenze bei Amsoldingen (Guthnick).

Bupleurum. Hasenohr.

ranunculoides L. An felsigen Orten der oberen Region ziemlich häufig. — Stellenweise in die Thäler herabsteigend, z. B. Grindelwald auf einem Hügel oberhalb des »Adler« bei c. 1100^m! An Kalkfelsen bei der Simmenbrücke am Eingang des Simmenthals, 630^m!

stellatum L. Auf Gneissfelsen im südöstlichen Gebiet stellenweise häufig. Zwischen Gadmern und der Steinalp! Guttannen und Grimsel (Brunner), Urnenalp im Urbachthal!

Anmerkung. *B. falcatum* L. Meiringen (Guthnick), kaum einheimisch; eine Pflanze der wärmeren Schweiz.

Aethusa. Gleisse.

* *Cynapium* L. *Hundspetersilie*, *Gartenschierling*. Auf Aeckern und als Gartenunkraut, in der unteren Region gemein.

Foeniculum. Fenchel.

[*officinale* All.] In Weinbergen bei Spiez! (cultivirt).

Libanotis. Heilwurz.

montana Crantz. (*Seseli Libanotis* Koch.) An Felsen der unteren Region stellenweise häufig; vorzugsweise auf Kalkstein. Am Eingang des Simmenthals bei Wimmis! Goldei bei Interlaken! Ringgenberg! Ballenberg bei Brienz! Meiringen! Innerkirchen (auf Gneiss)! — Seltener in der mittleren und höheren Region, z. B. Bussalp bei Grindelwald (Prof. Brunner), Lattreienalp (Vulpius). An der Stockhornkette am Bürglen (Leresche), Ganterischalp (Hügli), Nünennen (Brügger).

Anmerkung. *Seseli coloratum* Ehrh., unweit der nördl. Gebietsgrenze auf der Thunerallmend (Brown).

Athamanta. Augenwurz.

cretensis L. Auf Kalkfelsen und im Geröll der mittleren und oberen Region, ziemlich häufig. — Stellenweise bis in die Thäler herabsteigend; z. B. im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers, (1000^m)! An der Kien bei Kienthal! am Eingang des Simmenthals bei Wimmis, c. 630^m! — Selten auf Gneiss: Urnenalp im Urbachthal!

Silaus. Silau.

* *pratensis* Bess. Auf Sumpfwiesen der unteren Region hin und wieder. Thun! Unweit der Kanderamündung!

Meum. Bärwurz.

Mutellina Gärtner. *Mutteren*. Auf Alpenweiden häufig; selten unterhalb der Waldgrenze, z. B. Mürren bei 1700^m! — Fehlt dem Jura.

Gaya.

simplex Gaud. Auf Alpenweiden stellenweise häufig. — Bis über die Schneegrenze aufsteigend, z. B. Schneehorn an der Jungfrau bei 3000^m (Fellenberg). — Fehlt dem Jura.

Levisticum. Liebstöckel.

- [*officinale Koch.*] In Gärten der Alpendörfer ziemlich häufig cultivirt.

Angelica.

- * *silvestris L.* In lichten Wäldern und Gebüschern der unteren Region an feuchten Orten häufig. Wengen bei 1300^m! — *Var. montana (A. montana Schleich.)* In Bergwäldern hin und wieder, z. B. Grüsisberg bei Thun, Giessbach (Fischer-Ooster).

Peucedanum. Haarstrang.

Cervaria Lap. Auf Kalkfelsen am Thunersee zwischen Merligen und Neuhaus!

Oreoselinum Mönch. Meiringen (Guthnick). — Wie die vorige eine Pflanze der wärmeren Schweiz.

austriacum Koch. An Kalkfelsen beim Weissenburgbad (schon von Haller citirt). An der Wandeliflüh bei Reidenbach im Obersimmenthal (Maurer). — Eine Pflanze der südlichen Schweiz.

Thysselinum.

- * *palustre Hoffm. (Peucedanum Mönch.)* Auf Sumpfwiesen und Torfmooren der unteren Region hin und wieder. Reutigenmoos!

Imperatoria. Meisterwurz.

Ostruthium L. (Peucedanum Koch.) Auf Alpenwiesen, in lichten Wäldern, von der unteren bis in die obere Region, stellenweise häufig, z. B. Burgfeldalp ob Beatenberg! Oberhaslithal von der Handeck bis auf die Grimsel! Rosenloui (Fischer-Ooster). Faulhorn! Mürren! Trachsellaunen, häufig von 1000^m bis gegen die Oberhornalp (2000^m)! Gemmi! Laubhorn bei Lenk (Meissner). Stockhornkette, auf der Wallopalp! und am Sohlhorn (Vulpus). — Fehlt dem Jura.

Anmerkung. Pastinaca sativa L. Auf Wiesen, an Wegen (Brown) — ob im Gebiet? Diese in der ebeneren Schweiz stellenweise häufige Pflanze scheint im Oberlande kaum einheimisch.

Heracleum. Bärenklau.

- * *Sphondylium* L. Auf Wiesen der unteren und mittleren Region gemein; an gedüngten Stellen bis gegen die Waldgrenze, z. B. Mürren!
- * *montanum* Schleich. (*H. asperum* Koch.) In Bergwäldern, hin und wieder. Beatenberg!

Laserpitium. Laserkraut.

latifolium L. Auf Wiesen und an felsigen Orten der Voralpen, stellenweise häufig, z. B. Balmholz am Thunersee (Brown), Rugen bei Interlaken! Meiringen (Hügli), Wengen! Kienthal! Kandersteg! Schwarzenmatt bei Boltigen! Thalberg an der Stockhornkette (Brügger), Burgfluh bei Wimmis! — Selten in der oberen Region, z. B. Bürglen (Maurer). — *Var. asperum* bei Grindelwald (Fischer-Ooster).

Siler L. Auf Kalkfelsen der unteren Region, hin und wieder. Häufig zwischen Neuhaus und der Beatenhöhle! und bis gegen Beatenberg, c. 1000^m, aufsteigend! Ballenberg bei Brienz! Brünig (Brunner), Meiringen! Grindelwald! Trachsellaunen! Schwarzenmatt bei Boltigen (Hügli), Burgfluh bei Wimmis!

hirsutum Lam. (*L. Panax* Gouan. *L. Halleri* All.) Auf Weiden und an felsigen Orten der Voralpen hin und wieder. Hohgant (Imobersteg), Grimsel und Guttannen (Brunner), Urnenalp im Urbachthal! Grindelwald gegen das Faulhorn! Wengen bei 1400^m! — Fehlt dem Jura.

Daucus. Mohrrübe.

- * *Carota* L. Auf trockenen Wiesen, an Wegen, in der unteren Region gemein. Beatenberg bei 1200^m! — Cultivirt bis in die höhere Region, z. B. Engstlenalp, 1839^m. Stein am Susten 1868^m (Rätzer).

Torilis. Borstendolde.

- * *Anthriscus* Gmel. In Hecken und Gebüsch der unteren Region gemein. Beatenberg bei 1000^m!

Anthriscus. Klettenkerbel.

- * *silvestris Hoffm.* Auf Wiesen, in Hecken und Gebüsch der unteren und mittleren Region gemein. — *Var. alpestris* im Geröll bei Stocken (Bamberger nach Rhiner).
* [*Cerefolium Hoffm.*] In Gärten cultivirt und hie und da verwildert.

Chærophyllum. Kälberkropf.

- * *aureum L.* In Hecken, auf Wiesen, von der Ebene bis in die mittlere Region hin und wieder, z. B. Spiez! Mürren bei 1630^m!
Villarsii Koch (C. hirsutum L. nach Greml.) Auf Wiesen und Weiden der Voralpen häufig, z. B. Beatenberg, Mürren! Wengen! Grindelwald u. a. O. — Stellenweise bis an den Fuss der Berge, z. B. Reichenbach bei Meiringen!
* *Cicutaria Vill. (C. hirsutum Koch.)* Auf feuchten Wiesen, an Bächen, von der Ebene bis in die höhere Region ziemlich häufig.

Myrrhis. Süssdolde.

- .. [*odorata Scop.*] Auf Wiesen, in Baumgärten in der Nähe der Häuser, hin und wieder. Grüsisberg bei Thun (Brown), Homberg! Beatenberg! Wengen! Kanderthal! Klus bei Boltigen (Leresche) u. a. O. — Kaum einheimisch.

Anmerkung. *Conium maculatum L.*, nach Brown bei Sichelauenen im Lauterbrunnenthal, wurde in neuerer Zeit nicht mehr gefunden. — Eine Pflanze der wärmeren Schweiz.

40. Araliaceen.

Hedera. Efeu.

- * *Helix L.* In wärmeren Lagen der unteren Region, in Wäldern, an alten Mauern und Bäumen häufig; in kräftigen (reichlich blühenden) Exemplaren bei Oberhofen! Gunten! Spiez! am Gemäuer der Ruinen von Unspunnen! Ringgenberg! u. a. O. — Beatenberg bei 1150^m (Krähenbühl).

41. Corneen.

Cornus. Hornstrauch.

- * *sanguinea* L. *Rother Hartriegel*. In Hecken, an Waldrändern der unteren Region, ziemlich häufig.
- * [*mas* L. *Kornelkirsche. Thierlibaum.*] In der unteren Region hin und wieder cultivirt, z. B. Thun! Spiez!

42. Caprifoliaceen.

Adoxa. Bisamkraut.

- * *Moschatellina* L. An etwas feuchten, schattigen Orten, in Hecken und Gebüsch, von der Ebene bis in die obere Region. Häufig in den Umgebungen von Thun, am Bächihölzli! Hünibach! Anhöhen bei Goldiwyl! — Im übrigen Theil des Oberlandes an vereinzelt Stellen: Spiez! Meiringen (Brunner), Justisthal bei c. 1000^m! Mürren, im Schatten grosser Felsblöcke, c. 1650^m! Wengernalp bei den Wixihütten (Rothenbach).

Sambucus. Hollunder.

- * *Ebulus* L. *Zwerghollunder*. In Wäldern, besonders auf Lichtungen, und auf etwas feuchten Weideplätzen der unteren Region, häufig. — Wengen bei 1300^m!
- * *nigra* L. *Schwarzer Hollunder. Holder*. In Gebüsch und in der Nähe der Häuser, hin und wieder. — Oberhalb Brienz bei c. 1000^m! An der Thürifuh bei Reichenbach bis gegen die Waldgrenze (Maurer).
- * *racemosa* L. *Waldhollunder. Traubenhollunder*. In Gebüsch und lichten Wäldern, auf Weiden in der Nähe der Hütten, in der unteren und mittleren Region ziemlich häufig. — Wengen bei 1400^m! Engstligenalp bei c. 1800^m (v. Rütte). — Im Oberhasli bis über die Tannengrenze (Kasthofer.)

Viburnum. Schneeball. Schlinge.

- * *Lantana* L. *Mehlbaum*. In Gebüsch, an Waldrändern der unteren Region ziemlich häufig. Beatenberg bei 1030^m! Obersimmenthal, bis in die mittlere Region (Maurer).

* *Opulus L. Schneeballenbaum.* An wärmeren Stellen der unteren Region, hin und wieder.

Lonicera.

.. [*Caprifolium L. Geissblatt.*] Als Zierpflanze cultivirt und hie und da verwildert, z. B. in Gebüsch bei Ringgenberg!

.. *Periclymenum L.* Grüsisberg bei Thun, am Weg nach Goldiwyl (Fischer-Ooster).

* *Xylosteum L. Beinweide.* In Wäldern und Gebüsch der unteren Region gemein.

.. *nigra L.* In Wäldern der unteren und mittleren Region ziemlich häufig. Grüsisberg bei Thun (Brown), Stockenthal! Beatenberg! Wengen! Kandergrund! u. a. O.

* *cærulea L.* In Wäldern und Gebüsch von der unteren bis in die obere Region hin und wieder, z. B. Sulwald ob Eisenfluh! Schwarzwald in Ammerten! Busenalp im Lauterbrunnenthal (Fischer-Ooster), Rosenloui (Brunner), Saanenmöser und Gsteig bei Saanen (Leresche). — Im nördlich angrenzenden Hügelland noch bei Schwarzeneck (Vulpis) und auf dem alten Kandergrien bei Thun (Brown).

alpigena L. In Wäldern der unteren und mittleren Region, an feuchten, felsigen Orten hin und wieder, z. B. Stockenthal (Brown), Spiezfluh! Breitlauen ob Interlaken! Giessbach! Rosenloui (Brunner); Wengen! Sulwald ob Eisenfluh! Suldthal! Obersimmenthal (Maurer), Wallopalp bei Boltigen (c. 1700^m)! — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel (Brügger) und auf dem alten Kandergrien bei Thun (Brown).

43. Rubiaceen (Stellaten).

Sherardia.

* *arvensis L.* Auf Aeckern der unteren Region häufig. — Wengen bei 1300^m!

Asperula. Waldmeister.

laurina L. Im östlichen Gebiet, von Meiringen bis an den Thunersee, in Hecken und Gebüsch der unteren Region,

Bern. Mittheil. 1875.

Nr. 883.

stellenweise häufig: Kirchet bei Meiringen! Ballenberg! Brünig! Häufig am Brienersee, z. B. Brienz! (am Weg zur Planalp bis c. 1100^m), Oberried! Ringgenberg! Giessbach! Iseltwald! — Seltener im unteren Lauterbrunnenthal von Wilderswyl und Gsteig bis Zweilütschinen! Interlaken! Sundlauenen am Thunersee!

•• *cynanchica* L. An trockenen, steinigen Abhängen hin und wieder. Thun (Brown), Meiringen (Brunner).

* *odorata* L. Waldmeister. Häufig in Wäldern der unteren Region.

Anmerkung. *Rubia tinctorum* L. Verwildert an einer Mauer unterhalb der Kirche von Spiez!

Galium. Labkraut.

* *cruciatum* Sm. (*G. Cruciata* Scop.) In Hecken und im Geröll, an Waldrändern von der Ebene bis gegen die Waldgrenze, ziemlich häufig. — Nordabhang des Männlichen bei 1800^m!

* *Aparine* L. In Hecken und auf Aeckern gemein. Wengen bis c. 1450^m! — Zu dieser Art gehört als Form *G. tenerum* Schleich. Schönbalm im Trümletenthal unter überhängenden Felsen (Rothenbach). Gemmi (Seringe nach Gaud. Flor. helv.)

* *uliginosum* L. In Sümpfen, an Gräben der unteren und mittleren Region, hin und wieder. Waldeckallmend bei Beatenberg, 1340^m!

* *palustre* L. An sumpfigen Stellen hin und wieder.

* *rotundifolium* L. In Wäldern der unteren und mittleren Region stellenweise häufig, z. B. bei Interlaken! Zwischen Lauterbrunnen und Mürren! Wengen bei 1400^m u. a. O.

•• *boreale* L. Auf Sumpfwiesen, selten. Saanenmöser (Prof. Brunner).

* *verum* L. An steinigen Orten, an Wegen und Ufern der unteren Region hin und wieder.

- * *silvaticum* L. In Wäldern und Schluchten hin und wieder. Häufig in der Kohlerenschlucht bei Thun! Zwischen Meiringen und Rosenlauri! (Brunner) u. a. O.
- * *Mollugo* L. In Hecken und Gebüsch gemein. — Die z. Thl. als Arten beschriebenen Formen (*G. elatum* Thuill., *G. erectum* Huds. u. a.) sind im Oberlande noch genauer zu beobachten.
- * *silvestre* Poll. An steinigen Orten, auf trockenen Grasplätzen von der Ebene bis in die obere Region häufig. — *Var. glabrum* Koch, bei Thun (Fischer-Ooster). — *Var. alpestre* Koch, auf Alpenweiden häufig. — Auch bei dieser Art sind die Varietäten und ihre Verbreitung noch näher zu untersuchen.
- helveticum* Weig. Auf etwas feuchtem Sand- oder Kiesboden der höheren Region, im Geröll der Gletscherbäche und auf Schutthalden häufig. — Stellenweise in die Thäler herabgeschwemmt, z. B. an der Kanderemündung! — Selten an der Stockhornkette, Felsgeröll am Ganterisch (Guthnick).

44. Valerianeen.

Valeriana. Baldrian.

- * *officinalis* L. In Hecken und Gebüsch der unteren, stellenweise auch der mittleren Region: Wengen bei 1400^m! Mettlenalp bei Wengernalp, 1700^m (Rothenbach). — Auf Gneiss bei Trachsellauen. — *Var. angustifolia* an steinigen Orten hin und wieder, z. B. Wengen bei 1300^m! Beatenberg, 1250^m!
- * *dioica* L. An Gräben und Bächen, auf nassen Wiesen der unteren und mittleren Region ziemlich häufig. Schwefelberg bei 1400^m (Hügli).
- *tripteris* L. An etwas feuchten, felsigen Orten, in Wäldern und Schluchten der unteren und mittleren Region ziemlich häufig; bis in die höhere Region aufsteigend, z. B. Wengernalp am Eigergletscher (Rothenbach). — Im nördlich angrenzenden Gebiet am Gurnigel und an Molassefelsen im Schwarzwasserthal.

montana L. An etwas feuchten Felsen und Blöcken der mittleren und oberen Region hin und wieder, z. B. Rosenloui (Brunner), Faulhorn (Brown), Suleck (Hügli), Busenalp im Sefinenthal (Fischer-Ooster), Gemmi (Brown), Kiley an der Niesenkette (Brown), Südseite des Ganterisch (Vulpus). — Selten in der Ebene, z. B. im alten Kandergrien bei Thun (Brown).

Anmerkung. *V. montana* × *tripteris* (*V. intermedia* Vahl?). Hierher gehört wahrscheinlich die von Trachsel (Verzeichniss der Pflanzen der Stockhornkette) erwähnte Pflanze aus der Gegend des Ochsen.

Valerianella. Feldsalat.

- * *olitoria* Pollich. *Nüsslikraut*. Auf Wiesen und Aeckern der unteren Region stellenweise häufig.
- * *carinata* Lois. Wie vorige.
- * *Auricula* D.C. Im Getreide, selten. Bei Thun!
- * *Morisonii* D.C. (*V. dentata* Koch). Ebenso.

45. Dipsaceen.

Dipsacus. Karden.

- *silvestris* Mill. An wärmeren Orten der unteren Region, auf steinigem, etwas feuchtem Boden ziemlich selten. Interlaken an der Aar! Golzwyl! Ringgenberg! Ballenberg bei Brienz (Hügli). — Latterbach im Simmenthal!
- *pilosus* L. Wie vorige und z. Thl. an denselben Standorten: Glockenthal bei Thun (Brown). An der Aar zwischen Unterseen und Golzwyl! Ringgenberg! Ballenberg bei Brienz! Am Eingang des Kienthals (Fischer-Ooster), Garstatt bei Boltigen (Maurer), Stockenthal!

Cephalaria.

alpina Schrad. Tschertschisthal bei Saanen im Geröll, selten (Leresche). Die Angabe von Brown: »Stockhornkette, sehr selten«, bedarf der Bestätigung und genauerer Bezeichnung des Standorts. — In den angrenzenden Waadt-

länder- und Freiburgeralpen, sowie im südl. Jura an mehreren Orten vorkommend.

Knautia.

* *silvatica* Duby. In der unteren und mittleren Region, an feuchten, schattigen Orten, in Wäldern, gemein. — Stellenweise bis über die Waldgrenze, z. B. Oberbergalp im Sefinenthal bei c. 1900^m!

* *arvensis* Coult. Auf Wiesen, an Wegen gemein; von der Ebene bis in die mittlere Region.

Succisa.

* *pratensis* Mönch. Auf feuchten Wiesen und Weiden der unteren und mittleren Region gemein.

Scabiosa. Krätzkraut.

* *columbaria* L. Auf trockenen Grasplätzen, und steinigten Orten der unteren und mittleren Region gemein. — Stellenweise bis in die obere Region, z. B. am Bürglen (Maurer).

lucida Vill. Auf Weiden und Schutthalden der höheren Region hin und wieder. Oltscherenalp (Hasli)! Faulhorn (Guthnick), Trümmletenthal auf Schutthalden am Fuss des Mönch, c. 2000^m! Busenalp im Sefinenthal (Fischer-Ooster), Gemmi oberhalb Schwarrenbach (Brown), Bürglen (Guthnick).

46. Compositen.

Eupatorium. Wasserdost.

* *cannabinum* L. An Gräben und feuchten Orten der Wälder und Gebüsch häufig. — Beatenberg bei 1050^m!

Adenostyles. Drüsengriffel.

.. *albifrons* Rb. In feuchten Wäldern, hin und wieder, z. B. Rosenloui (Brunner), Schwarzwald in Ammertten (Fischer-Ooster), Adelboden (v. Rütte), Bürglen (Maurer), Wirtnerenalp ob Blumenstein (Vulpius).

alpina, Bl. et Fing. In feuchten Wäldern der unteren und mittleren Region häufig; stellenweise auch an schattigen Orten der oberen Region.

Homogyne.

- *alpina* Cass. Auf feuchten, etwas beschatteten Weiden, an Waldrändern der mittleren Region häufig; seltener in der unteren und oberen Region, z. B. Reutigenmoos bei c. 615^m! Gipfel des Männlichen, 2345^m!

Tussilago. Huftattich.

- * *Farfara* L. Auf feuchtem Lehmboden der unteren und mittleren Region häufig; seltener in der höheren Region, z. B. Wengernalp am Eigergletscher, c. 1920^m (Rothenbach), Briener Rothhorn bei c. 2000^m!

Petasites. Pestwurz.

- *officinalis* Mönch. Auf nassen Wiesen, an Bächen, von der Ebene bis in die mittlere Region, hin und wieder. Bächi-matt bei Thun (Rothenbach), Justisthal von 1100^m—1300^m! Rosenloui (Brunner), Grindelwald (Rhiner), Obersimmenthal, bis in die mittlere Region (Maurer).
- *albus* Gärtner. In feuchten Waldschluchten, auf Geröllhalden, an Gräben und Bächen, in der unteren und mittleren Region stellenweise häufig, z. B. am Grüsisberg und bei Oberhofen (Fischer-Ooster), Därligen! Lauterbrunnenthal! Rosenloui (Brunner). Häufig im Obersimmenthal (Fischer-Ooster).

niveus Baumg. An feuchten Stellen der mittleren und oberen Region stellenweise häufig, z. B. Justisthal (Vulpus). Am Weg von Breitlauenen zur Schynigen Platte, bei c. 1900^m! An mehreren Stellen auf den Alpen des oberen Lauterbrunnenthals! Suldthal! Am Oeschenensee! Gemmi (Rhiner), Adelbodenthal! Iffigenthal (Rhiner). Stockhornkette an den Krümmelwegen (Fischer-Ooster). — Dem Schweizer Jura fehlend.

Aster.

alpinus L. An felsigen Stellen der oberen Region ziemlich häufig.

Anmerkung. *A. salignus* Willd., verwildert auf Sumpfwiesen am Thunersee bei Neuhaus (Fischer-Ooster).

Bellidiastrum.

- *Michelii* Cass. An feuchten Stellen, im Geröll, an schattigen Felsen vom Fuss der Berge bis in die höhere Region häufig.

Bellis. Gänseblümchen. Maasliebe.

- * *perennis* L. Auf Grasplätzen der unteren und mittleren Region gemein; stellenweise bis in die obere Region, z. B. Oberberg im Sefinenthal bis gegen 2000^m!

Erigeron. Berufkraut.

- * *canadensis* L. An kiesigen Orten der unteren Region.— Auf Gneiss bei Innerkirchen! — (Aus N.-Amerika stammend).
* *acer* L. An trockenen, steinigen Orten der unteren Region. Auf Gneiss im Oberhasli. — *Var. E. dröbachensis* Müll. (*E. angulosus* Gaud.), hin und wieder im Geröll der Alpenbäche, z. B. an der Kander zwischen Wimmis und Spiez! an der Aar bei Meiringen (Brunner) u. a. O.

Villarsii Bell. Auf Alpenweiden hin und wieder. — Faulhorn (Christener), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (v. Rütte), Gasterenthal (Vulpus). Stockhornkette am Thalberg (Trachsel) und Bürglen (Guthnick).

alpinus L. An felsigen Orten der oberen Region häufig.

glabratus Hoppe et Hornsch. In der oberen Region hin und wieder, z. B. Hohstollen (Hasliberg), Faulhorn (Brunner), Lattreienalp (Vulpus), Kiley an der Niesenkette (Dr. Sterki). — Nicht selten an der Stockhornkette: Kaisereck und Bürglen (Leresche), Schwefelbergalp (Christener), Ganterisch (Guthnick) u. a. O.

uniflorus L. An felsigen Orten der höheren Alpen, stellenweise häufig, z. B. Faulhorn (Brunner), Schneehorn an der Jungfrau bis c. 3000^m (Fellenberg), Oberhorn im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (auf Gneiss)! Obere Oeschenenalp! Gemmi (Brown), Kiley an der Niesenkette (Brown), Ganterisch und Nünene (Brügger).

Solidago. Goldruchte.

- * *Virga aurea* L. In Wäldern der unteren und mittleren Region häufig. — *Var. alpestris* und *cambrica* Koch, auf Alpenweiden gemein.

Bupthalmum. Rindsauge.

salicifolium L. An steinigen Orten, an sonnigen Abhängen, längs des Thuner- und Brienersees stellenweise häufig, z. B. zwischen Ralligen und Neuhaus, bis gegen Beatenberg c. 1200^m ansteigend! Goldei bei Interlaken! Brienz! Meiringen! Innerkirchen (auf Kalkstein und Gneiss)!

Inula. Alant.

- .. *Vaillantii* Vill. In der Nähe der Kandermündung (Brown)! — Eine in der Schweiz wenig verbreitete (an der Aar zwischen Thun und Bern stellenweise häufige) südeuropäische Pflanze.

- * *Conyza* D.C. (*Conyza squarrosa* L.) An steinigen Orten, in Gebüsch der unteren Region hin und wieder. Zwischen Merligen und Neuhaus! Golzwyl! Ballenberg bei Brienz! Meiringen (Brunner), Klus bei Boltigen (Hügli) u. a. O.

Anmerkung. *I. salicina* L. In der Nähe der nördlichen Gebietsgrenze, Kandergrien und Rossweid bei Thun (Brown).

Pulicaria. Flöhkraut.

- * *dysenterica* Gärtner. An Gräben, auf feuchten Weiden der unteren Region, hin und wieder. Goldei bei Interlaken!

Bidens. Zweizahn.

- .. *cernuus* L. An Gräben und feuchten Orten, besonders auf Torfboden in der unteren Region, stellenweise häufig, z. B. am Faulensee bei Ringgenberg! Auf feuchten Aeckern auf dem Kirchet bei Meiringen! u. a. O.

- .. *tripartitus* L. Wie vorige. Reutigenmoos! Spiezmoos! Interlaken an der Aar! Winkel bei Innerkirchen!

Carpesium. Kragenblume.

cernuum L. Auf feuchten Grasplätzen, in Gebüsch, selten: Zwischen Bönigen und Iseltwald am Eingang einer kleinen

Schlucht (Brown). Am Fuss des Ballenbergs, zwischen Brienz und der Wylerbrücke (Brown, Leresche). — Nach Gaud. Flor. helv. in der Goldei bei Interlaken (scheint daselbst nicht mehr vorzukommen).

Gnaphalium. Ruhrkraut.

* *silvaticum* L. In Wäldern, besonders in Lichtungen, gemein; bis in die obere Region aufsteigend, z. B. Engstlenalp (Fischer-Ooster).

norvegicum Gunner. Auf Weiden der mittleren und höheren Region hin und wieder. Grimsel! Faulhorn. Mürren! u. a. O. — Fehlt dem Jura.

supinum L. Auf Weiden der höheren Region ziemlich häufig. — *Var. G. fuscum* Scop. und *G. pusillum* Willd. auf höheren Alpenweiden hin und wieder.

* *uliginosum* L. Auf feuchten Aeckern, selten. Oberhasli zwischen Inner Urweid und Guttannen!

Leontopodium Scop. (*Leontopodium alpinum* Cass.) Edelweiss. An felsigen Orten der oberen Region, auf verschiedenem Gestein, hin und wieder, z. B. Ralligstöcke! Burgfeldstand ob Beatenberg! Engstlenalp, Gadmen. Am Unteraargletscher (Girard nach Desor). Mattenalp im Urbachthal (Lindt). Faulhorn, Gleckstein am Wetterhorn, bei 2300^m (Lindt). Sausboden zwischen Sausthal und Suleck, Lattreienalp, Dürrenberg im Kienthal! Oeschenenalp! Gemmi (Brown). Am Iffigensee im Obersimmenthal (Meissner), Rawyl und Oldenhorn (Leresche). Niesen, Widdergalm (Imobersteg), Bürglen (Trachsel), Stockhorn (häufig an der Südseite des Gipfels)! u. a. O. — Selten in der mittleren Region, z. B. zwischen der Boltigenklus und der Wallopalp (Maurer). — Im Jura am Gipfel der Dôle.

•• *dioicum* L. (*Antennaria* D. C.) Auf trockenen Gras- und Heideplätzen, von der Ebene bis in die obere Region stellenweise häufig.

carpathicum Wahl. (*Antennaria* Bl. et Fing.) Auf Alpenweiden hin und wieder: Faulhorn (Brunner), Lattreienalp (Vulpius), Lötschpass! Gemmi (Brown), Oldenalp (Leresche), Bürglen (Trachsel), Ganterisch (Brügger), Nünenen (Brown). — Fehlt dem Jura.

Artemisia. Beifuss.

* [*Absinthium* L. *Wermut.*] In Gärten häufig cultivirt und hin und wieder an Wegen und Ackerrändern verwildert, z. B. Lütschenthal! Wengen bei 1200^m!

Mutellina Vill. An Felsen der höheren Alpen, besonders in der Nähe der Schneelinie, auf verschiedenem Gestein, hin und wieder, z. B. am Unteraargletscher (Girard nach Desor), Urnenalp im Urbachthal! Wellhorn und Garzen bei Rosenloui (Brunner), Faulhorn (Brunner), Zäsenberg bei Grindelwald (Dr. Fankhauser), Schneehorn an der Jungfrau bei c. 3000^m (Fellenberg), Roththal (Fischer-Ooster), Schilthorn! Glütschalp im Kienthal und im oberen Gasterenthal (Vulpius), Niesen (Brown), Gipfel des Ganterisch (Trachsel). — Selten in die Thäler herabsteigend, z. B. im Kies am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei c. 1000^m! Kander bei Reutigen (Vulpius).

spicata Wulf. Wie vorige und zum Theil an denselben Standorten. Hohstollen (Hasliberg)! Grimsel (Girard), Oberaarhorn bei 3400^m (Lindt), Garzen ob Rosenloui (Brunner), Kastenstein am Grindelwaldgletscher (Lindt), Faulhorn (Guthnick), Schneehorn an der Jungfrau bei c. 3000^m (Fellenberg), Roththal (Fischer-Ooster), Gr. Hundshorn! Gemmi (Brown), Wildhorn bei Lauenen (v. Rütte), Oldenhorn (Leresche).

•• *vulgaris* L. In der unteren Region, an Wegen, in der Nähe der Häuser, hin und wieder, z. B. Thun (Brown), Lütschenthal! Wengen bei 1200^m! Schwarzenmatt bei Boltigen (Hügli). — Auf Gneiss im Oberhasli!

Tanacetum. Rainfarn.

- [*vulgare* L.] In Gärten hin und wieder cultivirt und in der Nähe derselben verwildert.

Achillea. Schafgarbe.

- *Ptarmica* L. In der unteren Region, an Gräben und feuchten Stellen, selten: Gsteig (Guthnick), Brünig (Brunner).

macrophylla L. In Wäldern und an schattigen Orten der Alpen und Voralpen. Im Gneissgebiet stellenweise häufig: Gadmen-, Guttannen- und Urbachthal! Trachsellaunen von c. 1000^m bis c. 2000^m! Gasterenthal am Alpetligletscher (Vulpius)! — Mürren am Fuss des Brünlihorns! An der Stockhornkette auf der Wallopalp bei Boltigen! und am Stockhorn über der Wahlpalp (Brügger).

moschata Wulf. Auf etwas feuchtem, sandigem und schief-
rigem Boden, auf mageren Weiden der höheren Region,
stellenweise häufig, z. B. Susten (Vulpius), Grimsel! Ober-
aarhorn bei c. 3400^m (Lindt), Gr. und Kl. Scheideck! —
Selten auf den äusseren Ketten. Kiley an der Niesenkette
(Brown). — Im Geröll am Fuss des unteren Grindelwald-
gletschers bei c. 1000^m!

nana L. An steinigen Orten der Hochalpen, selten. Garzen
ob Rosenlauri (Brunner), Zäsenberg am unteren Grindelwald-
gletscher (Christener). An Gneissfelsen des Kalli am Vie-
schergletscher und im Roththal an der Jungfrau (Fischer-
Ooster). — Häufiger in den Walliser Alpen. — *A. nana* ×
moschata (*A. hybrida* Koch.) am Kalli, zwischen den
Stammarten (Fischer-Ooster).

atrata L. *Schwarze Garbe.* Auf Weiden und an felsigen
Orten der höheren Region, auf verschiedenem Gestein, häufig.
— Stellenweise weit über der Schneelinie, z. B. am Finster-
aarhorn, über 4000^m (Lindt, im Jahrbuch des Schweiz.
Alpenclub Vol. VIII.), auch in tiefere Regionen herabge-
schwemmt, z. B. im Kies am Fuss des unteren Grindelwald-
gletschers bei c. 1000^m! — Diese und die drei vorigen

Species fehlen dem Jura, welcher dagegen die dem Oberlande fehlende *A. nobilis* L. besitzt.

- * *Millefolium* L. *Schafgarbe*. Auf trockenen Grasplätzen, an Wegen gemein, von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Sefinenthal bei 2000^m!

Anmerkung. *A. tanacetifolia* All. nach Gaud. Fl. helv. am Niesen. — Diese Angabe, von welcher mir keine neuere Bestätigung bekannt geworden, dürfte wohl auf einem Irrthum beruhen.

Anthemis L.

- * *arvensis* L. Auf Aeckern der unteren Region, selten. Thun! Meiringen (Brunner).

Matricaria. Kamille.

- * [*Chamomilla* L. *Aechte Kamille*.] Hin und wieder cultivirt und in der Nähe der Gärten verwildert, z. B. Thun! Spiez! u. a. O.
- .. *inodora* L. (*Chrysanthemum* L.) Auf Aeckern der unteren Region, vereinzelt und selten. Zwischen Interlaken und Bönigen!

Chrysanthemum. Wucherblume.

- * *Leucanthemum* L. (*Leucanthemum vulgare* Lam.) Auf Wiesen und Weiden gemein; von der Ebene bis in die obere Region. — *Var. atratum* Koch (*C. atratum* Gaud.) auf Alpenweiden. — *Var. C. montanum* Koch. (*C. atratum* D.C.). Ebenso.
- coronopifolium* Vill. (*Leucanthemum* Gren. Godr. *C. Halleri* Sut.) An steinigen, etwas feuchten Stellen der höheren Region hin und wieder, z. B. Engstlenalp (Fischer-Ooster), Suleck (Fischer-Ooster), Oeschenenalp! Gemmi (Brown). Häufig am Rawyl und Sanetsch (Leresche), Gifferhorn bei Saanen! Stockhorn! u. a. O. — Zuweilen herabgeschwemmt, z. B. Rosenlauri (Brunner), Kanderermündung (Fischer-Ooster).
- alpinum* L. (*Leucanthemum* Lam.) Wie vorige; ziemlich verbreitet, z. B. Jochpass (Fischer-Ooster), Susten (Vulpus),

Alpen von Rosenloui (Brunner), Faulhorn (Brown), Kl. Scheideck! Suleck! Sefinenfurke! Oeschenenalp! Gemmi (Gaud.), Oldenalp (Leresche), Stockhorn (Gaud.) u. a. O.

* *Parthenium Pers.* (*Leucanthemum Gren. Godr.*) *Mutterkraut*. In der unteren Region, auf Schutt, in der Nähe der Häuser, an Ackerrändern, selten. Oberhofen (Fischer-Ooster), Stoffelberg bei Därligen! Wengen bei 1200^m!

Aronicum. Schwindelkraut.

Clusii Koch. An etwas feuchten Stellen, im Geröll der höheren Alpen hin und wieder; vorzugsweise im Gneissgebiet. Am Unteraargletscher (Girard, nach Desor), Urnenalp im Urbachthal! Kalli am Vieschergletscher und Oberhorn im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Fischer-Ooster), Lötschpass! — Schwarzhorn (Brunner), Wengernalp am Eigergletscher (Rothenbach). — *Var. glaciale (A. glaciale Rb.)* Susten (Vulpus), Garzen ob Rosenloui (Brunner).

scorpioides Koch. An etwas feuchten, steinigen Orten der höheren Region, besonders auf Geröll- und Schutthalden häufig; auf verschiedenem Gestein.

Arnica. Wolverlei.

montana L. Auf Weiden und trockenen Grasplätzen in der mittleren und im unteren Theil der oberen Region, durch das ganze Oberland stellenweise häufig, z. B. Ralligstöcke (Brown). Gemmenalp! Beatenberg! Im Aarthal von der Handeck bis gegen den Aargletscher! Urnenalp im Urbachthal! Gadmen! Rosenloui (Brunner). Grindelalp! Am Weg von Grindelwald auf's Faulhorn! Kleine Scheideck! Wengen (Schiltwald) bei 1300^m! Mürren! Saxetenthal am Weg nach dem Renggli bis e. 1800^m! Birchenberg ob Leissigen! Kienthal! Alpen von Lenk! und Lauenen! — Seltener an der Niesen- und Stockhornkette. (Kiley, Niesen, Bürglen, Stockhorn). — Fehlt dem nördlich angrenzenden Hügelland; im Jura selten, dagegen häufig in den Vogesen und im Schwarzwald. — Eine schmalblättrige *Var.* bei Walleck westlich von Lenk (Fischer-Ooster).

Senecio. Kreuzkraut.

aurantiacus D.C. (*Cineraria Hoppe.*) Auf Alpenweiden der Stockhornkette stellenweise häufig: Sohlhorn (Vulpus), Wahlalp am Stockhorn! Ganterisch (Vulpus), Nünenen (Brown), Leiterengrat gegen Bürglen (Vulpus), Bürglen (Leresche), Wallopgrat! Rothenkasten (Maurer). — Ausserdem noch auf dem Sattel zwischen Faulhorn und Schwabhorn! und auf der Bettenalp!

* *vulgaris* L. Auf Aeckern, an Wegen, in der Nähe der Häuser, gemein. — Wengen im Getreide bis c. 1450^m!

•• *viscosus* L. An steinigen Orten, an Mauern und im Geröll, in der unteren und mittleren Region hin und wieder. Meiringen (Brunner)! Grindelwaldthal (Prof. Brunner), Wengen bei 1400^m! Sulldthal ob Aeschi! Latterbach (Brown), Thalberg (Trachsel), Lenk (Rhiner).

* *silvaticus* L. In Wäldern, besonders auf Lichtungen, in der unteren und mittleren Region, ziemlich häufig.

* *erucifolius* L. In der unteren Region, an Wegen, auf Weiden hin und wieder. Jakobshubel bei Thun!

* *Jacobaea* L. Wie vorige. Interlaken!

cordatus Koch. Auf Weiden der Alpen und Voralpen, in der Nähe der Sennhütten häufig. — *S. cordatus* × *Jacobaea* (*S. lyratifolius* Rb.) Rosenlauri (Brunner), Saxetenthal am Renggli (Vulpus), Niesen (Guthnick), Günzenen (Vulpus), Wahlalp am Stockhorn (Brown).

incanus L. Im südöstlichen und südwestlichen Gebiet, im Geröll in der Nähe der Schneelinie, selten: Am Unteraargletscher (Girard nach Desor). Am Gauligletscher oberhalb Urnenalp (Lindt). — Am Südabhang des Niesenhorns bei Lauenen (v. Rütte). Im Geröll östlich oberhalb der Passhöhe des Sanetsch (Centurier nach Leresche). Oldenhorn (Gaud. Fl. helv. Vol. VII.) — Häufiger in den Walliser-alpen.

Fuchsii Gmel. (*S. nemorensis* var. *Fuchsii* Koch.) In Gebüsch der unteren und mittleren Region hin und wie-

der, z. B. Meiringen (Hügli), Gadmen! Trachsellaunen! Niesen (Brown), Krümmelwege oberhalb Blumenstein (Fischer-Ooster), Schwarzenmatt bei Boltigen (Maurer) u. a. O.

Doronicum L. An felsigen Orten der höheren Region stellenweise häufig. — Im Jura auf einigen Gipfeln des südlichen Theils.

Anmerkung. Die Angabe von *S. abrotanifolius* L. in den Berneralpen (Heg. Fl. der Schweiz) beruht wahrscheinlich auf einem Irrthum.

Cirsium. Kratzdistel.

eriophorum Scop. Auf Weiden, von der unteren bis in die höhere Region, im westlichen Theil des Oberlandes stellenweise häufig: Niesen (Vulpus), Günzenen (Vulpus), Wahlalp am Stockhorn! Thalberg (Trachsel), Ganterischalp (Hügli), Klus bei Boltigen! Häufig in den Alpen von Saanen! — Im östlichen Gebiet im Justisthal. — Im Jura ziemlich verbreitet.

* *lanceolatum* Scop. An Wegen und steinigen Orten, auf Schutt, von der Ebene bis in die mittlere Region, häufig.

* *palustre* Scop. Auf sumpfigen Weiden, an Gräben von der Ebene bis in die mittlere Region gemein.

rivulare Link. Im westlichen Gebiet, auf feuchten Wiesen und Weiden der unteren und mittleren Region. Obersimmenthal (Fischer-Ooster), Brandeck oberhalb Lenk bei 1500^m! Ziemlich häufig bei Saanen! — Häufig im Jura.

heterophyllum All. Am Räterichsboden im Oberhasli (Guthnick). — Häufiger im Gotthardgebiet.

•• *acaule* All. Auf Weiden und Grasplätzen vom Fuss der Berge bis in die obere Region häufig.

spinosissimum Scop. Auf Alpenweiden gemein. — Eine der Alpenkette eigenthümliche, dem Jura fehlende Pflanze.

* *oleraceum* Scop. Auf feuchten Wiesen und Weiden von der Ebene bis in die mittlere Region gemein. Wengen bei 1400^m!

* *arvense* Scop. Auf feuchten Aeckern der unteren Region häufig.

Anmerkung. Von hybriden Zwischenformen sind beobachtet: *C. oleraceum* × *acaule* (*C. rigens* Wallr.) stellenweise häufig. — *C. rivulare* × *oleraceum* (*C. erucagineum* D.C., *Cnicus saanensis* Schleich) und *C. palustre* × *rivulare* (*C. subalpinum* Gaud.) im Saanenthal. — *C. palustre* × *oleraceum* (*C. hybridum* Koch, Matten bei Lenk (Rhiner). *C. spinosissimum* × *acaule* auf Weiden der oberen Waldregion oberhalb Stocken (Fischer-Ooster).

Carduus. Distel.

- * *crispus* L. An Wegen, auf Schutt in der Nähe der Häuser gemein; von der Ebene bis in die mittlere Region. — Auf Gneiss im Urbachthal!
- *Personata* Jacq. In Gebüsch, an Ufern, in der unteren und mittleren Region hin und wieder, z. B. Neuhaus am Thunersee! Habkerenthal (Fischer-Ooster), Grindelwald! Kienthal! Stockhornkette (Brown), Lenk (Meissner), Saanen (v. Rütte).
- *defloratus* L. Auf steinigen Alpenweiden, im Geröll der Alpenbäche bis an den Fuss der Berge, häufig. — Auf Gneiss bei Trachsellauen! — Im Geröll der Aar bis in die Gegend von Bern stellenweise häufig.
- * *nutans* L. In der unteren Region, an Wegen, auf Schutt, hin und wieder. Thun!

Anmerkung. Von Hybriden sind beobachtet: *C. crispus* × *nutans* (*C. polyacanthos* Schl.), am Eingang des Simmenthals bei Wimmis (Gaud. Flor. helv.). — *C. crispus* × *defloratus* bei Kienthal!

Lappa. Klette.

- *major* Gärtner. (*L. officinalis* All.) In der unteren Region hin und wieder, z. B. bei Wimmis und Sigriswyl (Fischer-Ooster).
- *minor* D. C. An Wegen, auf Schutt, in der Nähe der Häuser von der Ebene bis in die mittlere Region, ziemlich häufig. — Auf Gneiss bei Innerkirchen!

- *tomentosa* Lam. Ebenso: Kienthal! Simmenthal, an mehreren Stellen, Klus bei Boltigen! Lenk! Brand oberhalb Lenk 1357^m!

Carlina. Eberwurz.

- *acaulis* L. Auf Weiden von der unteren bis in die obere Region häufig; in niedrigen Lagen meist die Form *caulescens*. — Selten und vereinzelt auch im nördlich vorliegenden Hügelland.
- *vulgaris* L. An dünnen, steinigen Orten der unteren Region ziemlich häufig.

Saussurea.

alpina D. C. An vereinzelt Standorten der höheren Region: Brienergrat (Imobersteg), Bettenalp am Faulhorn (Guthnick, Brown), Zäsenberghorn am unteren Grindelwaldgletscher (Christener), Gipfel des Männlichen! — *Var. nana*. Ammerhorn am Rätzligletscher (Meissner).

depressa Gren. et Godr. Am Niesenhorn über dem Dürsee bei Lauenen (v. Rütte).

Centaurea. Flockenblume.

- * *Jacea* L. Auf Wiesen und Grasplätzen der unteren und mittleren Region gemein. — In mehreren, noch näher zu untersuchenden Varietäten. — Eine niedrige, einköpfige Form nicht selten auf den Voralpenweiden.
- *montana* L. An feuchten, waldigen Abhängen der unteren und mittleren Region häufig, stellenweise bis an den Fuss der Berge, z. B. Goldei bei Interlaken, 570^m! Seltener in der oberen Region, z. B. Wallopgrat bei 2000^m!
- * *Cyanus* L., *Cyane*, *blaue Kornblume*. Im Getreide, selten und vorübergehend. Innerkirchen! Hausen bei Meiringen (Brunner), Saanen (Christeler).
- * *Scabiosa* L. Auf Wiesen und Aeckern der Ebene und Voralpen gemein. — Wallopalp bei Boltigen bis 1700^m! — In mehreren Varietäten: *Var. C. alpestris* Heg., oberhalb Oberhofen, Ralligstöcke, Kandersteg (Fischer-Ooster), Wengernalp (Rothenbach).

Anmerkung. *Centaurea solstitialis* L. vereinzelt (und vorübergehend) im Getreide. Ried bei Thun!

Lampsana. Rainkohl.

* *communis* L. An Wegen und Waldrändern der unteren Region gemein.

Aposeris. Hainsalat.

foetida Less. An steinigen Orten in Wäldern des westlichen Gebiets, stellenweise sehr häufig: Nordabhang der Stockhornkette über Stocken und Blumenstein! Am unteren Nünenen (Trachsel), Schwarzenmatt bei Boltigen! Bruchalp zwischen Boltigen und Abläntschen (Hügli), Alpen von Saanen (Hegetschweiler). Obersimmenthal! Häufig zwischen Hahnenmoos und Adelboden! Kienthal (Gaud. Fl. helv.) — Stellenweise bis in die Ebene herabgeschwemmt, z. B. Kandergrien bei Thun (Brown). — Im Jura fehlend.

Cichorium. Wegwarte.

* *Intybus* L. An Wegen und trockenen Abhängen der unteren Region.

Leontodon. Löwenzahn.

* *autumnalis* L. An Wegen, auf Wiesen der Ebene und Vor-alpen gemein.

Taraxaci Lois. Auf steinigen Weiden und Geröllhalden der oberen Region stellenweise häufig, z. B. Faulhorn, zwischen Sägisthal und Iselten! Zwischen Schwabhorn und Faulhorn (Leresche), Schwalmern (Fischer-Ooster), Kiley und Gemmi (Brown), Rawyl (Fischer-Ooster), Stockhornkette an der Südseite des Ochsen (Hügli).

pyrenaicus Gouan. Auf Alpenweiden ziemlich häufig. — Wetterhorn am Gleckstein bei 3000^m (Lindt). — Fehlt dem Jura, dagegen häufig im Schwarzwald und den Vogesen.

* *hastilis* Koch. Auf Wiesen und Grasplätzen von der Ebene bis in die höhere Region gemein. — Kl. Scheideck bei 2069^m! — *Var. hispidus*, hin und wieder, von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Männlichen bei 2345^m!

Anmerkung. Die Angabe von *L. incanus* Schrank am Faulhorn (Heg. Fl. d. Schw.) bedarf der Bestätigung.

Picris. Bitterkraut.

* *hieracioides* L. Auf trockenen Wiesen und Grasplätzen der unteren Region.

Tragopogon. Bocksbart.

* *pratensis* Döll. *Habermark. Var. orientalis* (*T. orientalis* L.) Auf feuchten Wiesen und Weiden stellenweise häufig; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Burgholz bei Wimmis! Spiez! Zwischen Gunten und Merligen! Neuhaus! Meiringen (Brunner). Mürren! Bürglen (Maurer).

Hypochæris. Ferkelkraut.

* *radicata* L. Auf Wiesen, an Wegen von der Ebene bis in die mittlere Region häufig. — Wengen bei 1400^m!

uniflora Vill. (*H. helvetica* Wulf.) Auf Weiden der Alpen und Voralpen stellenweise häufig, z. B. Grimsel (Vulpus), Urnenalp im Urbachthal! Grindelalp (Fischer-Ooster), Faulhorn (Brown), Gipfel des Märnlischen (2345^m)! Auf Weiden oberhalb Wengen, bei 1400^m! Mürren gegen das Sefinenthal! Bundalp im Kienthal! Hahnenmöser zwischen Adelboden und Lenk! Trütlisberg zwischen Lenk und Lauenen (Leresche), Lauenenhorn!

Taraxacum. Pfaffenröhrlein.

* *officinale* Web. Auf etwas feuchten Wiesen und Grasplätzen gemein; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Sefinenfurke bei 2600^m! — *Var. lividum* Koch. (*T. palustre* D. C.) auf sumpfigen Wiesen, z. B. Reutigenmoos! — *Var. T. lævigatum* D. C. an trockenen Stellen hin und wieder. Stockhorn, Gemmi (Brown).

Prenanthes. Hasenlattich.

* *purpurea* L. In Wäldern; von der Ebene bis in die mittlere Region häufig.

Lactuca. Salat.

* [*sativa* L. *Lattich. Salat.*] In Gärten häufig cultivirt; noch in der höheren Region gedeihend, z. B. Kl. Scheideck 2069^m.

* *muralis* Less. (*Phoenixopus* Koch. *Ed. 1.*) In Wäldern der Ebene und Voralpen gemein.

perennis L. Häufig an Kalkfelsen am Thunersee zwischen Neuhaus und der Beatushöhle! — Eine Pflanze der wärmeren Schweiz.

Sonchus. Gänsedistel.

* *oleraceus* L. Auf cultivirtem Boden, auf Schutt, auf Waldschlägen gemein.

* *asper* All. Wie vorige. Wengen bei 1300^m!

* *arvensis* L. Auf Aeckern stellenweise häufig, z. B. Wimmis! Interlaken! u. a. O.

Mulgedium. Milchlattich.

alpinum Less. An feuchten, schattigen Stellen der Voralpen, bis über die Baumgrenze stellenweise häufig: Oberhasli zwischen Handeck und Grimsel! Urnenalp im Urbachthal! Rosenloui (Brunner). Faulhorn zwischen Giessbach und Bettenalp! Hahneckwald bei Wengernalp (Rothenbach), Ammertenen im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Mürren! Schiltthal am Fuss des Brünlihorns! Stockhornkette, an mehreren Stellen: Wirtneren ob Blumenstein (Vulpus), Bruchalp zwischen Boltigen und Abläntschen (Hügli), Hundsrück am Bäderberg (Maurer). — Kalberhöni bei Saanen (Leresche). — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel (Trachsel). — Auch im Jura verbreitet.

Anmerkung. *M. Plumieri* D. C., eine Pflanze der benachbarten Waadtländeralpen, nach Gaud. Fl. helv. bei Zweisimmen und nach Heg. Fl. d. Schw. bei Saanen, wurde daselbst in neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

Crepis. Pippau.

* *taraxacifolia* Thuill. (*Barkhausia* D. C.) Auf Wiesen der unteren Region.

præmorsa Tausch. Auf schattigen Grasplätzen, an Waldrändern, selten: Oberhalb Hilterfingen (Fischer-Ooster), Erlenbach (Guthnick). In Gebüsch oberhalb Leissigen bei c. 700^m (Hügli)!

aurea Cass. Auf Weiden der Alpen und Voralpen häufig; selten in der unteren Region, z. B. Waldeck bei Beaten-

berg, bei 1150^m! Oberhalb Oberhofen zwischen Heiligenschwendi und Schwendi (Brown). — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel; dem niedrigeren Gelände fehlend.

* *biennis* L. Auf Wiesen der unteren Region ziemlich häufig.

* *virens* Vill. Auf Grasplätzen und Aeckern der unteren Region gemein.

•• *paludosa* Mönch. An feuchten, schattigen Stellen der Ebene und Voralpen hin und wieder, z. B. Stockenthal! Faulenseemoos bei Spiez! Saxetenthal gegen das Renggli (Vulpus), Lauterbrunnenthal! Rosenloui (Brunner) u. a. O.

pygmæa L. Im feuchten Geröll der höheren Region, auf dem westlichen Theil der Hauptkette, selten: Gemmi nordöstlich vom Daubensee (Christener) und in der Nähe des Lämmerengletschers (Brown), Rawyl (Kölliker, nach Heg. Fl. d. Schw.), Westabhang des Niesenhorns bei Lauenen mit *Saussurea depressa* (v. Rütte), Sanetsch (Schneider), Oldenhorn (Gaud. Fl. helv. Vol. VII).

blattarioides Vill. Auf Wiesen und Weiden der Voralpen häufig.

grandiflora Tausch. An felsigen Abhängen der mittleren und oberen Region, stellenweise häufig, z. B. Gadmen! Guttannen (Brunner), Grindelalp (Fischer-Ooster), Faulhorn! Wengen bei 1400^m! Hahnenmöser zwischen Adelboden und Lenk (Brown), Trüttlisberg zwischen Lenk und Saanen (Leresche), Bruchberg bei Boltigen (Maurer).

montana Tausch. (*Soyeria Monn.*) Auf Alpenweiden, ziemlich selten: Ralligstöcke (Fischer-Ooster), Faulhorn (Brown), Kiley an der Niesenkette (Guthnick), Sieglerefluh am Niesenhorn bei Boltigen (Maurer), Bürglen (Maurer), Ganterisch (Guthnick).

hyoseridifolia Tausch. (*Soyeria Koch.*) An steinigen Orten, im Geröll der höheren Alpen, hin und wieder: Hohstollen (Hasliberg)! Schönengiebel (Hohe Gumm) an der Kette des Brienzer Rothorns (Christ, Rhiner), Faulhorn (Guthnick,

Leresche). Am Fuss des Mönch im Hintergrund des Trümm-
letenthals c. 2000^m! Roththal an der Jungfrau (Muret),
Suleck! Gemmi oberhalb des Daubensees (Brown), Rawyl
(Leresche).

Anmerkung. *C. setosa* Hall. fil. und *C. nicæensis* Balb's,
selten (und vorübergehend) im Getreide; letztere am
Eichbühl bei Thun (Fischer-Ooster).

Hieracium. Habichtskraut.

(Nomenclatur und Anordnung meist nach Christener, Hieracien
der Schweiz, 1863).

* *Pilosella* L. Auf trockenen Grasplätzen von der Ebene bis
in die obere Region häufig.

sphaerocephalum Fröl. (*H. furcatum* Koch excl. var. b.)
Auf Alpenweiden selten, Genthal (Fischer-Ooster).

* *Auricula* L. Auf Grasplätzen, an Wegen und Waldrändern,
von der Ebene bis in die obere Region häufig, z. B. Gipfel
des Männlichen, 2345^m!

suecicum Fr. Kleine Scheideck! — Stimmt mit den von
Muret in Graubünden gefundenen Exemplaren in allen wesent-
lichen Merkmalen überein.

aurantiacum L. Auf Alpenweiden stellenweise häufig, z. B.
Engstlenalp, Gaden (Muret), Hasliberg! Alpen von Rosen-
lauh (Brunner), Faulhorn (Guthnick). »Am Stein« in Grindel-
wald (Christener), Wengernalp! und bei Schiltwald an einer
Stelle bis tief in die Waldregion (1400') herab! Mürren
am Weg ins Sefinenthal! Haslerberg bei Lenk (Fischer-
Ooster), Lauenenhorn bei Saanen! Selten an der Stockhorn-
kette: Bruchberg bei Boltigen (Maurer), Bürglen (Shuttle-
worth), Stockhorn (Brown).

glaciale Lachen. (*H. angustifolium* Hoppe. *H. breviscapum*
Gaud.) Auf Weiden der höheren Region hin und wieder.
Grimsel (Rhiner), Faulhornkette (Christener), Gr. Scheideck
(Brunner), Wengernalp (Christener), Oberhornalp im Hinter-
grund des Lauterbrunnenthals (v. Rütte), Gemmi! u. a. O.

•• *piloselloides* Vill. (*H. florentinum* All.) Auf Sand- und Kiesboden, längs der Flüsse in der unteren Region hin und wieder.

•• *præaltum* Vill. An steinigen Orten, im Geröll, an Mauern, von der Ebene bis in die Voralpen hin und wieder, z. B. Rosenloui (Brunner), Grindelwald (Christener). An der Kander und Simme bei Wimmis!

Nestleri Koch. *Var. Vaillantii* Koch. (*H. cymosum pubescens* Fr.) Eisboden am Fuss des Wetterhorns in Grindelwald (Christener).

alpinum L. Auf höheren Alpenweiden durch das ganze Oberland ziemlich häufig. — *Var. Halleri* Engstlenalp (Fischer-Ooster), Grimsel! Urnenalp im Urbachthal! Scheidekalp in Grindelwald (Christener), Wengernalp! Lauenenhorn bei Saanen! Zwischen Bürglen und Ganterisch (Guthnick). — *Var. pumilum*, Zäsenberghorn in Grindelwald (Dr. Fankhauser), Bettenalp am Faulhorn (Guthnick).

rhœticum Fr. Auf höheren Alpenweiden, selten: Grindelwald im Spielmattenläger (Christener).

•• *amplexicaule* L. (incl. *H. pulmonarioides* Koch). An Felsen der unteren und mittleren Region ziemlich häufig.

ligusticum Fries. (*f. minor* Fr.) Meiringen am Alpbach (Guthnick, Brunner).

Pseudo-Cerinth Koch. Am Eingang in die Klus bei Schwarzenmatt im Obersimmenthal (Maurer). — Eine südeuropäische, in der Schweiz nur im Südwesten vorkommende Art.

glanduliferum Hoppe. Auf Weiden der oberen Region hin und wieder: Gadmen! Bachalp in Grindelwald (Christener), Gemmi und Ochsen (Brown). — Eine Form mit kahlen Blättern, auf dem Schönbühl in Grindelwald (Christener).

piliferum Hoppe (*H. Schraderi* Schleich). Auf Weiden der höheren Alpen hin und wieder, z. B. Gadmen! Grimsel (Vulpus), Grindelwald am Spielmattenläger (Christener), Bachalp am Faulhorn (Christener), Kiley an der Niesenkette (Sterki), Gemmi am Læmmerengletscher (Brown), Rawyl (Le-

resche), Sanetsch (Herb. Godet). Zwischen Bürglen und Ochsen (Maurer).

Gaudini Christener. (*H. Schraderi dentatum Gaud. excl. var. β.*) Auf Weiden der mittleren und oberen Region hin und wieder. Engstlenalp (Fischer-Ooster), Rosenloui (Brunner), Alpen von Grindelwald (Christener), Lauterbrunnenthal ob Gimmelwald (Schneider), Gemmi (Christener). Ziemlich häufig an der Stockhornkette, besonders auf der Nünenenalp (Christener).

villosum L. An felsigen Orten der mittleren und oberen Region häufig. — In zahlreichen Formen. — *Var. elongatum (H. valdepilosum Gaud.)* Röthihorn in Grindelwald (Christener) u. a. O. — *Var. nudum Gren. Godr.* Am Fuss des Wetterhorns in Grindelwald (Christener).

scorzoneraefolium Vill. (H. flexuosum Gaud. z. Thl.) An steinigen Orten der mittleren und oberen Region, hin und wieder. Gadmenthal! Bachalp und Scheideckalp bei Grindelwald (Christener), Schwarzenmatt bei Boltigen (Maurer).

bernense Christener. (Mitth. der naturf. Ges. in Bern 1860 und »Hieracien der Schweiz« Taf. 1.) Rosenloui (Brunner). An Felsblöcken der Spielmatten am Fuss des Röthihorns bei Grindelwald c. 2110^m und auf steinigen Weiden am Fuss des Wetterhorns, c. 1460^m (Christener).

glaucum All. (incl. H. bupleuroides Koch.) An Felsen und im Geröll vom Fuss der Berge bis in die höhere Region stellenweise häufig, z. B. am Thunersee zwischen Sundlauenen und Neuhaus! Am Fuss des Ballenbergs bei Brienz und bei Meiringen (*H. bupleuroides Gmel.*) (Brunner, Hügli), Rosenloui (Brunner), Grindelwald (Christener), Lauterbrunnenthal (Brown), Rawyl (Leresche), Klus bei Boltigen! Im Geröll der Simme und an der Simmenfluh bei Wimmis!

lanatum Vill. In vereinzelt Exemplaren an einer Felswand am Fuss des Kienhorns bei Schwarzenmatt im Obersimmenthal (Maurer). — In der Schweiz bisher nur im Wallis (und im Neuenburger Jura) gefunden.

Jacquini Vill. An Felsen und steinigen Orten vom Fuss der Berge bis in die obere Region hin und wieder, z. B. Beatenhöhle (Vulpius), Grindelwald (Christener), Oeschenenalp! Stockhornkette am Thalberg und Gänterisch (Trachsel), Stockhorn (Brown). An der Simmenfluh und im Kies der Simme bei Wimmis!

Trachselianum Christener (Mitth. der naturf. Ges. in Bern 1860 und »Hieracien der Schweiz«, Taf. 1. u. 2.) (*H. oxydon Fr.*) An Felsblöcken und steinigen Orten der oberen Region. Am Röthi- und Wetterhorn (Christener). Am Gänterisch und Nünenen an der Stockhornkette (Christener). — Auch in den angrenzenden Waadtländer- und Freiburgeralpen. — *Var. β hirsutum* auf Steintrümmern der Spielmatten am Röthihorn bei Grindelwald, c. 2270^m (Christener).

* *mirorum L.* An Mauern und steinigen Orten, in Wäldern, von der Ebene bis in die höhere Region gemein. — In zahlreichen Formen. — *Var. alpestre (H. incisum Koch)* auf Alpenweiden häufig.

cæsiun Fr. In der mittleren und höheren Region, selten. Am Fuss des Wetterhorns bei Grindelwald (Christener).

•• *vulgatum Fr. (H. sylvaticum Lam.)* In Wäldern und Gebüsch der Ebene und Voralpen. — In zahlreichen Abänderungen.

pseudo-porrectum Christener. (Gremli Fl. d. Schw. Aufl. 1. p. 233). Am Fuss des Wetterhorns in Grindelwald (Christener). Am »rothen Herd« im Sefinenthal (Schneider).

gothicum Fr. In der unteren und mittleren Region hin und wieder: Hundschüpf bei Meiringen (Fischer-Ooster), Waldränder und Voralpen bei Grindelwald (Christener).

•• *tridentatum Fr. (H. rigidum Koch).* An Waldrändern, in Gebüsch der unteren Region hin und wieder: Grüsisberg bei Thun (Fischer-Ooster), Grindelwald (Christener).

cydoniaefolium Vill. (nach Fries Ep.) Grimsel (Lagger). — Das verwandte *H. picroides Vill.* jenseits der südl. Gebietsgrenze an der Maienwand (Vulpius, Lagger).

- prenanthoides* Vill. Auf Weiden der Alpen und Voralpen ziemlich häufig. — In zahlreichen Abänderungen; dazu gehört *H. vogesiacum* Gren. Unterbach bei Grindelwald (Christener). — *H. juranum* Fr., nach Christener am Fuss des Wetterhorns bei Grindelwald, ist noch näher zu untersuchen.
- perfoliatum* Fröl. In der mittleren Region, am Fuss des Wetterhorns bei Grindelwald (Christener). — Auch in den Freiburgeralpen.
- valdepilosum* Vill. Am Fuss des Wetterhorns bei Grindelwald (Christener), Schiltthal bei Mürren (Vulpius), Schlucht unterhalb des Stockhorns (Trachsel).
- *boreale* Fr. An Waldrändern und in Gebüschern der unteren Region. Grüsisberg bei Thun (Christener), Beatenhöhle. Zwischen Bönigen und Iseltwald! u. a. O. — Sehr veränderlich.
- * *umbellatum* L. In lichten Wäldern und Gebüschern, an Waldrändern häufig. — In verschiedenen Formen.
- intybaceum* Jacq. (*H. albidum* Vill.) Auf Gneissfelsen und auf Weiden der mittleren und höheren Region im südöstlichen Gebiet, stellenweise häufig: Bei Ræterichsboden, zwischen Handeck und Grimsel, c. 1700^m! Grimsel (Christener). Urnenalp im Urbachthal, c. 2000^m!
- *staticifolium* Vill. (*Tolpis staticifolia* Schultz. bip.) An steinigen Orten, im Geröll der Alpenbäche häufig, bis an den Fuss der Berge, z. B. an der Kander und Simme bei Wimmis! — Am Schwarzwasser und an der Saane bis in die Ebene herabgeschwemmt.

47. Campanulaceen.

Phyteuma. Rapunzel.

- hemisphaericum* L. Auf Weiden der höheren Region ziemlich häufig, z. B. Gemmenalphorn! Faulhorn! Kl. Scheideck! Niesen (Brown), Gemmi (Brown) u. a. O.
- *orbiculare* L. Auf Wiesen und Weiden der Voralpen häufig und bis in die höhere Region, z. B. Männlichen, 2345^m!

— Stellenweise bis an den Fuss der Berge, so zwischen Gunten und Merligen! Burgholz bei Wimmis! Leissigen u. a. O.

Scheuchzeri All. Gasterenthal am Alpetligletscher (Vulpius).
— Häufiger in den südlicheren Alpenketten.

betonicæfolium Vill. (*P. Michelii* var. Koch.) Auf Wiesen und Weiden von der unteren bis in die obere Region hin und wieder; Beatenberg! Gadmenthal, Grimsel! Rosenlauri (Brunner), Faulhorn (Brown), Grindelwald auf einem Hügel unweit der Kirche bei c. 1100^m! Wengen 1400^m! Mürren! Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Gasterenthal (Vulpius)! Gemmi (Brown).

* *spicatum* L. In Wäldern und Gebüsch von der Ebene bis gegen die Waldgrenze, häufig. — Gümmlen bei Mürren 1800^m! Selten in der höheren Region, z. B. am Bürglen, über 2000^m (Guthnick, Maurer).

Halleri All. An waldigen Abhängen, auf Wiesen der Voralpen, ziemlich selten: »Im Boden« im Oberhasli und bei Grindelwald (Gaud. Fl. helv.), Mürren! Gemmi oberhalb Kandersteg!

Campanula. Glockenblume.

•• *pusilla* Hænke. An schattigen Felsen und Mauern, in waldigen Schluchten, im Geröll der Bäche, vom Fuss der Berge bis in die obere Region häufig. — Im nördlich angrenzenden Hügelland, in schattigen Schluchten hin und wieder; häufiger im Geröll der Flüsse.

* *rotundifolia* L. Auf Grasplätzen, an Mauern und Felsen, von der Ebene bis in die höhere Region. — *Var. C. Scheuchzeri* Vill. (*C. linifolia* Lam.) auf Weiden der Alpen und Voralpen häufig, stellenweise bis an den Fuss der Berge. — *Var. C. valdensis* All. Grindelwald (Christener), Stockhorn (Gaud. Fl. helv.)

•• *rhomboidalis* L. Auf Wiesen und Weiden der unteren und mittleren Region häufig. Auf schattigen Wiesen bei Därligen und Leissigen bis zum See herab! Wiesen bei Mei-

ringen! Selten in der höheren Region, z. B. am Bürglen (Maurer).

* *rapunculoides* L. Auf Aeckern, an Wegen und in Gebüsch der unteren Region häufig. — Wengen bei 1200^m!

* *Trachelium* L. Ebenso. Wengen und Beatenberg bis c. 1300^m! — Auf Gneiss bei Urweid im Oberhasli! — Häufig mit weisser Blüthe.

•• *patula* L. An Wegen bei Hilterfingen und Oberhofen häufig (Brown)!

* *Rapunculus* L. *Rapunzel*. Auf Wiesen bei Thun! Meiringen (Brunner). — Im nördlich vorliegenden Hügelland stellenweise sehr häufig.

cenisia L. Auf Schutthalden und schieferigem Boden der höchsten Alpen in der Nähe der Schneelinie, stellenweise häufig: Titlis (Stud. Engelmann), Wellhorn bei Rosenlauri (Fellenberg), Wildgerst (Brunner), Schwarzhorn in Grindelwald (Fellenberg), Schwalmeren und Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster), Schilthorn (Fankhauser), Moräne des Tschingelgletschers (Rothenbach), Oeschenengrat! Gamchilücke, 2838^m! Albristhorn im Obersimmenthal (Fischer-Ooster), Rawyl (Guthnick), Sanetsch (Gaud. Fl. helv.), Oldenhorn (Leresche).

thyrsoidea L. An felsigen Stellen der höheren Region, stellenweise häufig, z. B. Ralligstöcke (Brown), Brienzgrat (Imobersteg), Faulhorn! Schynige Platte! Grindelwald gegen Bäreck (Fischer-Ooster); Wengernalp (Rothenbach), Lat-treienalp, Gasterenthal und Ueschenenthal (Vulpus), Hahnenmöser zwischen Adelboden und Lenk! An der Stockhornkette an mehreren Stellen: Morgeten, Bürglen, Stockhorn (Brown), Ganterisch (Brügger), Sohlhorn (Vulpus). — Selten im oberen Theil der mittleren Region, z. B. Wallopalp bei Boltigen, 1700^m!

•• *glomerata* L. Auf Wiesen der Ebene und Voralpen häufig.

barbata L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen gemein. — Stellenweise tief heruntersteigend, z. B. am Kienberg

bei Unterseen und am Stoffelberg bei Leissigen, bis c. 800^m!
— Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel,
dem niedrigeren Hügelland und dem Jura fehlend.

Anmerkung. *C. alpina* L., nach Haller auf der Scheideck,
nach Gaud. Fl. helv. Vol. VII. im Simmenthal, — wurde
dasselbst, wie überhaupt in der Schweiz, in neuerer Zeit
nicht mehr gefunden. — Eine Pflanze der östlichen
Alpenkette. — *Specularia Speculum* A. D. C. Im Ge-
treide, selten und vorübergehend. — Im nördlich an-
grenzenden Hügelland stellenweise häufig.

48. Vaccinieen.

Vaccinium.

- * *Myrtillus* L. *Heidelbeere. Heiti.* In Wäldern der unteren
und mittleren Region gemein; auch auf Weiden und an
steinigen Abhängen der höheren Region stellenweise häufig.
— Gemmenalphorn 2064^m! Grimsel! Wetterhorn am Gleck-
stein bis c. 2300 (Lindt).
- *uliginosum* L. *Rauschbeere.* In sumpfigen Wäldern, auf
Torfboden, von der Ebene bis in die höhere Region stellen-
weise häufig, z. B. unterhalb Waldeck (bei Beatenberg)!
Gemmenalphorn 2064^m! Männlichen 2345^m! Handeck! Grim-
sel! — Saanenmöser (Leresche) u. a. O. — In den N.-Polar-
ländern bis zum 78°.
- *Vitis Idæa* L. *Preisselbeere.* In Wäldern und auf Heide-
plätzen von der unteren bis in die höhere Region häufig.
— Im Aarthal bis gegen den Aargletscher! — Selten im
nördlich angrenzenden niedrigeren Hügelland.

Oxycoccus. Moosbeere.

- *palustris* Pers. (*Vaccinium Oxycoccus* L.) Auf Torfboden
im Reutigenmoos!

49. Ericineen.

Arctostaphylos. Bärentraube.

alpina Spreng. An steinigen Orten der mittleren und höheren
Region hin und wieder, z. B. Ralligstöcke (Vulpius), Gem-

menalphorn! Engstlenalp (Fischer-Ooster), Grimsel (Schær), Kl. Scheideck gegen Grindelwald! Breitlauenenalp ob Gsteig (Hügli), Niesen (Vulpius), Rawyl (Rhiner), Stockhornkette an mehreren Stellen: Bürglen (Maurer), Nünenen und Tschingelfuh (Trachsel), Stockhorn zwischen Wahlalp und Aelpithal!

- *Uva ursi Spreng.* (*A. officinalis Wimm.*) An steinigen Orten von der unteren bis in die höhere Region, stellenweise sehr häufig, z. B. Blume, am Südwestabhang bei 1300^m (Hügli). Zwischen Breitlauenen und der Schynigen Platte! Wengernalp! Zwischen Kandersteg und dem Oeschenensee! Thalberg an der Stockhornkette (Trachsel). — Stellenweise bis in die Ebene, z. B. an der Kanderermündung! — Häufig auf dem alten Kandergrien bei Thun.

Andromeda.

- *polifolia L.* Auf Torfboden im Reutigenmoos (Brown, Hügli).

Calluna. Besenheide.

- * *vulgaris Salisb.* (*Erica L.*) *Gemeine Heide, Bruuch. Brüsche.* AnWaldrändern, in Lichtungen, auf Torfmooren und mageren Weiden, von der Ebene bis in die höhere Region gemein.

Erica. Heide.

- *carnea L.* An bewaldeten, felsigen Abhängen, von der unteren bis in die obere Region stellenweise sehr häufig, z. B. am oberen Thunersee zwischen Merligen und Neuhaus! (vereinzelt auch unterhalb Merligen, am Ausgang der Stampachschlucht, auf Nagelfuh!) Am südlichen Ufer an der Krattighalde zwischen Spiez und Leissigen! Am Fuss des Abendberges von Därligen bis Interlaken! Am Brienersee zwischen Iseltwald und Giessbach! Oberhalb Brienz! Am Ballenberg! Meiringen (Brunner). — Im Lauterbrunnenthal stellenweise häufig und bis über die Waldgrenze steigend! Kandergrund! und Gemmi oberhalb Kandersteg (Brown), Sanetsch und Pillon (Leresche). An der Stockhornkette oberhalb Weissenbach (Maurer) und am Thalberg (Guthnick). — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch häufig

in lichtigem Wald des »alten Kandergriens« bei Thun und längs der Aar an vereinzeltten Stellen bis in die Gegend von Wichtrach. — Dem Jura fehlend.

Azalea.

procumbens L. Auf trockenen Weiden der oberen Region, stellenweise ganze Strecken überziehend; z. B. Hohgant (Fischer-Ooster), Gemmenalpgrat! Susten (Vulpius), Grimsel! Gr. und Kl. Scheideck! Faulhorn (Brown), Suleck! Gemmi! Rawyl (Gempeler). — Selten in der mittleren Region, z. B. am Wengernalpweg über Lauterbrunnen bis c. 1400^m herab! — Dem Jura fehlend.

Rhododendron. Alpenrose.

•• *ferrugineum* L. In Wäldern und an felsigen Abhängen im oberen Theil der mittleren und im unteren Theil der höheren Region auf den meisten Alpen häufig; auf verschiedenem Gestein. — Stellenweise auch in der unteren Region; z. B. an der Beatenbergstrasse unterhalb Waldeck, c. 1100^m! Am Ufer des Thunersees am felsigen Vorsprung der »Nase« unweit Merligen (auf Kalkstein)! und an der Krattighalde zwischen Leissigen und Spiez! — Im nördlich angrenzenden Gebiet am Gurnigel und an einer vereinzeltten Stelle im Schwarzwasserthal (auf Sandboden). — Im Jura auf einigen Gipfeln des westlichen Theils.

hirsutum L. Wie vorige, jedoch vorzugsweise auf den Kalkalpen; an manchen Stellen mit der vorigen, an andern ausschliesslich vorkommend. — Scheint dem Gneissgebiet zu fehlen. — Stellenweise in der unteren Region, z. B. Wengen gegen das Trümmlenthal bei 1200^m! Häufig am Fuss des Abendberges unweit der Ruine Weissenau! Krattighalde am Thunersee (560^m)! Stockenthal zwischen Reutigen und Stocken! — Dem Jura fehlend.

Anmerkung. *R. ferrugineum* × *hirsutum* (*R. intermedium* Tausch). Zwischen den Stammarten vereinzelt und selten: Faulhorn oberhalb des Giessbachs (Heg. Fl. d. Schw.), Rosenlauri (Brunner), Grindelwald am Eiger (Christener),

Wengernalp (Rothenbach), Lattreienalp (Vulpius), Oeschenenthal (Muret). Stockhornkette an mehreren Orten: Ochsen (Guthnick), Stockhorn (Fischer-Ooster), Lindenthal und Walpersberg zwischen Stockhorn und Günzenen (Vulpius).

50. Pirolaceen.

Pirola. Wintergrün.

- * *rotundifolia* L. In Wäldern und Gebüschern der Ebene und Voralpen hin und wieder: Oberhofen (Fischer-Ooster), Wimmis! Neuhaus! Beatenberg! Rugen bei Interlaken! Meiringen (Hügli), Trümmlenthal bei 1650^m (Rothenbach) u. a. O. — Häufig im alten Kandergrien bei Thun.
- *chlorantha* Sw. In Wäldern, selten und vereinzelt. Stockhornkette (Gaud. Fl. helv. Vol. VII.) — Unweit der nördl. Gebietsgrenze, im alten Kandergrien (Brown).
- media* Sw. Wie vorige. In Gebüschern unweit des Reichenbaches bei Meiringen (Brunner). Wald am Oeschenensee (Fischer-Ooster). — Vielleicht eine hybride Zwischenform (*P. rotundifolia* × *minor*).
- *minor* L. In Wäldern der Ebene und Voralpen und an schattigen Stellen der höheren Region stellenweise ziemlich häufig, z. B. Niederhorn bei Beatenberg, 1965^m! Unspunnen (Hügli), Rosenlauithal (Brunner), Wengernalp (Rothenbach), Kienthal bei Tschingel! Saanen (v. Rütte), Bürglen bei c. 2100^m (Hügli) u. a. O.
- * *secunda* L. In Wäldern der Ebene und Voralpen gemein. — Unterhalb Wengernalp bei 1720^m (Rothenbach).
- *uniflora* L. In Tannenwäldern der Voralpen stellenweise häufig: Justisthal (Fischer-Ooster), Beatenberg in der Schlucht oberhalb der Brücke! Rosenlauithal! Grindelwald, Mettlenalp bei Wengernalp! Gasterenthal! Suldthal bei der Säge! Saanen! Schwefelberg (Rothenbach).

51. Monotropeen.

Monotropa. Ohnblatt.

- * *Hypopitys* L. In Wäldern der unteren und mittleren Region, hin und wieder. Grüsisberg bei Thun und oberhalb Oberhofen (Brown), Interlaken (Fischer-Ooster), Schiltwald bei Wengen, 1400^m! Zaun bei Meiringen, c. 1200^m (*var. glabra*)! Saanen (v. Rütte) u. a. O.

52. Aquifoliaceen.

Ilex. Stechpalme.

- *Aquifolium* L. *Palmdorn*. In Wäldern und Hecken der unteren Region hin und wieder. Von Thun bis Meiringen, stellenweise häufig, z. B. zwischen Gunten und Neuhaus! und bis Waldeck, c. 1200^m aufsteigend! Goldei bei Interlaken! Ringgenberg! Meiringen (Brunner). Im Urbachthal auf Gneiss! Im Simmenthal bei Schwarzenmatt, Weissenbach (Maurer) u. a. O.

53. Oleaceen.

Ligustrum. Hartriegel.

- * *vulgare* L. In der unteren Region an Hecken und Wald-rändern häufig. — Beatenberg bei 1150^m!

Syringa. Flieder.

- * [*vulgaris* L. *Schneeballen*. *Lila*.] In Gärten der unteren Region häufig cultivirt; in kräftigen Exemplaren noch bei Guttannen! Beatenberg! Wengen (1300^m)!

Fraxinus. Esche.

- * *excelsior* L. In der unteren Region vereinzelt oder in kleinen Gruppen. — Wengen bei 1300^m!

54. Asclepiadeen.

Vincetoxicum. Schwalbenwurz.

- *officinale* Mönch. (*Cynanchum Vincetoxicum* R. Br.) An steinigen Abhängen, im Gebüsch der unteren Region, stellenweise sehr häufig, z. B. längs des Thuner- und Briener-Bern. Mittheil. 1875. Nr. 887.

sees! Meiringen (Brunner), Lauterbrunnenthal! Simmenthal!
u. a. O. — Auf Gneiss zwischen Innerkirchen und Urweid!

55. Apocyneen.

Vinca. Sinngrün.

* *minor* L. *Sinngrün. Stritten.* In Hecken und Wäldern der unteren Region häufig, zuweilen ganze Strecken überziehend, z. B. zwischen Oberhofen und Gunten! im Wald bei Zweilütschinen! u. a. O. — Waldeck bei Beatenberg (c. 1040^m)!

56. Gentianeen.

Menyanthes. Zottenblume.

.. *trifoliata* L. *Fiebertlee. Biberklee.* Auf sumpfigen Wiesen und Weiden vom Fuss der Berge bis in die höhere Region, stellenweise häufig, z. B. Faulenseemoos bei Spiez! Neuhaus (Fischer-Ooster), Faulensee bei Ringgenberg! Rosenlauithal (Brunner), Scheideckalp in Grindelwald, Adelboden! Saanenmöser (Christeler), Bruchalp zwischen Boltigen und Abläntschen (Hügli). Häufig im Stockenthal! u. a. O.

Sweertia.

perennis L. Auf Sumpfwiesen der unteren und mittleren Region, stellenweise häufig: Waldeckallmend »im Baumisboden« bei Beatenberg! — Ziemlich verbreitet im westlichen Gebiet: Reutigenmoos! Nünenenalp (Trachsel), Bruchalp zwischen Boltigen und Abläntschen (Hügli). Häufig im Saanenland! Saanenmöser (Brown), Böschenried bei Lenk (Fischer-Ooster), Hahnenmöser zwischen Lenk und Adelboden! Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel (Trachsel).

Gentiana. Enzian.

lutea L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen stellenweise häufig, z. B. Justisthal! Saxeten (bei c. 1100^m)! Breitlauenenalp oberhalb Gsteig! Wengernalp am Eigergletscher

bei 1900^m (Rothenbach), Mürren! Kandersteg! Brand oberhalb Lenk! ziemlich verbreitet auf der Stockhornkette u. a. O.

purpurea L. Auf Weiden, in Gebüsch der oberen und mittleren Region, besonders in der Nähe der Baumgrenze ziemlich häufig; seltener im unteren Theil der mittleren Region, z. B. Schiltwald bei Wengen bei 1400^m!

punctata L. Grimsel (Guthnick, Hügli). — Häufiger auf den Walliser Alpen.

•• *cruciata* L. Auf Weiden und Grasplätzen der unteren Region hin und wieder. Ringgenberg! Brünig (Brunner). Ballenberg bei Brienz und Meiringen (Hügli). — Obersimmenthal (Maurer), Stockenthal!

•• *asclepiadea* L. In Wäldern und Gebüsch von der Ebene bis in die obere Region häufig. — Am Eigergletscher bei 1950^m (Rothenbach). — Im Jura selten.

•• *Pneumonanthe* L. Häufig im Reutigenmoos in der Nähe der Moosmühle! Am oberen Ende des Thunersees zwischen Neuhaus und Weissenau! An der Aar oberhalb Interlaken!

acaulis Koch. (*G. Clusii* Perr. et Song.) Auf Weiden der mittleren und höheren Region stellenweise häufig; vorherrschend auf den äusseren Ketten. — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Ober-Gurnigel.

excisa Presl. (*G. Kochiana* Perr. et Song.) Wie vorige, jedoch vorherrschend auf den inneren Alpenketten, z. B. Faulhorn! Mürren! — Südseite der Stockhornkette bei Weissenbach, bis zur unteren Region herab (Maurer). — Die Verbreitungsverhältnisse dieser und der vorigen Species sind noch näher zu untersuchen; hin und wieder finden sich Uebergangsformen. — Die Angabe der *var. minor* Koch (*G. alpina* Vill.) am Faulhorn (Brown) bedarf der Bestätigung.

bavarica L. Auf Weiden und an steinigen Orten der höheren Alpen, häufig. — Stockhornkette am Nünenen (Guthnick), zwischen Ganterisch und Bürglen (Maurer). — *Var. imbric-*

cata. Am Unteraargletscher (Girard nach Desor), Faulhorn (Guthnick), Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster).

brachyphylla Vill. Wie vorige, aber seltener. Faulhorn (Brown), Kalli am Vieschergletscher (Fischer-Ooster). Wengernalp (Rothenbach), Schilthorn (Imobersteg), Schwalmere (Bamberger), Rawyl (Meissner), Oldenhorn (Leresche), Ganterischalp (Hügli).

•• *verna* L. Auf nassen Wiesen und Weiden von der Ebene bis in die höhere Region ziemlich häufig. — *Var. alata* Griseb. (*G. æstiva* Röm. et Schult.), auf Alpenweiden hin und wieder; von der *G. æstiva* der österreichischen Alpen durch kleinere Blüten und weniger breite Kelchflügel abweichend.

utriculosa L. Auf sumpfigen Weiden, selten. Bisher nur im westlichen Gebiet. Kiley an der Niesenkette (Brown), Lenk (Guthnick).

nivalis L. Auf Alpenweiden stellenweise häufig, z. B. Ralligstöcke (Brown), Gemmenalpgrat! Hohstollen! Engstlenalp (Fischer-Ooster), Faulhorn! Kl. Scheideck! Steinberg in Anmertten (Fischer-Ooster), Lattreienalp (Vulpus), Niesen und Gemmi (Brown), Stockhornkette zwischen Ganterisch und Nünenen (Trachsel) und am Stockhorn (Vulpus). — Selten in der mittleren Region, z. B. Mettlenalp bei Wengernalp, c. 1700^m!

campestris L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen gemein. — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel (Trachsel) und auf dem Kandergrien (Brown).

•• *germanica* Willd. Auf Weiden und Grasplätzen der unteren und mittleren Region hin und wieder, z. B. Burgholz bei Wimmis! Aeschi! Spiez! Lauterbrunnenthal! Ballenberg bei Brienz (Brunner) u. a. O. — Häufig auf dem alten Kandergrien bei Thun (Brown); selten im nördlicheren Hügelland.

obtusifolia Willd. Auf steinigem Weiden im Gneissgebiet, selten: Zwischen Guttannen und Handeck! Grimsel! Gasteren (Schneider).

tenella Rottböl. (*G. glacialis* Thomas.) Auf Weiden und steinigem Boden der höheren Alpen, in der Nähe der Schneelinie stellenweise häufig. Hohstollen am Hasliberg! Faulhorn (Guthnick), Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster), Gemmi oberhalb Schwarrenbach (Brown), Männliflüh an der Niesenkette (Fischer-Ooster), Ammertenhorn bei Lenk (Meissner), Gifferhorn bei Saanen!

- *ciliata* L. An Waldrändern, Ufern und steinigen Orten der Ebene und Voralpen hin und wieder. Stockenthal! Zwischen Thun und Oberhofen! Interlaken! Saxetenthal bei 1200^m!

Anmerkung. Von hybriden Zwischenformen ist beobachtet: *G. purpurea* × *lutea* (*G. Thomasii* Hall. fil.) Gsteig bei Saanen.

Erythræa. Tausendguldenkraut.

- * *Centaureum Pers.* An trockenen, steinigen Orten der unteren Region, hin und wieder, z. B. Grüsisberg bei Thun (Fischer-Ooster), Spiez! Sundlauenen am Thunersee! Interlaken! u. a. O.
- *pulchella* Fries. Auf Sumpfwiesen selten! An der Aar oberhalb Interlaken! Meiringen (Brunner).

57. Convolvulaceen.

Convolvulus. Winde.

- * *sepium* L. In Hecken der unteren Region hin und wieder. Thun! Spiez! Interlaken u. a. O.
- * *arvensis* L. Auf Aeckern, ziemlich häufig.

Cuscuta. Flachsseide.

- *europæa* L. In Hecken, an Wegen der unteren Region, stellenweise häufig. Wimmis! Spiez! Lauterbrunnenthal! Meiringen (Brunner), Urbachthal! Kienthal! Ob.-Simmenthal u. a. O. Auf verschiedenen Pflanzen schmarotzend, besonders auf *Urtica dioica*; auf *Salvia glutinosa* bei Sundlauenen am Thunersee (Fischer-Ooster).
- *Epithymum Murr.* Auf Wiesen und Weiden der unteren und mittleren Region stellenweise häufig; auf verschiedenen

Pflanzen schmarotzend, z. B. *Thymus Serpyllum*, *Trifolium pratense* und *medium* (*Var. Trifolii*. — *C. Trifolii Babingt.*), *Helianthemum vulgare*, *Euphorbia Cyparissias* (im Trümmletenthal bei 1800^m!), auf *Erica carnea* und *Globularia cordifolia* im Oeschenenthal (Fischer-Ooster) u. a. O.

58. Borragineen. (Asperifolien).

Asperugo. Scharfkraut.

procumbens L. Auf Schutt und gedüngten Stellen in der Nähe der Häuser, an sandigen Orten, in der unteren und mittleren Region hin und wieder, z. B. Leissigen! Meiringen (Brunner), Wengen! Mürren (Fischer-Ooster), Oeschenenthal unter überhängenden Felsen am Weg nach der Oeschenentalp bei c. 1700^m! Adelboden! Im Simmenthal stellenweise häufig.

Echinosperrum. Igelsame.

Lappula Lehm. Im Geröll bei Brienz (Schläfli). — Eine vorherrschend in der wärmeren Schweiz vorkommende Pflanze.
deflexum Lehm. Am Weg vom Giessbach zur Axalp im Buchenwald (Schläfli), Schönbalm im Trümmletenthal unter überhängenden Felsen bei 1470^m (Rothenbach). — Eine seltenere, vorwiegend der südlicheren Schweiz angehörende Art.

Cynoglossum. Hundszunge.

•• *officinale* L. An steinigen Orten der unteren Region, hin und wieder, z. B. am Thunersee bei Sundlauenen! Lombach bei Neuhaus! Brienz (Rhiner), Eisenfluh! Kienthal! Oberrsimmenthal bei Schwarzenmatt und Weissenbach (Maurer).

Borrago. Borretsch.

* [*officinalis* L.] In Gärten, und in der Nähe der Häuser hin und wieder verwildert.

Symphytum. Beinwurz.

* *officinale* L. An Gräben und Ufern, auf Sumpfwiesen, ziemlich selten, z. B. Interlaken! Simmenthal (Maurer).

Cerinte. Wachsblume.

alpina Kit. (*C. glabra* Gaud.) An steinigen Orten der mittleren und höheren Region, stellenweise häufig: Am westl. Fuss des Widderfeld an der Hohgantkette (Imobersteg), Schwarzwald ob Rosenlauri (Hügli). Iseltenalp an der Faulhornkette! Schwalmeren (Bamberger nach Rhiner), Mürren am Fuss des Brünlihorn! Spiggengrund! Steinenalp im Kienthal! Unter der Sieglerenfluh am südl. Fuss des Niederhorn bei Boltigen (Maurer). An der Stockhornkette an mehreren Stellen! Wallopalp bei Boltigen, oberhalb des Sees! Thalberg (Trachsel), Bürglen (Maurer), Ganterischalp (Hügli), Krümmelwege ob Blumenstein! Südseite des Sohlhorn (Vulpius).

Anmerkung. Die Angabe von *C. major* L. an der Stockhornkette (Koch. Syn. Ed. 2. und Heg. Flor. d. Schw.) beruht ohne Zweifel auf einer Verwechslung mit der vorigen Species.

Echium. Natterkopf.

* *vulgare* L. An dünnen, steinigen Orten der unteren Region gemein. — Wengen bei 1300^m! — Auf Gneiss im Oberhasli und bei Trachsellaunen.

Pulmonaria. Lungenkraut.

•• *mollis* Wolff. In subalpinen Laubwäldern (Fischer-Ooster). Fuss des Niesen beim Heustrichbad (Hügli).

Lithospermum. Steinsame.

•• *officinale* L. An steinigen Orten der unteren Region, hin und wieder, z. B. an der Kanderemündung! Meiringen (Hügli).

* *arvensis* L. Auf Aeckern der unteren Region hin und wieder, z. B. Thun! Reutigen! Spiez! Meiringen (Hügli).

Myosotis. Mausohr, Vergissmeinnicht.

* *palustris* With. Auf feuchten Wiesen der Ebene und Vor-alpen häufig. — *Var. caespitosa* (*M. caespitosa* Schultz.) Wengen bei 1400^m!

- * *silvatica Hoffm.* Auf Wiesen und Weiden von der Ebene bis in die obere Region häufig. — *Var. alpestris (M. alpestris Schmidt)* auf Alpenweiden gemein.
- * *hispida Schlecht.* Auf Aeckern hin und wieder. Meiringen (Brunner).
- * *intermedia Link.* Auf Wiesen und Aeckern gemein.

Eritrichium.

nanum Schrad. Auf Schutt und Geröll der Gneissalpen in der Nähe der Schneelinie im östlichsten Theil des Gebiets: Susten (Vulpius), Heuberg neben dem Sustenpass (Prof. Brunner), Steinlimmi zwischen der Steinalp und dem Triftgletscher, 2734^m (Ziegler).

Anmerkung. *Anchusa arvensis Bieb. (Lycopsis L.)* Auf Aeckern, selten und vereinzelt. Zwischen Lätterbach und Weissenburg (Brown).

59. Solaneen.

Solanum. Nachtschatten.

- * *nigrum L.* An Wegen, auf Schutt, in der Nähe der Häuser. Thun! Interlaken! Meiringen! u. a. O.
- *Dulcamara L. Bittersüss.* An steinigen Orten, an Ufern, auf alten Mauern, hin und wieder. Balmholz am Thunersee (Brown). An den Ruinen von Weissenau und Unspunnen! Unterseen! Brienz! Meiringen (Brunner). — Auf Gneiss bei Innerkirchen! und bei Stechelberg im Lauterbrunnenthal! An der Simme bei Wimmis! Saanen (v. Rütte) u. a. O.
- * [*tuberosum L. Kartoffel.*] In der unteren Region sehr häufig cultivirt; an einzelnen günstigen Stellen noch bedeutend höher, z. B. Wengen bis circa 1450^m! Mürren, 1630^m!

Physalis. Judenkirsche.

Alkekengi L. An steinigen, sonnigen Orten in der Umgebung des Thuner- und Brienersees stellenweise häufig: An der Simmenthalstrasse oberhalb der Wimmisbrücke! Zwischen

der Beatenhöhle und Neuhaus! Goldei bei Interlaken! Golzwyl! Ringgenberg! Brienz! Am Ballenberg zwischen Brienz und der Wylerbrücke! Zwischen Bönigen und Iseltwald!

Atropa. Tollkirsche.

- * *Belladonna* L. In Wäldern von der Ebene bis in die mittlere Region, ziemlich selten. Grüsisberg bei Thun (Brown), Hondrichberg bei Spiez (Hügli). Beatenberg, Brünig (Brunner), Reichenstein zwischen Saanen und Zweisimmen (Maurer), Saanen (Christeler).

Anmerkung. *Datura Stramonium* L., auf Schutt hin und wieder verwildert. Thun! Meiringen (Hügli).

60. Scrophulariaceen.

a. Verbasceen.

Verbascum. Wollkraut.

- * *Thapsus* L. (*Schraderi* Meyer). An steinigen Orten, auf Waldschlägen hin und wieder; von der Ebene bis in die mittlere Region. — Wengen bei 1400^m!
- * *thapsiforme* Schrad. Wie vorige. Hilterfingen! Sundlauenen am Thunersee! Aeschi! u. a. O.
- montanum* Schrad. Ebenso. Trümmletenthal bei c. 1470^m (Rothenbach).
- * *Lychnitis* L. An Wegen und Waldrändern ziemlich häufig. — Auf Gneiss bei Trachsellauenen!
- * *nigrum* L. Wie vorige. — Auf Gneiss bei Guttannen!

Anmerkung. Die hin und wieder vorkommenden hybriden Zwischenformen sind im Gebiete noch näher zu untersuchen.

b. Scrophularieen.

Scrophularia. Braunwurz.

- * *nodosa* L. In Hecken und Gebüsch der unteren Region gemein. — Wengen bei 1300^m!
- * *Ehrharti* Steven. (*S. aquatica* Koch Syn. Ed. 1, non L.) — *Var. Neesii* (*S. Neesii* Wirtg.) An sumpfigen Orten, Bern. Mittheil. 1875. Nr. 888.

an Gräben und Bächen der unteren Region hin und wieder, z. B. Thun! Goltzwy! bei Interlaken!

c. Antirrhineen.

Digitalis. Fingerhut.

- .. *grandiflora* Lam. (*D. ambigua* Murr.) In Gebüsch, an Waldrändern häufig. — Beatenberg bei 1400^m!
- .. *lutea* L. Wie vorige, aber seltener. Spiez! Rugen bei Interlaken! Brünig (Brunner). — Kandergrund!

Antirrhinum. Löwenmaul.

- .. [*majus* L.] Hie und da cultivirt und verwildert, z. B. an der Kirchhofmauer in Thun! Spiez!

Linaria. Leinkraut.

- .. [*Cymbalaria* Mill.] An Mauern bei Thun! Spiez!
- .. *spuria* Mill. Auf Aeckern der unteren Region, ziemlich selten. Blumenstein! Thun! Interlaken (de Bary), Meiringen (Brunner).
- * *minor* Desf. Auf Aeckern, an Mauern und steinigen Orten der unteren Region, hin und wieder, z. B. Aeschi! Interlaken! Meiringen (Brunner).
- .. *alpina* Mill. An feuchten, steinigen Orten, auf Schutthalden der höheren Region gemein; stellenweise bis weit über die Schneegrenze ansteigend, z. B. am Oberaarhorn, 3400^m (Lindt). — Nicht selten im Geröll der Alpenbäche in die Täler herabsteigend, z. B. am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei 1000^m! am Alpbach bei Meiringen (Hügli). Längs der Lütchine und Kander bis zur Mündung stellenweise häufig! — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch hin und wieder am Ufer der Flüsse.
- * *vulgaris* Mill. An steinigen Orten, an Wegen, auf Aeckern in der unteren Region hin und wieder, z. B. Thun! Interlaken! Meiringen (Brunner). — Häufiger im nördlich angrenzenden Molassegebiet.

Erinus. Leberbalsam.

- alpinus* L. An Felsen und steinigen Orten von der unteren bis in die höhere Region ziemlich verbreitet und stellen-

weise häufig. Bei der Beatenhöhle (Vulpius). Beatenberg an mehreren Stellen! Därligen (Brown), Wagnerenschlucht bei Interlaken (Hügli), Briener Rothhorn! Rosenlauithal (Brunner). An der Faulhornkette bei der Schynigen Platte, c. 2000^m! Eisenfluh (Hügli). Nordseite des Männlichen! Zwischen Lauterbrunnen und Mürren! Suldthal! Oeschenenalp und Ueschenenalp bei Kandersteg (Vulpius), Kandergrund! Gumfluh bei Saanen (v. Rütte). An der Stockhornkette an mehreren Stellen: Wandeliflüh bei Schwarzenmatt (Maurer), im Aufsteigen zu Wallopalp und bis auf den Wallopgrat, 2000^m! Ochsen und Thalberg (Trachsel), Stockhorn! Am Eingang des Simmenthals bei Wimmis! und in vereinzelt Exemplaren an der Kanderemündung. — Stellenweise auch im Jura vorkommend.

Veronica. Ehrenpreis.

- * *Anagallis L.* An Gräben und Bächen der unteren Region hin und wieder, z. B. am Faulensee bei Ringgenberg! Simmenthal (Maurer).
- * *Beccabunga L.* An Gräben und sumpfigen Stellen der Ebene und Voralpen häufig; seltener in der höheren Region, z. B. an einem kleinen Teich unweit der Kl. Scheideck, c. 2000^m!
- * *urticæfolia L. fil.* In Wäldern und Schluchten der unteren und mittleren Region häufig. — Unterhalb Wengernalp bei 1800^m (Rothenbach). — Auf Gneiss im Oberhasli!
- * *Chamædryas L.* An Hecken und Waldrändern, auf Weiden gemein; von der Ebene bis in die obere Region, z. B. am Weg von der Schynigen Platte auf's Faulhorn bei c. 2000^m!
- *montana L.* In Wäldern, selten. Stockhorn (Seringe). Am Fuss des Niesen oberhalb des Heustrichbades (Hügli). — Gurnigelwälder (ausserhalb des Gebietes).
- * *officinalis L.* In Wäldern, besonders auf Lichtungen, von der Ebene bis zur Waldgrenze häufig.
- aphylla L.* Auf Alpenweiden häufig; auch in der mittleren Region, z. B. Saxeten bei 1300^m (Hügli).

- *latifolia* L. nach Koch. (*V. Teucrium* L. Brown. Cat.) Gemmi am Daubensee (Brown). — Häufig im Jura.
- spicata* L. Am Gipfel des Bäderhorns bei Boltigen (Maurer), Widdergalm (Imobersteg). — Auch an einer vereinzelter Stelle im Aarschutt unterhalb Meiringen (Brunner).
- bellidioides* L. Auf Weiden der höheren Region stellenweise häufig, z. B. Grimsel (Brown), Faulhorn (Guthnick), Wengernalp! Gemmi über Schwarrenbach (Brown), Kiley an der Niesenkette (Sterki), Westseite des Bürglen (Brügger) u. a. O. — Seltener in der mittleren Region, z. B. auf der unteren Ganterischalp (Maurer).
- fruticulosa* L. An steinigen Orten, im Geröll, an Felsblöcken von der unteren bis in die höhere Region ziemlich häufig; auf verschiedenem Gestein. Beatenberg! Brünig (Brunner), Gadmenthal! Im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei 1000^m! Faulhorn (Brown), Wengen, häufig an Eisensteinblöcken, bei 1300^m! Eisenfluh! Trachsellauen! Kandergrund! Saanen (Haller En. plant.), Stockhornkette an mehreren Stellen: Schwarzenmatt bei Boltigen (Hügli), Wallopalp! Bürglen und Schwefelberg (Hügli), Leiterenpass (Trachsel), Stockhorn (Brown), Felsen am Eingang des Simmenthals (Brown).
- saxatilis* Jacq. Wie vorige, jedoch im Ganzen seltener und weniger tief herabsteigend, z. B. Rosenlauri (Brunner), Faulhorn und Wengernalp (Brown), Männlichen! Suleck (Hügli), Oberhornalp in Ammert, 2000^m (v. Rütte). Oeschenalp. Ganterisch (Trachsel), Stockhorn (Brown).
- alpina* L. Auf Alpenweiden häufig.
- * *serpyllifolia* L. Auf Aeckern und Grasplätzen, von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Lauberhorn! Männlichen! Am Gipfel des Faulhorns (Martins), Grimsel (Fankhauser).
- * *arvensis* L. Auf Aeckern, an Wegen, in der unteren Region.
- * *agrestis* L. (*V. agrestis pulchella* Gaud. Fl. helv.) Auf cultivirtem Boden, auf Aeckern, in Gärten.

* *polita* Fr. (*V. agrestis vulgaris* Gaud.) Wie vorige. Thun! Spiez! Interlaken! u. a. O. — Wasserwendi ob Meiringen bei c. 1200^m (Hügli).

* *Buxbaumii* Ten. (*V. persica* Poiret.) Auf cultivirtem Boden und an Wegen, an sonnigen Orten stellenweise häufig, z. B. Thun! Hilterfingen! Interlaken! Brienz! u. a. O.

* *hederæfolia* L. Auf cultivirtem Boden häufig.

Anmerkung. *V. scutellata* L. unweit der nördl. Gebietsgrenze bei Uebischi und Schwarzeneck (Brown). — *Limosella aquatica* L. Am Ufer des Thunersees bei Neuhaus (Brown), wurde daselbst in neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

d. **Rhinanthaceen.**

Tozzia.

alpina L. An etwas feuchten, steinigen Orten der mittleren und oberen Region, ziemlich selten, Grimsel (Vulpius), Rosenloui (Brunner), Eisboden am Fuss des Wetterhorns bei Grindelwald (Christener), Faulhornkette zwischen der Schynigen Platte und Iselten (Ziegler), Gasteren (Vulpius), Niesen ob Wimmis (Vulpius), Nordseite des Sohlhorns und unterhalb der Wirtnerenalp (Vulpius), Nordseite des Stockhorns! Nüenen unter der Tschingelflüh (Trachsel). Bürglen, am östlichen Abhang (Maurer).

Melampyrum. Wachtelweizen.

* *pratense* L. In Wäldern der Ebene und Voralpen gemein. — Wengernalp bei 1800^m (Rothenbach).

•• *silvaticum* L. In Wäldern der Voralpen gemein; stellenweise bis in die Ebene, z. B. an der Kanderermündung! Auch in der höheren Region, z. B. am Leiterengrat (Trachsel).

Anmerkung. *M. arvense* L. Nach Brown sehr selten auf Aeckern — ob im Gebiet?

Pedicularis. Läusekraut.

rostrata L. An etwas feuchten Stellen der höheren Region, im Gneissgebiet hin und wieder: Susten (Vulpius), Grimsel (Guthnick), Sidelhorn (Meissner), Urnenalp im Urbachthal!

Zwischen Dossenhorn und Engelhörnern bei Rosenlauri (Lindt), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Gasteren (Vulpus). — Selten in der mittleren Region, z. B. Räterichsboden unterhalb der Grimsel bei c. 1700^m!

tuberosa L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen, stellenweise häufig, z. B. zwischen Gadmen und Steinalp! Faulhorn (Brown), Kl. Scheideck! Oberhalb Wengen bis c. 1300^m herab! Suleck! Mürren am Weg nach dem Sefinenthal! Gasteren. Obersimmenthal (Maurer) u. a. O.

Barrelieri Rb. (*P. adscendens* Gaud.) Auf Alpenweiden ziemlich selten: Wetterhorn am Gleckstein, 2300^m (Lindt). Gemmi über Schwarrenbach (Brown), Haslerberg im Obersimmenthal (Maurer), Trüttlisberg und Lauenenhorn (Meissner), Gifferhorn bei Saanen (v. Rütte).

silvatica L. Auf Sumpfboden bei Rosenlauri (Brunner). — Im nördlich angrenzenden Gebiet auf dem Torfmoor von Schwarzeneck (Brown).

* *palustris* L. Auf Sumpfwiesen der unteren Region stellenweise häufig, z. B. Stockenthal! Neuhaus und Weissenau! Interlaken! Meiringen (Brunner) u. a. O. — Selten in den Voralpen, z. B. Bruchalp zwischen Boltigen und Abläntschen (Hügli), Lauenen (v. Rütte).

foliosa L. Auf Weiden und an felsigen Abhängen der Alpen und Voralpen ziemlich häufig. — Breitlauenenalp, und Rischerenalp bei Beatenberg bis 1500^m herab!

recutita L. Auf Weiden, an felsigen Stellen der höheren Region, selten: Grimsel! Urnenalp im Urbachthal! Alpen von Rosenlauri (Brunner). Mettenberg bei Grindelwald (Christener), Kiley an der Niesenkette und Gemmi (Brown).

versicolor Wahl. Auf Alpenweiden stellenweise sehr häufig, z. B. Briener-Rothhorn! Hohstollen am Hasliberg (Hügli), Olscherenalp im Unterhasli! Engstlenalp, Faulhorn! Suleck! Kiley an der Niesenkette (Brown). — Auf der Stockhornkette ziemlich verbreitet: Zwischen Morgeten und Bürglen und am Ganterisch gegen den Morgetengrat (Vulpus).

Zwischen Ganterisch und Nünenen (Trachsel), Stockhorn über Wahlalp!

verticillata L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen gemein; stellenweise bis in die untere Region, z. B. am Bühl bei Kandersteg, c. 1100^m!

Anmerkung. Von den genannten Spec. kommen nur *P. palustris*, *silvatica* und *foliosa* im Schweizer-Jura vor.

Rhinanthus. Klappertopf.

* *minor* Ehrh. (*Alectorolophus* Wimm. Gr.) Auf sumpfigen Wiesen und Weiden häufig; bis in die Voralpen aufsteigend, z. B. unterhalb Wengernalp bei c. 1700^m (Rothenbach).

angustifolius Gmel. (incl. *R. alpinus* Baumg.) Auf Weiden und an steinigen Orten der Alpen und Voralpen hin und wieder, z. B. Oberhasli zwischen Handeck und Grimsel! Rawyl (Rhyner), Fluhalp am Bäderhorn bei Boltigen (Maurer).

* *major* Ehrh. (*Alectorolophus major* Rb.) Auf Aeckern, unter dem Getreide und auf Wiesen, stellenweise häufig. — *Var. hirsutus* (*Alect. hirsutus* All.) ebenso. Beatenberg bei 1200^m! u. a. O.

Bartsia.

alpina L. Auf Weiden und an steinigen, etwas feuchten Orten der Alpen und Voralpen gemein; stellenweise bis in die untere Region, z. B. auf nassen Weiden unterhalb Waldeck bei Beatenberg, 1150^m! Meiringen am Abhang oberhalb Willigen (Brunner). — Im nördlich angrenzenden Gebiet häufig am Gurnigel und bis in die Ebene bei Allmendingen (Brown).

Euphrasia. Augentrost.

* *officinalis* L. Auf feuchten Grasplätzen, Waldwiesen und Weiden, von der Ebene bis in die höhere Region, gemein. — In mehreren Varietäten. — *Var. nemorosa* (*E. stricta* Host. *E. ericetorum* Jord.) an steinigen Orten, auf Heideplätzen hin und wieder. — *Var. hirtella* (*E. hirtella* Jord.) auf Alpenweiden.

minima Schleich. Auf Weiden der mittleren und höheren Region ziemlich häufig. — Eine Zwergform von wenigen Millim. Höhe im Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster).
salisburgensis Funk. Auf Weiden und an steinigen Orten der Voralpen ziemlich häufig; stellenweise bis an den Fuss der Berge, z. B. in der Kohlerenschlucht bei Thun! am Fuss des Abendberges bei Interlaken! u. a. O.

- *Odontites L.* Auf Aeckern der unteren Region hin und wieder. Thun! Spiez! Reichenbach im Frutigthal! u. a. O.
Anmerkung. Die Arten dieser schwierigen Gattung bedürfen noch weiterer Untersuchung.

Lathræa. Schuppenwurz.

- *Squamaria L.* In Wäldern und Gebüsch, selten; auf den Wurzeln verschiedener Laubhölzer (*Corylus Avellana*, *Juglans regia* u. a.) schmarotzend. Interlaken (Gaud. Fl. helv.), Meiringen (Brunner).

e. Orobanchen.

Orobanche. Sommerwurz.

- Scabiosæ Koch.* Auf Weiden und an Waldrändern der Voralpen, auf *Carduus defloratus*, hin und wieder, z. B. Wengen, 1300^m! Trümmletenthal bei 1500^m (Rothenbach), Oeschenenthal (Fischer-Ooster). — Kommt auch auf *Carduus Personata*, *Cirsium oleraceum* und *Scabiosa Columbaria* vor (Gremli).
- *Epithymum D.C.* Auf *Thymus Serpyllum*, von der Ebene bis in die höhere Region stellenweise häufig, z. B. Eichbühl bei Thun (Brown), Wengen bei 1400^m! Biglenalp, 1800^m! Stufensteinalp im hinteren Lauterbrunnenthal (Fischer-Ooster).
 - *Galii Dub.* Auf *Galium Mollugo*, *verum* u. a. Spec., hin und wieder. Meiringen (Brunner).
- Teucrîi Schultz.* Auf *Teucrium montanum*, *Chamædrys* und *Scorodonia*, häufig zwischen Sundlauenen und Neuhaus am Thunersee! — Wagnerenschlucht bei Interlaken (Hügli), Meiringen (Rhiner), Klus bei Boltigen! — Nach Grenier auch auf *Thymus Serpyllum* u. a. schmarotzend.

flava Mart. Auf Petasites albus im Saxetenthal und bei Weissenburg (Fischer-Ooster), Tschertschisthal bei Saanen! — Nach Gremlı auch auf Petasites officinalis und niveus, auf Adenostyles und Aconitum Lycoctonum schmarotzend.

minor Sutt. Auf Trifolium pratense. — Thun (Guthnick), Meiringen (Brunner). — Auch auf Trif. medium (nach Garcke) und T. repens (nach Grenier) schmarotzend.

Phelipæa.

•• *ramosa* C. A. Meyer. (*Orobanche* L.) Auf Cannabis sativa, hin und wieder. Oberhofen (Fischer-Ooster), Spiezmoos! Därligen (Dietrich). — Nach Koch auch auf Nicotiana, Solanum nigrum und Zea Mays schmarotzend.

61. Labiaten.

Mentha. Münze.

- * *silvestris* L. An Gräben, in feuchten Gebüsch und auf sumpfigen Stellen der Weiden, von der Ebene bis in die Voralpen gemein.
- * *aquatica* L. An Bächen und Gräben der unteren Region häufig.
- * *arvensis* L. Auf feuchten Aeckern häufig. — Saxeten und Beatenberg bei 1200^m!

Anmerkung. Die zahlreichen Abänderungen und hybriden Zwischenformen dieser Gattung sind im Oberlande noch näher zu beobachten.

Lycopus. Wolfsfuss.

- * *europæus* L. Auf Sumpfwiesen, an Gräben und auf Torfmooren in der unteren Region stellenweise häufig, z. B. Pohleren- und Reutigenmoos! Spiezmoos! Zwischen Neuhaus und Weissenau! Interlaken! Innerkirchen! u. a. O.

Salvia. Salbei.

- *glutinosa* L. In Gebüsch, an Waldrändern und steinig Orten der unteren Region gemein; seltener in der mittleren Region, z. B. Schynige Platte bei 1800^m (Hügli). — Auf verschiedenem Gestein.

- * *pratensis* L. Auf trockenen Wiesen gemein, bis gegen die Waldgrenze aufsteigend.

Origanum. Dosten.

- * *vulgare* L. An steinigen Orten, in Gebüsch und an Waldrändern der unteren und mittleren Region gemein. — Nordseite des Männlichen bei 1700^m! — Auf verschiedenem Gestein.

Thymus. Thymian.

- * *Serpyllum* L. (*T. Serpyllum* Fr. und *T. Chamædryis* Fr.) Auf trockenen Wiesen und Weiden von der Ebene bis in die höhere Region gemein. — In mehreren, in Betreff ihrer Verbreitung noch näher zu untersuchenden Varietäten. — *T. Trachselianus* Opiz, an der Nünenen (Gaud. Fl. helv. Vol. VII.).

Calamintha.

- * *Acinos Clairv.* Auf trockenen Aeckern, an Hecken und steinigen Orten der unteren Region, hin und wieder. Oberhofen! Interlaken! u. s. w.

alpina Lam. An steinigen Orten der Alpen und Voralpen gemein; stellenweise bis an den Fuss der Berge, z. B. auf Geröllhalden bei Wimmis!

grandiflora Mönch. Im westlichen Gebiet, an mehreren Stellen der südlichen Abdachung der Stockhornkette: Häufig am Weg vom Weissenburgbad nach der Morgetenalp! bis gegen die Waldgrenze aufsteigend (Leresche). An der Zugeck am Weg nach dem Thalberg (Trachsel). Zwischen Oberwyl und Boltigen (Leresche). Wandelifuh bei Schwarzenmatt (Maurer). — Eine in der Schweiz seltene, südeuropäische Pflanze.

- *officinalis* Mönch. — (*Var. C. nepetoides* Jord.) An steinigen, sonnigen Orten, in Hecken und Gebüsch der unteren Region, von Thun bis Meiringen, stellenweise sehr häufig.

- * *Clinopodium* Spenn. (*Clinopodium vulgare* L.) An Hecken und Waldrändern, auf Weiden und an steinigen Orten von

der Ebene bis in die mittlere Region gemein. — Auf verschiedenem Gestein.

Nepeta. Katzenmünze.

- *Cataria L.* Auf Schutt und an Mauern, meist in der Nähe der Häuser, selten. Hünibach bei Thun! Hilterfingen! Grüsisberg bei Thun (Fischer-Ooster).

Glechoma. Gundelrebe.

- * *hederacea L.* Auf Wiesen, an Hecken und Waldrändern von der Ebene bis in die mittlere Region gemein.

Melittis. Immenblatt.

- *Melissophyllum L.* An waldigen Abhängen zwischen Merligen und Neuhaus stellenweise häufig. Oberhalb Sundlauenen bis c. 1000^m aufsteigend. — Häufig im Jura.

Lamium. Taubnessel.

- *amplexicaule L.* Mürren, bei einem Hause gegen Gimmelwald (Rothenbach). — In der ebeneren Schweiz stellenweise häufig.
- * *purpureum L.* Auf Aeckern und an Wegen gemein. — Mürren bei 1636^m!
- * *maculatum L.* An Hecken und steinigen Orten gemein; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. am Weg von der Schynigen Platte nach dem Faulhorn bei c. 2000^m!
Anmerkung. *L. amplexicaule* × *purpureum* *G. Mey.* (*L. incisum Willd.*) auf einem Acker im Ried bei Thun, mit *L. purpureum*!

Galeobdolon. Waldnessel.

- * *luteum Huds.* (*Lamium Galeobdolon Crantz.*) In Wäldern von der Ebene bis in die mittlere Region häufig. — Bürgli im Kienthal bei 1620^m!

Galeopsis. Hohlzahn.

- * *Ladanum L.* Auf Aeckern, an Wegen und steinigen Orten der unteren Region gemein. — Sehr veränderlich. — *Var. angustifolia* (*G. angustifolia Ehrh.*) Goldei bei Interlaken! u. a. O.

- * *Tetrahit* L. Auf Aeckern und an steinigen Orten, in Lichtungen der Wälder, in der unteren und mittleren Region gemein.

Stachys. Ziest.

- *alpina* L. In Wäldern und auf Weiden der Voralpen, besonders in der Nähe der Sennhütten, häufig; stellenweise bis an den Fuss der Berge, z. B. Goldei bei Interlaken u. a. O.
- * *silvatica* L. An schattigen Orten, in Gebüsch und an Waldrändern von der Ebene bis in die mittlere Region gemein.
- *palustris* L. An Gräben und feuchten Orten der unteren Region häufig.
- * *annua* L. Auf Aeckern gemein.
- * *recta* L. An steinigen Orten, an Wegen der unteren Region.

Betonica. Betonie.

- * *officinalis* L. Auf trockenen Grasplätzen, an Waldrändern und in Gebüsch der unteren Region häufig. — *Var. stricta* auf Weiden der Voralpen.
- hirsuta* L. In der Nähe der westlichen Gebietsgrenze, auf der Schneit zwischen Saanen und Abläntschen (v. Rütte). — Auch in den benachbarten Alpen von Chateau d'Oex.
- Alopecurus* L. Im Sefinenthal in der Nähe der Tannengrenze, selten (Schneider). — Eine seltene, in der Schweiz ausserdem nur im Tessin gefundene Art.

Ballota.

- *nigra* L. — *Var. foetida* (*B. foetida* Lam.) Auf Schutt, in der Nähe der Häuser, stellenweise häufig, z. B. Thun! Spiez! Wimmis (Fischer-Ooster), Latterbach u. a. O.

Scutellaria. Helmkraut.

- *galericulata* L. Auf Sumpfboden, an Gräben, selten. Meiringen (Brunner).

Brunella. Braunheil.

- * *vulgaris* L. Auf Wiesen und Weiden der unteren und mittleren Region gemein. — Niederhorn bei Beatenberg, bei 1800^m!
- *grandiflora* Jacq. Auf Weiden und Grasplätzen von der unteren bis in die obere Region gemein. — *Var. pinnatifida* in einer waldigen Schlucht bei Beatenberg!

Ajuga. Günsel.

- * *reptans* L. Auf Grasplätzen, an Wegen und auf Waldschlägen von der Ebene bis in die mittlere Region gemein. — *Var. alpina* auf Alpenweiden.
- * *genevensis* L. Auf trockenen Wiesen, an Wegen (Brown).
- pyramidalis* L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen, stellenweise häufig. Engstlenalp (Hügli), Faulhorn (Brunner). Am Wengernalpweg ob Wengen! Mürren! Gemmi, Kiley und Gerihorn (Brown).

Teucrium. Gamander.

- * *Scorodonia* L. An trockenen, steinigen Orten, an Waldrändern und auf Heideplätzen der unteren Region gemein. — Beatenberg bei 1200^m!
- *Botrys* L. Auf trockenen Aeckern und an steinigen Orten, selten: Simmenthal bei Latterbach (Imobersteg) und auf Geröllhalden bei Schwarzenmatt (Hügli).
- *Chamædryas* L. An Mauern und steinigen Orten der unteren Region gemein.
- *montanum* L. An Felsen und steinigen Orten von der unteren bis in die höhere Region, stellenweise häufig. — Bei Innerkirchen auf Kalkstein und Gneiss!

62. Verbenaceen.

Verbena. Eisenkraut.

- * *officinulis* L. An sonnigen, steinigen Orten, an Wegen der unteren Region stellenweise häufig, z. B. Thun! Spiez! Interlaken! u. a. O.

63. Lentibularieen.

Pinguicula. Fettkraut.

- *alpina* L. An feuchten Felsen und auf sumpfigen Weiden, an Waldrändern vom Fuss der Berge bis in die höhere Region stellenweise häufig.
- * *vulgaris* L. Wie vorige, besonders auf Tuffboden. — Wengernalp auf Torf bei 1880^m!
- grandiflora* Lam. (*P. vulgaris* var. *grandiflora* Koch. Syn. Ed. 2.) Auf sumpfigen Weiden der Alpen und Voralpen. Susten (Guthnick), Guttannen (Brunner), Grimsel (Leresche).

Utricularia. Wasserschlauch.

- *vulgaris* L. In stehendem Wasser an der Aar oberhalb Interlaken!
- *minor* L. In Sumpfgräben, selten: Reutigenmoos! Neuhaus (Brown). In Gräben zwischen Därligen und Interlaken!
Anmerkung. *U. intermedia* Hayne unweit der nördl. Gebietsgrenze auf dem Schmidtmoos bei Amsoldingen (Brown). — *U. neglecta* Lehm. bei Uebischi (Fischer-Ooster).

64. Primulaceen.

Lysimachia.

- * *vulgaris* L. An feuchten Stellen, an Gräben und Ufern, in der unteren Region ziemlich häufig.
- * *Nummularia* L. An Hecken und Waldrändern hin und wieder. — Beatenberg bei 1230^m!
- * *nemorum* L. In feuchten Wäldern und Gebüsch, stellenweise häufig. — Wengen bei 1400^m!

Anagallis. Gauchheil.

- * *arvensis* L. Auf cultivirtem Boden, im Getreide, hin und wieder, z. B. Thun! Spiez! Brienz! Obersimmenthal bis gegen 1300^m (Maurer) u. a. O.
- *cærulea* Schreb. Auf Aeckern, im Getreide, selten und vorübergehend. Thun (Brown), Kandergrund (v. Rütte).

Androsace. Mannsschild.

helvetica Gaud. In Felsenritzen der höheren Alpengipfel, zwischen 2000^m und 3000^m stellenweise häufig; vorzugsweise auf Kalkstein und Schiefer: Hohstollen am Hasliberg! Schwarzhorn in Grindelwald, 2930^m (Fischer-Ooster). Faulhorn! Schreckhorn bei 2780^m (Lindt), Lauberhorn 2475^m! Männlichen! Schwalmeren (Vulpus), GrossHundshorn, 2932^m! Sefinenfurke! Oeschenengrat! Gamchilücke! Gemmi! Niesen (Brown), Albrist (Fischer-Ooster), Rawyl (Vulpus). Auf mehreren Gipfeln der Stockhornkette (bis c. 2000^m herunter): Ochsen, Ganterisch, Nünenen und Stockhorn (Trachsel). — Selten in tieferen Lagen, z. B. im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei c. 1000^m!

imbricata L. Auf Gneissfelsen am Unteraargletscher (Girard nach Desor).

glacialis Hoppe. (*A. pennina* Gaud.) Auf etwas feuchtem Schutt und Geröll der Hochalpen hin und wieder, vorzugsweise auf Gneiss und Schiefer: Titlis (Stud. Engelmann), Sidelhorn (Brown), Oberaarhorn bei 3400^m (Lindt), Viescherhorn (Fellenberg), Dossenhorn bei Rosenlauri (Lindt), Wellhorn, 3196^m (Fellenberg). Schreckhorn bei 3300^m, letzte Phanerogame bei einer Besteigung im J. 1864. (Fellenberg). Schwarzhorn und Röthhorn in Grindelwald (Fischer-Ooster), Faulhorn (Brunner), Roththal an der Jungfrau (Fischer-Ooster), Schwalmeren (Bamberger), Schilthorn! Sefinenfurke! Lötschpass!

pubescens D.C. (*A. alpina* Gaud.) Wie vorige. Am Unteraargletscher (Girard nach Desor), Schwarzhorn (Fischer-Ooster), Faulhorn! Suleck gegen die Lobhörner (Vulpus), Schwalmeren (Fischer-Ooster), Schilthorn! Lattreienalp (Vulpus), Oeschenengrat! Gemmi (Brown), Rawyl (Vulpus), Wildhorn (v. Rütte), Sanetsch (Brown), Oldenhorn (Vulpus). — Niesen (Brown).

Chamæjasme Host. Auf Alpenweiden der höheren Region stellenweise häufig; selten unterhalb der Waldgrenze, z. B. Mettlenalp (bei Wengernalp) bei 1700^m!

obtusifolia All. Auf Weiden und an steinigen Orten der höheren Region hin und wieder. Oberaarhorn bei 3400^m (Lindt), Faulhorn! Kl. Scheideck (Imobersteg), Tschuggen (Rothenbach), Gasterenthal, Gemmi (Brown).

lactea L. Auf den äusseren Kalkketten, an felsigen Orten der höheren, seltener der mittleren Region, stellenweise häufig, z. B. Sigriswylgrat (Brown), Stockhorn! Nünenen (Vulpus), Ganterisch (Leresche), Bürglen (Vulpus), Schwefelberg bei 1500^m (Hügli), Wallopgrat! — Im nördlichen und mittleren Theil des Jura verbreitet (nebst *A. villosa* die einzige jurassische *Androsace*-Art).

Anmerkung. Die Angabe von *Androsace imbricata* Lam., einer Pflanze der Walliser Alpen, am Unteraargletscher (Girard nach Desor) bedarf der Bestätigung.

Primula. Schlüsselblume.

* *farinosa* L. Auf feuchten Weiden der Alpen und Voralpen gemein; auch auf Sumpfwiesen der Ebene stellenweise sehr häufig, z. B. Reutigenmoos! Zwischen Interlaken und Bönigen! u. a. O. — Am Faulhorn Gipfel (Martins).

* *elatior* Jacq. An feuchten, schattigen Orten von der Ebene bis in die höhere Region gemein.

* *officinalis* Jacq. Auf trockenen, sonnigen Grasplätzen der unteren Region häufig, stellenweise bis in die mittlere Region.

Auricula L. *Aurikel. Frühblume.* An Felsen der mittleren und höheren Region ziemlich häufig; vorzugsweise auf Kalkstein. — Selten in der unteren Region, z. B. an der Simmenfluh bei Wimmis, 630^m (Vulpus).

viscosa Vill. (*P. villosa* Koch.) An etwas feuchten Felsen von der unteren bis in die obere Region stellenweise häufig; vorzugsweise auf quarzhaltigem Gestein. Burgfeld und Geumenalphorn oberhalb Beatenberg! An Gneissfelsen im Oberhasli stellenweise häufig! Faulhorn! Lauberhorn! Mürren

gegen das Schilthorn! Im Hintergrund des Lauterbrunnenthals von Sichelalpen bis Oberhorn (c. 1000^m—2000^m)! Dürrenberg im Kienthal! Am Gasterengletscher (Vulpus). — Selten mit weissen Blüten, z. B. Dürrenberg (Brown).

integrifolia L. Auf Weiden der höheren Region selten. Käserstatt am Hasliberg (Brunner, Hügli). Am Jochpass (Leresche, Fischer-Ooster), Susten (Vulpus), Faulhorn unterhalb des Bachalpsees!

Anmerkung. Von hybriden Zwischenformen finden sich: *P. elatior* × *officinalis*, zwischen den Stammarten, hin und wieder, z. B. Ralligen! Interlaken, gegen Golzwyl! *P. Auricula* × *viscosa* in mannigfaltigen Abstufungen; zu letzteren gehören *P. rhætica* Gaud. und *P. helvetica* Schleich, häufig auf Gemmenalp und Burgfeldalp bei Beatenberg! Hohgant (Imobersteg). Am Fuss des Schilthorns oberhalb Mürren (Vulpus).

Soldanella. Alpenglöckchen.

alpina L. Auf feuchten Weiden der höheren Region häufig. — Stellenweise in der mittleren, selten bis in die untere Region, z. B. Justisthal bei 1130^m! — Im Jura nur auf den höchsten Gipfeln.

pusilla Baumg. (*S. Clusii* Gaud.) Auf feuchten Weiden der höheren Region hin und wieder, z. B. Joch (Leresche), Grimsel (Brown), Faulhorn! Sefinenfurke! Oeschenengrat gegen Bundalp! u. a. O.

Beide Species hin und wieder mit weissen Blüten.

Cyclamen. Erdscheibe.

europæum L. In wärmeren Lagen am oberen Thunersee und in der Gegend von Interlaken, in steinigen Wäldern und Gebüschen stellenweise häufig: Im Ralligholz zwischen Ralligen und Merligen! an mehreren Stellen zwischen Merligen und Sundlauen! besonders in der Nähe der Beatenhöhle; am Weg von Sundlauen nach Beatenberg noch bei circa 1000^m! Am kleinen Rugen bei Interlaken! Am Harder (Brunner). Unweit der Ruine von Schadburg bei Ringgen-Bern. Mittheil. 1875. Nr. 890.

berg! — Eine in den Alpen und dem Jura an zerstreuten Standorten vorkommende Pflanze.

Anmerkung. *Centunculus minimus* L., auf feuchten Aeckern (Brown). — Ob im Gebiet?

65. Globularieen.

Globularia. Kugelblume.

vulgaris L. An trockenen, steinigen Orten, im Geröll der unteren Region hin und wieder. Bei der Kanderbrücke zwischen Wimmis und Spiez! Meiringen (Brunner). — Im nördlich angrenzenden Gebiet auf der Thunallmend (Brown).

nudicaulis L. An steinigen Orten, an Kalkfelsen und auf trockenen Weiden von der unteren bis in die höhere Region stellenweise häufig, z. B. Ralligstöcke! Am Brienersee zwischen Bönigen und Iseltwald. Meiringen (Brunner), Schynige Platte! Wengernalp am Eigergletscher (Rothenbach). Oberhalb Kandersteg gegen den Oeschenensee! Stockhornkette am Thalberg (Trachsel), Nünenen (Brügger). Stockhorn (Brown). — Dem Jura fehlend.

cordifolia L. An Felsen und steinigen Orten von der unteren bis in die obere Region; vorzugsweise auf Kalkstein, stellenweise sehr häufig; z. B. bei Wimmis! An sonnigen, felsigen Stellen von Merligen bis Meiringen! Grindelwald! Wengernalp (Rothenbach), Lauterbrunnenthal! Mürren (Vulpis); Kandersteg gegen den Oeschenensee! Stockhornkette u. a. O.

66. Plantagineen.

Plantago. Wegerich.

* *major* L. An Wegen, auf Schutt und an gedüngten Stellen in der Nähe der Häuser, in der unteren und mittleren Region häufig.

* *media* L. Auf trockenen Wiesen, an Wegen der Ebene und Voralpen gemein.

* *lanceolata* L. Auf Wiesen und Weiden gemein; von der Ebene bis in die höhere Region. — Var. in Grösse und Form der Aehren und Behaarung der Blätter.

motana Lam. Auf Weiden der Alpen und Voralpen gemein; selten bis in die untere Region, z. B. Justisthal bei 1150^m!

alpina L. *Alpenwegerich*. Wie vorige. — Beatenbergallmend bei 1400^m! — *Var. P. incana* Heg. *Fl. der Schw.* am Faulhorn (Heg.) — Im Jura selten.

serpentina Vill. (*P. maritima* Koch *p. part. P. graminea* Schleich.) Hahnenmöser bei Lenk (Hügli). — Eine Pflanze der südlicheren Schweizeralpen.

Anmerkung. *Littorella lacustris* L., nach Brown am Ufer des Thunersees bei Neuhaus, wurde daselbst in neuerer Zeit nicht mehr gefunden.

67. Amarantaceen.

Amarantus. Amarant.

* *Blitum* L. (*Albersia* Kunth.) Auf Schutt in der Nähe der Häuser hin und wieder. Thun! Interlaken! Meiringen (Brunner) u. a. O.

68. Chenopodeen.

Chenopodium. Gänsefuss.

* *album* L. Auf Aeckern, auf Schutt in der Nähe der Häuser, in der unteren Region gemein, seltener in der mittleren Region.

* *polyspermum* L. Auf Aeckern, an Wegen, auf Schutt, in der unteren Region hin und wieder. Thun! Interlaken. Brienz! u. a. O.

•• *foetidum* Lam. (*C. Vulvaria* Lam.) An gedüngten Stellen, zwischen Steinen in der Nähe der Häuser, selten: Reichenbach im Frutigthal! Frutigen (v. Rütte).

* *Bonus Henricus* L. (*Blitum* C. A. Meyer). An Wegen in der Nähe der Häuser und an gedüngten Stellen gemein, von der Ebene bis in die höhere Region. — Am Faulhorngipfel (Martins).

rubrum L. (*Blitum* Rehb.) Weissenbach im Simmenthal, an gedüngten Orten in der Nähe der Häuser, stellenweise häufig (Maurer).

Beta.

- * [*vulgaris* L. *Runkelrübe, rothe Rübe, Mangold*]. Cultivirt und hin und wieder verwildert.

Spinacia. Spinat.

- * [*oleracea* L.] Häufig cultivirt. — Engstlenalp, 1839^m und »am Stein« im Gadmenthal, 1868^m (Rätzer).

Atriplex. Melde.

- * *patulum* L. Auf Aeckern, an Wegen, auf Schutt in der Nähe der Häuser, häufig.

69. Polygoneen.

Rumex. Ampfer.

- * *conglomeratus* Murr. An feuchten Stellen, an Wegen und Gräben der unteren Region ziemlich häufig.
- * *obtusifolius* L. Auf Wiesen, an Wegen gemein.
- * *crispus* L. Wie vorige.
- alpinus* L. *Blacken*. Auf Weiden der Alpen und Voralpen, besonders an gedüngten Stellen in der Nähe der Sennhütten. — Fehlt dem Jura.
- scutatus* L. An steinigen Orten, besonders im Geröll vom Fuss der Berge bis in die höhere Region, stellenweise sehr häufig; auf verschiedenem Gestein. Thun und Oberhofen an Mauern (Brown). Brienz! Häufig im Oberhasli: von Innerkirchen bis zum Aargletscher! im Gadmen- und Urbachthal! — Faulhorn, Grindelwald (Prof. Brunner). Häufig im Lauterbrunnenthal, bis Trachsellaunen! Gemmi (Brown), Schwarzenmatt bei Boltigen und bis auf die Wallopalp häufig! Südseite des Ganterisch (Trachsel).
- nivalis* Heg. An steinigen Orten, im Geröll der höheren Region ziemlich selten: Engstlenalp (Fischer-Ooster), Faulhorn bei 2600^m (Heg. Flor. der Schw.), Schwalmeren bei 2300^m (Fischer-Ooster), Suleck! — Eine vorwiegend der östlichen Alpenkette angehörende Pflanze.
- arifolius* All. An steinigen Orten, auf Weiden von der unteren bis in die höhere Region, stellenweise häufig, z. B.

Oberhasli! Faulhorn (Brown), Schiltwald bei Wengen! Männlichen 2345^m! Ammerten im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Niesen (Brown). Stockhornkette an der Tschingelfluh (Brown) und am Weg von der Boltigenklus zur Wallopalp!

* *Acetosa* L. *Sauerampfer*. Auf Wiesen und Grasplätzen der Ebene und Voralpen gemein.

* *Acetosella* L. Auf Aeckern und Heideplätzen, auf Sand- und Torfboden, von der Ebene bis in die obere Region, stellenweise sehr häufig. — Grimsel im Aargeröll!

Anmerkung. *R. sanguineus* L. ausserhalb der nördlichen Gebietsgrenze bei Amsoldingen (Guthnick).

Oxyria. Säuerling.

digyna Campd. An steinigen Orten, im Geröll der höheren Alpen stellenweise häufig; z. B. Oberhasli! Faulhorn! Lauberhorn (Rothenbach), Suleck! Gemmi (Brown). — Selten in der tieferen Region, z. B. im Geröll am Fuss des unteren Grindelwaldgletschers bei c. 1000^m! — Gehört zu den am weitesten nach dem Nordpol vordringenden Phanerogamen der arktischen Flora (bis 81°).

Polygonum. Knöterich.

.. *Bistorta* L. *Natterwurz. Schluche*. Auf feuchten Wiesen der unteren und mittleren Region sehr verbreitet; seltener in der höheren Region, z. B. Gemmenalphorn bis c. 2000^m!

viviparum L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen gemein; an vereinzelt Stellen auch in der unteren Region, z. B. Stoffelberg bei Leissigen, 730^m! Auf einer schattigen Weide bei Wilderswyl, 650^m!

.. *amphibium* L. Häufig im Weissensee am Ballenberg bei Brienz! — Ausserhalb der nördl. Gebietsgrenze im Amsoldingensee.

* *lapathifolium* L. Auf feuchten Aeckern, an Gräben und gedüngten Stellen häufig.

* *Persicaria* L. Wie vorige. — Wengen im Getreide bis c. 1450^m!

- * *Hydropiper* L. An feuchten Stellen, in Strassengräben, an gedüngten Orten in der Nähe der Häuser häufig.
- *minus* Huds. An Waldwegen und Gräben, auf Torfmooren, in der unteren und mittleren Region hin und wieder.
- * *aviculare* L. Auf Aeckern, an steinigen Orten in der Nähe der Häuser, in der unteren und mittleren Region gemein. — Mürren bei 1636^m!
- * *Convolvulus* L. Auf Aeckern gemein. — Wengen bis 1450^m!
dumetorum L. Eine durch sehr verlängerte Blütenstiele ausgezeichnete Varietät auf Kalkfelsen und im Geröll der Simmenfluh bei Wimmis (Fischer-Ooster).
alpinum All. Oberhasli unterhalb Guttannen (Schneider). — Häufiger in den südlichen Schweizeralpen.

70. Thymeleen.

Daphne. Kellerhals.

- *Mezereum* L. *Seidelbast. Zilang.* Hin und wieder in Wäldern und Gebüschern der Ebene und Voralpen; häufiger auf steinigen Weiden und im Geröll der Alpen.
alpina L. An vereinzelt, felsigen Stellen am südlichen Abhang der Stockhornkette: In der Nähe des Weissenburgbades (Schläfli), Thalberg (Gaud. Fl. helv. Vol. VII) und bei Schwarzenmatt (Maurer). — Eine vorherrschend südeuropäische, in den Alpen und im Jura seltene Art.

71. Santalaceen.

Thesium.

- *pratense* Ehrh. (*T. intermedium* Brown. Cat., non Schrad.) An steinigen Orten, auf Weiden, im Geröll, von der unteren bis in die obere Region hin und wieder, z. B. am Fuss der Ralligstöcke bei Sigriswyl (Fischer-Ooster). Im Kies der Simme bei Wimmis! und an der Kandermündung (Bamberger), Boltigen, bis über die Waldgrenze (Maurer).
- *alpinum* L. Wie vorige; auf Weiden der Alpen und Voralpen ziemlich häufig. — Kandermündung (Brown), Biglenalp im Trümmletenthal 2000^m!

72. Loranthaceen.

Viscum. Mistel.

- * *album* L. Auf verschiedenen Bäumen, besonders Apfelbäumen, in der unteren Region hin und wieder, z. B. Thun! Hilterfingen! Spiez! Meiringen (Hügli). — Golderen ob Meiringen bei 1050 (Hügli). — Auf *Sorbus Aria* ziemlich häufig zwischen Gunten und Merligen!

73. Elæagneen.

Hippophaë. Sanddorn.

- * *rhamnoides* L. An Ufern, im Geröll der Flüsse stellenweise häufig: An der Simme oberhalb der Wimmisbrücke! An der Kander bei Reichenbach, Wimmis, und bis zur Mündung häufig! Hin und wieder an der Lutschine, besonders am Ausfluss in den Brienersee! An der Aar oberhalb Interlaken!

74. Aristolochieen.

Aristolochia. Osterluzei.

- [*Clematitis* L.] In Gärten hin und wieder cultivirt und zuweilen verwildert, z. B. Gsteigwyler! Emdthal bei Aeschi (Hügli), Lütchenthal an der Grindelwaldstrasse!

Asarum. Haselwurz.

- europæum* L. In lichtem Gebüsch und an Hecken, selten: Im unteren Theil eines Waldes zwischen Teuffithal und der Blume (Brown). Meiringen, bei Geissholz und am Hasliberg (Brunner). Im Obersimmenthal auf der Schüpfen bei der Bruchalp (Maurer), am Hohlass und an der Siglerenfluh (Gempeler). An der Saane bei Saanen!

75. Empetreen.

Empetrum. Rauschbeere.

- nigrum* L. An steinigen Orten der höheren Alpenweiden, stellenweise häufig und oft ganze Strecken überziehend. Gipfel des Gemmenalphorns! Engstlenalp (Brunner). Häufig

im oberen Aarthal von der Handeck bis zum Aargletscher! Faulhorn (Brown), Männlichen! Kl. Scheideck! Mürren! Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Gasterenththal (Fischer-Ooster), Oldenhorn (v. Rütte), Stockhorn (Brown) u. a. O. — Selten in der Waldregion, z. B. an sumpfigen Stellen unterhalb der Handeck, c. 1300^m! — Im Jura an zerstreuten Standorten.

76. Euphorbiaceen.

Buxus. Buchs.

- * [*sempervirens* L.] In Gärten, als Einfassung häufig cultivirt, in warmen Lagen als freistehende Sträucher oder kleine Bäume, z. B. Oberhofen, Gunten, Niederried!

Euphorbia. Wolfsmilch.

- * *helioscopia* L. Auf cultivirtem Boden, auf Aeckern, in Gärten gemein. — Wengen bis 1450^m!
- *platyphylla* L. Auf Schutt, an Wegen, vereinzelt und selten. Hilterfingen (Brown).
- *stricta* L. Wie vorige. Wimmis (Hügli).
- * *dulcis* Jacq. In Wäldern hin und wieder.
- *verrucosa* Lam. An steinigen Orten, in Gebüsch, selten. — Meiringen (Brunner).
- *amygdaloides* L. In Wäldern bei Thun (Guthnick).
- * *Cyparissias* L. An steinigen Orten, im Geröll, von der Ebene bis in die obere Region, häufig. — Wengernalp am Eigergletscher, 1920^m (Rothenbach).
- * *Peplus* L. Auf cultivirtem Boden, auf Aeckern, in Gärten und Weinbergen.
- * *exigua* L. Auf Aeckern, nach der Erndte, hin und wieder.
Anmerkung. *E. Lathyris* L. in Weinbergen bei Spiez (wohl ursprünglich cultivirt).

Mercurialis. Bingelkraut.

- * *perennis* L. In steinigen Wäldern und Gebüsch der unteren Region häufig. — Justisthal bei 1100^m! Obersimmenthal (bis in die mittlere Region) (Maurer).

77. Urticeen.

Urtica. Nessel.

- * *urens* L. Auf Schutt, an gedüngten Stellen in der Nähe der Häuser hin und wieder. Thun (Brown). Nicht selten in den Dörfern im Oberhasli! Trachsellaunen! Saxeten bei 1100^m! Frutigen, Kandersteg und Saanen (Rhiner).
- * *dioica* L. In Hecken und Gebüsch, auf Schutt in der Nähe der Häuser gemein; auch in der höheren Region, an gedüngten Stellen.

Parietaria. Glaskraut.

- erecta* Mert. et Koch. (*P. officinalis* L. var. *erecta* Ascherson.) In der Gegend von Interlaken: bei der Kirche! in der Goldei! und ziemlich häufig an Mauern im Dorfe Ringenberg!

78. Cannabineen.

Cannabis. Hanf.

- * [*sativa* L.] In der unteren Region häufig cultivirt. — Gadementhal bis 1220^m (Rätzer), Beatenberg 1250^m!

Humulus. Hopfen.

- * *Lupulus* L. In Hecken und Gebüsch der unteren Region ziemlich häufig.

79. Ulmaceen.

Ulmus. Ulme. Rüster.

- * *campestris* L. (incl. *U. montana* Sm.) In der unteren Region hin und wieder zwischen anderen Laubbölgern; in Anlagen und an Strassen häufig cultivirt. — Beatenberg bei 1150^m! — In mehreren Varietäten, die im Oberlande noch näher zu untersuchen sind.

80. Plataneen.

Platanus. Platane.

- * *orientalis* L. var. *acerifolia* D. C. Prodr. (*P. acerifolia* Willd.) Hin und wieder cultivirt, z. B. Thun! Interlaken!
Bern. Mittheil. 1875. Nr. 891.

81. Juglandeen.

Juglans. Wallnuss.

* [*regia* L.] In wärmeren Lagen der unteren Region häufig cultivirt. — Im Aarthal bis äusser Urweid, c. 700^m! Gadmenthal, an der Sonnseite vereinzelt bis c. 1250^m (Rätzer). Lütschenthal circa 800^m, Frutigthal bis Reinisch oberhalb Frutigen, c. 900^m. Simmenthal, oberhalb Schwarzenmatt bei 1050^m!

82. Cupuliferen.

Fagus. Buche.

* *silvatica* L. In der unteren Region, in reinen oder mit anderen Baumarten gemischten Waldungen, in kleineren Gruppen oder vereinzelt; in günstigen Lagen bis c. 1300^m. — Nur ausnahmsweise höher, z. B. oberhalb Wengen bis c. 1450^m! im Genthal (Spicherfluhwald) bis über 1500^m (Kern). — Im Aarthal bildet ein kleines Gehölz bei Aegerstein, unterhalb Guttannen (bei c. 1000^m)! die Grenze des Vorkommens. — Im grössten Theil der Kander-, Simmen- und Saanethäler tritt die Buche nur in sehr untergeordneter Weise auf und fehlt auf grösseren Strecken ganz.

Castanea. Kastanie.

•• [*sativa* Mill.] (*C. vesca* Gærtn. *C. vulgaris*. Lam.) In warmen, geschützten Lagen der unteren Region, selten. In schönen Exemplaren bei Spiez! Zwischen Spiez und Leisigen! Interlaken, am Weg nach Golzwyl! und am kleinen Rugen.

Quercus. Eiche.

* *sessiliflora* Sm. *Wintereiche*. In der unteren Region, meist vereinzelt und in manchen Bezirken fehlend. — Beatenberg 1200^m! Wengen 1300^m!

* *pedunculata* Ehrh. *Sommereiche*. Ebenso; in der Ebene häufiger als vorige.

83. Betulaceen.

a. Carpineen.

Carpinus. Hainbuche.

Betulus L. Weissbuche, Hagbuche. In Hecken und Gebüsch der unteren Region, selten und vereinzelt. Thun und Interlaken (Brown).

Corylus. Haselnuss.

* *Avellana L.* In Hecken und Gebüsch der unteren Region gemein, stellenweise noch etwas höher, z. B. Wengen bis c. 1350^m!

b. Betuleen.

Betula. Birke.

* *alba L. nach Koch. (B. verrucosa Ehrh.)* In Wäldern und Gebüsch, meist in kleineren Gruppen oder vereinzelt; grösseren Bezirken fehlend. Beatenberg und Wengen bei 1300^m! Im Aarthal oberhalb der Handeck bis c. 1700^m und in vereinzelt Exemplaren noch in der Nähe des Unteraargletschers.

Anmerkung. *B. pubescens Ehrh.*, nicht selten auf Torfmooren des Hügellandes, dürfte sich im Gebiet noch finden. — *B. nana L.* unweit der nördlichen Grenze bei Wacheldorn.

Alnus. Erle.

•• *viridis D.C. Berg-Erle. Droos.* Auf Weiden, an Waldrändern vom Fuss der Berge bis in den unteren Theil der oberen Region häufig; oberhalb der Waldgrenze oft ganze Abhänge überziehend.

* *incana D. C. Weiss-Erle.* In Wäldern und Gebüsch der Ebene und Voralpen, besonders am Ufer der Flüsse und Bäche häufig. — Wengen bei 1300^m!

•• *glutinosa Gærtn. Schwarz-Erle.* An feuchten Stellen in Wäldern und Gebüsch; selten und vereinzelt. Interlaken! Beatenberg bei c. 1150^m! Meiringen (Brunner). Zwischen äusser und inner Urweid!

84. Salicineen.

Salix. Weide.

- *pentandra* L. In Gebüsch, an Ufern, selten. Am nördlichen Fuss der Gemmi bei Kandersteg (Seringe, Gaud.)
- *fragilis* L. An Ufern, selten. Bei Thun.
- * *alba* L. An Ufern hin und wieder. Thun! Interlaken! Meiringen (Brunner). — *Var. vitellina* hin und wieder cultivirt.
- * [*babylonica* L. *Trauerweide.*] In warmen Lagen hin und wieder cultivirt. Thun! Oberhofen! Spiez! u. a. O.
- * *amygdalina* Koch. An Ufern hin und wieder. — *Var. concolor* (*S. triandra* L.) Thun (Fischer-Ooster). Kander-
mündung (Brown), Meiringen (Brunner). — *Var. discolor.* (*S. amygdalina* L.) Kienthal (Fischer-Ooster).
- *daphnoides* Vill. An Ufern der unteren Region hin und wieder: Am Lombach oberhalb Neuhaus! Meiringen (Brunner). — • Kander-
mündung! An der Simme bei Wimmis! Weissenbach (Maurer), Vanel bei Saanen (Leresche). — Zu dieser Art gehört nach Andersson (D.C. Prodr.) die in der Gegend von Thun citirte *S. pulchra* Wimmer.
- * *purpurea* L. Am Ufer des Flüsse und Bäche in der unteren Region häufig. — Beatenberg bei 1200^m!
- * *incana* Schrank. An Ufern häufig; bis in die mittlere Region aufsteigend. — Wengen bei 1300^m! Engstligenalp bei 1500^m (v. Rütte).
- * *cinerea* L. An feuchten Stellen, in Wäldern und Gebüsch hin und wieder. Hünibach bei Thun (Brown), Spiez (Hügli), Rosenloui (Brunner).
- * *nigricans* Fr. An Ufern, in Gebüsch ziemlich häufig; von der Ebene bis in die mittlere Region. — Mürren, c. 1630^m (Fischer-Ooster).
- *grandifolia* Seringe. An bewaldeten, felsigen Abhängen, in Schluchten, ziemlich häufig. Stockenthal! Burgfluh bei Wimmis! Balmholz am Thunersee (Vulpus) u. a. O.

- * *Caprea L. Saalweide.* In Wäldern und Gebüsch hin und wieder.
- * *aurita L.* An sumpfigen Stellen der Wälder, auf Torfmooren, hin und wieder; z. B. Reutigenmoos! u. a. O.
- hastata L.* Auf Alpenweiden ziemlich häufig, z. B. Ralligstöcke (Fischer-Ooster), Grimsel (Seringe), Faulhorn (Brown), Wengernalp (Rothenbach), Mürren! Gemmi (Gaud.), Rawyl (Rhiner). Stockhornkette an der Nünenen und am Fuss der Tschingelfluh (Trachsel), Stockhorn (Brown) u. a. O. — In mehreren Varietäten.
- *repens L. Var. fusca (S. fusca Sm.)* Auf Torfmooren und an sumpfigen Stellen der unteren Region, selten: Reutigenmoos! Faulenseemoos bei Spiez!
- arbuscula L.* An Bächen und feuchten Stellen der höheren Alpen hin und wieder. Grimsel! Kl. Scheideck! Mürren und Gasterenthal (Fischer-Ooster), Gemmi (Heer), Hahnenmöser zwischen Adelboden und Lenk! — *Var. foetida (S. foetida D.C.)* Am Fuss des Brünlihorns bei Mürren (Fischer-Ooster), Gemmi (Gaud. Fl. helv.)
- helvetica Vill. (S. Lapponum Koch. p. part.)* Auf Weiden und an Bächen der höheren Alpen, selten; vorzugsweise auf Gneiss: Grimsel! Am Aargletscher (Seringe). Am Kalli über dem unteren Grindelwaldgletscher und am Schmadribach im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Fischer-Ooster). Lötschpass im Gasterenthal! Kiley an der Niesenkette (Brown).
- glauca L.* Auf den höheren Gneissalpen selten: Grimsel (Seringe). Am Schmadribach (Fischer-Ooster). Am Lötschgletscher.
- caesia Vill.* Steinberg in Ammertten (Fischer-Ooster), Gemmi (Guthnick).
- Myrsinites L.* Auf Alpenweiden selten. Grimsel (Seringe), Gemmi beim Daubensee und am Lämmerengletscher (Brown, Gaud.)

reticulata L. (*Chamitea reticulata* Kerner). Auf Weiden, an steinigen Abhängen der höheren Region ziemlich häufig; nicht selten auch in der mittleren Region, z. B. zwischen Gsteig und Schynige Platte bei c. 1600^m!

retusa L. An felsigen Orten der mittleren und oberen Region häufig. — Mettlenalp bei Wengen bei 1700^m! — *Var. serpyllifolia* (*S. serpyllifolia* Scop.) in der höheren Region ziemlich häufig. — *Var. serrulata* am Schmadribach (Fischer-Ooster).

herbacea L. An etwas feuchten Stellen der höheren Alpenweiden, stellenweise häufig, z. B. Grimsel! Faulhorn (Brown), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Fischer-Ooster), Gemmi (Brown), Stockhornkette zwischen Bürglen und Ganterisch.

Anmerkung. Die Formen und Verbreitungsverhältnisse dieser schwierigen Gattung sind im Oberlande noch weiter zu beobachten. — Vergleiche zu näherem Studium auch Kerner, *niederösterreichische Weiden* (in Verhandl. der zoolog.-botan. Ges. in Wien 1860.) — Von den zahlreichen Hybriden sind bis jetzt beobachtet: *S. Caprea* × *incana* (*S. Seringeana* Gaud. *S. Kanderiana* Ser.) an der Kander (Seringe). — *S. viminalis* × *purpurea* (*S. rubra* Huds.) Kandergrien (Gaud.), Meiringen (Brunner). — *S. aurita* × *repens* (*S. ambigua* Ehrh.) Bei Thun und auf feuchten Wiesen oberhalb Sigriswyl (Fischer-Ooster). — Zu den Hybriden (*S. glauca* × *herbacea*?) stellt Andersson (in D.C. Rodr.) auch die von Seringe am Aargletscher entdeckte *S. ovata* Ser. (*S. arbuscula* a. *Waldsteiniana* Koch. *Syn. Ed. 2 p. p. S. pyrenaica norvegica* Fr.)

Populus. Pappel.

* [*alba* L. *Silberpappel.*] Hin und wieder cultivirt. Thun! Interlaken! u. a. O.; zuweilen verwildert. In Gebüsch am südlichen Fuss der Burgfluh bei Wimmis! Zwischen Interlaken und Bönigen (Fischer-Ooster).

- * *tremula* L. *Zitterpappel*. *Aspe*. In Wäldern und Gebüsch der unteren Region häufig. — Beatenberg bis 1300^m! Wengen (Schiltwald) als Bäume bis c. 1200^m, als Sträucher bis 1350^m!
- * [*pyramidalis* Rozier. *P. italica* Mönch. *Italienische Pappel*]. Hie und da cultivirt. Thun! Neuhaus! u. a. O.
- * *nigra* L. *Schwarzpappel*. An Ufern, in Wäldern der unteren Region hin und wieder. Neuhaus! Meiringen (Brunner) u. a. O.

Reihe B. Monocotyledonen.

85. Alismaceen.

Alisma. Froschlöffel.

- * *Plantago* L. In Sumpfgräben, an Ufern hin und wieder. Spiez! Interlaken! Meiringen (Brunner) u. a. O.

86. Juncagineen.

Scheuchzeria.

palustris L. An sumpfigen Stellen der höheren Region, selten: Bachalp am Faulhorn. Gemmi über Schwarrenbach (Brown). — Jenseits der nördl. Gebietsgrenze auf dem Torfmoor von Schwarzeneck (Brown).

Triglochin. Dreizack.

- *palustris* L. Auf nassen Wiesen und Weiden, hin und wieder; von der Ebene bis in die höhere Region. Habkerenthal (Fischer-Ooster), Meiringen (Brunner), Bachalp am Faulhorn. Adelboden bei 1200^m! Saanen (v. Rütte). Im Stockenthal stellenweise häufig! u. a. O.

87. Potameen.

Potamogeton. Laichkraut.

- * *natans* L. In stehendem und langsam fließendem Wasser hin und wieder. — *Var. fluitans* (*P. fluitans* Roth.) bis in die höhere Region, z. B. Scheideck, Gemmi (Brown).

- gramineus* L. In Gräben an der Eisenbahn zwischen Därligen und Interlaken! Weissensee am Ballenberg bei Brienz!
- *lucens* L. Im Thunersee bei Spiez! In der Aar bei Scherzligen! und oberhalb Interlaken!
- * *perfoliatus* L. Häufig in der Aar bei Thun und Interlaken! Im Thunersee bei Leissigen! Därligen! Neuhaus! u. a. O.
- * *pusillus* L. In Gräben und Teichen stellenweise häufig, z. B. bei Interlaken! Brienz! Weissensee am Ballenberg!
- *pectinatus* L. In der Aar bei Thun (Fischer-Ooster) und bei Interlaken an mehreren Stellen häufig! Auch in der mittleren und höheren Region: Im Lauenensee 1379^m (Moritz nach Rhiner), Stockensee (Prof. Brunner), Sägisthalsee am Faulhorn 1938^m (de Bary).
- marinus* L. Zwischen Thun und Scherzligen (Fischer-Ooster). In stehendem Wasser an der Aar unterhalb Golzwyl bei Interlaken! — Eine seltene, in einigen Alpenseen, und häufiger in Norddeutschland vorkommende Art.
- * *densus* L. In Sumpfgräben und langsam fliessenden Bächen hin und wieder. Thun! Interlaken! u. a. O.

Anmerkung. *P. praelongus* Wulf., nach Brown in der Aar bei Thun, wurde daselbst in neuerer Zeit nicht mehr gefunden. — *P. crispus* L. bei Amsoldingen (Brown), dürfte sich im Gebiete noch finden.

88. Lemnaceen.

Lemna. Wasserlinse.

- * *minor* L. In Gräben und Teichen, selten. Reutigenmoos! Moosrain bei Ringgenberg!

Anmerkung. *L. gibba* L. unweit der nördl. Gebietsgrenze bei Schwarzeneck (Brown).

89. Typhaceen.

Typha. Rohrkolben.

- * *latifolia* L. An der Aar unterhalb Golzwyl bei Interlaken!
- *angustifolia* L. Mit der vorigen.

- *Shuttleworthii* Koch et Sonder. In Gräben auf dem Reutigenmoos! — Unterhalb Thun stellenweise längs der Aar.
- *minima* Hoppe. Am Thunersee unweit der Kander-
mündung (Brown), Unterheid zwischen Brienz und Meiringen (Hügli).

Sparganium. Igelkolben.

- * *ramosum* Huds. In Gräben und Bächen stellenweise häufig, z. B. im Glütschbach bei Reutigen! Mühlener im Kanderthal! Faulensee bei Ringgenberg! Zwischen Brienz und Meiringen! u. a. O.
- *minimum* Fr. (*S. natans* auct. non L.) In Gräben an der Eisenbahn zwischen Därligen und Interlaken! — Die schwimmende Form in Teichen der mittleren und höheren Region: Im Spitalboden auf der Grimsel! Räterichsboden zwischen Grimsel und Handeck (Brown)! Gr. Scheideck (Christener, Fankhauser), Wengernalp (Fischer-Ooster).

Anmerkung. Das ächte *S. natans* L. scheint der Schweiz zu fehlen. *S. simplex* Huds. unweit der nördl. Gebietsgrenze »im Kandergrien« bei Thun (Brown).

90. Aroideen.

Arum. Aron.

- * *maculatum* L. In Hecken und Gebüsch der unteren Region, stellenweise häufig, z. B. Thun! Hilterfingen! Merligen! Wimmis! Spiez! Interlaken! Meiringen (Brunner).

91. Orchideen.

Orchis. Ragwurz.

- *militaris* L. In lichten Wäldern und Gebüsch hin und wieder. Oberhofen (Brown). Häufig zwischen Gunten und Merligen! An der Kander-
mündung! u. a. O.
- *ustulata* L. Auf nassen Wiesen und Weiden der Ebene hin und wieder, z. B. Neuhaus! Lauterbrunnenthal! Meiringen (Brunner). Häufiger auf Weiden der Alpen und Voralpen.
- globosa* L. Auf Weiden der mittleren und höheren Region, hin und wieder, z. B. Ralligstöcke (Brown), Brienergräte

(Imobersteg). Oberhalb Rosenlauri (Brunner). Schynige Platte 2000^m! Lauterbrunnenthal ob Wengen! Hahnenmöser zwischen Adelboden und Lenk! An der Stockhornkette an mehreren Stellen: Bruchberg und Fluhalp bei Boltigen (Maurer). Am oberen Thalberg (Trachsel) und am Morgetengrat gegen Bürglen (Vulpinus). Schwefelberg bei 1400^m (Hügli).

•• *Morio* L. Auf mageren Wiesen und Weiden hin und wieder. Oberhofen (Fischer-Ooster), Meiringen (Brunner), Obersimmenthal (Maurer).

pallens L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen, selten. Ralligstöcke! Alpen von Grindelwald (Gaud. Fl. helv.); am unteren Thalberg (Trachsel).

* *mascula* L. An Waldrändern und auf feuchten Weiden der Ebene und Voralpen häufig. — Gürmschbühl bei Wengernalp, 1800^m!

sambucina L. Bäderalp bei Boltigen (Maurer). — Eine Pflanze der südlichen und westlichen Schweiz.

* *maculata* L. An grasigen Stellen der Wälder, von der Ebene bis in die Voralpen häufig. — Wengen bei 1400^m!

* *latifolia* L. Auf Sumpfwiesen hin und wieder. Meiringen (Brunner), Bruchberg bei Boltigen (Maurer).

•• *incarnata* L. (*O. angustifolia* Wimm. et Grab.) Auf Sumpfwiesen am Thunersee bei Spiez! Därligen (Hügli).

Anacamptis.

pyramidalis Rich. Auf trockenen Wiesen und Weiden der Voralpen, selten. Ob Eisenfluh! Meiringen (Brunner). — Häufig im Jura.

Gymnadenia. Nacktdrüse.

•• *conopea* R. Brw. Auf feuchten Weiden und an grasigen Stellen der Wälder, von der Ebene bis in die Voralpen häufig.

odoratissima Rich. Auf feuchten Weiden von der unteren bis in die höhere Region hin und wieder. Oberhalb Sigriswyl (Fischer-Ooster), Rosenlaurithal (Brunner), Grindelwald. Häufig bei Kandersteg! Wahlalp am Stockhorn (Guthnick).

albida Rich. (*Cœloglossum* Hartm.) Auf Alpenweiden häufig, selten bis in die untere Region, z. B. zwischen Heiligenschwendi und Hüniboden ob Thun (Brown). — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel.

Cœloglossum. Hohlzunge.

- *viride* Hartm. Auf Weiden der Alpen und Voralpen häufig; selten in der unteren Region, z. B. auf Weiden zwischen Niesen und Burgfluh bei c. 800^m! — Auch im Hügelland an vereinzelt Stellen, z. B. Bütscheleck.

Platanthera. Brechkölbchen.

- * *bifolia* Rich. In Wäldern der Ebene und Voralpen gemein. — Wengen bei 1400^m! Unterhalb Mettlenalp bei 1600^m (Rothenbach).
- *chlorantha* Cust. (*P. montana* Rehb.) In Wäldern hin und wieder. Oberhofen. Häufig zwischen Neuhaus und Waldeck (bei Beatenberg)!

Nigritella.

angustifolia Rich. (*Orchis nigra* Scop.) Bränderli. Auf Alpenweiden stellenweise sehr häufig; im Gneissgebiet seltener, z. B. am Unteraargletscher (Girard nach Desor.) — Hin und wieder bis in die mittlere Region herab, Wengwald bei Wengen auf einer bewaldeten Geröllhalde, 1300^m! — Eine isolirte Colonie dieser Pflanze hatte sich früher auf Weiden bei Uetendorf unterhalb Thun angesiedelt (Fischer-Ooster, Mitth. der naturf. Ges. 1848 p. 117). — *Var. rosea* (mit hellrothen Blüten, grünlichen Deckblättchen und blassem, sehr kleinem Sporn) vereinzelt zwischen der gewöhnlichen Form, z. B. Mettlenalp bei Wengen 1700^m!

Anmerkung. *Nigritella angustifolia* × *Gymnadenia odoratissima* (*N. suaveolens* Koch) selten und vereinzelt. Oberhalb Rosenloui (Brunner).

Ophrys.

- *muscifera* Huds. Auf Waldwiesen, in Gebüsch der Ebene und Vorberge, ziemlich selten: Grätisberg bei Thun und zwischen Thun und Hilterfingen (Brown). Bei der Kander-

mündung! Am Eingang des Simmenthals bei Wimmis (v. Rütte). Zwischen Gunten und Merligen! Oberhalb Leissigen! Wagnerenschlucht bei Interlaken (Hügli), Schiltwald ob Lauterbrunnen, c. 1300^m! Meiringen (Brunner). — Kalberhöni und Vanel bei Saanen (v. Rütte).

aranifera Huds. Auf Weideplätzen, selten. Meiringen (Brunner). — Unweit der nördl. Gebietsgrenze auf der Thunallmend.

•• *arachniles* Reichard. (*O. fuciflora* Rb. fil.) Auf Sumpfwiesen und mageren Grasplätzen selten: Hilterfingen (Brown), Gunten! Feuchte Wiesen in der Nähe der Kanderamündung! Zwischen Neuhaus und dem Fuss des Beatenberges stellenweise ziemlich häufig! Ringgenberg!

•• *apifera* Huds. Wie vorige, z. Thl. an denselben Standorten. Zwischen Oberhofen und Neuhaus stellenweise häufig!

Chamaeorchis.

alpina Rich. Auf Weiden der höheren Region ziemlich selten: Wildgerst (Brunner), Faulhorn über der Bettenalp (Brown) und auf der Bachalp (Fischer-Ooster), Laucherfluh am Eigerletscher (Rothenbach), Gemmi am Daubensee (Brown), Gifferhorn bei Saanen (v. Rütte), Oldenhorn (Leresche). Gipfel des Bürglen und am oberen Nünenen (Trachsel), Stockhorn, Wahlalpgrat (Fischer-Ooster).

Aceras.

•• *anthropophora* R. Brw. Auf mageren Wiesen und Grasplätzen der Wälder, selten: Auf den Hügeln oberhalb Hilterfingen und Oberhofen (Brown). Sigriswyl. — Ziemlich häufig am Jura.

Herminium.

•• *Monorchis* R. Brw. Auf feuchten Weiden der unteren und mittleren Region stellenweise häufig, z. B. Oberhofen, Sigriswyl, Neuhaus! Meiringen (Brunner), Lauterbrunnenthal häufig zwischen Wilderswyl und Zweilütschinen! Wengen bei 1400^m! Trachsellauenen! Kienthal! Kandergrund! Saanen (v. Rütte) u. a. O.

Epipogon.

- *aphyllus* Sw. (*E. Gmelini* Rich.) In feuchten Wäldern auf moderndem Laub oder Holz, selten: Im Buchenwald oberhalb Gsteig am Weg nach der Schynigen Platte! Oberhalb Iseltwald! Giessbach (Fischer-Ooster), Wald unterhalb Eisenfluh (Rothenbach). Am Seflütschinenfall (Fischer-Ooster). Im Tannenwald unterhalb Gasteren! — Am nördlichen Fuss der Stockhornkette (Trachsel).

Cephalanthera.

- *pallens* Rich. (*C. grandiflora* Babington). In Wäldern und Gebüschchen der unteren Region hin und wieder.
- *ensifolia* Rich. (*C. Xyphophyllum* Rehb. fil.) Ebenso: Balmholz am Thunersee! Im Wald bei der Kandermündung! u. a. O.
- *rubra* Rich. In Wäldern und Gebüschchen stellenweise häufig, z. B. Thun (Brown), Wagnerenschlucht bei Interlaken (Hügli), Brienz! Meiringen, bis auf den Brünig (Brunner), Wengen ob Lauterbrunnen 1300^m! Simmenthal am Weg nach der Wallopalp bei c. 1400^m! u. a. O.

Epipactis. Sumpfwurz.

- * *latifolia* All. (*E. latifolia* var. *pallens* Gaud.) In Wäldern der unteren Region hin und wieder. — Beatenberg bei 1200^m! Wengen 1300^m!
- *rubiginosa* Koch. (*E. atrorubens* Schult.) Wie vorige. Häufig zwischen Merligen und Neuhaus! Wengen bei 1300^m! u. a. O.
- * *palustris* Crantz. Auf Sumpfwiesen von der Ebene bis in die mittlere Region, stellenweise sehr häufig, z. B. zwischen der Kandermündung und Einigen (Brown). Am oberen Ende des Thunersees bei Neuhaus und Weissenau! An der Aar oberhalb Interlaken! Zwischen Brienz und Meiringen! — Wengen ob Lauterbrunnen bei c. 1400^m!

Listera.

- * *ovata* R. Brw. Auf schattigen Grasplätzen, in Gebüschchen der unteren und mittleren Region häufig. — Wengen bei

1400^m! Am Oeschenensee bei c. 1600^m (Hügli), Engstligenalp bei c. 1800^m (v. Rütte).

cordata R. Brw. In dunkeln, moosigen Tannenwäldern der unteren und mittleren Region, stellenweise häufig: Nordseite der Blume! Sauseneck oberhalb Sigriswyl (Brown), Waldeck bei Beatenberg! Gadmen am Weg nach der Steinalp! Oberhasli unterhalb der Handeck (Bamberger), Rosenlauthal! Faulhorn unterhalb Bettenalp (Fischer-Ooster). Wälder unterhalb der Wengernalp! Mürren bei der Säge am Weg nach Lauterbrunnen! Sefinenthal (Fischer-Ooster), Trachsellauenen! Im kleinen Kienthal! Hintergrund des Lauenenthal (Leresche), Saanen unter den Dorfflühen! Schwefelberg (Rothenbach). — Jenseits der nördl. Gebietsgrenze noch am Gurnigel.

Neottia. Nestwurz.

- *Nidus avis* Rich. In dunkeln Tannenwäldern hin und wieder. Grüsisberg bei Thun (Brown), Wälder oberhalb Neuhaus! Stoffelberg ob Leissigen! u. a. O.

Goodyera.

- *repens* R. Brw. In trockenen Tannenwäldern der unteren und mittleren Region hin und wieder. Grüsisberg bei Thun (Brown). Wald bei Heiligenschwendi! Balmholz, besonders in der Nähe der Beatenhöhle! Interlaken (Fischer-Ooster), Rosenlauthal (Brunner), Wengen! Sefinenthal (Fischer-Ooster), Adelboden gegen Engstligen bei c. 1500^m (v. Rütte), Saanen unter den Dorfflühen (v. Rütte), Oberried im Obersimmenthal (Fischer-Ooster).

Spiranthes. Drehblume.

- æstivalis* Rich. Auf Sumpfwiesen, sehr selten: Neuhaus (Fischer-Ooster). Zwischen Brienz und Meiringen (Brown).
- *autumnalis* Rich. Auf Weiden und Grasplätzen der unteren Region hin und wieder: Am Hünibach und auf der Oberhofenallmend (Brown). Oberhalb Hilterfingen (Vulpinus), Neuhaus (Guthnick). Unterhalb Waldeck bei c. 1000^m! Wilderswyl gegen Unspunnen! Ringgenberg! Meiringen (Brunner).

Corallorrhiza. Korallenwurz.

- *innata* R. Brw. In Tannenwäldern der unteren und mittleren Region ziemlich selten. Häufig in einem Walde zwischen der Sauseneck und dem Hohgant (Brown). Am Fuss der Ralligstöcke oberhalb Sigriswyl (Fischer-Ooster), Beatenberg in der Schlucht oberhalb der Brücke! Giessbach am Weg zum Faulhorn (Muret), Rosenlauithal! Mettlenalp unterhalb Wengernalp bei 1700^m! Trachsellaunen! Gasteren! Turbachthal bei Saanen (v. Rütte), Schwefelberg (Hügli).

Malaxis.

- monophylla* Sw. Auf schattigen und etwas feuchten Grasplätzen der unteren und mittleren Region, selten: Zwischen Innerkirchen und Guttannen (Schærer). Am Ausgang des Rosenlauithales unweit des Zwirggi! Giessbach am Weg nach dem Faulhorn (Guthnick), Schiltwald bei Wengen, c. 1400^m! Lauterbrunnenthal in der Nähe des Staubbachs (Brown), Trachsellaunen! Gasterenthal (Gaud. Fl. helv. Vol. VII.)

Cypripedium. Frauenschuh.

- *Calceolus* L. In Wäldern und Gebüschern der unteren Region, selten: Wälder oberhalb Thun und Oberhofen (Brown), Wengen bei 1200^m! Rosenlauri und auf Zaun bei Meiringen (Brunner).

Anmerkung. *Sturmia Læselii* Rb., früher zwischen Därligen und Unterseen unweit Weissenau gefunden (Fischer-Ooster), scheint daselbst nicht mehr vorzukommen.

92. Irideen.

Crocus. Safran.

- *vernus* All. Auf feuchten Wiesen und Weiden vom Fuss der Berge bis in die obere Region stellenweise sehr häufig, z. B. Bächimatt bei Thun! Sigriswyl! Justisthal (Vulpius). Wimmis! Längs des Thunersees von der Kanderemündung bis Därligen an verschiedenen Stellen häufig! Am Rugen gegen Unspunnen! — Von Meiringen durch das Rosenlauri-

thal bis zur Scheideck (Brunner), Wengernalp (Rothenbach), Lauberhorn! Mürren (Vulpus). Häufig auf den Saanenmösern! An der Stockhornkette am Thalberg (Trachsel) und bis auf Nünenen (Brügger), Stockhorn (Brown) u. a. O. — Var. mit weissen und violetten Blüten.

Iris. Schwertlilie.

* *Pseudacorus* L. An Teichen und Ufern, in Gräben, hin und wieder. Bei der Kanderemündung! Neuhaus! u. a. O.

Anmerkung. *I. germanica* L. häufig als Zierpflanze cultivirt, verwildert im Ried bei Thun und in Weinbergen bei Spiez!

93. Amaryllideen.

Narcissus. Narzisse.

•• *poëticus* L. *Sternblume*. In Gärten häufig cultivirt und in der Nähe der Häuser hin und wieder verwildert. — *Var. decolorans Grenier (N. radiiflorus Salisb.)* auf Wiesen und Weiden des westlichen Gebiets hin und wieder. Weissenbach bei Boltigen (Maurer), Zweisimmen (Gempeler), Saanen (v. Rütte). — Häufig in den Waadtländeralpen.

* *Pseudonarcissus* L. Auf Wiesen, unter Obstbäumen, hin und wieder. Auf den Anhöhen bei Thun (Brown), Goldiwyl! Merligen! Sehr häufig bei der Kirche von Einigen! Obersimmenthal bis in die mittlere Region (Maurer). Saanen (v. Rütte).

Leucojum. Knotenblume.

* *vernum* L. *Grosses Schnee- oder Märzglöckchen*. Auf Grasplätzen, in der Nähe der Häuser hin und wieder: Einigen! Bei Wimmis stellenweise sehr häufig! Obersimmenthal (Maurer). Am Hundsrück zwischen Zweisimmen und Abläntschen (Maurer). Saanen (v. Rütte). — Nachtstallboden unweit Merligen! Meiringen (Brunner).

Galanthus. Schneeglöckchen.

* *nivalis* L. *Schnee- oder Märzglöckchen*. Wie vorige, jedoch seltener, z. B. Hilterfingen! Spiez! Obersimmenthal (Maurer).

94. Asparageen.

Streptopus. Knotenfuss.

amplexifolius D.C. An felsigen Orten der Voralpenwälder, selten: Auf Gneiss bei Rohrmatten im Urbachthal! und unterhalb Trachsellauen! — Rosenlauithal (Brunner). — In einigen Wäldern der Stockhornkette (Brown, Guthnick). — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel (Trachsel).

Paris. Einbeere.

* *quadrifolia* L. In Wäldern und Gebüschern der unteren und mittleren Region häufig. — Steineckwald bei Wengernalp, 1770^m (Rothenbach).

Polygonatum.

- *verticillatum* All. (*Convallaria* L.) In Wäldern und Gebüschern der unteren und mittleren Region, stellenweise häufig, z. B. Därligen! Beatenberg! Rosenlauithal (Brunner), Schiltwald ob Lauterbrunnen bei c. 1350^m! — Ganterischalp (Maurer) u. a. O. — Jenseits der nördlichen Gebietsgrenze noch am Gurnigel und »im Kandergrien« bei Thun.
- *officinale* All. (*Convallaria Polygonatum* L.) Wie vorige und bis in die höhere Region aufsteigend, z. B. Grüsisberg bei Thun (Fischer-Ooster), Stockenthal (Brown), Kander-
mündung! Simmenthal! Kanderthal! Lauterbrunnenthal! Meiringen (Brunner) u. a. O. — Schynige Platte, am Weg nach dem Faulhorn bei c. 2000^m!
- * *multiflorum* All. (*Convallaria* L.) In Hecken und Gebüschern der unteren Region.

Convallaria. Maiblume.

* *majalis* L. *Maiglöckchen*. In Gebüschern, an Waldrändern hin und wieder; von der Ebene bis in die mittlere Region. Grüsisberg (Brown), Merligen! Interlaken! Meiringen und Rosenlauri (Brunner), Trümmletenthal bei c. 1650^m (Rothenbach), Obersimmenthal (Maurer).

Majanthemum. Schattenblume.

* *bifolium* D.C. (*Smilacina* Desf.) In Wäldern der unteren und mittleren Region gemein. — Am Oeschenensee bei c. 1600^m!

95. Dioscoreen.

Tamus. Schmeerwurz.

•• *communis* L. In Gebüschern, an Waldrändern der unteren Region hin und wieder, z. B. zwischen Reutigen und Wimmis! Spiez! Zwischen Oberhofen und Neuhaus an mehreren Stellen! Unspunnen! Ringgenberg! u. a. O.

96. Liliaceen.

Lilium. Lilie.

bulbiferum L. An felsigen Orten, selten: Brünig (Brunner), Zaun bei Meiringen! Kiley (Brown).

Anmerkung. In neueren Floren wird unterschieden: *L. bulbiferum* L. und *L. croceum* (Chaix). Die Pflanze von Zaun (wahrscheinlich auch die der andern Standorte) gehört zu letzterer.

Martagon L. *Türkenbund.* In Wäldern und Gebüschern der unteren und mittleren Region ziemlich verbreitet und stellenweise häufig; seltener im unteren Theil der höheren Region: Ralligstöcke (Brown). In Gebüschern an der Kanderermündung! Stoffelberg bei Därligen! Meiringen (Brunner), Susten, Kalli am unteren Grindelwaldgletscher (Fischer-Ooster), Wengernalp am Eigergletscher 1920^m (Rothenbach). Kniegraben bei Wengen! Iseltenalp oberhalb Gündlischwand! Ammernten im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Kienthal bei Tschingel! Kanderthal, häufig in der Nähe der Felsenburg! An der Stockhornkette an mehreren Stellen: Reidenbach (Maurer), Wallopalp häufig bei c. 1700^m! Am untersten Thalberg (Trachsel), Krümmelwege ob Blumenstein! Günsenen (Vulpus).

Lloydia.

serotina Salisb. An felsigen Orten der höheren Region, besonders an freistehenden Gipfeln und Kämmen, stellenweise häufig; auf verschiedenem Gestein. Sigriswyler Rothhorn (Fischer-Ooster), Niederhorn bei Beatenberg! Hohgant (Imobersteg), Briener Rothhorn! Hohstollen am Hasliberg (Hügli), Furtwangpass zwischen der Trift und Guttannen! Faulhorn! Lauberhorn! Suleck! Gemmi (Brown), Rawyl (Leresche), Niesen (Brown), Nünenen (Trachsel), Ganterisch (Maurer), Stockhorn! Sohlhorn (Vulpus), u. a. O.

Anthericum. Graslilie.

- *Liliago L.* An steinigen Abhängen der unteren und mittleren Region hin und wieder. Justisthal (Brown), Rosenloui (Brunner), Lütschenthal (Brown), Schönbalm im Trümmletenthal (Rothenbach), Stockhornkette an der Wandeliflüh bei Schwarzenmatt (Maurer) und am Thalberg (Trachsel).
- *rumosum L.* An trockenen, steinigen Orten der unteren Region stellenweise häufig; auf verschiedenem Gestein. An sonnigen Abhängen des Aarthaales, von Thun bis Innerkirchen an manchen Stellen sehr häufig! oberhalb Sundlauenen bis c. 1050^m ansteigend! — Lütschenthal! Lauterbrunnenthal, bis Trachsellaunen! Schiltwald ob Lauterbrunnen bei c. 1200^m! Kanderthal! An der Simmenbrücke bei Wimmis!

Paradisia.

Liliastrum Bertol. (*Anthericum L.*) An felsigen Abhängen der Alpen und Voralpen stellenweise häufig: Justisthal (Brown), Breitenbodenalp bei Rosenloui (Brunner), Faulhorn über Grindelwald bei c. 1600^m (Brown), Iseltenalp unweit der Schynigen Platte! Suleck oberhalb Eisenflüh! Mürren. Ammertent im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Rothenbach), Lattreienalp (Vulpus). Am Gasterengletscher (Fischer-Ooster), Ueschenenthal (Vulpus), Niesen. Gandlauenen bei St. Stephan (Imobersteg), Wallopalp bei Boltigen (Leresche), Stockhorn (Guthnick).

Ornithogalum. Milchstern.

- * *umbellatum* L. Auf Wiesen der unteren Region hin und wieder, z. B. Reutigen! Merligen!
- *nutans* L. Wie vorige. Thun (Brown), Meiringen (Brunner).
Anmerkung. *O. pyrenaicum* L. Einmal am Grüsisberg gefunden (Trog, Guthnick).

Gagea. Gelbstern.

- Liottardi* Schult. Auf feuchten Weiden der Alpen und Vor-alpen, besonders an gedüngten Stellen in der Nähe der Sennhütten stellenweise häufig, z. B. Kühmattenalp oberhalb Beatenberg! Rosenloui (Brunner). Zwischen der Gr. Scheideck und dem Faulhorn! Bachalp am Faulhorn! Biglenalp bei Wengernalp! Boganggenalp im Sefinenthal (Fischer-Ooster), Sulsalp an der Suleck! Gemmi (Brown, Vulpius), Niesen (Brown), Stockhornkette (Brügger).
- *lutea* Schult. Auf feuchten Wiesen hin und wieder. Justisthal in der Nähe der Sennhütten im Vorderstberg c. 1200^m! Spiez! Därliken! Ringgenberg (Fankhauser). Zwischen Meiringen und Rosenloui (Brunner). — Schwarzenmatt bei Boltigen (Maurer), Wimmis zwischen der Burgfluh und dem Niesen (Brown).

Allium. Lauch.

- Victorialis* L. An felsigen Abhängen der höheren Region, selten; auf verschiedenem Gestein. Brienzer Rothhorn (Haller, nach Wahlenberg und Gand. Fl. helv.), Schwarzhorn in Grindelwald (Brunner), Bachalp am Faulhorn (Christener), Zäsenberg und Kalli über dem unteren Grindelwaldgletscher (Fischer-Ooster). Im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Rothenbach). Am Kandergletscher in Gasteren (Vulpius). Stockhorn (Brown, Guthnick).
- *ursinum* L. *Bärenlauch, Ramseren.* In Hecken, Wäldern und Gebüsch der unteren Region stellenweise häufig, z. B. zwischen Reutigen und Wimmis am Fuss der Geröllhalden! Im Ghei bei Spiez! Därliken! Niederried! Brienz,

häufig im Tannenwald am Weg zur Planalp bis c. 1100^m!
u. a. O.

fallax Don. (*A. angulosum* Jacq.) An felsigen Orten der unteren Region hin und wieder; auf verschiedenem Gestein. Riedhubel bei Thun (Fischer-Ooster), Simmenfluh bei Wimmis (Bamberger), Hohbühl bei Interlaken (Fischer-Ooster), Ballenberg bei Brienz! Meiringen! Innerkirchen (auf Gneiss)! Gadmen! Wengen auf Eisensteingeröll!

sphaerocephalum L. An sonnigen Kalkfelsen der unteren Region selten: Zwischen Merligen und Neuhaus! Goldei bei Interlaken! Meiringen (Brunner).

•• *vineale* L. An trockenen Orten der unteren Region selten. Zwischen Thun und Merligen (Brown).

•• *oleraceum* L. Wie vorige. Oberhofen (Brown).

•• *carinatum* L. An Hecken und Wegen der unteren Region ziemlich häufig. Thun, Spiez! Aeschi! Zwischen Neuhaus und Sundlauenen! Ringgenberg! Brienz! Lütschenthal! u. a. O.

Schoenoprasum L. *Var. alpinum* L. An feuchten Stellen der höheren Region, stellenweise häufig, z. B. Engstlenalp (Fischer-Ooster), Gadmen, Urnenalp im Urbachthal! Zwischen Rosenlauri und Faulhorn (Brunner), Rothstock am Eiger (Rothenbach), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Oberes Suldthal (Vulpis), Hohkien! Hahnenmöser zwischen Adelboden und Lenk! Sanetsch (Brown), Kiley an der Niesenkette (Brown), Stockhorn, am Kessel u. a. O. (Trachsel). — Selten tiefer herabsteigend, z. B. am Fuss der Bäderfluh bei Boltigen (Maurer); nach Brown auch an der Kanderemündung gefunden.

Hemerocallis. Taglilie.

•• *fulva* L. Am Bach oberhalb Hilterfingen (Fischer-Ooster), Gunten! — Kommt auch im nördlich angrenzenden Hügel-land an vereinzelt Standorten vor.

Muscari. Bisamhyacinthe.

•• *racemosum* D. C. Auf Wiesen, an Wegen der unteren Region hin und wieder. Häufig im Eichbühl bei Thun (Brown),

Oberhofen! Merligen! Meiringen (Brunner). — Obersimmenthal (Maurer).

- *botryoides* D. C. Wie vorige. Oberhofen! Ralligen! Spiez (Gosset). — Reidenbach im Obersimmenthal (Maurer).

Anmerkung. *Tulipa silvestris* L. wurde auf einer Wiese bei Thun (wahrscheinlich verwildert) gefunden (Vulpius).

97. Colchicaceen.

Colchicum. Zeitlose.

- * *autumnale* L. *Herbstzeitlose*. Auf feuchten Wiesen und Weiden häufig; von der Ebene bis in die Voralpen, z. B. Amnisbühl bei Beatenberg 1350^m! Brandeck oberhalb Lenk bei 1500^m!

Veratrum. Germer.

album L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen häufig; selten bis an den Fuss der Berge, z. B. zwischen Niesen und Burgfluh bei c. 800^m! — *Var. virescens* Gaud. (*V. Lobelianum* Bernh.) mit der typischen Form, häufig.

Tofieldia.

- * *calyculata* Wahl. Auf nassen Wiesen und Weiden von der Ebene bis in die höhere Region gemein. — *Var. glacialis* (*T. glacialis* Gaud.) auf Alpenweiden hin und wieder, z. B. am Rosenlauigletscher (Brunner), Faulhorn (Guthnick), Gemmi (Brown).

Anmerkung. *T. borealis* Wahl. in wenigen Exemplaren auf dem Susten, ausserhalb des Gebiets (Gisler nach Rhiner). Das Citat am Faulhorn (Heg. Fl. der Schw.) bezieht sich auf die vorige Spec. (var. *glacialis*).

98. Juncaceen.

Juncus. Binse. Simse.

Jacquini L. An felsigen Abhängen der höheren Region hin und wieder. Urnenalp im Urbachthal! Faulhorn (Brown), Suleck! Schiltalp bei Mürren (Fischer-Ooster), Gemmi (Brown).

* *conglomeratus* L. An Gräben und auf sumpfigen Stellen der Ebene und Voralpen häufig.

* *effusus* L. Wie vorige.

* *glaucus* Ehrh. Ebenso.

filiformis L. An feuchten Stellen der Alpen und Voralpen stellenweise häufig. Ralligstöcke (Fischer-Ooster). Häufig im Oberhasli von der Handeck bis auf die Grimsel! am Gelmersee bei 1829^m (Lindt). Faulhorn in der Nähe der Bachalp (Brown). Gürmschbühl bei Wengernalp! Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Leresche), Sanetsch (Brown). — Zwischen Gurnigel und Nünenen (Trachsel), Ganterischalp (Hügli).

triglumis L. Auf sumpfigen Weiden der Alpen und Voralpen hin und wieder, z. B. Urnenalp im Urbachthal! Rosenloui (Brunner), Faulhorn (Guthnick), Kl. Scheideck (Rhiner), Gürmschbühl bei Wengernalp 1700^m! Gemmi (Brown), Stierendungel bei Lauenen (v. Rütte). — Stockhornkette (Brown). — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch am Gurnigel (Trachsel).

trifidus L. An felsigen Abhängen der höheren Region, vorzugsweise auf Gneiss, Eisenstein, stellenweise häufig, z. B. Susten (Vulpus), Grimsel (Brown), Urbachthal! Wetterhorn am Gleckstein 2300^m (Lindt), Faulhorn (Guthnick), Kl. Scheideck! Männlichen und Steinberg (Rothenbach), Schiltalp bei Mürren! Hintergrund des Gasterenthals (Vulpus). — Fehlt dem Jura.

* *obtusiflorus* Ehrh. An sumpfigen Stellen, auf Torfmooren der unteren Region. Häufig auf dem Reutigenmoos!

* *silvaticus* Reich. (*J. acutiflorus* Reich.) An sumpfigen Stellen, an Ufern hin und wieder.

* *lamprocarpus* Ehrh. Wie vorige.

•• *alpinus* Vill. (*J. ustulatus* Hoppe.) An Ufern, auf sumpfigen Stellen der Weiden häufig; von der Ebene bis in die höhere Region.

* *compressus* Jacq. An feuchten Stellen, an Wegen und Gräben hin und wieder.

* *bufonius* L. Wie vorige.

Luzula. Hainsimse.

flavescens Gaud. Auf Weiden und in Wäldern der Voralpen hin und wieder. Gadmenthal, Faulhorn (Brown), Trümmletenthal (Rothenbach), Schwefelberg (Hügli) u. a. O.

* *pilosa* Willd. In Gebüsch, an Waldrändern häufig.

•• *maxima* D. C. (*L. silvatica* Gaud.) In lichten Wäldern und Gebüsch hin und wieder. Häufig zwischen Oberhofen und Gunten!

spadicea D. C. Auf Weiden der Alpen und Voralpen stellenweise häufig, z. B. Gemmenalpgrat (Vulpus), Engstlenalp (Fischer-Ooster). Im Aarthal oberhalb Handeck c. 1600^m! Grimsel (Brown), Faulhorn (Brunner), Oberhornalp im Lauterbrunnenthal (v. Rütte), Gemmi (Brown), Giffhorn bei Saanen! Kiley an der Niesenkette (Brown). — Dem Jura fehlend.

* *albida* D. C. (*angustifolia* Garcke.) In Wäldern und Gebüsch der unteren Region, häufig.

nivea D. C. In Wäldern und Gebüsch des Aarthales, an einzelnen Stellen häufig: Leerau am Thunersee (Apoth. Schnell). Am kleinen Rugen bei Interlaken! Meiringen (Brunner). Guttannen an mehreren Stellen!

lutea D. C. Auf Alpenweiden stellenweise häufig, vorzugsweise auf quarzhaltiger Unterlage, z. B. Furtwangpass zwischen der Trift und Guttannen! Grosse Scheideck! Faulhorn (Brunner), Lauberhorn! Boganggenalp im Sefinenthal (v. Rütte), Gasterenthal (Fischer-Ooster). — Dem Jura fehlend.

* *campestris* D. C. In Gebüsch, an Waldrändern, auf Weiden von der unteren bis in die höhere Region häufig. — *Var. multiflora* (*L. multiflora* Lej.) in Wäldern hin und wieder. — *Var. nigricans* (*L. nigricans* D. C. *L. sudetica* Heg.) auf Alpenweiden.

spicata D. C. Auf Alpenweiden hin und wieder, z. B. Bachalp am Faulhorn (Brown), Männlichen! Gemmi (Brown), Rawyl (Leresche), Bürglen (Guthnick), Stockhorn (Brown). — Im Jura selten.

99. Cyperaceen.

Cyperus. Cypergras.

- *flavescens* L. Auf sumpfigen Wiesen, an Wegen, stellenweise häufig. Unweit Goldiwyl! Stockenthal! Zwischen Spiez und Faulensee! Zwischen Interlaken und Bönigen! Faulensee bei Ringgenberg! Meiringen (Brunner), Winkel bei Innerkirchen!
- *fuscus* L. Wie vorige und zum Theil an denselben Standorten, doch im Ganzen seltener. Ringgenberg!
- longus* L. Am Ufer des Faulensees bei Ringgenberg! und an einem Teich zwischen Ringgenberg und Niederried! — Eine in der Schweiz seltene, an vereinzelt Standorten vorkommende Art.

Schoenus. Knopfgras.

- * *nigricans* L. Auf Sumpfwiesen, besonders auf Torf- und Tuffboden, stellenweise häufig, z. B. Reutigenmoos! Gunten! Faulenseemoos bei Spiez! Oberhalb Interlaken!
- *ferrugineus* L. Wie vorige. Reutigenmoos! Faulenseemoos! Interlaken!

Cladium. Sumpfgras.

- *Mariscus* R. Brw. An Gräben und Ufern selten: Reutigenmoos! Faulensee bei Ringgenberg!

Rhynchospora. Schnabelsame.

- *alba* Vahl. An sumpfigen Stellen auf dem Reutigenmoos stellenweise sehr häufig!

Heleocharis. Teichbinse.

- * *palustris* R. Brw. An Gräben und Ufern hin und wieder. — *Forma uniglumis* (H. *uniglumis* Schult. *Scirpus uniglumis* Link) Meiringen (Brunner).

- *acicularis* R. Brw. Auf feuchtem Sandboden, selten. Am Ufer des Thunersees zwischen Spiez und Faulensee (Brown).

Scirpus. Binse.

- cæspitosus* L. Auf sumpfigen Weiden und Mooren der Alpen und Voralpen häufig; stellenweise bis an den Fuss der Berge, z. B. Reutigenmoos!
- *pauciflorus* Lightf. (*S. Bæothryon* Ehrh.) An sumpfigen Stellen, an Ufern, selten. Rosenloui (Brunner).
- * *lacustris* L. An Ufern, in Teichen, hin und wieder. Häufig im Thunersee bei Spiez! Zwischen Neuhaus und Weissenau! u. a. O.
- *Tabernaemontani* Gmel. Pohlerenmoos im Stockenthal! Faulenseemoos bei Spiez!
- *Pollichii* Gren. et Godr. (*S. triqueter* Koch.) An der Aare bei Weissenau (Fischer-Ooster). — Bei Gwatt (Brown).
- * *silvaticus* L. An sumpfigen Stellen, Gräben und Ufern häufig; von der Ebene bis in die Voralpen. — Waldeckallmend bei Beatenberg bei 1340^m!
- * *compressus* Pers. Auf nassen Wiesen, an Wegen der Ebene und Voralpen häufig.

Anmerkung. Die Angabe von *S. supinus* L. und *S. setaceus* L. an der Stockhornkette (Brown) dürfte wohl auf einem Irrthum beruhen.

Eriophorum. Wollgras.

- alpinum* L. Auf Sumpfwiesen und Torfmooren von der unteren bis in die höhere Region hin und wieder, z. B. Reutigenmoos, c. 615^m! Stockhorn und Gemmi (Brown), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals, c. 2000^m (v. Rütte). — Im nördlich angrenzenden Gebiet noch in der Gegend von Amsoldingen und Schwarzeneck. — Häufig auf den Torfmooren des Jura.
- * *vaginatum* L. Auf Sümpfen und Torfmooren der Ebene und Voralpen häufig, z. B. Reutigenmoos! Waldeck bei Beatenberg, 1200^m!

Scheuchzeri Hoppe. (*E. capitatum Host.*) An sumpfigen Stellen der Alpen und Voralpen stellenweise häufig, z. B. Engstlenalp (Fischer-Ooster), Grimsel! Urnenalp im Urbachthal! Faulhorn (Muret), Wengernalp (Rothenbach), Suleck! Oberhorn im Hintergrund des Lauterbrunnenthals! Haslerberg bei Lenk (Fischer-Ooster), Kiley an der Niesenkette (Sterki). Am obersten Thalberg (Trachsel) u. a. O. — Fehlt dem Jura.

* *latifolium Hoppe.* Auf sumpfigen Wiesen und Weiden der Ebene und Voralpen gemein.

•• *angustifolium Roth* (*E. polystachyum L. p. part.*) An sumpfigen Stellen von der Ebene bis in die höhere Region, hin und wieder, z. B. Neuhaus (Fischer-Ooster), Rosenlauthal (Brunner), Urnenalp im Urbachthal! Sägisthal am Faulhorn (Hügli), Wengernalp (Rothenbach), Hahnenmöser zwischen Adelboden und Lenk (Hügli) u. a. O.

Anmerkung. Die Angabe von *E. gracile Koch* (*E. triquetrum Hoppe*) am Faulhorn (Heg. Fl. der Schw.) bedarf der Bestätigung. — Diese Art findet sich unweit der nördl. Gebietsgrenze bei Schwarzeneck (Brown).

Elyna.

spicata Schrad. Auf Weiden der höheren Region hin und wieder. Grimsel und Faulhorn (Brown), Stufensteinalp im Lauterbrunnenthal (v. Rütte), Lattreienalp (Vulpus). Am Kandergletscher im Gasterenthal (Dick, nach Gaud. Fl. helv.), Gemmi (Brown), Rawyl (Leresche), Niesen (Brown), Kaisereck (Chavin, Leresche), Bürglen und Ganterisch und auf dem Grat zwischen denselben häufig (Trachsel). Stockhorn (Fischer-Ooster).

Kobresia.

caricina Willd. Auf Weiden der höheren Region, selten: Am Aargletscher (Seringe nach Gaud. Fl. helv.), Bachalp am Faulhorn (Brown, Guthnick), Wengernalp am Eiger-gletscher (Rothenbach), Roththal an der Jungfrau (Fischer-

Ooster), Gemmi bei Wintereck und am südlichen Ende des Daubensees gegen den Lämmerengletscher (Brown).

Carex. Segge.

- *dioica* L. Auf Sumpfwiesen, selten. Reutigenmoos (Fischer-Ooster), Kandersteg (Leresche).
- * *Davalliana* Sm. Auf sumpfigen Wiesen und Weiden, an Bächen; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Wengernalp bei 1885^m! — *Var. androgyna* (*C. Sieberiana* Opiz) am Eigergletscher bei 2100^m (Rothenbach).
- *pulicaris* L. Auf Sumpfwiesen, selten: Faulenseemoos bei Spiez! Beatenberg (Christ), Meiringen (Brunner).
- rupestris* All. An felsigen Orten der Alpen, selten. Faulhorn (Hegetschw. Flora der Schweiz). An der Westseite des Bürglen (Guthnick).
- pauciflora* Lightf. Auf Torfmooren und feuchten Weiden, selten: Waldeck bei Beatenberg! Unterhalb Handeck (Bamberger), Grimsel (Schärer). — Zwischen Gurnigel und Nünenen (Trachsel).
- curvula* All. Auf Weiden und an steinigen Orten der höheren Region stellenweise häufig, z. B. Joch (Fischer-Ooster), Grimsel (Brown), Faulhorn (Guthnick), Schwalmeren (Fischer-Ooster), Oeschenenalp! Lötschpass! Gemmi am Daubensee (Brown).
- *disticha* Huds. (*C. intermedia* Good.) In Sümpfen und an Gräben der unteren Region, selten. Thun, Sigriswyl (Fischer-Ooster).
- foetida* All. An feuchten Stellen der höheren Region, stellenweise häufig. Grimsel! Urnenalp im Urbachthal! Breitenbodenalp bei Rosenlauri! Faulhorn (Muret), Sefinenfurke (v. Rütte), Gemmi (Brown), Männlifuh an der Niesenkette (Fischer-Ooster).
- Laggeri* Wimmer (*Flora 1854*). Grimsel in der Nähe des Spitals und häufiger am Todtensee auf der Passhöhe (Lagger, Guthnick). — Nach Vulpus = *foetida* × *lagopina*?

- microstyla* Gay. In der höheren Region, selten: Grimsel (Lagger), Breitenbodenalp bei Rosenlaur! Zwischen Faulhorn und Schwabhorn (Muret).
- * *vulpina* L. Auf Sumpfwiesen und Torfmooren hin und wieder.
- * *muricata* L. Auf Grasplätzen, an Wegen und Hecken der Ebene und Voralpen gemein. — In mehreren Varietäten.
- *teretiuseula* Good. Auf Torfmooren. Soll bei Rosenlaur vorkommen. — Die Verbreitung im Oberland ist noch zu untersuchen. — Unweit der nördlichen Gebietsgrenze bei Schwarzeneck und am Amsoldingensee (Brown).
- * *paniculata* L. An sumpfigen Stellen, in Gräben, von der Ebene bis über die Waldgrenze, hin und wieder. — Oberberg im Sefinenthal bei 2000^m!
- *brizoides* L. In lichten Wäldern, selten. Homberg bei Thun (Fischer-Ooster), Meiringen (Brunner).
- * *remota* L. An feuchten Stellen der Wälder hin und wieder.
- *stellulata* Good. (*C. echinata* Murr.) Auf Waldstümpfen und sumpfigen Weiden häufig; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Grimsel! Wengernalp! — *Var. grypus* (*C. grypus* Schkuhr.) an sumpfigen Stellen der Alpen hin und wieder. — Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals bei 2000^m (v. Rütte).
- * *leporina* L. Wie vorige. — Grimsel! Sefinenthal bei 2000^m!
- lagopina* Wahl. Auf Alpenweiden hin und wieder. Am Jochpass (Leresche), Grimsel! Faulhorn (Guthnick), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (v. Rütte), Kiley an der Niesenkette (Sterki).
- * *canescens* L. (*C. curta* Good.) Auf Sumpfwiesen und Torfmooren von der Ebene bis in die höhere Region hin und wieder, z. B. Oberhasli! Saanenmöser (Leresche). — *Var. Persoonii* (*C. Persoonii* Lang., *C. vililis* Fr.) — Auf Alpenweiden, z. B. Engstlenalp (Fischer-Ooster), Susten (Muret), Grimsel (Lagger), Faulhorn (Brown), Stockhornkette (Guthnick).

- * *stricta* Good. (*C. caespitosa* Gay, non L.) In Sümpfen, an Ufern gemein; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Wengernalp!
- * *vulgaris* Fr. (*C. caespitosa* Good.) Wie vorige. — Kl. Scheideck bei c. 2060^m!
- *acuta* L. An sumpfigen Stellen, selten. Balmholz am Thunersee (Brown).
- nigra* All. Auf Alpenweiden hin und wieder, z. B. Engstlenalp, Grimsel, Faulhorn (Brown), Schwabhorn (Guthnick), Ammerten im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Rothenbach), Boganggenalp im Sefinenthal! Engstligenalp (v. Rütte), Gemmi (Brown), Kiley an der Niesenkette (Brown), Giffhorn bei Saanen (v. Rütte). — Zwischen Bürglen und Ochsen (Guthnick).
- aterrima* Hoppe. Wie vorige, aber seltener, z. B. Grimsel (Bamberger), Faulhorn (Brunner), Zäsenberg am unteren Grindelwaldgletscher (Christener). Im Hintergrund des Gasterenthals (Vulpus).
- atrata* L. Auf Weiden und an felsigen Abhängen der höheren Region ziemlich häufig, z. B. Grimsel, Faulhorn (Brown), Wengernalp, Gemmi (Brown), Kiley an der Niesenkette (Sterki), Giffhorn bei Saanen (v. Rütte). Stockhornkette an mehreren Stellen: Bürglen (Vulpus), Nünenen (Trachsel), Stockhorn (Brown) u. a. O.
- irrigua* Sm. An feuchten Stellen der Alpen und Voralpen hin und wieder, z. B. im Aarthal oberhalb Handeck! Urnenalp im Urbachthal! Gr. Scheideck (Christener), Bachalp am Faulhorn (Brown), Oberhornalp im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Fischer-Ooster).
- *limosa* L. An sumpfigen Stellen, selten. Grimsel (Dr. Schmidt). — Im nördlich angrenzenden Hügelland am Amsoldingensee und bei Schwarzeneck (Brown).
- *pilulifera* L. In Wäldern hin und wieder. Bei Steffisburg (Guthnick).

- *tomentosa* L. In Wäldern, an Gräben, selten. Rossweid bei Thun (Brown) — ob auch im Gebiet?
- * *montana* L. In Gebüsch, an Hecken und Waldrändern der Ebene und Voralpen häufig.
- * *præcox* Jacq. (*C. verna* Vill.) Auf Weiden und trockenen Grasplätzen häufig; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Wahlalpgrat am Stockhorn (Fischer-Ooster).
- *humilis* Leysser. An sonnigen, felsigen Abhängen, in wärmeren Lagen der unteren Region: Grüsisberg bei Thun (Brown). An Kalkfelsen zwischen Merligen und Neuhaus stellenweise häufig! Meiringen (Brunner)! Simmenfluh bei Wimmis (Vulpius).
- gynobasis* Vill. (*C. Halleriana* Asso.) An sonnigen Abhängen in der Goldei bei Interlaken!
- * *digitata* L. In Wäldern der unteren und mittleren Region gemein. — Wengen bei 1400^m!
- * *ornithopoda* Willd. In Gebüsch, an Waldrändern, häufig. — *Var. alpina* Gaud. auf mageren Weiden der höheren Region hin und wieder, z. B. Niederhorn bei Beatenberg und zwischen Bürglen und Ganterisch (Guthnick).
- * *alba* Scop. In lichten Wäldern und Ufergebüsch, stellenweise häufig.
- * *panicæ* L. Auf Sumpfwiesen, an Gräben, häufig; von der Ebene bis in die obere Region.
- vaginata* Tausch. (*C. sparsiflora* Steudel.) Am Fuss des Schwabhorns (Faulhornkette) an wenigen Stellen und in geringer Zahl (Guthnick, Leresche, Muret). An der Stockhornkette zwischen Bürglen und Ochsen (Guthnick). — Eine der seltensten Arten, in Mitteleuropa nur an wenigen vereinzelt Standorten vorkommend.
- * *glauca* Scop. (*C. flacca* Schreb.) In feuchten Wäldern und Gebüsch, an Gräben und Bächen, gemein; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. am Eigergletscher bei 1980^m (Rothenbach).

- *maxima* Scop. (*C. pendula* Huds.) An sumpfigen Orten der Wälder, ziemlich selten. Grüsisberg bei Thun!
- * *pallescens* L. Auf schattigen Grasplätzen und feuchten Weiden häufig; von der Ebene bis in die höhere Region. — Grimsel und Wengernalp bei 1800^m!
- capillaris* L. An felsigen Orten der oberen Region stellenweise häufig, z. B. Niederhorn bei Beatenberg! Faulhorn! Steinberg im Lauterbrunnenthal (Brown), Gemmi (Brown), Niesen (Guthnick), Kaisereck (Leresche), Ganterisch (Trachsel), Stockhorn.
- ustulata* Wahl. Am Garzen bei Rosenloui (Brunner). Rawyl (Leresche, Muret). — Eine seltene, in der Schweiz nur an wenigen vereinzelt Standorten vorkommende Art.
- frigida* All. An nassen Stellen der Alpen und Voralpen hin und wieder, z. B. am Jochpass (Leresche), Handeck! Grimsel! Urnenalp im Urbachthal! Breitenbodenalp bei Rosenloui! Faulhorn (Brown). Kl. Scheideck, Gürmschbühl bei Wengernalp, 1700^m! Oeschenenalp! Niesen und Ganterisch (Brown) u. a. O.
- sempervirens* Vill. An felsigen Abhängen der Alpen und Voralpen häufig; stellenweise bis in die untere Region, z. B. Grindelwald (Leresche).
- firma* Host. An felsigen Orten der mittleren und höheren Region stellenweise häufig, z. B. Sigriswyler Rothhorn (Hügli), Niederhorn bei Beatenberg! Jochpass (Fischer-Ooster). Am Rosenlaugletscher (Brunner), Faulhorn (Brown, Guthnick). Schilthorn. Gasterenclus. Gemmi (Brown), Ganterisch (Trachsel), Stockhorn! u. a. O.
- ferruginea* Scop. Wie vorige. Rosenloui (Brunner), Gemmi (Brown), Niesen (Guthnick), Stockhornkette (Brown) u. a. O.
- tenuis* Host. An felsigen Abhängen der Alpen und Voralpen hin und wieder, z. B. Grindelwald (Christener), Ammertent im Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Brown), Oeschenenalp! Gemmi und Stockhorn (Brown). — Stellenweise bis in

die Ebene, z. B. im alten Kandergrien bei Thun (Fischer-Ooster). Dem nördlicheren Hügelland fehlend.

* *flava* L. Auf Sumpfwiesen, an Ufern und Gräben gemein; von der Ebene bis in die höhere Region. Hahnenmöser zwischen Adelboden und Lenk, 1800^m! — *Var. Oederi* (*C. Oederi* Ehrh.) auf feuchtem Sandboden hin und wieder, z. B. zwischen Neuhaus und Weissenau! Meiringen (Schærer).

* *Hornschuchiana* Hoppe. Auf Sumpfwiesen der Ebene und Voralpen. — Gürmschbühl bei Wengernalp (Rothenbach).

* *distans* L. Auf Sumpfwiesen hin und wieder. Thun, Oberhofen, Meiringen (Brunner) u. a. O.

* *silvatica* Huds. An sumpfigen Stellen der Wälder gemein. Beatenberg bei 1260^m!

Pseudocyperus L. Häufig in einem Graben am Faulensee bei Ringgenberg! — Eine in der Schweiz seltene, an vereinzelten Standorten vorkommende Pflanze.

* *ampullacea* Good. (*C. rostrata* With.) In Sumpfgräben, an Ufern häufig; von der Ebene bis in die höhere Region, z. B. Grimsel! Wengernalp! Sägisthalsee am Faulhorn, 1938^m (Hügli).

•• *vesicaria* L. In Sumpfgräben im Faulenseemoos bei Spiez!

* *paludosa* Good. In Gräben, an Ufern hin und wieder.

* *hirta* L. An feuchten, sandigen Orten, an Wegen, hin und wieder.

Anmerkung. Die Angabe von *C. incurva* Lightf. (*C. juncifolia* All.) in den Bergen des Simmenthals (Gaud. Fl. helv. Vol. VII.) bedarf der Bestätigung. — In der Nähe der nördlichen Gebietsgrenze: *C. chordorrhiza* Ehrh., auf dem Torfmoor von Schwarzeneck (Bamberger, Vulpius); *C. paradoxa* Willd. bei Uebischi und am Heimberg (Brown); *C. elongata* L. am Amsoldingensee und bei Schwarzeneck (Brown); *C. Heleonastes* Ehrh. Schwarzeneck (Brown) und auf dem Schmidtmoos bei Amsoldingen (Bamberger nach Rhiner); *C. Gaudiniana* Guthnick am Amsoldingensee (Guthnick), in neuerer

Zeit nicht mehr gefunden. *C. filiformis* L. am Amsoldingensee und bei Schwarzeneck (Brown). — *C. bicolor* All. in der Nähe der östlichen Gebietsgrenze in der Obwaldneralp Tannen (Rhiner) und an der Südseite der Grimsel (Guthnick).

100. Gramineen.

Zea. Mays.

- [*Mays* L. *Türkenkorn*, *Welschkorn*.] Im Thalgrund von Interlaken und Brienz häufig cultivirt.

Andropogon. Bartgras.

- *Ischæmum* L. An trockenen, sonnigen Abhängen von Thun bis Meiringen stellenweise häufig, z. B. Jakobshubel bei Thun. Hilterfingen (Brown), Goldei bei Interlaken! Unspunnen! Ringgenberg! Meiringen (Brunner).

Panicum. Fennich.

- * *sanguinale* L. (*Digitaria* Scop.) Auf Aeckern, an Mauern und Wegen, stellenweise häufig. Thun! Interlaken! u. a. O.
- ciliare* Retz. (*Digitaria* Kœl.) Auf Aeckern, selten. Im Ried bei Thun (Fischer-Ooster).
- *glabrum* Gaud. (*Digitaria filiformis* Kœl.) Wie vorige. Thun. Hilterfingen (Brown).
- * *Crus galli* L. (*Echinochloa* Beauv.) Auf cultivirtem Boden, an Mauern und in der Nähe der Häuser stellenweise häufig, z. B. Spiez! Interlaken! Innerkirchen! u. a. O.
- *verticillatum* L. (*Setaria* Beauv.) Auf cultivirtem Boden (Brown).
- * *viride* L. (*Setaria* Beauv.) Auf Aeckern.
- * *glaucum* L. (*Setaria* Beauv.) Wie vorige.

Phalaris. Glanzgras.

- * *arundinacea* L. An Ufern, in der unteren Region, hin und wieder.

Anthoxanthum. Ruchgras.

- * *odoratum* L. Auf Wiesen und Grasplätzen gemein; von der Ebene bis in die höhere Region.

Anmerkung. *Alopecurus geniculatus* L. jenseits der nördl. Gebietsgrenze bei Thierachern (Brown).

Phleum. Lieschgras.

Michelii All. Auf Weiden der Alpen und Voralpen ziemlich häufig. — Wengen bei 1400^m!

* *pratense* L. Auf Wiesen, an Wegen gemein. *Var. nodosum* Meiringen (Brunner).

alpinum L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen häufig. — *Var. commutatum* (*P. commutatum* Gaud.) Stockhorn (Fischer-Ooster).

Oryza. Reis.

•• *clandestina* A. Braun (*Leersia oryzoides* Sw.) In Sumpfgräben hin und wieder. Spiez (Gaud. Fl. helv.) Häufig in der Nähe des Faulensees bei Ringgenberg!

Agrostis. Windhalm.

* *alba* L. (*A. stolonifera* Koch). Auf feuchten Grasplätzen, an Wegen und Ufern häufig. — *Var. patula* Gaud. auf Alpenweiden. Stockhorn (Seringe), Gemmi (Brown).

* *vulgaris* With. Auf Grasplätzen, an Wegen der Ebene und Voralpen gemein.

•• *canina* L. An feuchten Stellen, an Wegen und Ufern, hin und wieder.

alpina Scop. (*A. rupestris* Gaud.) An felsigen Orten der höheren Region häufig.

rupestris All. (*A. alpina* Gaud.) Wie vorige.

Calamagrostis. Reithgras.

* *epigea* Roth. Auf feuchtem Sandboden, an Ufern hin und wieder. Häufig an der Kanderermündung (Brown).

Halleriana D.C. In Wäldern der Voralpen, selten. Susten (Muret). Im oberen Suldthal (Vulpius). Tschertschisthal bei Saanen (v. Rütte).

tenella Host. (*Agrostis pilosa* Gaud.) Am Aargletscher (Brown).

* *montana* Host. (*C. varia* Link.) In lichten Wäldern und Schluchten der unteren und mittleren Region häufig. —

Var. acutiflora (*C. acutiflora* D. C.) Gemmi auf Felstrümmern oberhalb Schwarrenbach (Brown).

- *arundinacea* Roth (*C. silvatica* D. C.) In Wäldern der Voralpen, selten. Grindelwald am Weg zum Faulhorn (Fischer-Ooster).

Millium. Hirsegras.

- * *effusum* L. In Wäldern hin und wieder. Zwischen Thun und Schwarzeneck (Brown). Saanen (Leresche).

Stipa. Pfriemengras.

- pennata* L. An sonnigen Kalkfelsen in der Nähe der Beatenhöhle (Vulpius).

Laslagrostis. Raubgras.

Calamagrostis Link. An Felsen und steinigen Orten der unteren Region stellenweise häufig, z. B. zwischen Merligen und Neuhaus! Am nördl. Ufer des Brienersees! Ballenberg bei Brienz! Lauterbrunnenthal! Kandersteg beim Fall des Ueschenebachs (Brown), Lauenenthal (v. Rütte). Häufig am Eingang des Simmenthals bei Wimmis! u. a. O.

Phragmites. Schilf.

- * *communis* Trinius. In der unteren Region, am Ufer der Seen und Flüsse stellenweise häufig.

Sesleria.

- *cærulea* Arduino. An felsigen Abhängen, von der Ebene bis in die höhere Region, auf verschiedenem Gestein, stellenweise häufig, z. B. in den Schluchten des Hüni- und Guntenbachs am Thunersee! Goldei bei Interlaken! — Gipfel des Männlichen bei 2345^m! u. s. w. — Häufig im alten Kandergrien bei Thun; an vereinzelt Stellen des nördlicheren Hügellandes; im Jura gemein.

disticha Pers. Susten auf der Passhöhe (Vulpius).

Koeleria.

- * *cristata* Pers. Auf Wiesen und Weiden häufig. — *Var. nana* Guthn. in der höheren Region. Bürglen (Guthnick).

Aira. Schmiele.

* *cæspitosa* L. (*Deschampsia Beauv.*) Auf feuchten Grasplätzen, in Gebüsch häufig. — *Var. alpina* (*A. alpina* Heg.) auf Alpenweiden hin und wieder. Grimsel! Faulhorn (Brunner), Hahnenmöser (Hügli) u. a. O.

flexuosa L. (*Deschampsia Trin.*) Auf trockenen Grasplätzen, an Waldrändern, von der unteren bis in die höhere Region stellenweise häufig; z. B. Heiligenschwendi und Sigriswyl (Brown), Beatenberg bei 1200^m! Sigriswylgrat (Brown). Guttannen- und Urbachthal! Faulhorn (Brown). Kl. Scheideck! Wengen bei c. 1300^m! Am Schmadribach (Leresche).

Holcus. Honiggras.

* *lanatus* L. Auf Wiesen und Grasplätzen gemein. — Beatenberg bei 1250^m!

•• *mollis* L. Auf Wiesen und Aeckern hin und wieder. Beatenberg im Getreide bei 1260^m! Meiringen (Brunner).

Arrhenatherum. Glatthafer.

* *elatius* Mert. et Koch. *Französisches Raygras.* Auf Wiesen und Grasplätzen der unteren Region. — Beatenberg bei 1200^m!

Avena. Hafer.

* [*sativa* L. *Rispenhafer.*] Häufig cultivirt; in günstigen Lagen bis in den oberen Theil der unteren Region, z. B. bei Beatenberg c. 1260^m; spärlich und vereinzelt noch im untersten Theil der mittleren Region, z. B. bei Adelboden (Matthys).

* [*orientalis* Schreb. *Fahnenhafer.*] Selten cultivirt. Simmenthal (Maurer).

* *pubescens* L. Auf Wiesen und Grasplätzen gemein; von der Ebene bis in die höhere Region. — Stockhorn bei 2100^m (Fischer-Ooster).

pratensis L. An trockenen Abhängen selten. Grüsisberg bei Thun (Fischer-Ooster).

versicolor Vill. (*A. Scheuchzeri* All.) An steinigen Orten der höheren Region hin und wieder. Urnenalp im Urbach-

thal! Faulhorn (Brown), Wetterhorn am Gleckstein, 2250—2300^m (Lindt), Wengernalp (Rothenbach). Gemmi und Niesen (Brown).

* *flavescens* L. (*Trisetum Beauv.*) Auf Wiesen, an Wegen der unteren Region ziemlich häufig.

distichophylla Vill. (*Trisetum Beauv.*) An steinigem Abhängen, im Geröll der höheren Region stellenweise häufig, z. B. Faulhorn (Brown). Im Hintergrund des Gasterenthals (Fischer-Ooster), Oeschenenalp! Gemmi (Brown), Oldenalp (Leresche), Stockhorn (Gaud. Fl. helv.)

subspicata Clairv. (*Trisetum Beauv.*) Auf Weiden der höheren Region, selten. Titlis (Stud. Engelmann), Faulhorn! Roththal an der Jungfrau und Männlifuh an der Niesenkette (Fischer-Ooster), Gemmi über Schwarrenbach (Brown), Giffhorn bei Saanen! In den N.-Polarländern bis zum 79°.

Anmerkung. *Avena hybrida* Peterm., im Getreide bei Stocken (Bamberger).

Triodia. Dreizahn.

•• *decumbens* Beauv. (*Danthonia D. C.*) Auf etwas feuchten Grasplätzen, in lichten Wäldern hin und wieder. Zwischen Thun und Hilterfingen (Brown), Beatenberg (Christ), Interlaken beim Jungfraublick!

Melica. Perlgras.

ciliata L. (*M. nebrodensis* Parlat.) An sonnigen Kalkfelsen stellenweise häufig. Zwischen Merligen und Neuhaus! Goldei bei Interlaken! Am nördl. Ufer des Brienersees! Ballenberg bei Brienz! Meiringen! Lauterbrunnenthal! — Schwarzenmatt bei Boltigen (Maurer). Felsen bei Weissenburgbad! Am Eingang des Simmenthals bei Wimmis (Brown). — Häufig im Jura.

* *nutans* L. In lichten Wäldern und Gebüsch der unteren Region ziemlich häufig.

•• *uniflora* Retz. Rosenlauithal (Brunner).

Briza. Zittergras.

* *media* L. Auf Wiesen und Grasplätzen gemein; von der Ebene bis über die Waldgrenze. — Engstligenalp bei circa 2000^m (v. Rütte).

Poa. Rispengras.

* *annua* L. Auf cultivirtem Boden, an Wegen und gedüngten Orten gemein! von der Ebene bis in die höhere Region. — *Var. varia* Gaud. (*P. supina* Schrad.). An feuchten Stellen der höheren Alpen.

laxa Hænke. Auf Weiden und an steinigen Orten der höheren Region hin und wieder. Grimsel und Faulhorn (Brown), Suleck (Vulpius), Gemmi (Brown), Stockhorn.

minor Gaud. Wie vorige. Engstlenalp (Fischer-Ooster), Wellhorn bei Rosenlauf, 3196^m (Fellenberg); Faulhorn (Brown, Muret), Gemsberg in Grindelwald (Christener), Suleck (Vulpius), Gimmelwäng am Brünlihorn bei Mürren und Oberhornalp im Lauterbrunnenthal (Fischer-Ooster), Gemmi (Gaud. Fl. helv.), Rawyl (Muret), Sanetsch (Leresche). Obere Wahlalp (Brügger).

* *bulbosa* L. Auf Grasplätzen, an Wegen hin und wieder. Die Form *vivipara* im Simmenthal (Maurer).

alpina L. Auf Weiden der Alpen und Voralpen gemein, besonders die Form *vivipara*. — Stellenweise bis in die untere Region, z. B. bei Wimmis, 690^m! — *Var. frigida* Gaud. auf den Moränen des Lämmerengletschers (Brown).

cæsia Sm. (*P. aspera* Gaud.) An steinigen Orten der höheren Region, selten. Gemmi (Gaud. Fl. helv.), Stockhornkette (Brown).

* *nemoralis* L. In Wäldern und an Mauern der Ebene und Voralpen gemein. — In mehreren, noch näher zu untersuchenden Varietäten. — *Var. glauca* Trachsellaunen (Fischer-Ooster). — *Var. montana* Engstlenalp, Faulhorn u. a. O.

sudetica Hænke. Zwischen Garzen und Wildgerst (Brunner nach Rhiner). Faulhorn (Brunner), Gemmi (Gaud. Fl. helv. Vol. VII).

* *trivialis* L. Auf feuchten Wiesen und Grasplätzen gemein.

* *pratensis* L. Auf Wiesen und Weiden der Ebene und Vor-
alpen gemein.

distichophylla Gaud. (*P. cenisia* Koch.) An steinigen Orten,
im Geröll der höheren Region, stellenweise häufig, z. B.
Schönengiebel an der Kette des Briener Rothorns (Christ.),
Oberhasli am Gelmersee (Lindt), Schwalmere (Bamberger),
Lattreienalp (Vulpius), Gemmi (Brown), Sanetsch (Gaud.
Fl. helv.), Oldenalp (Leresche), Ganterisch (Leresche, Vul-
pius). — Seltener in der unteren Region. — *Var. palles-*
cens (*P. Halleridis* Röm. et Schult.) Kohlerenschlucht
bei Thun (Fischer-Ooster)! Im Geröll des Alpbaches und
Mühlebaches bei Meiringen (Leresche), Rawyl (Muret), Stock-
horn (Seringe, Gaud. Fl. helv.)

* *compressa* L. An Wegen, Mauern hin und wieder. Thun.

Glyceria. Süßgras.

* *fluitans* R. Brw. In Bächen und Teichen häufig; von der
Ebene bis in die mittlere Region. Hilterfingen (Brown),
Sigriswyl, Faulenseemoos bei Spiez! Meiringen (Brunner),
Guttannen, 1050^m! Brandeck bei Lenk, 1500^m! — *Var.*
plicata (*G. plicata* Fr.) In Gräben bei Ringgenberg!
Genthal bei c. 1450^m (Fischer-Ooster).

Molinia.

* *cærulea* Mönch. In Wäldern, an Ufern, auf Torfmooren von
der Ebene bis in die Alpen häufig. — Wengernalp (Rothen-
bach).

Dactylis. Knäuelgras.

* *glomerata* L. Auf Wiesen und Grasplätzen der unteren Re-
gion gemein; seltener in der mittleren und höheren Region,
z. B. Mürren 1630^m! Nordabhang des Männlichen 1700^m!
Bürglen 2100 (Hügli).

Cynosurus. Kammgras.

* *cristatus* L. Auf Wiesen und Weiden der Ebene und Vor-
alpen gemein.

Festuca. Schwingel.

Halleri All. Auf Alpenweiden hin und wieder, z. B. Faulhorn (Brown), Schwalmeren (Bamberger), Gimmelwäng am Brünlihorn bei Mürren (Fischer-Ooster), Kiley an der Niesenkette und Gemmi (Brown). Am oberen Thalberg (Trachsel), Ganterischalp (Hügli), Stockhorn (Fischer-Ooster).

* *ovina* Koch. (*excl. var.*) Auf trockenen Gras- und Heideplätzen, an steinigen Orten gemein; von der Ebene bis in die höhere Region. — In mehreren auf ihre Verbreitung noch näher zu prüfenden Varietäten. — *Var. alpina* (*F. alpina* Sut.) auf Alpenweiden hin und wieder. Faulhorn (Guthnick), Steinberg im Lauterbrunnenthal (Brown), Gemmi (Brown), Rawyl (Leresche). — *Var. duriuscula* (*F. duriuscula* L.) auf trockenen Grasplätzen hin und wieder. — *Var. glauca* (*F. glauca* Schrad.) an trockenen, steinigen Orten, auf Sandboden hin und wieder. Wengen 1300^m! Niesen (Fischer-Ooster).

violacea Gaud. (*F. ovina var. violacea* Koch). Auf Alpenweiden hin und wieder, z. B. Oltscherenalp im Hasli! Faulhorn (Brunner), Schwalmeren (Fischer-Ooster), Niesen und Gemmi (Brown), Oldenalp (Leresche). Zwischen Bürglen und Ganterisch (Guthnick) u. a. O.

•• *heterophylla* Lam. In Wäldern hin und wieder. Bächihölzli bei Thun (Fischer-Ooster).

nigrescens Lam. (nach Koch Alpenform der vorigen Spec.) Auf Alpenweiden ziemlich häufig, z. B. Ralligstöcke, Engstlenalp, Stockhorn (Fischer-Ooster). Gemmi (Brown) u. a. O.

•• *rubra* L. Auf trockenen Wiesen und Weiden hin und wieder. Hintergrund des Lauterbrunnenthals (Fischer-Ooster).

varia Hænke. An felsigen Orten der höheren Region. Wengernalp (Guthnick).

pumila Vill. Auf Alpenweiden stellenweise häufig, z. B. Ralligstöcke (Fischer-Ooster), Oberhasli am Gelmersee (Lindt), Faulhorn (Guthnick), Niesen und Gemmi (Brown). An der

Stockhornkette an mehreren Orten: Kaisereck, Bürglen, Ganterisch, Stockhorn (Leresche).

silvatica Vill. In Wäldern selten. Merligen (Brown). Niederstocken (Bamberger).

Scheuchzeri Gaud. Auf Alpenweiden hin und wieder, z. B. Faulhorn, Südseite bei 1950^m (Brown). Am Fuss des Wetterhorns in Grindelwald (Christener), Gimmelwäng am Fuss des Brünlihorns bei Mürren (Fischer-Ooster), Lattreienalp (Vulpus), Niesen und Gemmi (Brown), Stockhorn (Seringe nach Gaud. Fl. helv.)

•• *gigantea* Vill. In Wäldern der unteren Region hin und wieder, z. B. Grüsisberg bei Thun (Guthnick), Därligen (Dietrich), Meiringen! Weissenbach im Obersimmenthal (Maurer).

* *arundinacea* Schreb. An sumpfigen Orten, an Ufern und Gräben hin und wieder, bis in die höhere Region aufsteigend, z. B. Oberbergalp im Sefinenthal bei c. 1900^m! — Hieher gehört auch *F. decolorans* Mert. et Koch, am Staubbachfall (Brown), am Alpbach und Mühlebach bei Meiringen (Leresche).

* *pratensis* Huds. (*F. elatior* L.) Auf feuchten Wiesen, an Bächen gemein.

Brachypodium. Zwenke.

* *silvaticum* Röm. et Schult. In Wäldern hin und wieder.

* *pinnatum* Beauv. Auf Wiesen, in Gebüsch der unteren und mittleren Region stellenweise häufig. — Am Nordabhang des Männlichen bis 1800^m!

Bromus. Tresse.

* *secalinus* L. Auf Aeckern, im Getreide hin und wieder. Därligen! Beatenberg! Gsteig bei Interlaken! — *Var. velutinus* (*B. velutinus* Schrad.) ebenso. Aeschi (Muret).

* *racemosus* L. Auf Wiesen, an Wegen hin und wieder.

* *mollis* L. Auf Wiesen und Grasplätzen häufig.

* *arvensis* L. Auf Aeckern selten (Brown).

- * *asper* Murr. In Wäldern und Gebüschten stellenweise häufig, z. B. Grüsisberg bei Thun und zwischen Reutigen und Wimmis (Brown), Spiez! Ringgenberg! Brienz! u. a. O.
- * *erectus* Huds. Auf Wiesen, an Wegen gemein.
- * *sterilis* L. An Wegen, auf Schutt in der Nähe der Häuser, hin und wieder.

tectorum L. An Mauern und steinigen Orten hin und wieder. Unter überhängenden Felsen über dem Oeschenensee am Weg nach der Oeschenenalp, mit *Sisymbrium Sophia* bei c. 1600^m! Reckholteri ob Weissenbach im Simmenthal (Maurer).

Anmerkung. *B. commutatus* Schrad. auf Aeckern, an Wegen vereinzelt und selten. Zwischen Gunten und Ralligen (Bamberger nach Rhiner). — *B. squarrosus* L. Grimsel (Seringe, nach Gaud. Fl. helv.), in neuerer Zeit nicht wieder gefunden.

Triticum. Weizen.

- * [*vulgare* Vill. Weizen.] In der unteren Region cultivirt; in günstigen Lagen stellenweise bis c. 1300^m, z. B. im Gadmenthal bis 1220^m und vereinzelt bis 1300^m (Rätzer), Wengen 1300^m! Beatenberg am Amnisbühl bis c. 1336^m!
- * *Spelta* L. Spelz, Dinkel, Korn. In wärmeren Lagen der unteren Region hin und wieder angebaut.
- * *repens* L. Quecken. In Hecken und Gebüschten der unteren Region.
- *caninum* Schreb. Wie vorige, jedoch seltener. Wimmis und Zweilütschinen (Brown). Oberhalb Iseltwald und bei Grindelwald (Guthnick), Wengen (Rothenbach), Weissenbach im Simmenthal (Maurer).

Secale. Roggen.

- * [*cereale* L.] In der unteren Region hin und wieder cultivirt. — Im Aarthal bis Guttannen, 1050^m! Gadmenthal bis 1220^m (Rätzer).

Elymus. Haargras.

- *europæus* L. In Wäldern der unteren Region ziemlich selten. Zwischen Schwendi und Ringoldswyl ob Hilterfingen (Brown). Därligen (Dietrich). Oberhalb Gsteig bei Interlaken! Brünig (Rhiner). Am Fuss der Stockhornkette oberhalb Blumenstein (Brown), Saanen (v. Rütte).

Hordeum. Gerste.

- * [*vulgare* L.] In der unteren Region häufig cultivirt. — Im Aarthal bis Guttannen 1050^m! Gadmenthal bis 1220^m (Rätzer). An vereinzelt günstigen Standorten noch im unteren Theil der mittleren Region, z. B. bei Beatenberg am Amnisbühl bis 1336^m! Wengen bis 1450^m! — *Var. hexastichum* (*H. hexastichum* L.) *sechszehilige Gerste*, seltener cultivirt. Oberhofen. Leissigen! Beatenberg bei 1000^m!
- * [*distichum* L. *Zweizeilige Gerste.*] In der unteren Region hin und wieder cultivirt. Aeschi, Gadmenthal bis 1220^m (Rätzer).
- * *murinum* L. An Mauern, auf Schutt in der Nähe der Häuser, hin und wieder. Thun! Spiez! u. s. w.

Lolium. Lolch.

- * *perenne* L. *Englisches Raygras.* Auf Wiesen und Grasplätzen häufig. Beatenberg bei 1200^m!
- * *italicum* A. Braun. *Italienisches Raygras.* Auf Wiesen und Grasplätzen der unteren Region hin und wieder.
- *temulentum* L. Auf Aeckern, im Getreide, ziemlich selten. Thun, Beatenberg bei 1260^m! Meiringen (Guthnick).

Nardus. Borstengras.

- *stricta* L. *Burst.* Auf mageren Weiden der Alpen und Voralpen gemein; auch auf Torfboden. — Stellenweise bis in die untere Region, z. B. Goldiwyl bei Thun (Fischer-Ooster), Hellweid bei Krattigen (Hügli), Waldeck bei Beatenberg!

Klasse II. Gymnospermen.

101. Coniferen.

a. Abietineen.

Abies. Tanne.

* *pectinata* D. C. (*Pinus Picea* L., *P. Abies Du Roi*, *Abies alba* Mill.) *Weisstanne*, *Edeltanne*. In der unteren Region, meist mit Rothtannen gemischte Waldungen bildend, in kleineren Gruppen oder vereinzelt; in günstigen Lagen bis in den unteren Theil der mittleren Region.

Picea. Fichte.

* *vulgaris* Link. (*Picea excelsa* Link in *Linnæa*, *Pinus Abies* L., *P. Picea Du Roi*, *Abies excelsa* D. C.) *Gemeine Fichte*, *Rothtanne*. In der unteren und mittleren Region ausgedehnte Waldungen bildend, welche nur ausnahmsweise die Höhe von 1800^m übersteigen, z. B. am Gürmschbühl bei Wengernalp, bis c. 1890^m! am Südabhang der Faulhornkette über Grindelwald in der Nähe des »Waldspitz« bis über 1900^m. — Vereinzelte Bäume und kleinere Gruppen mehr oder weniger verkümmerter Exemplare häufig bis c. 1900^m, selten über 2000^m. — Im Aarthal bleiben die Rothtannen bei c. 1700^m (am Hellenplattenstock oberhalb Handeck) zurück.

Larix. Lärche.

•• *europæa* D. C. (*Larix decidua* Mill., *Pinus Larix* L.) *Lärchtanne*. In der unteren und mittleren Region stellenweise häufig (grösseren Bezirken fehlend); meist mit anderen Nadelhölzern gemischt, seltener in reinen Beständen; an einzelnen Stellen bis gegen 2000^m. — Oberhasli oberhalb der Handeck bis c. 1700^m! und noch in der Nähe des Aargletschers (c. 1850^m) in wenigen vereinzelt Exemplaren! Im Torf in der Nähe des Grimselspitals gefundene Zapfen (Desor) lassen auf eine einstige grössere Verbreitung der

Lärche in den Umgebungen der Grimsel schliessen. Gadmen- und Urbachthal! Hintergrund des Sefinenthals! Gasterenthal und Gemmi (Kasthofer), Kanderthal, Obersimmenthal! Lauenenthal am Feissenberg bis c. 1950^m (Hunziker), Nordabhang des Sanetsch und unterhalb Oldenalp (Leresche) u. a. O. — In den Umgebungen des Thunersees und bei Interlaken stellenweise cultivirt.

Pinus. Kiefer.

- * *silvestris* L. *Kiefer, Föhre, Dähle*. In der unteren und mittleren Region, meist mit anderen Holzarten gemischt, stellenweise häufig; selten bis zur Waldgrenze aufsteigend.
- *montana* Miller. (*P. Mughus et uncinata* Koch Syn. Ed. II.) *Bergföhre, Legföhre*. In der mittleren und im unteren Theil der oberen Region, besonders an felsigen Abhängen, vereinzelte Gruppen oder kleine Bestände bildend. — Am Niederhorn bei Beatenberg 1700—1970^m! Im oberen Aarthal häufig von c. 1250^m—c. 1700^m, wo sie als Legföhre die Felskuppen oberhalb der »Hellen Platte« bedeckt. Am Unteraargletscher bei c. 1880^m (Heer). Im Torfboden der Grimsel wurden Zapfen dieser Art gefunden (Desor). — Stellenweise auch in der unteren Region, z. B. Reutigenmoos! — In mehreren, nach ihrer Verbreitung noch näher zu untersuchenden Varietäten.
- [*Laricio* Poiret. *Var. austriaca* Höss (*P. nigricans* Host. *Schwarzföhre*.)] In der unteren Region hin und wieder cultivirt, z. B. bei Interlaken: am Rugen, in der Goldei! im Brückwald u. a. O.
- Cembra* L. *Arve*. In der Nähe der Holzgrenze, vereinzelt oder in kleinen (selten grösseren) Beständen, bis über 2000^m ansteigend. — Engstlenalp (Kern), Gadmen- und Guttannenthal! In der Nähe des Aargletschers in vereinzelt Exemplaren, 1850^m bis über 2000^m! An der Ostseite der Kl. Scheideck als grosser, lockerer Bestand bis c. 2040^m! Oberhalb desselben, bis über die Passhöhe der Scheideck, zeigen zahlreiche abgestorbene Stammreste die einstige

grössere Ausdehnung des Waldes. — Sausalp an der Suleck bei c. 2000^m! Zwischen Ammertten und Oberhoralp, bis 2050^m! Selten und vereinzelt im Gebiet der Kander-, Simmen- und Saanenthäler: Gasterenthal (Kasthofer); am westl. Fuss der Altels ein kleiner Bestand bei 1865^m—2180^m (Gosset), Feissenberg bei Lauenen, c. 1950^m (Hunziker). Am nördlichen und östlichen Fuss des Bäderhorns bei Boltigen in einzelnen Exemplaren (Maurer), Wallopalp bei Boltigen oberhalb des Sees (Leresche). — In der unteren Region zuweilen cultivirt, z. B. in den Rugenwaldungen bei Interlaken (Kern). — Fehlt dem Jura.

- [*Strobilus L. Weymouthskiefer.*] Hin und wieder cultivirt, z. B. in den Rugenwäldern und am Harder bei Interlaken! Schwandwald am Fuss des Schwarz-Mönch im Lauterbrunnenthal und im Ganzlaniwald oberhalb Rosenlani bei c. 1500^m (Forstmeister Fankhauser). — Aus N.-Amerika stammend.

b. Cupressineen.

Juniperus. Wachholder.

- * *communis L. Wachholder. Reckholder.* An trockenen Abhängen, an Waldrändern, auf Heideplätzen der Ebene und Voralpen ziemlich häufig.

nana Willd. An trockenen Abhängen der höheren Region, stellenweise sehr häufig, z. B. Burgfeldalp bei Beatenberg und Gemmenalpgrat! Grimsel! Urnenalp im Urbachthal! Wengernalp! Brünlihorn bei Mürren und Lattreienalp (Vulpis). Häufig auf der Stockhornkette (Fischer-Ooster). — Im Jura auf einigen Gipfeln der südlichen Kette.

Sabina L. Sade- oder Sevenbaum. An der Nünenenfluh gegen die Thalalp (Trachsel, Guthnick). — Im Wallis stellenweise sehr häufig, seltener in den Alpen von Bex und Chateau d'Oex.

c. Taxineen.

Taxus. Eibe.

- *baccata L.* In Wäldern der unteren Region hin und wieder, z. B. Grüsisberg (Brown). Häufig im Balmholz am

Thunersee! Am Abendberg bei Interlaken (Kasthofer, Kern), Ballenberg bei Brienz! Eisenfluh (Kern), Lütschenthal und Kienthal (Kasthofer), Stockenthal (Brown).

Typus II. Gefässkryptogamen.

Klasse I. Heterosporeen.

1. Selaginelleen.

Selaginella.

spinulosa A. Braun. Auf mageren Weiden, an Wegrändern, in der mittleren und höheren Region häufig. — Gipfel des Männlichen bei 2345^m! Seltener in der unteren Region, z. B. im Justisthal, Beatenberg und Wengen bei c. 1200^m! Am Bühl unterhalb Kandersteg und im Suldthal oberhalb der Säge bei c. 1100^m! Am Fuss des Engel oberhalb Reichenbach im Frutigthal, circa 1000^m! An Felsköpfen bei Inner-Urweid (Oberhasli) bei 760^m! — Dem nördlich angrenzenden Molassegebiet fehlend; häufig im mittleren und südlichen Jura.

Anmerkung. *S. helvetica* Spring. häufig im benachbarten Wallis und Uri, scheint dem Berner Oberland zu fehlen.

Klasse II. Isosporeen.

2. Lycopodieen.

Lycopodium. Bärlapp.

•• *Selago* L. In feuchten Wäldern, an moosigen Felsblöcken und schattigen Felsen von der unteren bis in die höhere Region häufig; auf verschiedenem Gestein. — Im nördlich