# Anhang

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Tätigkeitsbericht der Naturforschenden Gesellschaft Baselland**

Band (Jahr): **36 (1990)**

PDF erstellt am: **18.05.2024**

**Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

**Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

**http://www.e-periodica.ch**

# 7. Anhang

## 7.1 Artenlisten

### 7.1.1 Liste der in der Ziegeleigrube festgestellten Gefässpflanzen

Von Heiner Lenzin (ergänzt von Th. Brodtbeck)

| | |
|---|---|
| *Equisetum arvense* | Acker-Schachtelhalm |
| *Equisetum telmateia* | Riesen-Schachtelhalm |
| *Dryopteris filix-mas* | Gemeiner Wurmfarn |
| *Taxus baccata* | Eibe |
| *Ranunculus trichophyllus* | Haarblättriger Wasser-Hahnenfuss |
| *Ranunculus acris* | Scharfer Hahnenfuss |
| *Ranunculus repens* | Kriechender Hahnenfuss |
| *Papaver rhoeas* | Klatsch-Mohn |
| *Quercus robur* | Stiel-Eiche |
| *Betula pendula* | Hänge-Birke |
| *Carpinus betulus* | Hagebuche |
| *Potentilla anserina* | Gänse-Fingerkraut |
| *Potentilla reptans* | Kriechendes Fingerkraut |
| *Fragaria vesca* | Wald-Erdbeere |
| *Rosa spec.* | Rose |
| *Rosa arvensis* | Acker-Rose |
| *Rubus spec.* | Brombeere |
| *Rubus idaeus* | Himbeere |
| *Sorbus aucuparia* | Vogelbeerbaum |
| *Crataegus laevigata* | Zweigriffliger Weissdorn |
| *Crataegus monogyna* | Eingriffliger Weissdorn |
| *Prunus avium* | Süsskirsche |
| *Prunus padus* | Traubenkirsche |
| *Medicago sativa* | Luzerne |
| *Medicago lupulina* | Hopfenklee |
| *Melilotus alba* | Weisser Honigklee |
| *Trifolium pratense* | Roter Wiesen-Klee |
| *Trifolium repens* | Weisser Wiesen-Klee |
| *Trifolium hybridum ssp. hybridum* | Schweden-Klee |
| *Trifolium campestre* | Gelber Acker-Klee |
| *Lotus corniculatus* | Wiesen-Hornklee |
| *Vicia hirsuta* | Rauhaarige Wicke |
| *Vicia tetrasperma* | Vierfrüchtige Wicke |
| *Vicia sepium* | Zaun-Wicke |
| *Vicia sativa s. l.* | Futter-Wicke |
| *Lathyrus pratensis* | Wiesen-Platterbse |
| *Lythrum salicaria* | Blut-Weiderich |
| *Epilobium angustifolium* | Wald-Weidenröschen |
| *Epilobium hirsutum* | Zottiges Weidenröschen |
| *Epilobium parviflorum* | Kleinblütiges Weidenröschen |
| *Oenothera erythrosepala* | Lamarcks Nachtkerze |
| *Myriophyllum spicatum* | Ähriges Tausendblatt |
| *Acer campestre* | Feld-Ahorn |
| *Cornus sanguinea* | Roter Hartriegel |

| | |
|---|---|
| *Daucus carota* | Wilde Möhre |
| *Hypericum perforatum* | Gemeines Johanniskraut |
| *Rorippa silvestris* | Wilde Sumpfkresse |
| *Capsella bursa-pastoris* | Gemeines Hirtentäschchen |
| *Sinapis arvensis* | Acker-Senf |
| *Salix spec.* | Weide |
| *Salix alba* | Silber-Weide |
| *Salix elaeagnos* | Lavendel-Weide |
| *Salix purpurea* | Purpur-Weide |
| *Salix viminalis* | Korb-Weide |
| *Salix caprea* | Sal-Weide |
| *Salix cf. aurita* | Ohr-Weide |
| *Populus nigra* | Schwarz-Pappel |
| *Lysimachia vulgaris* | Gewöhnlicher Gilbweiderich |
| *Anagallis arvensis* | Acker-Gauchheil |
| *Stellaria graminea* | Grasblättrige Sternmiere |
| *Lychnis flos-cuculi* | Kuckucks-Lichtnelke |
| *Chenopodium polyspermum* | Vielsamiger Gänsefuss |
| *Chenopodium album* | Weisser Gänsefuss |
| *Atriplex hastata* | Spiessblättrige Melde |
| *Atriplex patula* | Gemeine Melde |
| *Rumex obtusifolius* | Stumpfblättriger Ampfer |
| *Rumex conglomeratus* | Knäuelblütiger Ampfer |
| *Rumex crispus* | Krauser Ampfer |
| *Polygonum aviculare s. l.* | Vogel-Knöterich |
| *Polygonum persicaria* | Pfirsichblättriger Knöterich |
| *Polygonum lapathifolium* | Ampferblättriger Knöterich |
| *Polygonum hydropiper* | Wasserpfeffer-Knöterich |
| *Galium mollugo* | Gemeines Labkraut |
| *Fraxinus excelsior* | Gemeine Esche |
| *Ligustrum vulgare* | Liguster |
| *Calystegia sepium* | Zaun-Winde |
| *Myosotis arvensis* | Acker-Vergissmeinnicht |
| *Buddleja davidii* | Buddleja |
| *Chaenorrhinum minus* | Kleines Leinkraut |
| *Veronica beccabunga* | Bachbungen-Ehrenpreis |
| *Plantago major ssp. major* | Grosser Wegerich |
| *Plantago lanceolata* | Spitz-Wegerich |
| *Verbena officinalis* | Eisenkraut |
| *Ajuga reptans* | Kriechender Günsel |
| *Callitriche spec.* | Wasserstern |
| *Solidago canadensis* | Kanadische Goldrute |
| *Conyza canadensis* | Kanadisches Berufkraut |
| *Erigeron annuus* | Feinstrahliges Berufkraut |
| *Gnaphalium uliginosum* | Sumpf-Ruhrkraut |
| *Bidens tripartita* | Dreiteiliger Zweizahn |
| *Galinsoga ciliata* | Borstenhaariges Knopfkraut |
| *Matricaria chamomilla* | Echte Kamille |
| *Tripleurospermum inodorum* | Geruchlose Kamille |
| *Leucanthemum vulgare s. l.* | Margerite |
| *Artemisia vulgaris* | Gemeiner Beifuss |
| *Tussilago farfara* | Huflattich |
| *Senecio vulgaris* | Gemeines Kreuzkraut |
| *Senecio erucifolius* | Raukenblättriges Kreuzkraut |

| | |
|---|---|
| *Cirsium arvense* | Ackerdistel |
| *Lapsana communis* | Rainkohl |
| *Leontodon hispidus s. l.* | Gemeiner Löwenzahn |
| *Picris hieracioides s. l.* | Bitterkraut |
| *Taraxacum officinale s. l.* | Pfaffenröhrlein |
| *Sonchus oleraceus* | Gemeine Gänsedistel |
| *Sonchus asper* | Rauhe Gänsedistel |
| *Lactuca serriola* | Wilder Lattich |
| *Crepis capillaris* | Kleinblütiger Pippau |
| *Hieracium piloselloides* | Florentiner Habichtskraut |
| *Alisma plantago-aquatica* | Gemeiner Froschlöffel |
| *Potamogeton crispus* | Krauses Laichkraut |
| *Potamogeton natans* | Schwimmendes Laichkraut |
| *Juncus inflexus* | Seegrüne Binse |
| *Juncus effusus* | Flattrige Binse |
| *Juncus articulatus* | Glänzendfrüchtige Binse |
| *Juncus subnodulosus* | Stumpfblütige Binse |
| *Juncus bufonius* | Kröten-Binse |
| *Schoenoplectus mucronatus* | Stacheliges Seeried |
| *Eleocharis palustris s. str.* | Gewöhnliches Sumpfried |
| *Carex hirta* | Behaarte Segge |
| *Carex rostrata* | Schnabel-Segge |
| *Typha latifolia* | Breitblättriger Rohrkolben |
| *Sparganium erectum s. l.* | Ästiger Igelkolben |
| *Bromus sterilis* | Taube Trespe |
| *Poa annua* | Einjähriges Rispengras |
| *Poa trivialis* | Gemeines Rispengras |
| *Poa pratensis s. str.* | Wiesen-Rispengras |
| *Poa angustifolia* | Schmalblättriges Rispengras |
| *Poa nemoralis* | Hain-Rispengras |
| *Dactylis glomerata* | Gemeines Knäuelgras |
| *Lolium multiflorum* | Italienisches Raygras |
| *Lolium perenne* | Englisches Raygras |
| *Agropyron repens* | Kriechende Quecke |
| *Phragmites australis* | Schilf |
| *Holcus lanatus* | Wolliges Honiggras |
| *Arrhenatherum elatius* | Glatthafer |
| *Agrostis tenuis* | Gemeines Straussgras |
| *Agrostis stolonifera* | Kriechendes Straussgras |
| *Apera spica-venti* | Gemeiner Windhalm |
| *Calamagrostis epigeios* | Gemeines Reitgras |
| *Phleum pratense* | Wiesen-Lieschgras |
| *Anthoxanthum odoratum s. str.* | Ruchgras |
| *Echinochloa crus-galli* | Hühnerhirse |
| *Panicum capillare* | Haarästige Hirse |

Nomenklatur nach A. Binz/Chr. Heitz (1986)

## 7.1.2 Liste der beobachteten Vogelarten

Von Ernst Fischler, Heiner Lenzin und Thomas Reiss

| | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graureiher *(Ardea cinerea)* | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Purpurreiher *(Ardea pupurea)* | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Weissstorch *(Ciconia ciconia)* | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Stockente *(Anas platyrhynchos)* | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Mäusebussard *(Buteo buteo)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Schwarzmilan *(Milvus migrans)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rotmilan *(Milvus milvus)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Turmfalke *(Falco tinnunculus)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wanderfalke *(Falco peregrinus)* | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Rebhuhn *(Perdix perdix)* | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| Teichralle *(Gallinula chloropus)* | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Bekassine *(Gallinago gallinago)* | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Waldwasserläufer *(Tringa ochropus)* | | | | | | | | | | X | | X | X | | X | X | |
| Dunkler Wasserläufer *(Tringa erythropus)* | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| Haustaube *(Columba livia)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Waldkauz *(Strix aluco)* | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Buntspecht *(Dendrocopus major)* | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | X |
| Mauersegler *(Apus apus)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rauchschwalbe *(Hirundo rustica)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mehlschwalbe *(Delichon urbica)* | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | X | X | X |
| Feldlerche *(Alauda arvensis)* | X | B | B | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bachstelze *(Motacilla alba)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kohlmeise *(Parus major)* | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B |
| Blaumeise *(Parus caeruleus)* | | | | | | | | | | | X | X | B | B | B | B | B |
| Amsel *(Turdus merula)* | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausrotschwanz *(Phoenicurus ochruros)* | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Gartenrotschwanz *(Phoenicurus phoenicurus)* | | | X | X | X | | | X | X | | | X | X | X | X | | |
| Nachtigall *(Luscinia megarhynchos)* | | | | | | | | | | X | | | X | X | B | X | |
| Teichrohrsänger *(Acrocephalus scirpaceus)* | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Mönchsgrasmücke *(Sylvia atricapilla)* | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | B | B | X |
| Gartengrasmücke *(Sylvia borin)* | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X |
| Zilpzalp *(Phylloscopus collybita)* | | | | | | X | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Fitislaubsänger *(Phylloscopus trochilus)* | | | | | | | | X | X | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Neuntöter *(Lanius collurio)* | | | | | | | B | B | B | | | | | | | | |
| Buchfink *(Fringilla coelebs)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Distelfink *(Carduelis carduelis)* | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | B | B |
| Girlitz *(Serinus serinus)* | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| Bluthänfling *(Carduelis cannabina)* | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gimpel *(Pyrrhula pyrrhula)* | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X |
| Goldammer *(Emberiza citrinella)* | | | | | | | | | | | X | X | X | X | B | B | X |
| Haussperling *(Passer domesticus)* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

B Brutvogel
X Gast

Rebhuhn und Neuntöter sind durch Biotopveränderung verschwunden.

### 7.1.3 Festgestellte Libellenarten

Von Thomas Reiss

*Zygoptera* (Kleinlibellen):

| | |
|---|---|
| *Calopteryx splendens* | Gebänderte Prachtlibelle |
| *Sympecma fusca* | Gemeine Winterlibelle |
| *Lestes barbarus* | Südliche Binsenjungfer |
| *Lestes dryas* | Glänzende Binsenjungfer |
| *Lestes sponsa* | Gemeine Binsenjungfer |
| *Lestes virens* | Kleine Binsenjungfer |
| *Lestes viridis* | Grosse Binsenjungfer |
| *Ischnura elegans* | Grosse Pechlibelle |
| *Ischnura pumilio* | Kleine Pechlibelle |
| *Pyrrhosoma nymphula* | Frühe Adonislibelle |
| *Enallagma cyathigerum* | Becher-Azurjungfer |
| *Cercion lindenii* | Pokal-Azurjungfer |
| *Coenagrion puella* | Hufeisen-Azurjungfer |
| *Erythromma viridulum* | Kleines Granatauge |

*Anisoptera* (Grosslibellen):

| | |
|---|---|
| *Brachytron pratense* | Kleine Mosaikjungfer |
| *Aeshna affinis* | Südliche Mosaikjungfer |
| *Aeshna cyanea* | Blaugrüne Mosaikjungfer |
| *Aeshna juncea* | Torf-Mosaikjungfer |
| *Aeshna mixta* | Herbst-Mosaikjungfer |
| *Anax imperator* | Grosse Königslibelle |
| *Anax parthenope* | Kleine Königslibelle |
| *Cordulegaster boltonii* | Zweigestreifte Quelljungfer |
| *Cordulia aenea* | Gemeine Smaragdlibelle |
| *Somatochlora metallica* | Glänzende Smaragdlibelle |
| *Libellula depressa* | Plattbauchlibelle |
| *Libellula quadrimaculata* | Vierfleck-Libelle |
| *Orthetrum brunneum* | Südlicher Blaupfeil |
| *Orthetrum cancellatum* | Grosser Blaupfeil |
| *Crocothemis erythraea* | Feuerlibelle |
| *Sympetrum danae* | Schwarze Heidelibelle |
| *Sympetrum depressiusculum* | Sumpf-Heidelibelle |
| *Sympetrum fonscolombii* | Frühe Heidelibelle |
| *Sympetrum pedemontanum* | Gebänderte Heidelibelle |
| *Sympetrum sanguineum* | Blutrote Heidelibelle |
| *Sympetrum striolatum* | Grosse Heidelibelle |
| *Sympetrum vulgatum* | Gemeine Heidelibelle |
| *Leucorrhinia rubicunda* | Nordische Moosjungfer |

### 7.1.4 Liste der Wasserwirbellosen in zwei Weihern der Ziegeleigrube in Oberwil

Die Zusammenstellung basiert auf zwei Begehungen im Dezember 1989 und Januar 1990.

Häufigkeitsangaben: + vorhanden; ++ häufig; +++ sehr häufig

| Systematische Einheit | Weiher 1 | Weiher 2 |
|---|---|---|
| *Gastropoda* (Schnecken) | | |
| *Lymnea peregra* | + | |
| *Lymnea stagnalis* (Spitzschlammschnecke) | +++ | ++ |
| *Planorbarius corneus* (Posthornschnecke) | + | |
| *Ferissa wantieri* | + | + |
| Lamellibranchiata (Muscheln) | | |
| *Sphaerium sp.* (Schalen) | ++ | + |
| *Oligochaeta* (Wenigborster) | | |
| *Tubifex sp.* | + | |
| *Lumbriculus variegatus* | ++ | ++ |
| *Isopoda* (Asseln) | | |
| *Asellus aquaticus* | ++ | |
| *Insecta* (Insekten) | | |
| *Collembola* (Springschwänze) | | |
| *Isotomatidae* | ++ | ++ |
| *Podura aquatica* | +++ | |

## 7.2 Literaturverzeichnis


ANDRITZKY, M. et al., 1982: Grün in der Stadt. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg 474 S.

BELLMANN, H., 1987: Libellen beobachten - bestimmen, Neumann-Neudamm, Melsungen, 272 S.

BINZ, A., 1905: Flora von Basel und Umgebung, C. F. Lendorff, Basel, 366 S.

BINZ, A., 1915: Ergänzungen zur Flora von Basel, 1. Teil, Verh. Naturf. Ges. Basel, Bd. 26, S. 176–221

BINZ, A., 1942: Ergänzungen zur Flora von Basel, 3. Teil, Verh. Naturf. Ges. Basel, Basel 53, S. 83–135

BINZ, A. / HEITZ, CHR., 1986: Schul- und Exkursionsflora der Schweiz. Schwabe+Co AG, Basel, 624 S.

BITTERLI-BRUNNER, P. / FISCHER, H. & HERZOG, P., 1984: Blatt 1067 Arlesheim. Geologischer Atlas der Schweiz, 1:25 000, Atlasblatt 80, herausgegeben von der Schweizerischen Geologischen Kommission

BITTERLI-BRUNNER, P. / FISCHER, H., 1989: Erläuterungen zu Blatt 1067 Arlesheim. Geologischer Atlas der Schweiz, 1:25 000, herausgegeben von der Landeshydrologie und -geologie

BLATTNER, M., RITTER, M., EWALD, K., 1985: Basler Naturatlas, 3 Bde., SBN, Basel

BORNKAMM, R., 1981: Zusammensetzung, Biomasse und Inhaltstoffe der Vegetation während zehnjähriger Sukzession auf Gartenböden in Köln, Wecheniana 1, Bonn, S. 35–48

BRODMANN, P., 1985: «Die Amphibien der Schweiz», Heft 4 des Naturhistorischen Museums Basel, 5. Auflage

ELLENBERG, H., 1978: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Ulmer, Stuttgart, 981 S.
EWALD, K. (red.), 1981: Das Naturschutzgebiet Reinacherheide (Reinach, Basel-Landschaft), Tät.ber. Natf. Ges. Basell. *31,* Liestal, S. 5–183
EWALD, K., 1982: Natur- und Landschaftsschutzprobleme der Basler Agglomeration. Regio Basiliensis *23* (1/2), S. 70–87
GROSSENBACHER, K., 1988: «Verbreitungsatlas der Amphibien der Schweiz», Schweizer Bund für Naturschutz, Basel
HANTKE, R., 1978: Eiszeitalter, Band 1: Die jüngste Erdgeschichte der Schweiz und ihrer Nachbargebiete. Ott Verlag Thun
HEINIS, F., 1926: Beiträge zur Flora des Kantons Baselland, Tät.ber. Naturf. Ges. Baselland, Bd. 7, S. 57–85
HINTERMANN & WEBER: «Bestandesaufnahme der Amphibien der Ziegelei Oberwil», 1985/86 (unveröffentlicht)
HOHL, CHR., 1989: Reptilien, in «Natur aktuell», S. 267–270
HOTZ, H. J., & BROGGI, M. F., 1982: «Rote Liste der gefährdeten und seltenen Amphibien und Reptilien der Schweiz». Schweizer Bund für Naturschutz
JURIZITZA, G., 1978: Unsere Libellen. Kosmos Stuttgart, 1. Aufl., 71 S.
KOCH, W., 1926: Die Vegetationseinheiten der Linthebene, unter Berücksichtigung der Verhältnisse in der Nordostschweiz, Jb. Naturw. Ges. St. Gallen, *61,* 144 S.
LABHARDT, F. / SCHNEIDER, CH., 1981: Überblick über die Amphibienbestände in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt. Tät.ber. Natf. Ges. Basell., *31,* Liestal, S. 185–224
MAIBACH, A. / MEIER, C., 1987: Verbreitungsatlas der Libellen der Schweiz (Odonata), Documenta Faunistica Helvetiae, 228 S.
MEIER, C., 1988: 1. Nachtrag 1985–1987 (Odonata), opuscula zoologica fluminensia, Nr. 22, S. 1–8, B. KIAUTA, 8896 Flumserberg-Grossberg
OBERDORFER, E., 1977, 1978, 1983: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Ulmer, Stuttgart/Jena, I–III, 311 S., 355 S., 454 S.
PORTMANN, A., 1921: Die Odonaten der Umgebung von Basel, Diss. Universität Basel
REISS, T., 1991: Libellen des Kantons Baselland, Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel (im Druck)
REISS, T., 1988: Die Zurlindengruben in Pratteln, Libellen (Odonata). Tät.ber. Naturf. Ges. Baselland, Band 35, S. 41–43 und 97
ROBERT, P.-A., 1959: Die Libellen (Odonaten), Kümmerly & Frey, Bern, 404 S.
SINSCH, U., 1989: Die Kreuzkröte (Bufo calamita): Dynamik und Mikrohabitate einer Kiesgrubenpopulation, Verh. GfÖ (Essen 1988), Bd. XVIII, S. 101–109
TESTER, U.: «Zur Biologie des Laubfrosches Hyla arborea und den Möglichkeiten einer Wiederansiedlung in der Region Basel», Dissertation, 1990
WILLMANNS, O., 1984: Ökologische Pflanzensoziologie. 3. erw. Aufl., Quelle und Meyer, Heidelberg, 332 S.
ZEMP, M. / BRODTBECK, TH., 1988: Neuere Beiträge zur Flora des unteren Baselbiets und angrenzender Gebiete, Tät.ber. Naturf. Ges. Baselland, Band 35, S. 207–213
ZEMP, M. / BRODTBECK, TH., 1989: Rote Liste der Gefässpflanzen des Kantons Basel-Landschaft, in «Natur aktuell», S. 220–245
ZOLLER, H. / WAGNER, CHR. / FREY, V., 1986: Nutzungsbedingte Veränderungen in Mesobromion-Halbtrockenrasen in der Region Basel – Vergleich 1950–1980. Abhandlungen *48 (2/3),* Münster, S. 93–107