Ein neuer europäischer Athous

Autor(en): **Stierlin**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **5 (1877-1880)**

Heft 10

PDF erstellt am: **02.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-400387

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Ein neuer europäischer Athous

von Dr. Stierlin.

Athous Langsdorffi.

Castaneus, nitidus, nigro-villosus, fronte excavata, antennarum articulo tertio sequentibusque triangularibus, thorace latitudine elytrorum subtiliter crebre punctulato, angulis posticis carinatis, paulo divaricatis; elytris sulcatis, interstitiis convexis, subtiliter crebre punctatis, tarsorum articulo quarto minuto. Long. 16—17 mm.

♂ thorace longitudine paulo latiore, lateribus parum dilatato, subconico, elytris angustioribus. Lat. 5 mm.

♀ thorace longitudine multo latiore ante medium valde rotundato-ampliato, postice lateribus sub-sinuato, elytris latis, postice dilatatis. Lat. 8 mm.

Dieser prachtvolle Athous gehört in die 1. Abtheilung, 1. Rotte nach Candez, bei der das 4. Tarsenglied klein, das 3. Fühlerglied erweitert ist, und ist wohl die einzige Art dieser Rotte, bei der ♂ und ♀ so sehr verschieden sind. Das ♀ sieht dem ♀ von *A. mandibularis* sehr ähnlich. ist eben so gross und eben so breit, von gleicher Farbe, allein das Halsschild ist vorn viel mehr erweitert und dadurch viel kürzer, die Behaarung schwarz, bei jenem hellgelb, die Zwischenräume der Flügeldecken sind viel dichter punktirt und das 4. Tarsenglied ist viel kleiner, namentlich schmaler.

Er ist nur wenig kleiner als *A. rufus*, einfärbig kastanienbraun und mit feiner, aufstehender, ziemlich langer schwarzer Pubescenz überall ziemlich dicht bedeckt.

Die Stirn ist mässig vertieft, ihr Vorderrand in schwachen Bogen gerundet, sehr dicht punktirt; Fühler kräftig, das 2. Glied klein, das dritte breit dreieckig, von den folgenden kaum verschieden.

Halsschild so breit wie die Flügeldecken, die Vorderecken spitz vortretend, die Hinterecken sehr wenig divergirend, kräftig gekielt, die Scheibe mit undeutlicher Längsfurche, ziemlich dicht und fein, die Seiten noch etwas dichter punktirt.

Schildchen verlängt, zugespitzt. Flügeldecken ziemlich gewölbt, mit tiefen, undeutlich punktirten Furchen und gewölbten,

dicht und fein punktirten Zwischenräumen; Unterseite fein zerstreut punktirt mit feiner, schwarzer Pubeszenz. Das 4. Tarsenglied ist viel kürzer und viel schmaler als das 3.

♂ Halsschild wenig breiter als lang, seitlich schwach gerundet, an der Wurzel am breitesten, und hier so breit wie die Flügeldecken, diese cylindrisch, nach hinten nicht erweitert.

♀ Halsschild viel breiter als lang, seitlich vor der Mitte stark gerundet erweitert und vor den Hinterecken schwach gebuchtet. Flügeldecken in der hinteren Hälfte erweitert und an der breitesten Stelle so breit wie das Halsschild.

Von Herrn Clair an der Riviera gesammelt.

Verzeichniss

der Schriften, welche der Bibliothek der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft in Bern zugekommen sind.

Geschlossen den 30. Juli 1879.

Bemerkungen.

Nachstehendes Verzeichniss enthält die Schriften in alphabetischer Ordnung; die Namen in den Parenthesen bezeichnen die Geber. Es bedeutet:

(G.) Geschenk.
(T.) Tausch.
(V.) Verfasser.

Amiens, Mémoires de la Soc. linnéenne du Nord de la France, T. 4. 1874—77; Bulletin mensuel, Nr. 70—81, 1 Avril 1878—1 Mars 1879. (T.)

André, Spécies des Hyménoptères, Fasc. I. Beaune, 1879. 8. (T.)

Basel, Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft, 6. Thl. 2—4. Heft, 1875 bis 78. (T.)

Berg, Cárlos,

Contribucion al estudio de la fauna entom. de Patagonia. Buenos Aires 1877. 8. (V.)

f. Orugas acuáticas de la familia de Bombycidæ. Buenos Aires 1876. 8. (V.)

El género Streblota y las Notodontinas de la república argentina. Buenos Aires 1878. 8. (V.)

Patagonische Lepidopteren, beobachtet auf einer Reise im Jahre 1874. Moskau 1878. 6. (V.)

f. Untersuchungen über die Gattung Mimallo, Hübner und ihre Arten. (Tafel fehlt!) St. Pet. 8. (V.)