Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **SuchtMagazin**

Band (Jahr): **27 (2001)**

Heft 3

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

infoset direct

Information und Kommunikation im Drogen- und Suchtbereich

Die Schweizer Suchtarbeit auf dem Internet

http://www.infoset.ch

Drug-Screen

Jetzt noch einfacher und kostengünstiger...

Einfache Handhabung.
Ergebnis nach 3-8 Minuten.

Einzeltests

Kostengünstig in der neuen Runddose!

Tests auch als Multi-Test-Cards in fünf Kombinationen lieferbar, z.B. **Multi-5M**:

Insgesamt 10 Parameter:
Amphetamin, Barbiturate, Benzodiazepine, Methadon, Methamphetamin, Kokain, Opiate, PCP, TCA, THC

von minden GmbH

ISO 9002 zertifiziert

Carl-Peschken-Strasse 9 · 47441 Moers/Germany
Fon: +49 (0) 28 41/13 51 · Fax: +49 (0) 28 41/2 16 37
Internet: www.vonminden.de · E-mail: info@ vonminden.de

Drogenmissbrauch?

Triage® 8



Nachweis von MTD BZO COC AMP THC OPI BAR und TCA

8 Ergebnisse in 10 Minuten

- **Unzweideutige Interpretation auch im Cut-Off-Bereich**
- **Eingebaute Positiv- und Negativ-Reaktionskontrollen**
- **Hochspezifisches und sensitives Screening aller wichtigen Drogenmissbrauchsklassen, inklusive TCA**

Weitere Informationen unter:

MEDIM Schweiz GmbH
Medical Diagnostic Products
Postfach 247, CH-6374 **Buochs**
Tel. 041 622 10 40 Fax 041 622 10 43 Internet: www.medim.ch

Suchen Sie ein idyllisch gelegenes Haus in familiärer Atmosphäre um Ihre
Tagungen, Retraîten, Seminare
oder ähnliches durchzuführen?

Dann ist unser

Haus Antares

in Kienberg (SO)
35 km von Basel entfernt genau das Richtige!

Max. 17 Plätze und gut erreichbar. Halb-, Vollpension oder Selbstversorgung möglich. Alles vorhanden, um in einem besonderen Ambiente Ihre Tagungen durchzuführen.

Rufen Sie uns an oder verlangen Sie die Unterlagen:
Stiftung für Sucht- und Jugendprobleme, SSJ
Holbeinstrasse 48, 4051 Basel
Tel. 061/ 271 49 59, Fax 061/ 271 46 54
E-Mail: admin@ssj-basel.ch



Darreichungsformen: Filmtabletten zu 20 mg Paroxetin, Suspension 20 mg/10 ml. **Indikationen:** Depressive Erkrankungen, Panikstörungen, Zwangsstörungen, jeweils akute Therapie und Langzeitbehandlung; Sozialphobie, akute Therapie. **Dosierung:** *Depressionen und Sozialphobie:* Anfangs- und Standarddosierung: 20 mg pro Tag als morgendliche Einmaldosis. Falls nötig Erhöhung auf 30 oder 40 mg, bei Sozialphobie bis 50 mg. *Panikstörungen:* Anfangsdosierung: 10 mg pro Tag. Erhöhung in wöchentlichen 10 mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40 mg. Erhöhung bis maximal 60 mg möglich. *Zwangsstörungen:* Anfangsdosierung: 20 mg pro Tag. Erhöhung in wöchentlichen 10 mg-Schritten bis zur Standard-Tagesdosis von 40 mg. Erhöhung bis maximal 60 mg möglich. **Spezielle Dosierungsanweisungen:** Höchstdosis bei älteren Patienten 20 mg/Tag. Bei schwerer Nieren- oder Leberinsuffizienz unteren Dosierungsbereich wählen. **Kontraindikationen:** Bekannte Deroxat-Überempfindlichkeit. Keine gleichzeitige Anwendung von MAO-Hemmern oder Tryptophan. Vor und nach Therapie mit MAO-Hemmern Intervall von 2 Wochen einhalten. **Vorsichtsmassnahmen:** Vorsicht bei Patienten mit Epilepsie, manischen Episoden, Engwinkelglaukom, Blutdruck- oder kardialen Problemen, Elektroschocktherapie. Bei Krampfanfällen absetzen. Vorsicht bei gleichzeitiger Gabe von trizyklischen Antidepressiva, Neuroleptika vom Phenothiazin-Typ, 1c-Antiarrhythmika, Codein, Cimetidin, Phenytoin, Lithium, oralen Antikoagulantien sowie bei Schwangerschaft und Stillzeit; nicht bei Kindern anwenden. **Unerwünschte Wirkungen:** Am häufigsten beobachtet: Übelkeit, Schläfrigkeit, Schwitzen, Tremor, Schwächezustände, Mundtrockenheit, Schlafstörungen, sexuelle Störungen. **Packungen/Preise:** Packungen zu 14* (Fr. 51.55), 28* (Fr. 90.70) und 98* Filmtabletten (Fr. 295.95), Suspension 150 ml* (Fr. 51.55). **Verkaufskategorie:** B. *Kassenzulässig

gsk GlaxoSmithKline

SmithKline Beecham AG
Brunnmattstrasse 13
CH-3174 Thörishaus
Tel. +41(0)31 888 21 11
Fax. +41(0)31 888 21 22

Paroxetinum™

Deroxat

Echte Hilfe bei Depression und Angsterkrankungen