

Zeitschrift: Naturwissenschaftlicher Anzeiger der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften
Herausgeber: Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften
Band: 1 (1817)
Heft: 12

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CREPIDES HELVETIAE

accuratius disternatae per Alb. Hallerum fil.

In Historia Plantarum Delphinatus III. 146., libro observationibus novis et subtilibus ornato plurimis, monet Villarsius, errorum confusio- nisque in operibus botanicorum causam, prae- sertim in speciebus generis naturalis ideoque cautius disternendis, in eo positam esse, quod regio eadem, non omnes, sed plures tantum species generis cujusdam alat, omnibus autem notae quaedam communes sint, praeter generi- cas, et quod habitus, divisio caulis, foliorum figura, aliaeque notae spectabiles plurimum va- rient, pro situ plantae vario, immo in uno et eo- dem individuo pro eorum situ relativo. Hujus confusionis specimina vidimus in *Anchusis*, tot variisque plantis pro officinali venditatis, in *Crepidibus*, cum Itali *Cr. setosam*, Villarsius *taraxacifoliam* pro *Cr. tectorum* L. habuerint. Beata vero patria, in mediâ quasi Europa sita, plantas diversissimarum alit regionum, atque quasi terminum sistit plurium, v. gr. Hunga- ricæ *Geranium divaricatum*, *bohemicum*, *Sisymbrium pannonicum*, *Astragalus exscap- us*, ad occidentem Helvetiae nusquam occur- runt, uti *Phleum commutatum*, *Potentilla glacialis*, *Saxifragae* quaedam ad orientem. *Crepidis* genus Europae proprium pene, et Helvetia species plures fert quavis fere aliâ ditione; nam terminus orientalis est *Cr. ta- raxacifoliae*, occidentalis *globiferae*, septen- trionalis *setosae*, australis *tectorum*. His mo- tus per multos abhinc annos huic generi, et Hieraciis operam et studium impendi.

Antiquiores botanici quasdam habent spe- cies; genere vero non constituto, ad Hiera-

cium genus referebant. Nec icones, nec descriptio- nes magni sunt momenti, quoniam in notis maxime variabilibus, ut folia, divisio caulis, attentis, constantes neglexere. Vaillantius pri- mus eas in genus, *Hieracioïdes* dictum, coëgit, Linnaeus postea, talia improbens nomina, de- nominatione abs planta alii generis, ejusdem tamen familiae, mutuâtâ, *Crepidis* nuncupa- vit. Moenchius; qui in Methodo plurima dis- cerpsit genera, et hoc in duo partitus est, caractere a prolongatione seminis ducto, quem postea Candollaëus sequutus est. Ejusmodi autem character nimis exilis videtur ad divi- dendum genus, bonum ceterum, nec numero- sum, habituque communi junctum. Mihi is tantum pappus juste recteque stipitatus dicitur, qui stipiti proprio, in apice seminis quasi ar- ticulato, demum ab illo sponte solubili et cum illo avolante, insidet ut in *Taraxaco*, *Chondrillâ*, in *Barkhausia* vero Moenchii, in- tegumentum seminis, valde attenuatum, sed sulcos, costasque denticulatas suas tamen ser- vans, longius ultra embryonem continuatur.

Char. gen. Calyx calyculatus multiflorus: Squamis interioribus simplici serie, exterioribus multo minoribus, totis ab interioribus solutis, fabricae diversae, patulis, seu reflexis, post anthesin cito marcescentibus, immo deciduis. Receptaculum alveolatum, nudiusculum, aut pilosum, limbo alveolorum ciliato. Pappus sessilis.

Habitus. Radix fusiformis, aut fibrosa, annua aut biennis. Caulis striatus s. sulcatus, absque laesione semper erectus, divisus aut ramosus; folia oblonga, nervis pinnatis, mul- tifarie pinnatim divisa, aut dentata tantum, caulinis amplexicaulibus hamatis s. sagittatis, basi foliorum utrinque infra insertionem prolonga-

