

Zeitschrift: Acta Tropica
Herausgeber: Schweizerisches Tropeninstitut (Basel)
Band: 11 (1954)
Heft: 2

Artikel: Miscellanea : L'acide folique comme élément important dans la symbiose intestinale de Triatoma infestans
Autor: Geigy, R. / Halff, L.A. / Kocher, V.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-310484>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'acide folique comme élément important dans la symbiose intestinale de *Triatoma infestans*.

Par R. GEIGY, L. A. HALFF et V. KOCHER.

(Reçu le 9 février 1954.)

Triatoma infestans, Réduvidé bien connu qui transmet en Amérique du Sud la maladie de Chagas, se nourrit exclusivement de sang de mammifères, spécialement de l'homme. Elle est capable de digérer sans autre le sang absorbé, mais les substances qu'elle retire de cette assimilation ne lui suffisent pas pour accomplir normalement son développement post-embryonnaire, et il est évident que son métabolisme a besoin d'un autre apport. Il est très probable que des symbiotes, ressemblant à des coccus, et qui sont localisés dans la partie antérieure de l'intestin moyen de cette punaise, sont responsables de la production de ce composé indispensable. *Wigglesworth et Brecher* (1936-1952) ont décrit des symbiotes analogues, quoique d'un type un peu différent, dans l'intestin de *Rhodnius prolixus*, Réduvidé parent de *Triatoma*. Les symbiotes, dont ces insectes ne peuvent guère se passer, sont transmis d'une génération à l'autre non pas par un mécanisme génital, tel qu'il a été décrit chez d'autres groupes (voir *P. Buchner*, 1953), mais probablement directement par les matières fécales, qui contiennent ces coccus en grand nombre et sur lesquelles les jeunes punaises, encore stériles à l'éclosion, viennent s'infester. Lorsqu'on empêche leur infection, en pratiquant l'élevage stérile à partir de l'œuf, on constate que la mortalité — déjà grande dans le cas normal — accroît, que le développement des quatre stades larvaires est considérablement retardé et que le stade nymphal et surtout imaginal n'est que très rarement atteint ; quelquefois on voit éclore des formes intermédiaires présentant à la fois des caractères nymphaux et imaginiaux.

On réussit sans peine à cultiver le symbiose sur différents milieux de culture. Ainsi il a été possible d'appliquer des méthodes microbiologiques pour contrôler son pouvoir synthétisant concernant les vitamines suivants : lactoflavine, acide nicotinique, acide pantothenique, biotine, acide folique, adermine, aneurine, acide amino-benzoïque, choline, inosite, vitamine B₁₂ et strépogénine.

Des essais qualitatifs ont d'abord montré que le symbiose nécessite pour son propre métabolisme la lactoflavine, l'acide nicotinique, l'acide pantothenique, la biotine, et l'adermine ; il ne peut, par conséquent, pas les mettre à la disposition de son hôte. Par contre, il peut se passer pratiquement de l'acide folique, de l'aneurine, de la vitamine B₁₂, de la strépogénine, de la choline, de l'inosite et de l'acide amino-benzoïque. Ces vitamines entreraient donc en ligne de compte pour être mises à la disposition de l'hôte. On a alors contrôlé le métabolisme du symbiose en ce qui concerne spécialement ces vitamines du complexe B, en l'élevant sur un milieu semisynthétique, additionné de 20 % de sang humain défibriné ou maintenu liquide à l'aide de citrate. On a constaté que le symbiose synthétise l'aneurine, la vitamine B₁₂ et la strépogénine dans des quantités minimes, couvrant probablement juste ses propres besoins. Par contre, il y a une hyperproduction notable en acide folique, excédant selon nos estimations d'environ 2500 fois les propres besoins du symbiose.

On sait d'autre part que le complexe des vitamines B peut jouer le rôle d'un agent stimulant dans la métamorphose de certains insectes (*Brunner, Grob, Reichstein, Rosenthal*, 1942-1946). Il est donc permis de penser que cet excès d'acide folique, que le symbiose produit dans l'intestin de *Triatoma infestans*, est indispensable à l'hôte pour régulariser, c'est-à-dire pour mener à bon terme son développement post-embryonnaire.

Nous avons essayé de confirmer notre opinion sur ce symbiose et sur la signification de l'acide folique qu'il produit, en faisant plusieurs autres expériences dont nous donnons ici un aperçu provisoire.

a) *Comportement de punaises nourries de sérum de cobaye avec ou sans acide folique.*

Il est facile de faire sucer des punaises à travers une membrane tendue à la surface d'un liquide qui est maintenu à une température d'environ 40° C. Dans notre cas nous avons employé du sérum stérile de cobaye, auquel nous avons ajouté 1 γ d'acide folique par 1 ccm., quantité qui, selon nos estimations, doit dépasser de beaucoup celle qui est normalement produite par les symbiotes au cours de la digestion d'un repas de sang. Ces repas de sérum ont été donnés tous les 15 jours pendant huit mois à des larves du 3^e et du 4^e stade, ainsi qu'à des nymphes normales et stériles. Ces punaises ne se développaient cependant pas normalement et cela indifféremment s'il s'agissait d'individus stériles ou de porteurs de symbiotes. On constatait un dérèglement du rythme des mues et une réduction de leur nombre, accompagnée d'un retardement général du développement ; la mortalité n'était par contre pas augmentée. Deux lots de punaises de contrôle — stériles et porteuses de symbiotes — élevés parallèlement, mais nourris avec du sérum dépourvu d'acide folique, montraient également quelques irrégularités, mais dans l'ensemble un développement plus constant et des mues plus faciles.

Ce résultat, surprenant en apparence, peut s'expliquer si l'on admet que la dose de l'acide folique était trop grande et exerçait alors au contraire un effet ralentissant sur le développement, même chez les punaises stériles. Dans de nouvelles expériences, actuellement en cours, on essaye un dosage beaucoup plus réduit qui doit correspondre plus exactement à la quantité de cette vitamine produite par le symbiose.

b) *Blogeage de l'acide folique au moyen d'aminoptérine.*

L'aminoptérine est un corps dont la constitution chimique est très voisine de celle de l'acide folique, mais qui n'a pas la même action biologique. Nous pouvons le faire intervenir dans nos expériences en nous basant sur la réflexion suivante : Si nous faisons absorber à des punaises normales des quantités suffisantes d'aminoptérine, il est peut-être possible de « tromper » l'organisme de l'insecte dans ce sens qu'il assimile l'aminoptérine à la place de l'acide folique et que l'effet de ce dernier se trouve par conséquent inactivé. Des essais en cours montrent que la réalisation pratique de cette idée n'est cependant pas facile et se heurte surtout à des difficultés de dosage.

c) *Réinfection de larves stériles avec des symbiotes de culture.*

Pour contrôler si les coccus, que nous avons réussi à isoler sur milieu de culture à partir de *Triatoma*, sont réellement identiques aux symbiotes observés microscopiquement dans l'intestin moyen de la punaise, nous avons tenté de réinfester vice versa des individus stériles au moyen de ces coccus de culture. A cet effet on a examiné plusieurs larves dans un lot élevé stérilemement à partir de l'œuf, et on a constaté microscopiquement qu'elles étaient toutes entièrement dépourvues de symbiotes. Le reste des individus de ce lot a alors été gorgé sur membrane une seule fois avec une suspension de symbiotes de culture dans du sérum stérile de cobaye. Les intestins de ces individus, examinés histologiquement trois semaines plus tard, contenaient sans exception des symbiotes en position typique. La preuve d'identité a donc pu être donnée.



Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 1. Epithélium intestinal d'une larve de *Triatoma* du 4^e stade, avant le traitement à la terramycine (symbiotes présents dans le lumen).

Fig. 2. 12 jours après le traitement (pas de symbiotes).

d) *Effet d'antibiotiques sur les symbiotes.*

On a d'abord examiné la résistance du symbiose de culture envers trois antibiotiques : la chloromycétine, l'auréomycine et la terramycine. De toutes ces substances, seule la terramycine était capable d'affecter le développement du symbiose et de le détruire sur milieu de culture.

En se basant sur ce résultat, on a alors tâché d'attaquer le symbiose en sa position naturelle dans l'intestin de *Triatoma*. On a fait gorger des punaises sur une solution de sérum de cobaye, contenant 10 mg. de terramycine par ccm. Les individus, ainsi traités et disséqués 0, 4, 8, 12, 15 et 19 jours après le repas, ne montraient à l'examen microscopique plus de symbiotes dans leur intestin moyen à partir du 12^e jour (voir Fig. 1 et 2). La terramycine nous offre donc un moyen de stérilisation interne des triatomines par un seul « repas antibiotique ». Un inconvénient pratique consiste cependant dans le fait que des punaises, ainsi stérilisées, ne le sont qu'intérieurement et non pas à la surface de leur corps et peuvent par conséquent se réinfecter à tout moment.

Bibliographie.

- Brecher, G. & Wigglesworth, V. B. (1944). The Transmission of *Actinomyces rhodnii* in *Rhodnius prolixus*. — Parasitology 35, 220.
Buchner, P. (1953). Endosymbiose der Tiere mit pflanzlichen Mikroorganismen. — Basel/Stuttgart, Birkhäuser.
Geigy, R., Halff, L. A. & Kocher, V. (1953). Untersuchungen über die physiologischen Beziehungen zwischen einem Überträger der Chagas-Krankheit

- Triatoma infestans und dessen Darmsymbionten. — Schweiz. Med. Wochenschr. 83, 928.
- Geigy, R., & Kraus, C.* (1952). Rüssel und Stechakt von *Rhodnius prolixus*. — *Acta Tropica* 9, 272.
- Grob, C. A. & Brunner, Th.* (1946). Der Vitaminbedarf des amerikanischen Reismehlkäfers *Tribolium confusum* Duval. — *Experientia* 2, Fasc. 11.
- Lwoff, M. & Nicolle, P.* (1942). Nutrition des Réduvidés hématophages I. Développement des stades larvaires de *Triatoma infestans* Klug dans les conditions habituelles d'élevage. — *Bull. Soc. Path. exot.* 35, 65.
— (1943). II. Besoins alimentaires des adultes de *Triatoma infestans* Klug dans les conditions habituelles de l'élevage. — *Bull. Soc. Path. exot.* 36, 110.
— (1943). III. Alimentation artificielle de *Triatoma infestans* Klug au moyen de sang défibriné, hémolysé. — *Bull. Soc. Path. exot.* 36, 154.
— (1944). IV. Alimentation de *Triatoma infestans* Klug à l'aide de sérum de cheval. Action du glucose. — *Bull. Soc. Path. exot.* 37, 38.
— (1946). V. Alimentation de *Triatoma infestans* Klug à l'aide de sérum vitaminé. Importance de l'acide pantothénique. — *Bull. Soc. Path. exot.* 39, 206.
— (1947). VI. Nécessité de l'hématine pour la nutrition de *Triatoma infestans* Klug. — *Bull. Soc. Path. exot.* 40, 467. C. R. Soc. Biol. 139.
- Rosenthal, H. & Reichstein, T.* (1942). Vitamin Requirement of the American Flour Beetle *Tribolium confusum* Duval. — *Nature* 150, 546
— (1945). Der Vitaminbedarf des amerikanischen Reismehlkäfers *Tribolium confusum* Duval. 2. Mitteilung. — *Zs. für Vitaminforschung* 15, 341.
- Rosenthal, H. & Grob, C. A.* (1946). Über den Vitaminbedarf des amerikanischen Reismehlkäfers *Tribolium confusum* Duval. 4. Mitteilung. — *Zs. für Vitaminforschung* 17, 27.
- Wigglesworth, V. B.* (1936). Symbiotic Bacteria in a Blood-Sucking Insect, *Rhodnius prolixus* Stål. — *Parasitology* 28, 284.
— (1952). Symbiosis in Blood-Sucking Insects. — *Tijdschrift voor Entomologie* 95.
-