Zeitschrift: Acta Tropica

**Herausgeber:** Schweizerisches Tropeninstitut (Basel)

**Band:** 20 (1963)

Heft: 3

**Artikel:** Miscellanea: Influence du mode de vie sur la composition des

protéines sériques chez les Indiens de Madras

Autor: Henrotte, J.G. / Coquelet, M.L. / Traverse, P.M. de

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-311112

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Influence du mode de vie sur la composition des protéines sériques chez les Indiens de Madras.

Par J. G. HENROTTE, M. L. COQUELET et P. M. DE TRAVERSE.

Laboratoire de Pathologie et Thérapeutique Générales, Université de Liège. Institut de Biologie Clinique, Université de Paris.

L'électrophorèse des protéines sériques a été réalisée chez 27 étudiants et 27 travailleurs pauvres de la région de Madras. Ce dernier groupe était composé de techniciens de laboratoire et garçons de bureau (sédentaires), de balayeurs et garçons de ferme (domestiques) et de débardeurs de poids lourds (coolies). Tous les sujets étaient indiens, adultes et en bonne santé.

#### Méthode.

Le sang veineux était prélevé le matin à jeun. Les électrophorèses ont été faites sur papier Whatman I, en tampon véronal — véronal sodique (pH 8,6; force ionique 0,06) pendant 16 heures à 3 volts/cm. Les fractions albumines, globulines  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  ont été déterminées par lecture photométrique et planimétrie après coloration à l'amido schwartz.

### Résultats et Discussion.

Les résultats sont indiqués dans le tableau I et comparés à d'autres données de la littérature. Le test t de Student a été utilisé pour déterminer la signification des différences entre moyennes.

Le taux des globulines est élevé comme chez tous les autochtones des pays tropicaux. Il est toutefois significativement plus haut (P < 0,001) dans le groupe des travailleurs pauvres que dans celui des étudiants. Ces résultats concordent bien avec ceux trouvés par CARR & GELFAND (1960) chez des étudiants et des manœuvres Sud-Africains. Ils confirment les conclusions de ces auteurs selon lesquelles le taux de globulines  $\gamma$  est d'autant plus haut que le statut économique du groupe examiné est plus bas. L'augmentation des globulines  $\gamma$  s'accompagne d'une diminution des albumines sans altérations notables du taux de protéines totales. En effet, les protéines sériques, déterminées lors d'un travail précédent (Henrotte et coll., 1960) chez des sujets Indiens de même âge, appartenant aux mêmes classes sociales et vivant dans les mêmes conditions, ont des valeurs très proches, de  $76,6\pm3,18$  et de  $77,6\pm2,70$  grs/L, respectivement pour un groupe de 24 étudiants et un groupe de 10 travailleurs pauvres.

L'activité physique a également une influence nette sur le protéinogramme des étudiants de notre série. Les globulines  $\alpha_2$  sont diminuées et les globulines  $\beta$  sont augmentées chez les sportifs (P < 0,02). Dans le groupe des travailleurs, les différences sont moins marquées mais il existe une corrélation suggestive entre l'intensité du travail musculaire exigé par leur métier et le taux de globulines  $\alpha_2$  et  $\beta$ . Chaque sous-groupe a la même composition et comporte le même nombre d'individus végétariens et non végétariens. Contrairement à Satoskar & Lewis (1954), nous n'avons d'ailleurs trouvé aucune différence entre les Indiens musulmans et chrétiens, dont le régime est principalement carné, et les Indous, végétariens stricts ou non végétariens occasionnels. Le régime alimentaire pourrait cependant être en rapport avec l'activité physique

Tableau I: Moyennes et écarts-types des fractions protéiniques, exprimées en % des protéines sériques totales.

Résultats significativement différents : a (P < 0,001) et b (P < 0,02). (1) Verghese et coll. (1957); (2) Carr & Gelfand (1960).

Albumines 53,29 ± 3,14 54,12 ± 2,82
a± 3,00   3,42 ± 0,91
49,03 ± 2,07 3,34 ± 0,70   48,82 ± 3,74 3,06 ± 0,81   50,36 ± 4,24 2,83 ± 0,81
3,10 ± 5,32
$53,20 \pm 3,44                                 $
$50,49 \pm 5,46$ $4,01 \pm 1,13$

qui agirait en stimulant l'appétit des sujets. La quantité, sinon la qualité de la nourriture ingérée, modifierait ainsi les proportions des protéines circulantes. L'exercice musculaire pourrait aussi exercer une action plus directe. Une influence similaire de l'activité physique sur le protéinogramme est observée par GROULADE & JACQUELINE (1961) qui trouvent dans le sérum des travailleurs manuels français des taux de lipoprotéines totales et de lipoprotéines  $\beta$ , nettement supérieurs à ceux des étudiants de la même région.

## Summary.

Serum proteins of South Indian men have been studied by paper electrophoresis. The  $\gamma$  globulin percentage is higher in workers of low economic status than in University students. In the latter group,  $\alpha_2$  globulin and  $\beta$  globulin levels are related to the physical activity of subjects. The meaning of those findings is briefly discussed.

Nous remercions le Professeur S. Subrahmanyam, Stanley Medical College, Madras, de l'aide qu'elle a bien voulu nous apporter dans ce travail.

# Bibliographie.

- CARR, W. R. & GELFAND, W. (1960). The biochemistry of the African in Southern Rhodesia. Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg. 54, 478-486.
- GROULADE, J. & JACQUELINE, F. (1961). Valeurs normales des protéines, glycoet lipo-protéines sériques selon l'âge, chez l'homme et la femme. Biotypologie (Paris) 22, 177-195.
- HENROTTE, J. G., RANGANATHAN, G. & KRISHNAMURTHI, G. (1960). Normal values of plasma potassium, cholesterol and proteins and of blood glucose in South Indian people, in reference to western standards. Experientia 16, 350.
- SATOSKAR, R. S. & LEWIS, R. A. (1954). Plasma protein pattern of Indian students. Relation to diet and previous illness. Indian J. med. Sciences 8, 663-670.
- Verghese, N., Satyanarayana, M. P., Ramakrishnan, P. N. & Kuppuswamy, K. (1957). Serum protein fraction in Lymphogranuloma Venerum. J. Lab. clin. Med. 49, 370-376.