Zeitschrift: Acta Tropica

Herausgeber: Schweizerisches Tropeninstitut (Basel)

Band: 20 (1963)

Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

TRACHOME UN SULFAMIDE

- * ACTIF A FAIBLE DOSE
- * PROCURANT UNE SULFAMIDÉMIE ÉLEVÉE ET PERSISTANTE

SULTIRENE

(7522 R.P. - Sulfaméthoxypyridazine)

- Comprimés dosés à 250 mg (flacon de 20)
- Suspension buvable (flacon de 125 ml) Une cuiller-mesure = 100 mg de principe actif.

Une seule prise hebdomadaire ou bihebdomadaire

	ADULTES	ENFANTS			
À	¥	Au-dessous de 6 ans	De 6 à 10 ans	De 10 à 13 ans	Au-dessús de 13 ans
Une fois par semaine	3 g (12 comprimés)	1,50 g (6 comprimés ou 15 cuillerées de suspension)	2 g (8 comprimés ou 20 cuillerées de suspension)	(10 comprimés)	Même posologie
Deux fois par semaine	1,50 g (6 comprimés)	0,75 g (3 comprimés ou 7 cuillerées de suspension)	1 g (4 comprimés ou 10 cuillerées de suspension)	(5 comprimés)	que chez l'adulte
	Assurer une diurèse abondante pendant la durée du traitement				

ANTIBIOTHÉRAPIE LOCALE: ROVAMYCINE SPECIA POMMADE

SOCIÉTÉ PARISIENNE



RHÔNE

D'EXPANSION CHIMIQUE

POULENC

Information Médicale: 28, Cours Albert-1er - PARIS-8e - B. P. 490-08 - BAL. 10-70

Printed in Switzerland

Druck von Friedrich Reinhardt AG., Basel