

Zeitschrift: Acta Tropica
Herausgeber: Schweizerisches Tropeninstitut (Basel)
Band: 33 (1976)
Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

le traitement moderne de l'amibiase

FLAGYL

(métronidazole - 8823 R.P.)

amœbicide diffusible, et de contact,
d'action rapide et puissante par voie buccale,
sans contre-indications.

dyserterie amibienne
▼
amibiase hépatique

une proportion étonnante
de guérisons cliniques,
rectoscopiques
et parasitologiques

une efficacité pratiquement
constante à bref délai.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

● Doses journalières :

- Adultes : 1.50 g (sciz 6 comprimés) / en 3 ou 4 prises
- Enfants : 40 mg par kg de poids

● Durée du traitement :

5 à 7 jours consécutifs, quelle que soit la localisation clinique.

● **N.B.** : Le traitement par le Flagyl de l'amibiase hépatique à la phase suppurative doit évidemment être effectué conjointement à l'évacuation du pus de l'abcès ou des abcès.

PRÉSENTATIONS

Comprimés dosés à 250 mg (flacons de 20)

Suspension buvable dosée à 4 p. 100 de benzoyl-métronidazole (flacons de 120 ml). 1 cuillerée à café contient l'équivalent de 125 mg de métronidazole.



SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE - S.P.E.C.I.A. - S.A.

CAPITAL 18.400.000 FRANCS - R.C. PARIS B 562.071.878

SIÈGE SOCIAL : 21, RUE JEAN-GOUJON 75008 PARIS

DÉPARTEMENT PATHOLOGIE TROPICALE ET PARASITAIRE :

16, RUE CLISSON, 75646 PARIS CEDEX 13 - TÉL. (1) 584.11.33

annonces et Publicité - Paris