Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 42 (1916)

Artikel: Résumé météorologique de l'année 1915 pour Genève et le Grand

Saint-Bernard

Autor: Gautier, Raoul

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-743288

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

RÉSUMÉ MÉTÉOROLOGIQUE

DE L'ANNÉE 1915

POUR

GENÈVE ET LE GRAND SAINT-BERNARD

PAR

Raoul GAUTIER

Directeur de l'Observatoire de Genève

I. Introduction

L'année 1915 a été, dans l'ensemble, assez semblable à ses trois devancières dans ses caractères météorologiques principaux. Elle a cependant été meilleure au point de vue de la température: les mois de mai et de juin ont été beaux et chauds, et toutes les récoltes en ont bénéficié, quoique les mois d'été et d'automne aient tous été, après juin, plus froids que la moyenne. Si l'on entre dans le détail, on trouve beaucoup de différences avec 1914, mais ces deux années, comme d'ailleurs 1913 et 1912, ont eu en commun un été peu chaud. L'hiver 1914-1915 a été chaud, beaucoup plus chaud que le précédent, et il en résulte une faible amplitude annuelle.

Au point de vue de l'humidité, l'année a été pluvieuse, surtout en hiver, et elle dépasse comme quantité d'eau tombée ses trois devancières, sans cependant atteindre au total anormal de 1910. C'est cependant une année très pluvieuse, l'année météorologique plus que l'année civile, à cause de la chute totale d'eau de décembre 1914. Moins nuageuse en moyenne que 1914, 1915 fournit cependant un nombre faible d'heures d'insolation, parce que les mois d'été ont été, relativement, très nuageux.

On trouvera d'ailleurs tous les caractères climatologiques de l'année résumés dans les pages et les tableaux suivants.

Il n'y a rien à signaler de nouveau cette année, ni dans la publication des tableaux météorologiques mensuels, ni dans celle du résumé annuel. Tous les tableaux de celui-ci contiennent treize mois, de décembre 1914 à décembre 1915, afin que les moyennes annuelles correspondent à la fois à l'année météorologique et à l'année civile. Seul le tableau V, fournissant les températures de cinq en cinq jours à Genève, n'est établi que pour l'année civile.

L'ordre des matières traitées dans ce résumé reste le même que dans ceux qui l'ont précédé. Après quelques indications de portée générale, les différents éléments météorologiques sont passés en revue dans l'ordre accoutumé: température, pression atmosphérique, humidité de l'air, vent, pluie et neige, nébulosité et durée d'insolation, cette dernière pour Genève seulement.

A l'Observatoire de Genève, les observations météorologiques directes se font toujours de trois en trois heures, à partir de 7 h. du matin et jusqu'à 10 h. du soir. Les instruments enregistreurs fournissent en outre les valeurs de la plupart des éléments météorologiques à 1 h. et à 4 h. du matin. Les moyennes diurnes de ces éléments-là reposent donc sur huit observations trihoraires. L'observation supplémentaire de 9 h. du soir a été utilisée, avec celles de 7 h. du matin et de 1 h. du soir, pour obtenir des moyennes spéciales de la température qui soient directement comparables à celles du Grand Saint-Bernard, où les observations ne se font plus qu'à ces trois heures-là depuis 1902, comme dans toutes les autres stations de la Suisse.

Les valeurs normales des différents éléments météorologiques sont empruntées pour Genève, aux « Nouvelles études sur le climat de Genève », d'Émile Plantamour, où étaient utilisées toutes les observations faites de 1826 à 1875. Pour le Grand Saint-Bernard, les valeurs normales sont fournies par les moyennes des 27 années, 1841-1867, calculées aussi par Plantamour.

Les tableaux mensuels des observations météorologiques faites à l'observatoire de Genève et au Grand Saint-Bernard et publiés dans les *Archives* sont établis chaque mois à l'observa-

toire par M. Jules Marmet; les tableaux de ce résumé-ci ont été préparés par M. Ernest Rod.

Les observations ont toutes été faites à l'HEURE LOCALE, seule indiquée. Pour la transformer en temps moyen de l'Europe centrale, il faut ajouter 35 minutes aux instants des observations de Genève et 30 minutes pour le Grand Saint-Bernard.

II. TEMPÉRATURE

Les résultats généraux des observations thermométriques sont consignés dans dix tableaux de chiffres groupes sous cinq rubriques différentes :

1º Moyennes générales de la température — Écarts

Le tableau I fournit, pour Genève, toutes les valeurs moyennes des températures, de trois en trois heures à partir de 1 h. du matin, puis les températures moyennes des mois, des saisons et de l'année (météorologique et civile), moyennes des huit moyennes trihoraires, enfin les minima et les maxima moyens. Les températures des heures de nuit, 1 h et 4 h. du matin, ont été relevées, comme précédemment, sur les diagrammes du thermographe Richard, grand modèle, qui a bien fonctionné toute l'année.

Le tableau II pour Genève et le tableau III pour le Grand Saint-Bernard donnent les valeurs moyennes des températures des différentes périodes pour les trois observations de 7 h. du matin, 1 h. et 9 h. du soir, puis les températures moyennes des mêmes périodes calculées sur les deux formules employées par l'Institut central météorologique suisse: a) en prenant la moyenne arithmétique des trois températures moyennes diurnes; b) en attribuant un poids double à l'observation de 9 h. du soir. Ce sont, du reste, ces dernières moyennes qui ont servi pour la comparaison des deux stations. Le tableau III contient en outre les minima et les maxima moyens pour la station du Grand Saint-Bernard.

Le tableau IV donne les écarts entre les températures moyennes des différentes périodes et les valeurs normales. Pour

I. Température. GENÈVE, 1915.

я			22
Maximum moyen	+ 8.36 - 8.36 - 5.09 - 8.76 - 8.76 - 8.76 - 8.36 - 8.36	6.03 13.92 23.50 11.84	13.87 13.96
Minimum moyen	+ 1.17 - 3.95 - 2.12 + 0.31 3.00 10.56 13.15 12.59 10.91 7.73 4.19 0.31 +3.40	- 1.62 + 4.64 12.21 4.08	4.86
Tempé- rature moyenne	, 1.78 1.50 4.44 7.83 15.36 18.17 18.04 17.02 12.96 8.01 3.18	2.68 9.23 17.74 8.05	9.46 9.60
10 h. s.	+ 3.82 1.62 1.37 3.99 7.39 14.91 17.19 17.03 16.28 11.97 7.17 7.17 5.64	2.30 8.78 16.83 7.29	8.84 8.99
7 h. s.	+ 4.4 225 225 225 9.48 16.88 19.99 19.99 19.37 19.31 8.83 8.83 6.34	2.99 10.59 19.46 8.89	10.53 10.69
4 h. s.	+ 5.78 + 3.11 3.45 7.14 11.36 18.74 21.48 22.11 21.68 10.35 4.51	4.14 12.42 21.76 10.45	12.24 12.39
I h. s.	\$\circ\$ 6.98 \\ 3.35 \\ 3.35 \\ 3.83 \\ 7.21 \\ 10.63 \\ 21.99 \\ 20.99 \\ 16.35 \\ 10.68 \\ 5.10 \\ 8.06 \\ 8.06 \\ 8.06 \\ \end{array}\$	4.75 12.11 21.61 10.71	12.34 12.43
10 h. m.	+ 4.97 1.63 1.55 5.08 8.83 16.35 19.71 19.36 18.53 14.37 8.97 8.97	2.75 10.10 19.20 8.93	$10.29 \\ 10.41$
7 h. m	+ 8.34 + 0.45 - 0.35 + 2.33 + 2.33 13.73 16.33 16.33 10.45 5.25	1.20 7.35 15.98 6.27	7.74
4 h. m.	+ 3.84 + 0.65 - 0.23 + 1.85 + 1.85 13.70 13.30 11.75 9.31 5.81	1.48 5.79 12.91 5.63	6.48
l h.m.	+ 3.89 1.20 0.21 2.58 4.91 15.05 14.36 13.21 10.42 6.05 5.22	1.82 6.67 14.20 6.23	7.26 7.38
PÉRIODE	Déc. 1914. Janv. 1915 Février Mars Avril Juint Septembre Octobre Novembre Décembre.	Hiver Printemps Été Automne .	Année mét. » civile

II. TEMPÉRATURE. GENÈVE, 1915.

				Tempéra	t. moyenne
PÉRIODE	7 h. m.	1 h. s.	9 h. s.	7+1+9	7+1+2×9
	13			3	4
Décembre 1914	+ 3.34	+ 6.98	1 1 06		+ 4.61
Janvier 1915	+ 0.45	3.35	+4.06 1.90	1.90	1.90
Février	- 0.35	3.83	1.72	1.73	1.73
Mars	+ 2.33	7.21	4.51	4.68	4.64
Avril	5.94	10.63	8.14	8.24	8.21
Mai Juin	$13.73 \\ 16.90$	$18.44 \\ 21.99$	$15.55 \\ 17.87$	15.91 18.92	15.82 18.66
Juillet	16.33	21.85	17.87	18.68	18.48
Août	14.73	20.99	17.01	17.58	17.43
Septembre	10.45	16.35	12.89	13.23	13.14
Octobre	6.25	10.68	7.75	8.23	8.11
Novembre,	2.12	5.10	2.98	3.40	3.29
Décembre	5.23	8.06	5.84	6.38	6.24
Hiver	1.20	4.75	2.59	2.85	2.78
Printemps	7.35	12.11	9.41	9.62	9.57
Eté	15.98	21.61	17.60	18.40	18.20
Automne	6.27	10.71	7.87	8.28	8.18
			1		
Année météorolog	7.74	12.34	9.41	9.83	, 9.72
» civile	7.90	12.43	9.56	9.96	9.86
				81	

III. — TEMPÉRATURE. SAINT-BERNARD, 1915.

PÉRIODE	7. h. m. 1 h. s.	9 h. s.	$\begin{array}{ c c c c c c }\hline \textbf{Températ. moyenne} \\\hline \hline \hline 7+1+9 & 7+1+2\times 9 \\\hline 3 & 4 \\\hline \end{array}$	Minimum Maximu moyen moyen
Déc. 1914. Janv. 1915 Février Mars Avril Juin Juillet Aoùt Septembre Octobre . Novembre Décembre	$ \begin{vmatrix} -12.04 & -10.09 \\ -11.25 & -8.82 \\ -8.39 & -4.89 \\ -6.29 & -2.99 \\ +1.74 & +5.01 \\ 4.05 & 6.90 \\ 4.89 & 8.24 \\ 4.12 & 8.61 \end{vmatrix} $	-11.93 -11 20 - 7 90 - 5.30 + 2.19 4 46 5.96 4.95 + 2 12 - 3.46 - 8.11	$ \begin{vmatrix} -10.42 & -10.62 \\ -7.06 & -7.27 \\ -4.86 & -4.97 \\ +2.98 & +2.78 \\ 5.14 & 4.97 \\ 6.36 & 6.26 \\ 5.89 & 5.66 \\ +2.72 & +2.57 \\ -3.06 & -3.16 \\ -7.37 & -7.55 \end{vmatrix} $	$ \begin{vmatrix} -9.4 & -5.1 \\ -144 & -93 \\ -12.8 & -8.2 \\ -9.7 & -4.1 \\ -7.2 & -2.0 \\ +0.9 & +5.9 \\ 3.3 & 8.2 \\ 3.6 & 9.9 \\ 3.2 & 9.5 \\ +0.4 & +5.8 \\ -5.3 & -03 \\ -10.6 & -4.7 \\ -7.4 & -2.6 \end{vmatrix} $
Printemps Été Automne .	- 3.75 - 0.83 - 3 48 - 0.53	- 3.65 + 5.13 - 3.15		$ \begin{vmatrix} -12.20 & -7 & 52 \\ -5.33 & -0 & 03 \\ +3.40 & +9.20 \\ -5 & 18 & +0.22 \end{vmatrix} $ $ \begin{vmatrix} -4.79 & +0.51 \\ -4.62 & +0.73 \end{vmatrix} $

IV. ÉCARTS AVEC LES TEMPÉRATURES NORMALES, 1915.

PÉRIODE	Moyenne des 8 obs.	$\underbrace{\frac{2}{7+1+2\times 9}}_{4}$	Grand St-Bernard $\frac{7+1+2 \setminus 9}{4}$	Différence entre les deux stations
Décembre 1914 Janvier 1915 Février. Mars. Avril Mai. Juin Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre Décembre.	+ 3.83	+ 3.81	+ 0.17	+ 3.64
	+ 1.86	+ 1.98	- 2.46	+ 4.44
	- 0.10	+ 0.13	- 2.01	+ 2.14
	- 0.16	+ 0.04	+ 0.05	- 0.01
	- 1.14	- 0.76	- 1.70	+ 0.94
	+ 2.16	+ 2.62	+ 2.27	+ 0.35
	+ 1.36	+ 1.85	+ 0.88	+ 0.97
	- 0.77	- 0.33	+ 0.10	- 0.43
	- 0.89	- 0.48	- 0.32	- 0.16
	- 1.70	- 1.52	- 0.75	- 0.77
	- 1.87	- 1.77	- 2.68	+ 0.91
	- 1.37	- 1.26	- 2.25	+ 0.99
	+ 5.46	+ 5.44	+ 2.53	+ 2.91
Hiver	+ 1.93	+ 2.03	$\begin{array}{c c} -1.41 \\ +0.22 \\ +0.23 \\ -1.90 \end{array}$	+ 3.44
Printemps	+ 0.31	+ 0.65		+ 0.43
Eté	- 0.11	+ 0.35		+ 0.13
Automne	- 1.65	- 1.52		+ 0.38
Année météorol . » civile	+ 0.11 + 0.25	+ 0.37 + 0.51	- 0.71 - 0.51	+ 1.08 + 1.02

Genève, il y a deux séries d'écarts, correspondant l'une aux températures du tableau I et l'autre à celles du tableau II calculées sur la deuxième formule. La dernière colonne du tableau IV donne la différence entre les écarts de Genève et ceux du Grand Saint-Bernard, écarts correspondant aux températures calculées d'après cette même formule.

Comme je le disais au début, 1915 a été moins froid, dans l'ensemble, à Genève, que 1914. La température moyenne annuelle est même un peu supérieure à la normale (9°,35) tandis que 1914 était un peu plus froide. L'année civile est encore un peu plus chaude que l'année météorologique, à cause du très chaud mois de décembre 1915, plus chaud que celui de 1914, qui était déjà sensiblement trop chaud. La différence entre les deux années consécutives vient partiellement de ce que 1914 a eu un janvier froid et 1915 un janvier chaud. Pour les autres mois il y a analogie pour juillet, août et obtobre, tous froids; divergence pour février, mars, avril et septembre trop chauds en 1914 et trop froids en 1915; puis divergence encore pour

mai et juin, trop froids en 1914 et trop chauds en 1915, ce qui a amené un beaucoup meilleur rendement des récoltes en 1915 qu'en 1914.

Au Grand Saint-Bernard, la température moyenne annuelle est inférieure de —0°,7 à la moyenne et de —1°,1 par rapport à celle de Genève. Il y a de légères différences pour quelques mois du printemps, de l'été et de l'automne, entre les deux stations: mars et juillet ont été un peu trop chauds. Mais la différence essentielle est en hiver qui est, absolument et relativement, beaucoup plus froid à la montagne. Cela vient du fait, reconnu pour la première fois en 1886 par notre concitoyen, le P. Marc Dechevrens, que, dans un régime de dépressions, ou cyclones successifs, la diminution de la température avec la hauteur est beaucoup plus rapide que dans un régime de hautes pressions ou d'anticyclones. Or, l'hiver de 1914-1915 a été riche en basses pressions, au Saint-Bernard comme à Genève, et les anomalies thermiques sont généralement inverses aux deux stations.

L'amplitude annuelle est faible cette année à Genève; elle se calcule d'ailleurs sur les températures des mois de juin et de février, ce qui est anormal; elle est de 16°,67 seulement. Au Grand Saint-Bernard elle se calcule, normalement, sur les températures de juillet et de janvier; elle est de 17°,76, supérieure de plus de 2 degrés à la moyenne, tandis qu'à Genève elle est inférieure de la même quantité à la moyenne de juillet moins janvier.

2º Température de cinq en cinq jours à Genève

Le tableau V fournit les températures moyennes par pentades et, comme précédemment, pour l'année civile seule, du 1^{er} janvier au 31 décembre 1915. A côté des températures figure l'écart avec les températures calculées d'après la formule déduite par Plantamour de l'étude des cinquante années de 1826 à 1875. Lorsque l'écart observé dépasse la limite de l'écart probable calculé et constitue ainsi une anomalie, le chiffre de l'écart est mis entre parenthèses dans le tableau.

Sur les 73 pentades de l'année, il y en a 34 qui présentent un

V. Température de 5 en 5 jours. GENÈVE, 1915.

Date	Tempé- rature moyen.	Diffé- rence avec la nor- male	Date	Tempé- rature moyen.	Diffé- rence avec la nor- male
1-5 Janvier 6-10 id. 11-15 id. 16-20 id. 21-25 id. 26-30 id.	†3.99 5 72 4.43 †0.38 -0.45 -2.32	(+4.25) (+6.04) (+4.73) +0.58 -0.42 (-2.53)	30-4 Juillet 5-9 id. 10-14 id. 15-19 id. 20-24 id. 25-29 id.	+15.93 21.36 18.00 16.42 18.84 17.54	(-2.35) (+2.82) -0.73 (-2.43) -0.06 -1.33
31-4 Février 5-9 id. 10-14 id. 15-19 id. 20-24 id. 25-1 Mars	-1.62 +1 29 2.53 3.22 1.87 1.25	-2.13 +0.42 +1.25 +1.48 -0.36 -1.51	30-3 Août 4-8 id. 9-13 id. 14-18 id. 19-23 id. 24-28 id.	16.32 17.44 20.09 16.30 14.83 17.53	(-2.45) -1.15 (+1.74) (-1.73) (-2.82) +0.32
2-6 Mars 7-11 id. 12-16 id. 17-21 id. 22-26 id. 27-31 id.		+0.72 (-2.81) -0.50 +0.10 (+1.98) (-1.80)	29-2 Septemb. 3-7 id. 8-12 id. 13-17 id. 18-22 id. 23-27 id.	14.58 10.80 12.70 14.80 14.95 13.81	(-2.12) (-5 33) (-2.82) -0.05 +0.82 +0.44
1-5 Avril 6-10 id. 11-15 id. 16-20 id. 21-25 id. 26-30 id.	5.71 6.17 5.10 9.53 7.98 12.52	-1.39 -1.62 (-3.39) +0.34 (-1.93) (+1.89)	28-2 Octobre 3-7 id. 8-12 id. 13-17 id. 18-22 id. 23-27 id.	8.63 8.68 9 08 10.14 7.95 6.76	(-3 94) (-3.06) (-1.80) +0.14 -1.16 -1.45
1-5 Mai 6-10 id. 11-15 id. 16-20 id. 21-25 id. 26-30 id.	$ \begin{array}{c c} 15.65 \\ 14.38 \\ 12.72 \\ 17.07 \end{array} $	(†3.64) (†3.58) +1.60 -0.77 (†2.90) (†2.65)	28-1 Novemb. 2-6 id. 7-11 id. 12-16 id. 17-21 id. 22-26 id.	5.87 6.80 7.26 + 4.23 - 0.38 + 0.78	-1.45 +0.36 +1.69 -0.51 (-4.33) (-2.42)
31-4 Juin 5-9 id. 10-14 id. 15-19 id. 20-24 id. 25-29 id.		+0 99 (+4.26) (+4.01) +1.21 -1.15 -0.88	27-1 Décemb. 2-6 id. 7-11 id. 12-16 id. 17-21 id. 22-26 id. 27-31 id.		(-2.36) (+10.26) (+10.95) -0.01 +0.61 (+5.75) (+5.22)

écart de température positif et 39 qui présentent un écart négatif. Les premières se rencontrent surtout dans les mois de janvier et février, puis mai et juin et décembre; les autres en mars et avril, puis de juillet à novembre. Si l'on se borne aux 36 pentades dont l'écart de température dépasse la limite probable, il y a 17 écarts positifs et 19 négatifs, répartis d'ailleurs de la même façon; seulement les premiers sont un peu moins nombreux, mais plus forts, ce qui fait que l'année dépasse, en somme, d'une petite quantité la température moyenne.

La plus longue période de chaleur relative ne comprend, cette année, que six pentades, allant du 21 mai au 19 juin. La plus longue période de froid relatif a la même longueur et va du 10 juillet au 8 août.

La pentade la plus froide, absolument parlant, est la 6°, du 26 au 30 janvier, avec — 2°,32 et un écart de — 2°,53. Au point de vue relatif, la plus froide est la 50°, du 3 au 7 septembre avec 10°,80 et un écart de — 5°,33.

La pentade la plus chaude, au point de vue absolu, est la 38°, du 5 au 9 juillet, avec 21° ,36 et un écart de $+2^{\circ}$,82. Les plus chaudes, au point de vue relatif, sont, comme en 1914, les 68° et 69°, du 2 au 11 décembre, avec 12° ,14 et 12° ,27 et les écarts énormes de $+10^{\circ}$,26 et de $+10^{\circ}$,95.

Les plus forts mouvements de température ont eu lieu en décembre: la plus forte hausse, de la 67° à la 68° pentade, du 1° au 2 décembre, avec + 11°,99; et la plus forte baisse, de la 69° à la 70°, du 11 au 12 décembre, avec — 11°,44.

3° Moyennes diurnes — Anomalies

Le tableau VI fournit la classification des jours de l'année, à Genève, suivant leur température moyenne et conformément à la terminologie introduite par Plantamour. Il n'y a eu qu'un jour très froid, et encore ne dépasse-t-il — 5° que de — 0°,06. Il n'y a eu d'ailleurs que 28 jours à température moyenne audessous de zéro. Il n'y a pas eu de jour très chaud, avec température dépassant 25°, pas plus qu'en 1910 et de 1912 à 1914. Le plus chaud dépasse seulement de peu 23°.

Le tableau VII fournit une classification analogue pour le

VI. Classement des températures diurnes. — GENÈVE, 1915.

	Jour le plus chaud	+ 13.30 le 8 8.21 le 16 5.50 le 18 10.19 le 24 14.37 le 30 18.76 le 26 21.67 le 13 23.10 le 7 21.70 le 11 16.76 le 15 11.85 le 13 9.84 le 9	23.10 le 7 juillet id.
	Jour le plus froid	1.49 le 31 - 5.06 le 20 - 3.36 le 20 - 1.73 le 10 + 3.96 le 10 13.91 le 1 12.18 le 31 7.99 le 30 + 3.54 le 28 - 4.60 le 28 - 3.79 le 15	- 5.06 le 20 janvier id.
	très chauds + 25 + 30 + 30		
	chauds 15 + 20 15 + 20 10 + 25		19
SS	cha + 15 + 20		88 88
NOMBRE DE JOURS	tempérés $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}$	2	58 66
IBRE D	tem] + 5 + 10 + 10	112.645 425.	87
NON	froids $ \begin{array}{c c} & \circ \\ & 5 \\ & & 0 \\ & + & 5 \\ & & 5 \end{array} $	16 17 17 17 18 18 18 18 17 17 17	81 77
	fred - 5 0	NOLN LN	27
	très froids $ \begin{array}{c c} & \circ \\ & 15 \\ & 3 \\ & 10 \\ & 10 \end{array} $		
	$\frac{\text{très}}{-15}$		-
	PÉRIODE	Décembre 1914. Janvier 1915. Février. Mars Avril. Mai Juin Juillet Septembre Octobre. Novembre Décembre.	Année météorol Année civile

2.	· · · · ·	le plus chaud	+ 0.7 le 1 2.1 le 14 - 2.2 le 14 1.0 le 30 6.6 le 25 10.5 le 13 10.5 le 13 12.6 le 9 9.9 le 19 1.4 le 11 1.4 le 11	12.6 le 9 août id.
SAINT-BERNARD, 1915.	***************************************	le plus froid	- 14.0 le 23 - 19.9 le 19 - 16.4 le 26 - 17.1 le 10 - 11.1 le 12 - 0.6 le 19 - 0.4 le 1 - 1.0 le 30 - 4.0 le 30 - 6.9 le 1 - 17.0 le 27 - 14.3 le 14	-19.9 le 19 janv. id.
SAIN	entre	+ 10 + 15 + 15		66
TES.	de jours dont la température est comprise entre	+ 5 et + 10	9 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.9
DES TEMPÉRATURES DIURNES.	ire est c	0 et + 5	8 - 487 - 484 - 4	83
ATURES	mpératu	et 0		81 86
EMPÉR.	nt la te	- 10 et		73
DES T	onrs do	$\begin{vmatrix} - & 0 & 0 \\ - & 15 & 0 \\ - & 10 & 0 \end{vmatrix}$	≈ 11 1 ∞ 4	50 46
CLASSEMENT	100000	$\begin{vmatrix} - & 0 \\ -20 \\ \text{et} \\ -15 \end{vmatrix}$	1,50,00	===
CLASSI	Nombre	- 25 et - 20		11.
VII.	حا	PERIODE	Décembre 1914 Janvier 1915	Année météorologique. » civile

Grand Saint-Bernard. La longue série de jours dont la température moyenne diurne reste au-dessous de zéro s'étend, avec quatre interruptions très faibles d'un jour seulement, en octobre, novembre et décembre 1914, du 14 octobre 1914 au 29 avril 1915. D'autre part, la température moyenne diurne est restée constamment au-dessus de zéro du 30 avril au 2 septembre, avec exception de trois jours seulement en mai, juillet et août.

Il n'y a pas eu de jour à température extrêmement froide au Saint-Bernard, soit au-dessous de — 20°, pas plus qu'en 1914 et que les quatre années précédentes. Il faut remonter pour cela au 24 février 1909. Mais le jour le plus froid de 1915 atteint presque cette limite de — 20° et est plus froid que les jours extrêmes des cinq années antérieures.

Ces deux tableaux fournissent, en outre, pour chaque mois et pour l'année, les dates des jours les plus froids et les plus chauds. L'écart entre les températures diurnes extrêmes est seulement de 28°,16 à Genève et de 32°,5 au Saint-Bernard. Ce dernier chiffre est le même qu'en 1914.

L'anomalie résultant de ce qu'il fait plus chaud dans la station de montagne que dans celle de plaine ne s'est présentée qu'une fois dans l'année météorologique et civile, le 23 novembre, pendant un jour de brouillard dans la plaine; il a failli en être de même le 4 février, toujours par le brouillard à Genève.

4° Températures extrêmes

Les tableaux VIII et IX fournissent, pour les deux stations, les températures extrêmes indiquées par les thermomètres à minimum et à maximum. A Genève, le minimum absolu est plus bas que de 1910 à 1914, mais toujours moins bas que le minimum moyen des cinquante années de 1826 à 1875 (— 13°,3). Le maximum absolu est aussi inférieur aux maximum absolu moyen (32°,5). Grâce à ces faits, l'oscillation totale de la température, 40°,7, reste inférieure à l'oscillation moyenne (45°,8). Au Grand Saint-Bernard, l'oscillation extrême est de 40°,1 un peu supérieure à celles de 1910 à 1914.

VIII. TEMPÉRATURES EXTRÊMES. GENÈVE, 1915.

	Minimum	Maximum		de jours
PÉRIODE	absolu Date	absolu Date	Minimum au-dessous de 0°	Maximum au-dessous de 0°
Déc. 1914 Janvier 1915 Février Mars Avril Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre	- 4.0 le 31 - 11.3 le 31 - 7.8 le 27 - 4.8 le 10 - 2.0 le 13 † 7.0 le 1 9.2 le 30 8.0 les 49 et 20 5.5 le 31 + 2.2 le 30 - 3.2 le 28 - 7 6 le 29 - 7.0 le 15	+ 17.8 le 7 11.8 le 14 10.8 le 18 18.5 le 23 20.8 le 30 26.0 le 26 28.7 le 9 29.4 le 5 29.0 le 11 22.6 le 15 16.0 le 13 14.0 le 9 17.6 le 6	12 16 20 14 3 — — — — 2 13 9	- 5 1 - - - - - - 2 1
Année mét » civile	- 11.3 le 31 janvier id.	29.4 le 5 juillet id.	80	8 9

IX. TEMPÉRATURES EXTRÊMES. SAINT-BERNARD, 1915.

PÉRIODE	Minimum Date absolu Date	Maximum Date absolu	Nombre de jours Minimum au-dessous de 0° Maximum au-dessous de 0°
Déc. 1914 Janvier 1915. Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre	- 15.8 le 23 - 23 8 le 19 - 17.7 le 27 - 18.3 le 10 - 15.3 le 12 - 2.0 les 4 et 20 - 0.2 le 30 - 2.1 le 1 - 2.6 le 31 - 6.8 le 30 - 9.5 le 31 - 19.5 le 27 - 18.6 le 14	+ 2.5 les 4 et 7 - 1 0 le 14 - 1.5 le 4 + 1.4 le 17 5.3 le 30 11 3 le 25 15.8 le 13 16.0 le 5 16.3 le 9 13.2 le 19 4.7 le 10 3.8 le 8 4.0 le 11	31 26 31 31 28 28 31 28 30 23 10 — 1 3 4 — 14 4 30 25 30 21
Année mét » civile	- 23 8 le 19 janvier id.	16.3 le 9 août id.	243 182 242 177

Ces tableaux fournissent en outre, pour les deux stations, les nombres de jours de gelée, où le minimum est descendu audessous de zéro, et de jours de non-dégel, où le maximum est resté au-dessous de zéro. A Genève, ces nombres sont de nouveau bien inférieurs aux nombres moyens des 50 années de 1826 à 1875 (91 et 21).

La dernière gelée blanche à glace du printemps à Genève a eu lieu le 16 avril. La première gelée blanche à glace de l'automne a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 octobre.

Au Grand Saint-Bernard, le petit lac près de l'hospice a été complètement dégelé le 7 juillet, un mois plus tôt qu'en 1914, et s'est congelé à nouveau le 30 octobre.

5° Température du Rhône

Le tableau X fournit les documents habituels sur la température du Rhône prise, comme antérieurement, vers midi, à la sortie du lac sous le pont des Bergues, à une profondeur d'un mètre au-dessous de la surface.

X. — Température d	u Rhône.	1915.
--------------------	----------	-------

PÉRIODE	Moyenne	Écarts avec la normale	Minimum	Maximum	Différence entre la température de l'eau et celle de l'air
Décembre 1914 Janvier 1915. Février Mars Avril Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre	5.89 4 95 5.76 7.83 13.17 18.76 15 10 17.99 15.22 12.40	+ 0.68 + 0.78 - 0.01 - 0.36 - 0.95 + 1.42 + 3.42 - 2.99 - 0.66 - 1.85 - 1.58 - 1.44 + 0.22	6.3 les 26 el 34 4.5 le 30 4.5 le 2 3.2 le 10 6.54,6,8,40,42 8.0 le 4 13.0 le 30 11.5 le 14 10.7 le 5 8.0 les 28 el 29 11.0 le 27 5.8 le 19 6.0 27, 30 et 31	7.0 le 2 5.5 le 16 7.0 le 26 10.5 le 30 17.3 le 29 22.0 le 14 18.5 le 6 20.5 le 12 17.7 le 1 13.2 les 43 et 45 11.2 le 1	+ 4.11 + 3.45 + 1.32 0.00 - 2.19 + 0.59 - 2.94 + 0.97 + 2.26
Année météor. Année civile .	Ann Ann	- 0 24 - 0.28	3.2 le 10 mars id.	22.0 le 14 juin id.	+ 1.64 + 1.46

III. Pression atmosphérique

Genève. — Comme je l'ai déjà indiqué dans le résumé de l'année 1903, le baromètre de Fuess nº 1492/57, qui sert de baromètre normal depuis 1902, a été vérifié le 30 janvier 1904, et sa correction, par rapport au baromètre normal de l'Institut météorologique de Zurich, est de + 0^{mm},21. Cette correction a été vérifiée au cours du mois de septembre 1915 et trouvée presqu'identique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de changer la tabelle des corrections. L'altitude du zéro de l'échelle est de 404^m,96, la même que pour l'ancien baromètre de Noblet, en admettant 373^m,60 pour la cote absolue du repère de la pierre du Niton.

Les six observations diurnes, de 7 h. du matin à 10 h. du soir, se font directement au baromètre de Fuess. Les indications pour les deux observations nocturnes de 1 h. et de 4 h. du matin; ainsi que les valeurs des minima et des maxima, sont relevées sur les diagrammes du barographe à enregistrement continu de Redier.

La moyenne des huit observations trihoraires donne la moyenne diurne de la pression atmosphérique. Les moyennes mensuelles et annuelles sont directement déduites de ces moyennes diurnes.

Grand Saint-Bernard. — Depuis 1904, les trois observations directes diurnes sont faites au nouveau baromètre de Fuess, n° 1570/100, installé à l'hospice le 5 octobre 1903, à côté de l'ancien baromètre de Gourdon. La correction de ce baromètre, par rapport au baromètre normal de l'Institut météorologique de Zurich, est de +0^{mm},75. Son altitude, résultant du nouveau nivellement de précision exécuté en 1906, est de 2475^m,8. — Les valeurs des minima et des maxima de la pression n'ont plus été relevées sur les diagrammes du barographe horaire de Hottinger, décrit dans le résumé de 1884, mais sur ceux d'un nouveau barographe de Richard, de grandeur moyenne (2^{mm} pour 1^{mm} de mercure) qui a été installé à l'Hospice au mois de novembre 1914.

1º Moyennes générales — Variation diurne — Écarts

Le tableau XI donne, pour Genève, les valeurs moyennes de la pression atmosphérique pour les treize mois, les saisons et l'année, météorologique et civile; il donne en outre, pour toutes ces périodes, la variation diurne exprimée par les différences entre les moyennes générales et les moyennes des huit observations trihoraires.

Le tableau XII fournit les indications analogues pour le Grand Saint-Bernard, mais la variation diurne n'est plus exprimée qu'assez incomplètement par la différence entre les moyennes générales et les moyennes des trois observations diurnes.

Le tableau XIII donne les résultats de la comparaison entre les moyennes mensuelles et annuelles et les valeurs normales déduites par Plantamour des années de 1836 à 1875 pour Genève et des années de 1841 à 1867 pour le Grand-Saint-Bernard.

Cette année, contrairement à ce que nous constations en 1914, la moyenne annuelle est inférieure à la normale aux deux stations, mais plus pour Genève que pour le Saint-Bernard. L'hiver, et surtout janvier, accuse des pressions très basses aux deux altitudes mais encore plus à Genève qu'au Saint-Bernard, à cause du régime persistant de dépressions barométriques successives. Il n'y a d'ailleurs que deux mois qui présentent, à Genève, une pression moyenne supérieure à la normale; il y en a cinq au Saint-Bernard. Les plus forts écarts négatifs sont donc en janvier, les écarts positifs les moins faibles sont en avril à Genève, en mai au Saint-Bernard.

Le maximum de discordance entre les deux stations, dans le sens d'une plus forte pression relative à la montagne se rencontre en mai et, dans le sens d'une plus forte pression à Genève, en octobre.

2° Valeurs extrêmes de la pression atmosphérique

Les tableaux XIV et XV donnent les minima et les maxima absolus pour les treize mois et pour l'année aux deux stations.

XI. Pression atmosphérique. — GENÈVE, 1915.

PÉRIODE	Hanteur moyenne	1 h. m.	4 h. m.	7 h. m.	10 h. m.	l h. s.	4 h. s.	7 h. s.	10 h. s.
Décembre 1914 Janvier 1915 Février Mari Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre	mm 725.03 720.06 723.14 724.50 725.93 725.93 725.06 726.54 727.94 727.94 727.94 727.94	+ 0.01 + 0.02 + 0.03 + 0.22 + 0.23 + 0.23 + 0.13 + 0.13 + 0.14 + 0.19 + 0.04	+ 0.11 - 0.04 + 0.01 + 0.04 + 0.05 + 0.06 - 0.06 - 0.06 - 0.25	mm + 0.19 - 0.05 - 0.09 + 0.28 + 0.46 + 0.30 + 0.39 + 0.29 - 0.29 - 0.23	mm + 0.71 + 0.25 + 0.25 + 0.39 + 0.36 + 0.36 + 0.36 + 0.36 + 0.37 + 0.55 + 0.55 + 0.55	mm - 0.22 - 0.31 - 0.26 - 0.21 - 0.27 - 0.27 - 0.26 - 0.27 - 0.26 - 0.37 - 0.37	0.44 - 0.44 - 0.45 - 0.45 - 0.57 - 0.77 - 0.76 - 0.57 - 0.57 - 0.57 - 0.57 - 0.57 - 0.57 - 0.58 - 0.58	0.28 + 0.02 + 0.03 - 0.30 - 0.45 - 0.39 - 0.39 - 0.39 - 0.39 - 0.39 + 0.01 + 0.01	
Hiver Printemps Eté Automne Automne	722.73 725.16 727.33 726.37	+ 0.12 + 0.24 + 0.18 + 0.17	- 0.03 + 0.02 + 0.09 - 0.09	$\begin{array}{c} + 0.05 \\ + 0.29 \\ + 0.43 \\ + 0.14 \end{array}$	+ 0.47 + 0.36 + 0.31 + 0.44	- 0.26 - 0.19 - 0.28 - 0.26	- 0.43 - 0.69 - 0.63 - 0.53	- 0.04 - 0.28 - 0.38 - 0.08	+ 0.12 + 0.25 + 0.28 + 0.21
Année météorologique . Année civile	725.41 725.39	+ 0.18 + 0.16	0.00	+ 0.23 + 0.19	+ 0.40 + 0.36	- 0.25 - 0.26	- 0.58 - 0.56	- 0.20 - 0 14	+ 0.22 + 0.28

XII. Pression atmosphérique. — Saint-Bernard, 1915.

PÉRIODE	Hauteur moyenne	7 h. m.	l h. s.	9 h. s.
Décembre 1914 Janvier 1915	mm. 561.22 554.12 557.60 559.50 562.04 565.83 568.00 568.75 568.64 566.98 563.06 560.40 561.88	mm. + 0.09 - 0.18 - 0.25 - 0.29 - 0.32 - 0.18 - 0.38 - 0.35 - 0.27 - 0.31 - 0.25 - 0.22	mm 0.18 - 0.16 - 0.13 - 0.01 - 0.06 - 0.01 - 0.04 + 0.10 - 0.05 + 0.01 - 0.05 - 0.16 - 0.19	mm. + 0.09 + 0.34 + 0.38 + 0.30 + 0.25 + 0.22 + 0.28 + 0.40 + 0.36 + 0.41 + 0.41
Hiver	557.65 562.46 568.47 563.47	- 0.11 - 0.29 - 0.31 - 0.27	$ \begin{array}{c} -0.15 \\ -0.02 \\ +0.01 \\ -0.07 \end{array} $	+ 0.26 + 0.31 + 0.30 + 0.34
Année météorologique . Année civile	563.04 563.10	- 0.24 - 0 27	- 0.06 - 0.06	+ 0.33

XIII. Pression atmosphérique. — Écarts, 1915.

PÉRIODE	Genève	St-Bernard	Genève— St-Bernard
Décembre 1914. Janvier 1915. Février Mars Avril Mai. Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre	- 2 93 - 7.31 - 3.70 - 0 53 + 1.16 - 0.18 - 0.65 - 0.17 + 0 28 0.00 - 0.25 - 0.61 - 3.20	mm - 1.10 - 6.37 - 2.64 - 0.21 + 0.41 + 1.99 + 0.89 + 0.27 + 0.24 - 0.47 - 1.54 - 1.63 - 0.44	mm - 1 83 - 0.94 - 1.06 - 0.32 + 0.75 - 2.17 - 1.54 - 0.44 + 0.04 + 0.47 + 1.29 + 1.02 - 2 76
Année météorologique . Année civile	- 1.23 - 1.25	- 0.84 - 0.78	- 0.39 - 0.47

XIV. Pressions extrêmes. GENÈVE, 1915.

PÉRIODE	Mininimum absolu Date	Maximum Date	Amplitude
	mm.	mm.	mm.
Décembre 1914	709.2 le 14	737.3 le 3	28.1
Janvier 1915	702.9 le 23	736.5 le 20	33.6
Février	702.8 le 22	735.5 les 26 et 27	32.7
Mars	710.0 le 28	734.6 le 5	24.6
Avril	714.6 le 7	733.8 le 2	19.2
Mai	717.4 le 29	730.1 le 15	12.7
Juin	722.8 le 25	732.2 le 4	9.4
Juillet	718.3 le 13	733.0 le 19	14.7
Août	723.0 le 2	732.3 le 7	9.3
Septembre	713.5 le 29	736.6 les 16 et 17	23.1
Octobre	718.7 le 31	731.5 le 13	12.8
Novembre	709.5 le 12	739.1 le 21	29.6
Décembre	712.2 le 25	735.4 le 14	23.2
Année météorolog	702.8 le 22	739.1 le 21	36.3
	février	novembre	
Année civile	id.	id.	36.3
	W 1		2

XV. Pressions extrêmes. SAINT-BERNARD, 1915.

PÉRIODE	Minimum Date	Maximum absolu Date	Amplitude
Décembre 1914 Janvier 1915 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre	mm. 549.8 le 14 539.5 le 28 542.8 le 20 550.0 le 28 555.4 le 8 559.1 le 18 563.2 le 29 562.7 le 1 564.9 le 18 554.6 le 29 557.3 le 29 551.5 le 13 552.8 le 25	mm. 571.7 le 2 569.3 le 15 567.8 le 3 568.8 le 5 567.7 le 30 569.3 le 6 572.9 le 5 575.5 le 27 573.3 le 7 576.1 le 16 569.6 le 12 572.5 le 21 568.3 le 27	mm. 21.9 29.8 25.0 18.8 12.3 10.2 9.7 12.8 8.4 21.5 12.3 21.0 15.5
Année météorolog Année civile	539.5 le 28 janvier id.	576.1 le 16 septembre id.	36.6 36.6

A Genève, les extrêmes moyens et absolus ont les valeurs suivantes:

```
minimum extrême moyen: 705.05

» » absolu: 700.00 (2 II 1912)

maximum extrême moyen: 741.03

» » absolu: 748.71 (17 1 1882)
```

Il y a cette année, en hiver, deux minima inférieurs au minimum moyen. Mais le maximum absolu de 1915 est inférieur au maximum moyen. Il en résulte que l'amplitude annuelle totale de 1915 diffère à peine de l'amplitude moyenne (36^{mm},0) et est inférieure à celle de 1914.

Au Grand Saint-Bernard, l'amplitude annuelle dépasse un peu celle de Genève et est sensiblement plus forte qu'en 1913 et qu'en 1914, à cause du minimum de janvier.

IV. Humidité de l'air

La valeur de la fraction de saturation est, depuis 1901, appréciée en pour cent, et non plus en millièmes. Je n'ai conservé l'indication des dixièmes de pour cent que pour la valeur moyenne annuelle à Genève, afin de permettre la comparaison exacte avec le passé.

A Genève, la valeur de la fraction de saturation est, pour les six observations faites de jour, déduite des indications des deux thermomètres du psychromètre; pour les deux observations de nuit, 1 h. et 4 h. du matin, ses valeurs sont relevées sur les diagrammes de l'hygromètre enregisteur de Richard.

Le tableau XVI fournit, pour les huit observations trihoraires, les valeurs moyennes de la fraction de saturation, pour les treize mois, les saisons et l'année; puis les valeurs de la fraction de saturation moyenne pour les mêmes périodes; enfin les minima et les maxima absolus. Lorsque le maximum correspond à la saturation complète, le nombre des cas de saturation est indiqué. Afin de rendre l'évaluation de ces cas de saturation comparable avec celle de l'ancien système des observations bihoraires, usité jusqu'en 1883, on a continué à calculer la fréquence relative de la saturation.

Le tableau XVII donne les écarts de la fraction de saturation

XVI. FRACTION DE SATURATION EN POUR CENT. GENÈVE, 1915.

Fréquence relat. de la saturation	0.052 0.004 0.004 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.008 0.008	0.033 0.000 0.003 0.012	0.012
Maximum absolu	100 13 fois 100 1 8 100 10 8 99 99 99 100 2 8 100 2 8 100 7 8 100 9 8	100 24 fois 99 100 2 » 100 9 »	100 35 fois 100 31 »
Minimum	33 33 33 33 33 38 38 38	32 26 36	. 26 26
Fraction moyenne	80 82 82 77 73 71 71 80 80	81 74 71 81	7.6.7 7.6.7
10 h. s.	882 883 777 774 80 877 877 877 877 877	83 77 86	81
7 h. s.	88 81 72 72 73 73 80 80	81 71 66 79	74 74
4 h. s.	75 71 71 66 63 63 61 51 70 77 76	74 62 55 71	65
1 h. s.	63 63 55 55 72 72 72	71 62 54 68	64
10 h. m.	78 71 71 65 65 76 76 76 76	80 69 65 77	73
7 h. m.	88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	85 83 80 88	84
4 h. m.	888 883 884 888 883 884 888 888	85 87 88 89	87
1 h. m.	888 887 887 888 888 888 888 888 888	84 86 88	88 85 70 70
PÉRIODE	Décembre 1914 Janvier 1915 Révrier Mars. Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre.	Hiver Printemps Eté Automne	Année météorol

XVII. ÉCARTS DE L'HUMIDITÉ. GENÈVE, 1915.

PÉRIODE	de sati	etion uration Ecarts pour 1915	Fréquence relative de la saturation Moyennes Ecarts pour 1849-1875 1915		
Décembre 1914. Janvier 1915. Février. Mars. Avril. Mai. Juin Juillet. Août. Septembre. Octobre Novembre. Décembre.	86 86 82 75 70 70 70 68 71 77 83 83	- 6 - 4 - 2 0 + 3 + 6 + 3 + 2 - 2 - 6	0.147 0.145 0.096 0.039 0.016 0.016 0.010 0.006 0.009 0.025 0.083 0.067 0.147	- 0.095 - 0.141 - 0.051 - 0.039 - 0.016 - 0.010 + 0.002 - 0.009 - 0.017 - 0.083 - 0.038 - 0.111	
Hiver	85 72 69 81	- 5 + 3 + 2 0	0.130 0.024 0.008 0.058	- 0.097 - 0.024 - 0.005 - 0.046	
Année météorolog	76.8 76.8	- 0.1 - 0.1	$\begin{array}{ c c c c }\hline 0.055 \\ 0.055 \\ \end{array}$	- 0.048 - 0.044	

et de la fréquence de la saturation avec les valeurs normales des « Nouvelles études sur le climat de Genève », de Plantamour.

La fraction de saturation moyenne annuelle est très légèrement inférieure à la normale. Les mois les plus humides sont, comme toujours, ceux d'hiver et d'automne, avec faible maximum pour janvier. Mais tous ces mois d'hiver et d'automne, à l'exception de septembre, sont, relativement, trop secs, surtout les deux mois de décembre. A l'inverse, les mois du printemps et de l'été sont tous, relativement, trop humides, sauf mars et août qui sont normaux. Le mois le plus sec, absolument parlant, est juillet, comme c'est le cas en général et quoique, comme nous venons de le constater, il soit relativement trop humide. Dans l'ensemble, l'année a une fraction de saturation remarquablement constante, due à un hiver trop chaud et à un été trop froid. Les extrêmes qui, normalement, sont 68 en juillet et 86 en décembre et janvier sont, cette année, 70 en juillet et 82 en janvier.

XVIII. Fraction de saturation en pour cent. GRAND SAINT-BERNARD, 1915.

PÉRIODE	7 h. m.	1 h. s.	9 h. s.	Fract. moy.	Min. abs.	Maximum absolu	Fréq. relat. de la satur.
Déc. 1914 Janvier 1915. Février Mars Avril Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre	70 84 84 85 86 85 88 77 80 80 82 79 86	68 84 83 80 80 76 79 73 69 69 82 77	68 85 83 89 89 90 79 90 77 88 77 88	69 84 83 85 85 84 86 76 80 79 84 78	10 34 14 27 29 28 35 10 16 10 21 14 18	93 97 100 4 fois 100 10 » 100 3 » 100 3 » 100 1 » 100 3 » 100 5 » 100 4 » 100 2 » 100 3 »	0.000 0.000 0.048 0.108 0.033 0.032 0.000 0.011 0.032 0.056 0.043 0.022 0.032
Hiver Printemps Eté Automne Année météor. » civile.	79 85 82 81 82 83	78 79 73 76	79 89 87 84 85 86	79 84 81 80 81 82	10 27 10 10 10	100 4 fois 100 16 » 100 4 » 100 11 » 100 35 fois 100 38 »	0.058 0.015 0.040

Il n'y a pas eu de cas de grande sécheresse de l'air de nouveau cette année. Quant à la saturation complète de l'air, elle a été beaucoup moins fréquente cette année que la précédente; elle reste très au-dessous de la normale, comme avant 1914.

Le tableau XVIII fournit le résultat des observations faites au Grand Saint-Bernard avec l'hygromètre à cheveu d'Usteri-Reinacher.

Comme en 1914, la fraction de saturation moyenne annuelle n'est pas la même aux deux stations, mais la différence est en sens contraire: en 1915 cet élément est plus fort au Saint-Bernard qu'à Genève.

Quant à la répartition annuelle de l'humidité relative qui est toujours différente entre la station de plaine et celle de la montagne, elle l'est bien de nouveau cette année, mais d'une façon moins accusée que d'ordinaire. Le minimum est bien en décembre 1914 au Saint-Bernard (69 %), mais on trouve des

chiffres très voisins du maximum en décembre 1915, comme en janvier et février. Quant au maximum absolu, on le constate bien en juin (86 %) ce qui est normal, mais il y a, comme à Genève, moins de différence que d'ordinaire entre les extrêmes.

Les cas de saturation complète de l'air sont de nouveau rares, cette année, au Saint-Bernard, mais cependant moins rares qu'en 1914. Quant aux cas de grande sécheresse de l'air, ils sont moins fréquents que l'année dernière, ce qui ne doit pas étonner pour une année aussi humide que 1915.

(A suivre.)