Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 42 (1916)

Artikel: Dérivés du camphre

Autor: Rupe, H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-743308

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

$$\begin{array}{c} Cl \\ \hline \\ N-N- \\ OC \end{array} + 2H_2O .$$

La réduction, dans des conditions données, de l'éther-sel de l'acide dichloro-azo-benzoïque conduit au dérivé hydrazo correspondant qui, en contact avec de l'acide chlorhydrique perd deux molécules d'alcool pour se transformer à son tour en anhydride :

H. Rupe (Bâle). — Dérivés du camphre.

Après avoir préparé, avec la collaboration de Wild, l'amylacétone optiquement active, ainsi que la benzoyl- et l'acétylamylacétone, l'auteur et E. Burckhard ont étudié l'action du chlorure de méthylène-camphre sur l'éther acétylacétique sodé. On n'obtient pas d'éther cétonique, mais l'éther de l'acide méthylène-camphreacétique, conformément aux équations suivantes :

C'est un corps jaune cristallisé qui réagit avec le chlorure de diazonium en formant un dérivé formazylique :

$$\begin{array}{c|c} C_8H_{14} & C=CH-C=N-NH-C_6H_5 \\ | & \\ CO & N=N-C_6H_5 \end{array}.$$

Porté à l'ébullition avec de la soude caustique, l'éther se transforme en lactone :

$$C_8H_{14}$$

$$CO$$

$$CO$$

$$CO$$

$$CO$$

L'acide méthylène-camphre-acétique donne, par dissolution dans l'acide sulfurique concentré, la combinaison :

$$C_8H_{14} < \begin{array}{c} C - CH = CH \\ \parallel & \parallel \\ C - O - CO \end{array}$$

(beaux cristaux, forte odeur de cuir de Russie).

On obtient, par distillation ou chauffage de l'acide sous pression en présence d'eau, du méthyle-méthylène-camphre :

$$C_8H_{14} \begin{picture}(200,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0){\li$$

Lorsqu'on fait réagir le chlorure de l'acide méthylène-camphrecarbonique

$$C_8H_{14}$$
 $C=CH-COOH$
 CO

sur l'éther malonique sodé, on obtient, après saponification d'un produit intermédiaire, la cétone :

$$C_8H_{14}$$
 $C = CH - CO - CH_3$.

Le campholcarbinol

$$C_8H_{14}$$
 CH_2-OH

se forme, avec un rendement faible, lors de la réduction de l'éther de l'acide campholique au moyen du sodium et de l'alcool.

J. Lifschitz (Zurich). — Méthodes de mesure et calcul de l'absorption de la lumière.

La majorité des études d'absorption lumineuse, spécialement celles appliquées par les chimistes, ont été, jusqu'à présent, exécutées au moyen de la méthode qualitative. La raison en est que les chimistes ont essayé d'élaborer ou d'appliquer des méthodes