Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 43 (1917)

Artikel: Sur quelques combinaisons o-amidoazoïques

Autor: Ceresole, M. / Macalick, G.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-743047

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

M. Ceresole et G. Mačalick (Zurich). — Sur quelques com-

binaisons o-amidoazoïques.

Les combinaisons amidoazoïques, connues de longue date, qui résultent de la copulation de diazoïques avec l'α-naphtylamine, et dont plusieurs ont fait l'objet de travaux détaillés, ont été considérées jusqu'à ce jour comme des corps homogènes. En fait, ils sont pour la plupartdes mélanges de para-et d'orthoaminoazoïques, dans lesquels prédomine toujours l'isomère para, la proportion d'isomèrie ortho pouvant toutefois s'élever à plus de 20 %.

Toutes choses égales d'ailleurs, la quantité d'ortho qui se forme s'accroit à mesure que l'on procède plus lentement à la copulation

du diazoïque avec l'α-naphtylamine.