

Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles
Band: 9 (1927)

Artikel: L'expérience de Michelson réalisée à Bruxelles (dans le laboratoire de physique de l'université)
Autor: Piccard, A. / Stahel, E.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-740884>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 31.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

A. PICCARD et E. STAHEL. — *L'expérience de Michelson réalisée à Bruxelles (dans le laboratoire de physique de l'Université).*

Nous avons poursuivi nos mesures avec l'interféromètre Michelson (voir ces *Archives* (5) 8, p. 269 (1927)) sur terre ferme à Bruxelles. Au moment où, d'après Miller, le vent d'éther horizontal devait être maximum (8.91 km/sec), la moyenne de nos mesures a donné un déplacement des franges qui était 28 fois plus petit que celui produit par l'effet Miller. Cette valeur rentre dans les limites des fautes probables de notre appareil.

Pour contrôler notre appareil nous avons provoqué artificiellement un déplacement des franges correspondant à l'effet Miller. Ce mouvement s'est nettement manifesté en direction et en grandeur dans l'analyse du film. Pour éliminer toute possibilité d'une « erreur psychologique » nous avons fait faire l'analyse du film par le personnel subalterne du laboratoire bien entraîné, mais ne connaissant nullement la signification des mesures.

Nous concluons donc à la non existence du vent d'éther à Bruxelles.

A. PICCARD et E. STAHEL. — *Résultat négatif d'essais de transformation de l'hydrogène en hélium.*

Si la transformation représentée par l'équation $4\text{H} = \text{He}$ est possible, elle doit se faire avec dégagement d'énergie puisque 4 atomes-grammes d'hydrogène pèsent 0,03 gr de plus qu'un atome-gramme d'hélium. Cette énergie serait probablement libérée sous forme d'énergie rayonnante. Un calcul simple montre qu'une production de 10^{-8} cm³ He par heure donnerait 0,3 cal/heure. D'autre part, le rayonnement γ de 1 gr de Ra dégage environ 3 cal/heure. Le rayonnement hypothétique équivaldrait donc énergétiquement aux rayons γ de 100 mgr de Ra. Sa longueur d'onde serait d'après la loi du $h\nu$ égale à $0,4 \cdot 10^{-11}$ cm, donc environ 10 fois plus courte que celle des rayons γ les plus durs. Dans l'air, ce rayonnement serait