

Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles
Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève
Band: 10 (1928)

Artikel: Recherches sur l'étoile variable T Vulpeculae
Autor: Tiercy, Georges
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-742785>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

RECHERCHES
SUR
L'ÉTOILE VARIABLE T VULPECULÆ
PAR
Georges TIERCY
(Avec 7 fig.)

§ 1. INTRODUCTION.

1. — Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'étoile variable *T Vulpeculae*. La courbe de lumière a été déterminée en appliquant la méthode que nous avons donnée à l'occasion de nos recherches sur *SU Cassiopeiae*¹; nous rappelons ci-dessous en quoi consiste cette méthode.

Une fois la courbe de lumière trouvée, nous nous sommes attaché à établir la variation du rayon de l'étoile au cours de la pulsation; nous nous sommes alors appuyé sur la «courbe des vitesses radiales» tracée d'après les données numériques de A. F. Beal². La connaissance de la variation de la magnitude et de la courbe de pulsation a permis de déterminer la valeur de l'index de couleur pour chaque phase de la céphéide; nous avons dessiné, comme nous l'avions fait pour *SU Cassiopeiae*, la courbe représentant la relation qui existe entre l'index de couleur et la magnitude, au cours de la pulsation. Les derniers

¹ *Publicationi del R. Osservatorio Astrofisico di Arcetri (Firenze)*, fasc. 44, 1927.

² *Publications of the Allegheny Observatory*, vol. III, 1916.

paragraphes sont consacrés à l'établissement de la courbe de variation de la température T , ainsi que de la courbe de variation de la pression P .

La méthode utilisée pour trouver la courbe de lumière consiste dans les opérations suivantes:

a) Mesure des largeurs des raies des spectres, et tout spécialement des largeurs de H_{β} , H_{γ} , H_{δ} , H et K . Il est essentiel de n'utiliser que des plaques également exposées, c'est-à-dire pour lesquelles on a adopté une même durée de pose θ (nous avons pris $\theta = 12$ min.); si les durées des poses effectivement choisies ne sont pas les mêmes, il faut, par des formules convenables (voir § 2), ramener les mesures des largeurs des raies à ce qu'elles seraient si la durée de pose effectivement adoptée avait été la même pour tous les spectres, soit θ .

b) Mesure des longueurs des spectres; il est essentiel, ici aussi, de ramener ces mesures à ce qu'elles seraient si la durée de pose avait été θ pour toutes les plaques; cela se fait au moyen des formules données au § 2.

Alors, en appelant L la longueur du spectre le plus long (spectre correspondant au maximum de lumière), on obtient, pour un spectre correspondant à une phase quelconque, une longueur ($L - d$).

Ce déficit (d) est traité, par la suite, comme une raie large; il est en effet la traduction du fait que, par rapport au maximum de lumière, une certaine quantité de lumière n'est pas arrivée sur la plaque. En tenant compte de (d), on peut donc dire que la longueur théorique de tous les spectres est L .

c) Calcul, pour chaque plaque, du total (y) des largeurs des raies et de (d); puis calcul de la différence $x = L - y$.

d) Calcul, pour chaque plaque, du rapport $q = \frac{y}{x}$.

La valeur du rapport (q) représente la magnitude (m); en effet, plus (y) est grand, moins il y a eu de lumière arrivant sur la plaque; (q) varie donc dans le même sens que la magnitude (m).

e) Calcul des valeurs de (m) correspondant respectivement à toutes les phases, grâce à la connaissance de deux d'entre elles seulement, par exemple celles du maximum et du minimum de lumière.

§ 2. LES CLICHÉS; LES DONNÉES NUMÉRIQUES FONDAMENTALES;
LES FORMULES DE RÉDUCTION.

2. — Les clichés qui ont servi à cette étude portent les numéros E 20-25-41-43-48-52-60-62-64-65-68-70-71, et E 124-125-126-127-129-130-132-133-142-147-159 de la collection de l'Observatoire Astrophysique d'Arcetri (Florence); la première série (de 20 à 71) a été prise en 1924 par M. le Prof. Giorgio Abetti; la seconde série (de 124 à 159) a été prise par nous-même. Les plaques utilisées sont des plaques « Capelli-blu », sauf E 43-52-62-64 qui sont des plaques « Sensima ».

Ces photographies ont été obtenues au moyen du petit télescope d'Arcetri, dont le miroir a 30 cm de diamètre, et qui est muni de deux « prismes-objectifs »; ce télescope est monté sur l'axe de l'équatorial « Peratoner »; on en trouve la description détaillée dans le 41^{me} fascicule des Publications de l'Observatoire d'Arcetri.

Les clichés ont été mesurés par nous-même à Arcetri, au moyen d'un petit spectrocomparateur à deux microscopes, celui-là même qui nous a servi à faire les mesures relatives à SU Cassiopeiae. Le dépouillement de ce dossier de mesures, ainsi que l'établissement des conclusions présentées dans les paragraphes suivants, ont été effectués à Genève.

Les données numériques fondamentales relatives à T Vulpeculae ont été relevées dans le « Vierteljahrsschrift der A. G. », 1914; on a:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Epoque (T. M. de Greenwich)} = 2409849^d,079 ; \\ \text{Période} = 4^d,435521 ; \\ \text{du min. au max. de lumière} = 1^d,361 ; \end{array} \right.$$

en temps moyen d'Arcetri, l'époque vaut:

$$2409849^d,079 + 0^d,031265 = 2409849^d,110265 .$$

Nous donnons ci-dessous le tableau des phases des différentes plaques:

SÉRIE 1924.

Plaque	Date	Heure sid.	Durée de pose	Date du cliché (J. J.)	Phase	Remarques
E 20	5 juill.	20 6	12 m.	d 2423963,546	0,608	médiocre
25	11 juill.	19 30	20 m.	3969,508	2,134	piquée
41	27 juill.	22 2	16 m.	3985,570	0,454	très bonne
43	28 juill.	22 2	15 m.	3986,567	1,451	quelques nuag.
48	5 août	21 31	16 m.	3994,524	0,537	très bonne
52	7 août	22 32	20 m.	3996,560	2,573	sensima-bonne
60	19 sept.	23 34	16 m.	4039,486	1,144	bonne
62	23 sept.	23 20	12 m.	4043,465	0,688	mauvaise
64	30 sept.	23 28	18 m.	4050,452	3,239	médiocre
65	5 oct.	22 33	14 m.	4055,400	3,751	très bonne
68	17 oct.	21 07	12 m.	4067,308	2,353	très bonne
70	21 oct.	23 32	12 m.	4071,397	2,006	très bonne
71	29 oct.	24 02	12 m.	4079,396	1,134	très bonne

SÉRIE 1927.

Plaque	Date	Heure sid.	Durée de pose	Date du cliché (J. J.)	Phase	Remarques
E 124	25 juill.	19 8	40 m.	d 2425087,438	2,313	très bonne
125	26 juill.	19 32	60 m.	5088,463	3,338	un peu noire
126	27 juill.	18 59	30 m.	5089,431	4,306	mal guidée
127	29 juill.	20 22	40 m.	5091,479	1,919	médiocre
129	31 juill.	19 13	40 m.	5093,430	3,870	très bonne
130	4 août	19 15	40 m.	5094,429	0,433	très bonne
132	4 août	20 12	60 m.	5097,465	3,469	bonne
133	5 août	19 14	40 m.	5098,428	4,432	assez bonne
142	27 août	19 25	40 m.	5120,377	4,203	très bonne
147	31 août	19 37	40 m.	5124,375	3,766	très bonne
159	28 sept.	19 25	80 m.	5152,297	0,641	très bonne

3. — Disons ici que les courbes de lumière, indiquées par les auteurs qui se sont occupés de T Vulpeculae, diffèrent quelque peu d'allure; le lecteur pourra comparer les courbes données par E. C. Pickering¹, Sawyer², Chandler², Yendell²,

¹ *Harvard Annals*, 1903, p. 156.

² *Lick Bulletin* IV, 1907, p. 137. Article Albrecht.

Luizet¹, Hertzsprung², Nijland³, Hellerich⁴, etc.; il constatera, par exemple, que la branche descendante de la courbe de Pickering est beaucoup moins « creusée » que la branche descendante dessinée par Luizet, ou par Hertzsprung, ou par Nijland; il verra aussi que Nijland n'exclut pas la possibilité d'une petite ondulation secondaire vers le bas de la branche descendante.

Les limites de magnitude indiquées par Luizet sont 5,50 et 6,40; tandis que celles indiquées par Nijland sont 5,43 et 6,32; nous adopterons les limites de Nijland.

4. — La première difficulté à résoudre a été de raccorder les mesures faites en 1927 avec celles effectuées en 1924; le miroir était neuf en 1924; il a été réargenté en 1927 pour prendre les clichés indiqués plus haut; et il s'est trouvé que l'argenture de 1927 a été moins bonne que celle de 1924.

Nous avons fait le raccord en étudiant une série de photographies du spectre de l'étoile invariable *Boss* 3855, qui est de 5^{me} magnitude; nous y avons mesuré les largeurs des raies H_{β} , H_{γ} , H_{δ} , H et K , ainsi que les longueurs des parties de spectres précédent H_{β} du côté du rouge et suivant K du côté de l'ultraviolet.

Nous avons trouvé les moyennes suivantes:

	Avant H_{β}	Après K	H_{β}	H_{γ}	H_{δ}	H	K	Remarques
1924	m m 1,730	m m 6,160	μ 67	μ 64	μ 47	μ 89	μ 103	
1927	1,330	5,450	75	65	58	106	122	spectre plus court, raies plus larges
Différence	0,400	0,710	8	1	11	17	19	“

¹ *Astronomische Nachrichten* 4596, 1912, p. 196.

² *Astronomische Nachrichten* V. 208, 1919, p. 51.

³ *Utrecht, Recherches astronomiques* 81, 1923.

⁴ *Astronomische Nachrichten* V. 228, 1926, p. 113.

ce qui donne les pourcentages ci-dessous pour effectuer le passage des mesures faites en 1927 à celles faites en 1924, ou vice-versa:

		Avant H _β	Après K	H _β	H _γ	H _δ	H	K	
Pour ramener à 1927	% rapporté à 1924	- 0,23	- 0,115	+ 0,12	+ 0,02	+ 0,23	+ 0,20	+ 0,18	moyenne pr les raies 0,15
Pour ramener à 1924	% rapporté à 1927	+ 0,30	+ 0,13	- 0,11	- 0,02	- 0,19	- 0,16	- 0,15	moyenne pr les raies 0,13

Nous nous sommes servi des pourcentages indiqués à la dernière ligne pour ramener toutes les mesures faites avec le miroir de 1927 à ce qu'elles auraient été, si elles avaient été effectuées avec le miroir de 1924.

5. — Nous avons dit, dans l'introduction, qu'il était essentiel de n'utiliser que des mesures relatives à des clichés obtenus après le même temps de pose. Or, pratiquement, les temps de pose effectivement choisis diffèrent les uns des autres, surtout dans la série de 1924. Il importe donc de trouver des formules permettant de calculer ce qu'auraient été les largeurs des raies d'un spectre et la longueur de ce spectre, si la durée de pose avait été différente de celle effectivement choisie.

Il faut, ici, prévoir deux formules; l'une se rapportant aux largeurs des raies; l'autre à la longueur du spectre.

a) *Largeurs des raies (réduction des)* en prenant une durée de pose différente de celle de la plaque.

Une série de mesures effectuées sur des plaques « Cappelli-blù » nous a conduit à la formule suivante:

$$s' = s \cdot 10^{\left(-\frac{0,105}{M} \cdot \frac{t' - t}{t} \right)}$$

où (*s*) est la largeur de raie mesurée effectivement, (*s'*) ce qu'aurait été la largeur si la durée de pose avait été (*t'*) au lieu de (*t*), et où $\frac{1}{M}$ représente le module logarithmique 0,4342945;

dans cette formule, la durée t' est plus grande que t , mais vaut au maximum $2t$.

On a donc:

$$s' = s \cdot 10^{(-0,045601) \cdot \frac{t'-t}{t}} \quad (1)$$

si l'on résoud cette relation par rapport à (s), on trouve:

$$s = s' \cdot 10^{(+0,045601) \cdot \frac{t-t'}{t'}} \quad ,$$

formule qui serait valable pour passer d'une durée de pose t' effective plus longue à une durée t plus courte; ou bien, en remettant l'accent pour désigner la largeur cherchée et non la largeur mesurée:

$$s' = s \cdot 10^{(+0,045601) \cdot \frac{t-t'}{t'}} \quad . \quad (2)$$

où $t' < t$.

Mettant ces deux formules sous forme logarithmique, on a:

$$\left\{ \begin{array}{l} \log s' = \log s - (0,045601) \cdot \frac{t'-t}{t} \quad , \quad (t' > t) \quad , \\ \log s' = \log s + (0,045601) \cdot \frac{t-t'}{t'} \quad , \quad (t' < t) \quad . \end{array} \right.$$

Notons qu'en développant les formules (1) et (2), et en ne gardant que les deux premiers termes de chaque développement, on retrouve les formules que nous avons utilisées dans l'étude de SU Cassiopeiae.

b) *Réduction de la longueur d'un spectre*, en prenant une durée de pose différente de celle de la plaque.

Une série de comparaisons effectuées sur des plaques « Capelli-blu » nous a montré qu'en doublant le temps de pose, la partie du spectre qui précède la raie H_{β} du côté du rouge ainsi

que la partie suivant la raie K du côté de l'ultra-violet s'allongent des 0,105 de la différence entre la longueur mesurée de la partie considérée et la longueur maximum de cette partie.

On a donc les formules suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} l' = l + (\mathcal{L} - l) \cdot (0,105) \left(\frac{t' - t}{t} \right); \\ l' = l - (\mathcal{L} - l) \cdot (0,105) \left(\frac{t - t'}{t'} \right); \end{array} \right. \quad (3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} l' = l + (\mathcal{L} - l) \cdot (0,105) \left(\frac{t' - t}{t} \right); \\ l' = l - (\mathcal{L} - l) \cdot (0,105) \left(\frac{t - t'}{t'} \right); \end{array} \right. \quad (4)$$

(3) correspond au cas de $t' > t$;

(4) correspond au cas de $t' < t$.

Ces formules sont légèrement différentes de celles que nous avons utilisées pour SU Cassiopeiae, mais donnent des résultats comparables dans les conditions où l'on opère.

On a pris :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathcal{L} = 6000 \mu \text{ (côté ultra-violet)}; \\ \mathcal{L} = 3000 \mu \text{ (côté rouge)}. \end{array} \right.$$

§ 3. RAPPORT q ; COURBE REPRÉSENTATIVE;

COURBE DE LUMIÈRE.

6. — Nous rappelons que les plaques « Cappelli-blu » utilisées donnent des spectres commençant un peu avant la raie H_{β} du côté du rouge, et s'étendant dans l'ultra-violet, au-delà des raies H et K du calcium, plus ou moins loin suivant leur type.

Appliquant la méthode indiquée au paragraphe (1), nous établissons dans les tableaux ci-dessous, les valeurs de L , d et t pour chaque plaque. Les deux premiers tableaux conduisent à connaître L et les valeurs des (d); on remarquera que la valeur de L est à prendre dans le second tableau (clichés 1927; E 133). D'autre part, de H_{β} à K, on mesure 11780 μ .

PLAQUES 1924 (mesures en μ).

	E 41	48	20	62	74	60	43	70	25	68	52	Min.	64	65
measures { avant H _B directes { après K	1402	1468	1217	1496	1016	1380	1912	1076	926	1214	1453		1200	1770
Réd. à { avant H _B 12 m. { après K	4732	5588	4140	847	2146	3813	1428	1200	1723	1600	700		800	4658
L — d d	1318	1380	1217	1496	1016	1297	1826	1076	815	1214	1279		1092	1717

PLAQUES 1927.

	E 130	159	127	124	Min.	125	132	147	129	142	126	133	
Measures directes { avant H _B 1927 { après K	1874	2030	900	1033		1230	1354	1480	1610	1753	1512	2003	
Réd. à 12 min. { avant H _B 1927 { après K	5303	5889	3730	2000		3900	3531	4015	5016	5744	5213	6000	
Réd. à 12 min. { avant H _B 1924 { après K	1353	1213	649	745		790	860	1068	1162	1274	1184	1145	
L — d	4207	3765	2958	1587		2410	2166	2819	3521	4032	3998	4212	
d	17746	17122	15582	14336		15530	15344	16353	17270	17992	17837	18419	0
	673	1297	2837	4083		2889	3075	2066	1149	427	582		

PLAQUES 1924 (mesures en μ).

	E 41	48	20	62	71	60	43	70	25	68	52	Min.	64	65
Mesures directes	H ₉ H ₇ H ₈ H K	60 60 60 182 186	61 54 53 180 187	63 62 55 185 192	64 52 56 178 186	55 60 54 170 180	52 50 46 139 155	50 62 54 218 232	38 62 61 212 250	30 55 61 209 241	28 60 65 237 272	28 60 64 (?) (?)	28 60 66 (300) (400)	65 70 57 203 241
Réd. à 12 min.	H ₉ H ₇ H ₈ H K	62 62 61 189 194	63 62 53 187 194	64 52 55 185 192	55 60 56 178 186	55 52 54 170 180	51 63 48 145 161	51 62 55 214 227	38 62 61 212 250	32 60 66 226 260	30 65 67 237 272	30 65 67 (?) (?)	30 65 71 (300) (400)	66 71 58 207 246
Autres { jusqu'à K raies { après K		350 1475	330 2610	220 1380	220 255	500 715	310 2420	445 745	810 700	(20) 1250	1040 1060	394 —	402 588	650 3050
Total t		2394	3473	2457	1011	1734	3191	1805	2133	1914	2764	596	1844	4348

PLAQUES 1927.

RECHERCHES SUR L'ÉTOILE VARIABLE T VULPECULAE 117

	E	130	159	127	124	Min.	125	132	147	129	142	126	133
Mesures directes 1927	H ₃	83	25	30	50		37	40	45	45	(90)	86	70
	H ₇	63	50	50	70		62	50	64	40	60	57	(90)
	H ₈	61	57	55	61		53	62	48	(24)	55	62	60
	H	130	140	178	240		154	210	(218)	137	123	140	116
Réd. à 12 min. 1927	K	188	161	245	260		180	217	(205)	150	125	138	121
	H ₃	100	34	36	61		48	52	54	54	109	99	85
	H ₇	76	68	61	85		80	65	77	48	73	66	109
	H ₈	74	78	67	74		68	75	58	29	67	71	73
Réd. à 12 min. 1924	H	157	190	245	290		199	271	264	166	149	162	140
	K	227	218	296	315		233	280	248	182	151	160	146
	H ₃	89	30	32	54		43	46	48	48	97	88	76
	H ₇	74	67	60	83		78	64	75	47	72	65	107
Autres raies	H ₈	60	63	54	60		55	61	47	23	54	58	59
	H	132	160	181	244		167	228	222	139	125	142	118
	K	201	193	262	279		206	248	220	161	134	136	129
	jusqu'à K	460	320	470	810		800	850	570	150	425	0	
après K		1402	1506	1986	1058		2014	1790	1592	1990	1140	1130	1140
Total t		2418	2339	3045	2588		3363	3287	3004	2978	1772	2044	1629

Les deux tableaux précédents établissent les valeurs respectives de t .


Rassemblant en un tableau général les valeurs respectives des (d) et des (t), on en tire les valeurs correspondantes des (y), des (x) et des (q):

Plaque	t	d	y	$x = L - y$	$q = \frac{y}{x}$
E 130	2418	673	3091	15328	0,202
41	2394	867	3261	15158	0,215
48	3473	34	3507	14912	0,235
20	2157	1282	3439	14980	0,230
159	2339	1297	3636	14783	0,246
62	1011	4296	5307	13112	(0,405)
71	1734	3477	5211	13208	0,395
60	3191	1777	4968	13451	0,369
43	1805	3454	5259	13160	0,400
127	3045	2837	5882	12237	0,481
70	2133	4363	6496	11923	0,545
25	1914	4324	6238	12181	0,512
124	2588	4083	6671	11748	0,568
68	2764	3825	6589	11830	0,557
52	596	6172	6768	11651	0,581
Min. lum.	—	—	—	—	—
64	1844	4825	6669	11750	0,568
125	3363	2889	6252	12167	0,514
132	3287	3075	6362	12057	0,528
65	4348	414	4762	13657	0,349
147	3004	2066	5070	13349	0,380
129	2978	1149	4127	14292	0,289
142	1772	427	2199	16220	0,135
126	2044	582	2626	15793	(0,166)
(Max. lum.)	1629	0	1629	16790	0,097

On relève dans ce tableau deux « irrégularités » concernant respectivement les plaques E 62 et E 126. Pour la plaque E 62 (Sensima), on constate que le spectre est trop court dans sa partie ultra-violette (après K); (d) est donc trop fort; la raison probable est signalée dans le carnet de notes du professeur G. Abetti, qui a indiqué, en date du 23 septembre 1924: « veli sparsi »; il y avait donc un léger écran nébuleux; et l'on sait bien qu'un tel écran influe d'abord sur la partie ultra-violette

d'un spectre. Quant au cliché E 126, il présente un spectre beaucoup trop large; l'appareil a donc été mal conduit, et l'image obtenue correspondrait à une pose inférieure à 30 min.

7. — *Courbe représentative de la variation de (q)*. — Le tableau numérique précédent permet de tracer la courbe (q), dont le minimum correspond à la valeur $q = 0,597$.



Cette courbe présente visiblement l'allure de la courbe de lumière de Luizet ou de celle de Nijland, avec la branche descendante creusée dès le maximum de lumière.

Il est d'ailleurs possible que la branche descendante porte une petite ondulation secondaire, comme Nijland l'a signalé pour sa courbe de lumière; mais nous ne possédons pas suffisamment de plaques se rapportant aux phases comprises entre 1^d et 3^d pour pouvoir l'affirmer. Nous adopterons donc la courbe marquée dans la figure (1).

8. — *Valeurs de m et M_v ; courbe de lumière*. — Le tableau numérique précédent et la courbe (q) permettent dès lors de trouver la magnitude (m) et la grandeur absolue M_v de l'étoile à chaque instant de sa pulsation. Pour la magnitude (m), nous avons pris les limites 5,43 et 6,32 de Nijland (voir tableau ci-dessous).

Quant à la magnitude absolue M_v correspondant au maximum

120 RECHERCHES SUR L'ÉTOILE VARIABLE T VULPECULAE

de lumière, nous l'avons déterminée en utilisant les tables et les courbes données par MM. Russell-Dugan-Stewart dans le volume II de leur traité d'astronomie (p. 734 et 764); on trouve alors:

$$M_p = -1,5, \quad M_v = -1,2;$$

et comme M_v oscille entre ($-1,2$) et ($-0,3$), la table de la page 690 montre que la masse de l'étoile est environ:

$$\mu = 5,5.$$

Plaque	Phase	Courbe (q)	m	M_v
E 133	d			
130	4,432	0,097	5,43	- 1,20
41	0,433	0,200	5,61	- 1,02
48	0,454	0,205	5,62	- 1,01
20	0,537	0,228	5,66	- 0,97
159	0,608	0,246	5,70	- 0,93
62	0,641	0,255	5,71	- 0,92
71	0,688	(0,270)	5,74	- 0,89
60	1,134	0,374	5,92	- 0,71
43	1,144	0,380	5,93	- 0,70
127	1,451	0,436	6,03	- 0,60
70	1,919	0,507	6,16	- 0,47
25	2,006	0,512	6,17	- 0,46
124	2,134	0,536	6,21	- 0,42
68	2,313	0,558	6,25	- 0,38
52	2,353	0,562	6,26	- 0,37
Min. lum.	2,573	0,581	6,29	- 0,34
64	3,075	0,597	6,32	- 0,31
125	3,239	0,583	6,30	- 0,33
132	3,338	0,557	6,25	- 0,38
65	3,469	0,512	6,17	- 0,46
147	3,751	0,382	5,94	- 0,69
129	3,766	0,370	5,92	- 0,71
142	3,870	0,296	5,78	- 0,85
126	4,203	0,135	5,50	- 1,13
133	4,306	(0,108)	5,45	- 1,18
	4,432	0,097	5,43	- 1,20


La phase $1^d,165$ dont nous aurons besoin plus loin, lors de l'étude de la variation du rayon, correspond à:

$$\left\{ \begin{array}{l} q = 0,385, \\ m = 5,94, \\ M_v = -0,69; \end{array} \right.$$

de même, la phase 3^d,575 correspond à :

$$\left\{ \begin{array}{l} q = 0,464, \\ m = 6,08, \\ M_v = -0,55. \end{array} \right.$$

On trouve ainsi la *courbe de lumière* (fig. 2). Nous y avons joint l'indication des spectres correspondant aux différentes phases, tels que nous les avons obtenus au § 4.



§ 4. DÉTERMINATION DES SPECTRES.

9. — Les clichés ont été étudiés et mesurés au moyen du petit spectrocomparateur d'Arcetri. Sur chacun d'eux, on a repéré un nombre de raies plus ou moins grand, variant de 50 à 80 suivant le cliché. La connaissance de ces raies a permis de déterminer le type spectral de chaque plaque.

Nous nous sommes basé, pour établir cette détermination, sur un certain nombre de renseignements généraux, que nous avons déjà signalés et utilisés à l'occasion de notre étude sur SU Cassiopeiae¹; nous avons aussi comparé les spectres de T Vulpeculae aux spectres de quelques étoiles pseudocéphéides, les mêmes qui nous ont servi pour SU Cassiopeiae.

¹ *Publicationi del R. Osservatorio Astrofisico di Arcetri*. Fasc. 44.

Nous avons ainsi obtenu les spectres suivants, que nous avons reporté sur la figure (2):

Plaque	Spectre	Plaque	Spectre
E 133	A ₉	124	G ₀₋₁
130	F ₀	68	G ₀₋₁
41	F ₀	52	G ₀₋₁
48	F ₁	Min. lum.	(G ₀)
20	F ₁	64	F ₉ — G ₀
159	F ₁	125	F ₉
62	F ₂	132	F ₈
71	F ₄	65	F ₅₋₆
60	F ₄	147	F ₅
43	F ₅	129	F ₄
127	F ₉ — G ₀	142	A ₈
70	G ₁	126	A ₉
25	G ₁	133	A ₉

§ 5. CALCUL DES RAYONS, ET COURBE DE PULSATION.

10. — *Rayon au maximum de lumière.* — Connaissant la magnitude absolue $M_v = -1,2$ au maximum de lumière, un calcul simple¹ indique que le rayon correspondant est 9,2 fois plus grand que celui de notre Soleil. On a donc:

$$R = 9,2 R_{\odot} ;$$

et comme $R_{\odot} = 696000$ km, le rayon de T Vulpeculae au maximum de lumière vaut: 6.403.200 km.

Pour trouver les valeurs de R correspondant aux autres phases, nous avons employé la courbe des vitesses radiales de T Vulpeculae, telle qu'elle résulte des éléments numériques donnés par A. F. Beal².


¹ *Publicationi del R. Osservatorio Astrofisico di Arcetri*, Fasc. 44.

² *Publ. of the Allegheny Observatory*, Vol. III, 1916.

11. — *Courbe des vitesses radiales de A. F. Beal.* — Les données numériques de Beal sont les suivantes (vitesse en km):

Phase	Vit. v	Phase	Vit. v
d 0,057	— 17,7	d 2,837	+ 12,4
0,408	— 10,0	3,082	+ 14,0
0,672	— 8,2	3,221	+ 12,6
0,868	— 6,4	3,444	+ 9,4
1,227	— 1,7	3,596	— 3,2
1,759	+ 6,1	3,727	— 10,5
2,179	+ 7,2	4,043	— 20,8
2,380	+ 12,4	4,251	— 19,6

On en déduit la courbe dite « des vitesses radiales » (fig. 3).



De la courbe et du tableau précédents, nous avons déterminé la vitesse V du centre de l'étoile par la condition suivante: la somme des augmentations du rayon pendant la période de croissance de l'étoile doit être égale à la somme des diminutions pendant la période de décroissance. Nous avons ainsi trouvé $V = -1,367$.

124 RECHERCHES SUR L'ÉTOILE VARIABLE T VULPECULAE

On aperçoit alors que le maximum de R correspond à la phase 1^d,165; tandis que le minimum de R correspond à la phase 3^d,575.

12. — *Calcul des rayons aux différentes phases.* — La courbe du N° 11 permet d'établir le tableau suivant:


Phase	<i>v + V</i>	Inter-valle en sec.	Vitesse moyenne	Phase	<i>v + V</i>	Inter-valle en sec.	Vitesse moyenne
0 ^d	— 18,4	—	—	3,075	+ 13,46	—	—
0,250	— 14,3	21600	— 14,983	3,125	+ 13,4	4752	+ 14,797
0,500	— 10,3	21600	— 10,933	3,250	+ 12,4	10800	+ 14,267
0,750	— 6,6	21600	— 7,083	3,375	+ 9,4	10800	+ 12,267
1,000	— 3,5	21600	— 3,683	3,500	+ 3,5	10800	+ 7,817
1,250	— 0,4	21600	+ 2,367	3,625	— 5,5	10800	— 7,633
1,500	+ 2,4	21600	+ 5,067	3,750	— 12,5	10800	— 14,133
1,750	+ 5,0	21600	+ 7,517	3,875	— 18,5	10800	— 18,183
2,000	+ 7,3	21600	+ 9,767	4,000	— 20,6	5184	— 19,283
2,250	+ 9,5	21600	+ 11,817	4,060	— 20,7	5616	— 19,233
2,500	+ 11,4	21600	+ 13,517	4,125	— 20,5	10800	— 18,683
2,750	+ 12,9	21600	+ 14,517	4,250	— 19,6	16070	— 17,633
3,000	+ 13,4	6048	+ 14,797	4,436	— 18,4	—	—

On en déduit les variations de rayon de proche en proche, et par conséquent les valeurs successives que prend le rayon à partir de la phase du maximum de lumière. Les résultats sont présentés ci-dessous:

Phase	ΔR de proche en proche	R. en km
d 0	—	6.403.200
+ 323.633	—	6.726.833
0,250	+ 236.153	6.962.986
0,500	+ 152.993	7.115.979
0,750	+ 79.553	7.195.532
1,000	+ 15.204	7.210.736 max.
1,165	— 3.551	7.207.185
1,250	— 51.127	7.156.058
1,500	— 109.447	7.046.611
1,750	— 162.367	6.884.244
2,000	— 210.967	6.673.277
2,250	— 255.247	6.418.030
2,500	— 291.967	6.126.063
2,750	— 313.567	5.812.496
3,000	— 89.492	

Phase	ΔR de proche en proche	R. en km
d 3,075	—	5.723.004
— 70.315	—	5.652.689
3,125	— 154.084	5.498.605
3,250	— 132.484	5.366.121
3,375	— 84.424	5.281.697
3,500	— 15.769	5.265.928 min.
3,575	+ 8.927	5.274.855
3,625	+ 82.436	5.357.291
3,750	+ 152.636	5.509.927
3,875	+ 196.376	5.706.303
4,000	+ 99.963	5.806.266
4,060	+ 108.013	5.914.279
4,125	+ 201.776	6.116.055
4,250	+ (287.145)	6.403.200
4,436		
	$\Sigma \Delta R = 0$	

13. — *Courbe de Pulsation.* — La courbe de variation de R, en fonction du temps, ou courbe de pulsation, est alors donnée par la figure (4):



126 RECHERCHES SUR L'ÉTOILE VARIABLE T VULPECULAE

De cette courbe et du tableau précédent, on tire les valeurs de R correspondant respectivement aux phases des différents clichés considérés dans ce travail. Voici ces valeurs de R:

Plaque	Phase	R en km	Plaque	Phase	R en km
E 133	d	6.403.200	124	d	6.608.955
130	0,433	6.899.697	68	2,353	6.568.115
41	0,454	6.917.645	52	2,573	6.332.776
48	0,537	6.985.629	Min. lum.	3,075	5.723.004
20	0,608	7.029.079	64	3,239	5.512.165
159	0,641	7.049.274	125	3,338	5.405.336
62	0,688	7.078.036	132	3,469	5.302.634
71	1,134	7.207.879	R. min.	3,575	5.265.928
60	1,144	7.208.801	65	3,751	5.358.512
R. max.	1,165	7.210.736	147	3,766	5.376.828
43	1,451	7.166.079	129	3,870	5.503.822
127	1,919	6.936.851	142	4,203	6.040.187
70	2,006	6.922.412	126	4,306	6.202.507
25	2,134	6.771.166	133	4,432	6.403.200
			(max. lum.)		

§ 6. INDEX DE COULEUR. — COURBE (I; q).

14. — Les valeurs de l'index de couleur correspondant aux différentes phases ont été calculées au moyen de la formule fondamentale ¹:

$$0,819 I = \log R + 0,20 M_v - 0,515 .$$

On trouve ainsi les valeurs indiquées dans le tableau suivant; le cliché E 70 correspond donc à la valeur maximum de I, tandis que E 142 correspond à la valeur minimum. On voit qu'il s'écoule des temps égaux de I max. à I min. et de I min. à I max.

¹ *Publicationi del R. Osservatorio Astrofisico di Arcetri*, Fasc. 44.

Plaque	Spectre	R ($R_{\odot} = 1$)	$\log R$	M_v	I	Courbe q
E 133	A ₉	9,200	0,96379	-1,20	0,255	0,097
130	F ₀	9,913	0,99621	-1,02	0,338	0,200
41	F ₀	9,939	0,99734	-1,01	0,342	0,205
48	F ₁	10,037	1,00160	-0,97	0,357	0,228
20	F ₁	10,098	1,00424	-0,93	0,370	0,246
159	F ₁	10,128	1,00552	-0,92	0,374	0,255
62	F ₂	10,170	1,00732	-0,89	0,384	(0,270)
71	F ₄	10,356	1,01519	-0,71	0,437	0,374
60	F ₄	10,357	1,01523	-0,70	0,440	0,380
R. max.	—	10,360	1,01536	-0,69	0,442	0,385
43	F ₅	10,296	1,01267	-0,60	0,461	0,436
127	F ₉ — G ₀	9,967	0,99856	-0,47	0,476	0,507
70	G ₁	9,946	0,99766	-0,46	0,477	0,512
25	G ₁	9,729	0,98807	-0,42	0,475	0,536
124	G ₀₋₁	9,496	0,97754	-0,38	0,472	0,558
68	G ₀₋₁	9,437	0,97483	-0,37	0,471	0,562
52	G ₀₋₁	9,099	0,95899	-0,34	0,459	0,581
Min. lum.	G ₀	8,223	0,91503	-0,31	0,413	0,597
64	F ₉ — G ₀	7,920	0,89873	-0,33	0,388	0,583
125	F ₉	7,766	0,89020	-0,38	0,365	0,557
132	F ₈	7,617	0,88178	-0,46	0,336	0,512
R. min.	—	7,566	0,87887	-0,55	0,310	0,464
65	F ₅₋₆	7,699	0,88643	-0,69	0,285	0,382
147	F ₅	7,725	0,88790	-0,71	0,282	0,370
129	F ₄	7,908	0,89807	-0,85	0,260	0,296
142	A ₈	8,678	0,93842	-1,13	0,241	0,135
126	A ₉	8,912	0,94998	-1,18	0,243	(0,108)
133	A ₉	9,200	0,96379	-1,20	0,255	0,097
(max. lum.)						


I max.

I min.


Nous avons joint au tableau ci-dessus une colonne supplémentaire rappelant les valeurs du rapport (q) ; cela facilitera la construction de la courbe (I; q) du n° 16.

15. — *Courbe de variation de l'index I.* — Portant les phases en abscisses et les indices I en ordonnées, on obtient le dessin de la fig. 5.

Cette courbe est visiblement beaucoup plus « symétrique » que la courbe de lumière.



16. — *Courbe ($I; q$)*. — Le tableau du n° 14 permet de tracer immédiatement cette courbe (fig. 6).



On constate que la partie supérieure de la courbe (petites valeurs de q) est plus étroite que la partie inférieure; la courbe présente la forme d'une « poire », avec renflement vers le bas.

La courbe n'est pas symétrique par rapport à la droite XX' (direction de symétrie parallèle à l'axe I), comme c'était le cas

pour SU Cassiopeiae, où la courbe se rapprochait fort d'une ellipse. Ici, la branche descendante est fortement boursoufflée; cela est dû au fait que, pour T Vulpeculae, les décalages de $I_{\text{max.}}$ et de $I_{\text{min.}}$, par rapport au minimum et au maximum de lumière respectivement, sont très différents l'un de l'autre (tandis que, pour SU Cassiopeiae, ils étaient presque égaux).

Dans la figure (6), nous avons tracé en pointillé une branche de courbe symétrique de la branche montante (direction de symétrie parallèle à l'axe I); cela donne une courbe de largeur CC' au niveau moyen; c'est la courbe $(I; q)$ que l'on obtiendrait si les deux branches, descendante et ascendante, de la courbe de lumière avaient la même durée, celle de la branche montante. On voit que cette courbe de largeur CC' n'est pas tout à fait une ellipse; elle est un peu plus large dans la partie inférieure que dans la partie supérieure; ce détail n'était pas sensible dans le cas de SU Cassiopeiae.

De même, nous avons construit la branche symétrique de la branche descendante XDX' ; cela donne une « poire » de largeur DD' au niveau moyen; c'est probablement la courbe que l'on obtiendrait si les deux branches de la courbe de lumière avaient la même durée, celle de la branche descendante.

Les cordes joignant les types spectraux de même nom situés sur la courbe CC' ont été tracées; elles n'ont pas tout à fait les mêmes inclinaisons sur XX' que pour SU Cassiopeiae. Il semble que ces inclinaisons doivent varier un peu d'un cas à l'autre, soit avec les décalages de $I_{\text{max.}}$ et de $I_{\text{min.}}$, soit avec le domaine de variation du type spectral. Il semble en particulier que l'inclinaison maximum des cordes sur XX' soit plus faible lorsque le domaine de variation spectrale est plus étendu.

Il faut remarquer cependant que la courbe CC' n'est plus une ellipse, comme c'était le cas pour SU Cassiopeiae. Il est bien possible que, pour toute Céphéide à période voisine de 2 jours, on trouve une ellipse, à peu près, comme courbe $(I; q)$; alors, les inclinaisons des cordes seraient exactement celles relevées pour SU Cassiopeiae. Par contre, pour T Vulpeculae, la période est plus du double de 2 jours; l'ellipse CC' se déforme en se renflant davantage dans la partie inférieure; ce qui entraîne une légère modification des inclinaisons des cordes.

§ 7. LA VARIATION DE LA TEMPÉRATURE T.

17. — Les formules fondamentales, qui lient entre eux les nombres T , M_v , I et R , sont¹:

$$\left\{ \begin{array}{l} T = \frac{7200}{I + 0,611} ; \\ 0,819 I = \log R + 0,2 M_v - 0,515 ; \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T = \frac{5896,8}{\log R + 0,2 M_v - 0,0154} . \end{array} \right. \quad (2)$$

$$(3)$$

Comme nous connaissons les valeurs de I , de R , et de M_v , nous pouvons employer les formules (1) et (3) pour trouver T .

Plaque	Phase	Log R	M_v	I	T par (1)	T par (3)	Moyenne
E	133	4,432	0,96379	— 1,20	0,255	8314	8324
	130	0,433	0,99621	— 1,02	0,338	7587	7592
	41	0,454	0,99734	— 1,01	0,342	7555	7561
	48	0,537	1,00160	— 0,97	0,357	7438	7444
	20	0,608	1,00424	— 0,93	0,370	7339	7345
	159	0,641	1,00552	— 0,92	0,374	7310	7315
	62	0,688	1,00732	— 0,89	0,384	7236	7245
	71	1,134	1,01519	— 0,71	0,437	6870	6874
	60	1,144	1,01523	— 0,70	0,440	6851	6858
	R. max.	1,165	1,01536	— 0,69	0,442	6838	6841
R. max.	43	1,451	1,01267	— 0,60	0,461	6716	6722
	127	1,919	0,99856	— 0,47	0,476	6624	6632
	70	2,006	0,99766	— 0,46	0,477	6618	6624
	25	2,134	0,98807	— 0,42	0,475	6630	6636
	124	2,313	0,97754	— 0,38	0,472	6648	6654
	68	2,353	0,97483	— 0,37	0,471	6654	6660
	52	2,573	0,95899	— 0,34	0,459	6729	6735
	Min. lum.	3,075	0,91503	— 0,31	0,413	7031	7040
	64	3,239	0,89873	— 0,33	0,388	7207	7215
	125	3,338	0,89020	— 0,38	0,365	7377	7382
R. min.	132	3,469	0,88178	— 0,46	0,336	7603	7615
	3,575	0,87887	— 0,55	0,310	7818	7826	7822
	65	3,751	0,88643	— 0,69	0,285	8036	8044
	147	3,766	0,88790	— 0,71	0,282	8063	8072
	129	3,870	0,89807	— 0,85	0,260	8266	8274
	142	4,203	0,93842	— 1,13	0,241	8451	8460
	126	4,306	0,94998	— 1,18	0,243	8431	8440
	133	4,432	0,96379	— 1,20	0,255	8314	8324
							8319

¹ *Publicationi del R. Osservatorio Astrofisico di Arcetri*, fasc. 44, p. 41 et 42.

Le minimum de T correspond donc à la plaque E 70 (phase 2^d,006) et le maximum de T à la plaque E 142 (phase 4^d,203); c'est-à-dire que le minimum de T accompagne le maximum de I, et vice-versa. La courbe de variation de T, que l'on déduit de ce tableau, ne présente rien d'anormal.

§ 8. CALCUL DES PRESSIONS.

18. — Nous avons utilisé la relation suivante, que nous avions déjà signalée dans notre étude de SU Cassiopeiae:

$$\frac{T^4}{T_1^4} = \frac{1 - \beta}{1 - \beta_1} \cdot \frac{P}{P_1} .$$

En voici d'ailleurs rapidement la démonstration. En tout point de la masse gazeuse de l'étoile, on a:

$$P = p + p_r ,$$

où P est la pression totale, p la pression due à la force élastique du gaz, et p_r la pression de radiation.

On a aussi:

$$p_r = \frac{a}{3} T^4 .$$

où (a) est la constante de Stephan.

On peut donc écrire, en comparant deux étoiles, ou, ce qui revient au même, deux phases différentes d'une même Céphéide:

$$\frac{p_r}{(p_r)_1} = \frac{T^4}{T_1^4} .$$

D'autre part, d'après la théorie de M. A.-S. Eddington¹, on a:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_r = (1 - \beta) P ; \\ 1 - \beta = \frac{Hk}{gc} ; \end{array} \right.$$

H est la quantité d'énergie passant en un point, dans une direction radiale, par seconde et par cm²; k est le coefficient d'absorption, c la vitesse de la lumière, et g l'accélération due à la gravité.

¹ *Monthly Notices, 1916-17-18; Astrophysical Journal, 1918.*

Nous avons adopté ici les deux hypothèses primitives de M. A.-S. Eddington ; c'est-à-dire: 1^o H est, en chaque point, proportionnelle à g ; 2^o dans toute l'étoile, k est une constante.

En réalité, k varie avec la température; il décroît de la surface au centre de l'étoile¹; mais, en même temps, le quotient $(\frac{H}{g})$ croît; de sorte que le produit $(\frac{Hk}{g})$ reste à peu près constant.

La quantité β est donc une constante pour chaque étoile; chacune d'elles (ou chaque phase d'une Céphéide) possède son coefficient β . On trouve alors:

$$\frac{p_r}{(p_r)_1} = \frac{1 - \beta}{1 - \beta_1} \cdot \frac{P}{P_1};$$

et finalement:

$$\frac{T^4}{T_1^4} = \frac{1 - \beta}{1 - \beta_1} \cdot \frac{P}{P_1} = \gamma \cdot \frac{P}{P_1}.$$

Comme nous connaissons la variation de la température de T Vulpeculae, il suffit de trouver les valeurs successives de γ pour pouvoir connaître celles du rapport $\frac{P}{P_1}$.

Pour trouver la valeur de γ , on part de:

$$H = \frac{(1 - \beta) gc}{k};$$

et l'on sait que la luminosité L est donnée par la relation:

$$L = 4\pi R^2 H.$$

où H est alors le flux d'énergie relatif à la surface. On a aussi:

$$g = \frac{f\mu}{R^2} \quad [f = (6.66) \cdot 10^{-8} \text{ unités C.G.S.}],$$

où μ est la masse de l'étoile. On tire de tout cela:

$$H = \frac{(1 - \beta)f\mu c}{R^2 k}; \quad L = \frac{4\pi f c \mu}{k} (1 - \beta);$$

$$\frac{L}{L_1} = \frac{k_1}{k} \cdot \frac{1 - \beta}{1 - \beta_1};$$

le rapport $(\frac{k_1}{k})$ restant voisin de l'unité, on pourra poser :

$$\gamma = \frac{L}{L_1} = \frac{1 - \beta}{1 - \beta_1};$$

¹ A.-S. EDDINGTON. *Monthly Notices*, 1922.

or, $\left(\frac{L}{L_1}\right)$ est donné par la loi de Pogson:

$$\log \frac{L}{L_1} = 0,4(m_1 - m),$$

où les différences $(m_1 - m)$ sont connues, puisqu'on connaît la courbe de lumière.

La formule en question:

$$\frac{P}{P_1} = \frac{1}{\gamma} \cdot \left(\frac{T}{T_1}\right)^4$$

conduit alors au tableau numérique suivant, pour lequel on a $T_1 = 8319^\circ$, et $\log T_1 = 3,92007$.

Plaque	m	$m_1 - m$	$\log \gamma$	$\log \left(\frac{1}{\gamma}\right)$	$\log \left(\frac{T}{T_1}\right)^4$	$\log \frac{P}{P_1}$	P en fonction de P_1
E 133	5,43	0	0	0	0	0	P_1
130	5,61	-0,18	1,92800	0,07200	1,84068	1,91268	0,81786 P_1
41	5,62	-0,19	1,92400	0,07600	1,83334	1,90934	0,81160 P_1
48	5,66	-0,23	1,90800	0,09200	1,80624	1,89824	0,79112 P_1
20	5,70	-0,27	1,89200	0,10800	1,78297	1,89097	0,77798 P_1
159	5,71	-0,28	1,88800	0,11200	1,77610	1,88810	0,77286 P_1
62	5,74	-0,31	1,87600	0,12400	1,75891	1,88291	0,76368 P_1
71	5,92	-0,49	1,80400	0,19600	1,66805	1,86405	0,73122 P_1
60	5,93	-0,50	1,80000	0,20000	1,66375	1,86375	0,73072 P_1
R. max.	5,94	-0,51	1,79600	0,20400	1,65994	1,86394	0,73104 P_1
43	6,03	-0,60	1,76000	0,24000	1,62893	1,86893	0,73949 P_1
127	6,16	-0,73	1,70800	0,29200	1,60525	1,89725	0,78932 P_1
70	6,17	-0,74	1,70400	0,29600	1,60341	1,89941	0,79325 P_1
25	6,21	-0,78	1,68800	0,31200	1,60656	1,91856	0,82901 P_1
124	6,25	-0,82	1,67200	0,32800	1,61126	1,93926	0,86948 P_1
68	6,26	-0,83	1,66800	0,33200	1,61283	1,94483	0,88070 P_1
52	6,29	-0,86	1,65600	0,34400	1,63229	1,97629	0,94687 P_1
Min. lum.	6,32	-0,89	1,64400	0,35600	1,70902	0,06502	1,16150 P_1
64	6,30	-0,87	1,65200	0,34800	1,74810	0,09610	1,24767 P_1
125	6,25	-0,82	1,67200	0,32800	1,79194	0,11994	1,31809 P_1
132	6,17	-0,74	1,70400	0,29600	1,84503	0,14103	1,38368 P_1
R. min.	6,08	-0,65	1,74000	0,26000	1,89299	0,15299	1,42230 P_1
65	5,94	-0,51	1,79600	0,20400	1,94074	0,14474	1,39554 P_1
147	5,92	-0,49	1,80400	0,19600	1,94678	0,14278	1,38924 P_1
129	5,78	-0,35	1,86000	0,14000	1,98974	0,12974	1,34817 P_1
142	5,50	-0,07	1,97200	0,02800	0,02838	0,05638	1,13862 P_1
126	5,45	-0,02	1,99200	0,00800	0,02426	0,03226	1,07711 P_1
133	5,43	0	0	0	0	0	P_1

134 RECHERCHES SUR L'ÉTOILE VARIABLE T VULPECULAE

19. — Il nous reste à choisir une valeur de P_1 , quoique cela ne soit pas absolument nécessaire pour dessiner l'allure de la courbe de variation de P .

On trouve une approximation de P_1 en appliquant la formule de Stephan-Bolzmann; la pression de radiation vaut:

$$(p_r)_1 = \frac{\sigma}{3} T_1^4 ,$$

où $\sigma = (1,374) \cdot 10^{-12}$ unités C. G. S.; on a donc :

$$(p_r)_1 = \frac{(1,374) \cdot 10^{-12} \cdot (8319)^4}{3} = 2194 \text{ unités C.G.S. ;}$$

mais on a d'autre part:

$$(p_r)_1 = (1 - \beta_1) P_1 , \quad \text{d'où} \quad P_1 = \frac{(p_r)_1}{1 - \beta_1} ;$$

et comme $R_1 = 9,2 R_{\odot}$ et $\mu = 5,5$:

$$1 - \beta_1 = 0,450 ;$$

on trouve donc:

$$P_1 = \frac{2194}{0,450} = 4876 \text{ baryes}$$


$$P_1 = \text{atm. } 0,004876 ,$$

soit environ 0,005 atmosphère.

Le tableau du n° 18 donne alors immédiatement les valeurs des pressions successives. On trouve:

Plaque	P (atm.)	Plaque	P (atm.)
E 133	0,005000	124	0,004347
130	0,004089	68	0,004404
41	0,004058	52	0,004734
48	0,003956	Min. lum.	0,005808
20	0,003890	64	0,006238
159	0,003864	125	0,006590
62	0,003818	132	0,006908
71	0,003656	R. min.	0,007112
60	0,003653	65	0,006978
R. max.	0,003655	147	0,006946
43	0,003697	129	0,006741
127	0,003946	142	0,005693
70	0,003966	126	0,005386
25	0,004145	133	0,005000

20. — *Courbe de variation de P* (fig. 7). — On constate que l'étoile met plus de temps à passer par la série des basses pressions qu'elle n'en met à passer par la série des hautes pressions;



l'état de compression maximum semble donc moins « supportable » que l'état de dilatation maximum.

Cependant, la différence entre la durée des pressions inférieures à celle qui règne lors du maximum de lumière (5000 baryes), et la durée des pressions qui lui sont supérieures, n'est pas si grande que la différence entre les durées respectives des branches descendante et ascendante de la courbe de lumière.

Remarque. — Les résultats obtenus dans ce mémoire pourront servir de base à une étude de la variation de l'ionisation dans T Vulpeculae.