

**Zeitschrift:** Archives des sciences physiques et naturelles  
**Herausgeber:** Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève  
**Band:** 16 (1934)  
  
**Artikel:** Sur la transformation de  $\text{NH}_4\text{Cl}$  à  $-30^\circ\text{C}$   
**Autor:** Weigle, J. / Huber, F.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-741520>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 14.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## 2. *Ecoulements tourbillonnaires.*

Alors que les recherches ci-dessus étaient en train, nous avons eu connaissance d'une note préliminaire de M. R. Mercier <sup>1</sup> sur le désarrangement des molécules d'eau en écoulement tourbillonnaire. Mercier a étudié celui-ci aux rayons X et il a montré qu'avec un écoulement correspondant à un nombre de Reynolds de 30000, il y avait une désorganisation considérable.

Nous avons donc essayé au moyen de l'appareil décrit ci-dessus de voir si cet effet pouvait être mis en évidence par des mesures de constante diélectrique. Avec des nombres de Reynolds allant jusqu'à 60000 pour l'eau et l'acétone, nous n'avons pas observé de variation et cela avec une exactitude de 1 pour 5000 environ. Il est intéressant de noter aussi que l'absorption n'a pas varié.

Ces résultats négatifs, qui concordent avec ceux que nous avons enregistrés ci-dessus, nous permettront peut-être de mieux comprendre la disposition des forces agissant au sein des liquides.

*Institut de Physique de l'Université.*

**J. Weigle et F. Huber.** — *Sur la transformation de  $\text{NH}_4\text{Cl}$  à  $-30^\circ \text{C}$ .*

Nous avons étudié aux rayons X la transformation du  $\text{NH}_4\text{Cl}$  qui a lieu autour de  $-30^\circ$ . Au moyen d'une chambre dont le principe a été décrit précédemment <sup>2</sup>, mais que nous avons adaptée pour les mesures aux basses températures, nous avons mesuré la constante réticulaire avec une précision de 1 pour 50.000 environ. L'exposition durait environ 90 minutes, pendant lesquelles la température de la substance était maintenue constante à moins d'un demi-degré près.

<sup>1</sup> MERCIER, Comptes rendus de la Société suisse de Physique, Morat, 1934.

<sup>2</sup> WEIGLE et SAINI, Ces Comptes Rendus, 49, 129, 1932.

Le tableau ci-dessous donne nos résultats:

$t^{\circ} \text{ C.}$	$a_1 \times 10^8 \text{ cm}$	$a_2 \times 10^8 \text{ cm}$
— 75°,0	3,8322	
— 41°,0	3,8400	
— 36°,6	3,8417	
— 34°,5	3,8427	
— 33°,3	3,8458	3,8551
— 32°,0	3,8459	3,8552
— 30°,3	3,8457	3,8551
— 29°,4	3,8458	3,8551
— 28°	(3,8458?)	3,8551
— 25°		3,8680
— 18°,7		3,8581
— 10°		3,8598
+ 20°		3,8663

*Constantes réticulaires  $a_1$  et  $a_2$  des deux modifications du  $\text{NH}_4\text{Cl}$ .*

On voit d'après ceux-ci qu'autour de — 30° le  $\text{NH}_4\text{Cl}$  se dilate soudainement lorsque la température augmente. Sur un intervalle de température de 5° environ, deux réseaux coexistent qui diffèrent de 0,3% environ dans leurs dimensions. On voit du reste sur nos photographies la proportion relative de ces deux réseaux changer avec la température. Alors qu'à — 33°,3 les réflexions du réseau  $a_1$  sont fortes, celles de  $a_2$  commencent à apparaître seulement tandis qu'à — 28° les lignes dues au réseau  $a_1$  sont à peine visibles.

Nos mesures diffèrent considérablement de celles de Smits et Mac Gillavry<sup>1</sup> faites macroscopiquement, qui montraient une transformation s'étalant sur 0°,3 seulement.

D'autre part, la précision de nos mesures nous permet d'affirmer qu'à basse température le réseau de  $\text{NH}_4\text{Cl}$  reste cubique à moins de 0,5 ‰ près<sup>2</sup>. Cette remarque est importante par le fait que nous avons pu mettre en évidence certains changements dans la constante diélectrique du  $\text{NH}_4\text{Cl}$  qui

<sup>1</sup> SMITS et MAC GILLAVRY, Z. phys. Chem., A., 166, 97, 1933.

<sup>2</sup> Voir J. WEIGLE, Ces comptes rendus, 51, 15, 1934.

rendent nécessaire une diminution de la symétrie lors de la transformation <sup>1</sup>.

Nous réservons pour une prochaine note l'analyse du phénomène du point de vue de la rotation du groupe  $\text{NH}_4$  dans le cristal.

*Laboratoire Reiger.  
Institut de Physique de l'Université.*

**G. Tiercy et A. Grosrey.** — *Sur la largeur des spectrogrammes pour les étoiles de type  $F_0$ .*

La présente note donne les résultats de mesures se rapportant à huit étoiles de type  $F_0$  et dont les magnitudes respectives sont comprises entre  $m = 3,00$  et  $m = 6,30$ . Les photographies ont été prises au moyen du prisme-objectif de Schaer-Boulenger par M. A. Grosrey. Pour chaque étoile, on a fait plusieurs poses, dont les durées respectives sont de 1 min.,  $2\frac{1}{2}$  min., 5 min., 10 min., 20 min., 40 min.

Le tableau I donne les résultats bruts des mesures, les largeurs des spectres étant exprimées en  $\mu$ :

TABLEAU I.

$m$	Largeur, pour une pose de:						Courbe
	60 <sup>s</sup>	150 <sup>s</sup>	300 <sup>s</sup>	600 <sup>s</sup>	1200 <sup>s</sup>	2400 <sup>s</sup>	
3.00	75	96	115	127	151	206	$C_1$
3.62	51	92	109	127	149	183	$C_2$
4.48	29	49	79	96	115	166	$C_3$
4.92	17	25	37	66	92	120	$C_4$
5.12	21	27	44	63	78	107	$C_5$
5.73	18	23	33	38	61	97	$C_6$
6.04	26	32	39	55	65	83	$C_7$
6.30	—	25	31	40	54	64	$C_8$

Les Courbes  $C_i$  seront représentées par l'équation suivante:

$$y = A.10^{-\frac{1}{x^k}}, \quad (1)$$

<sup>1</sup> Voir aussi les mesures de A. HETTIG, Z. phys. Chem., A., 168, 353, 1934.