Zeitschrift: Archives des sciences physiques et naturelles

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 18 (1936)

Artikel: Note sur le spectre Raman de l'éther triméthylique de

l'oxyhydroquinone

Autor: Fried, S. / Susz, B.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-743111

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Propénylbenzène

(Grédy)

Cis

1264

1408

1642

Trans

1210

1278

1665

Iso-eugénol (Perrottet-Susz) Alcool cinnamique (Grédy)

Trans Cis Trans Cis

1410

1629

1209

1274

1657

1256

1408

1642

TABLEAU 3.

1230

1654

Les fréquences dans la région de 1270 cm⁻¹, sont absentes dans nos composés polysubstitués. A part cela il y a une excellente concordance entre ces divers spectres. Nous estimons que ces résultats permettent d'affirmer que l'on est bien en présence des isomères cis et trans de l'iso-eugénol.

Notre produit contient environ 20% de dirivé cis. Nous n'avions cependant trouvé dans le spectre Raman de ce produit qu'une seule fréquence éthylénique, celle du composé trans. Pensant que la fréquence caractéristique du composé cis se trouvait confondue avec celle du composé trans à cause de sa faible intensité, nous avons fait une nouvelle détermination du spectre Raman de notre produit de départ, en utilisant une dispersion du spectrographe beaucoup plus grande (13 Å par mm). Nous avons alors constaté la présence de deux raies: une fréquence forte (1652 cm⁻¹ composé trans) et une fréquence faible (1630 cm⁻¹ composé cis).

S. Fried et B. Susz. — Note sur le spectre Raman de l'éther triméthylique de l'oxyhydroquinone.

Au cours de recherches sur le spectre Raman de divers composés benzéniques polysubstitués ¹ nous avons constaté que le spectre de l'éther triméthylique de l'oxyhydroquinone (1, 2, 4, triméthoxybenzène) n'a pas été étudié, alors que ceux

¹ E. Briner, S. Fried et B. Susz, Compt. Rend. Soc. Phys. Genève, 52, 178, 1935; B. Susz et F. Fried, Id., 56, ??, 1936.

des isomères (1, 2, 3 et 1, 3, 5, triméthoxybenzènes) ont été déterminés par Kohlrausch et Pongratz ¹.

Nous avons donc préparé ce corps dans le but d'obtenir son spectre Raman. Nous avons oxydé l'hydroquinone d'après la méthode usuelle avec le mélange chromique. La quinone (II) ainsi préparée a été transformée d'après Thiele ² en triacétyloxyhydroquinone (III) par action de l'anhydride acétique et de l'acide sulfurique à basse température. Puis au moyen de sulfate de méthyle en milieu alcalin les groupes acétyles sont échangés par la méthode de Bargellini et Martegiani ³ contre des groupes méthyles aboutissant ainsi à l'éther triméthylique de l'oxyhydroquinone (IV).

Le produit brut est redistillé deux fois sous pression réduite (point d'ébullition: $126^{\circ}/12$ mm). On obtient une huile presque incolore dont le point d'ébullition à la pression ordinaire est de $242,5^{\circ}$ (littérature: $245-247^{\circ}$). Densité $d_4^{26}=1,1255$; indice de réfraction $n_D^{26}=1,53073$.

Le spectre Raman de ce corps a été obtenu avec le dispositif décrit dans les notes précédentes. Les expositions ont été faites dans les conditions suivantes:

- a) Substance pure, filtre (solution benzénique de métadinitrobenzène), fente 0,05 mm, temps de pose 17 heures. Pas d'altération.
- ¹ K. W. F. Kohlrausch et A. Pongratz, Monatshefte, 65, 17, 1934.
 - ² J. Thiele, Berichte, 31, 1247, 1898.
- ³ G. Bargellini et E. Martegiani, Gazz. chim. it., 41, II, 448, 1911.
 - C. R. Soc. phys. Genève, vol. 53, 1936.

b) Substance pure, mêmes conditions, mais sans filtre et temps de pose réduit à la moitié. La substance s'est un peu colorée, mais la constance de l'indice de réfraction indique qu'il n'y a pas eu de décomposition notable.

La concordance des deux spectres obtenus est excellente. Les fréquences trouvées et leur intensité relative sont les suivantes:

348 (m)	, 382	(m),	545	(m),	617	(m),	70	7 (F),
761 (FF	790	(ff?),	902	(ff?),	917	(m),	100	3 (f),
1022 (m)	, 1153	(f) ,	1184	(m),	1206	(ff),	125	6 (F),
1346 (FF), 1452	(F),	1506	(ff),	1542	(f) ,	160	1 (FF),
1652 (ff),	2827	(F),	3001	$(\mathbf{F}),$	3081	(\mathbf{F}) .		

Lorsqu'on compare ces fréquences avec celles des isomères, on voit que toutes les fréquences benzéniques, la fréquence 1452 cm^{-1} du groupe méthyle et la fréquence 3001 cm^{-1} de la liaison carbone-hydrogène ont des valeurs voisines.

P. Rossier. — Discussion de spectrogrammes d'étoiles B₅.

La documentation actuelle de l'Observatoire de Genève comporte 133 spectrogrammes 1 d'étoiles B_5 obtenus en 20 minutes de pose, sur plaques Cappelli-blu, au prisme-objectif Schaer-Boulenger. Ils concernent 85 étoiles et sont répartis sur 80 plaques. Nous nous proposons de résumer ci-dessous les résultats que nous a donnés leur étude. Pour le détail des méthodes nous renverrons aux études antérieures relatives aux étoiles A_0 ou F_0 ².

Photométrie spectrographique.— Les formules expérimentales donnant les longueurs des portions peu réfrangible, ultra-

¹ 21 d'entre eux ont été posés par M. Grosrey.

² Photométrie spectrographique et extinction atmosphérique; Relation entre les abscisses des extrémités d'un spectrogramme; Recherches expérimentales sur la largeur des raies de l'hydrogène stellaire; La longueur d'onde centrale en spectrographie astronomique, etc., notes parues dans les Archives et le Compte rendu de la Soc. de Phys. de 1930 à 1935 et reproduites dans les fascicules 13 à 29 des Publications de l'Observatoire de Genève.