

Compléments sur la géologie de la région de Barme (Champéry)

Autor(en): **Collet, Léon-W.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Archives des sciences physiques et naturelles**

Band (Jahr): **22 (1940)**

PDF erstellt am: **21.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-741725>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

En résumé, nous avons découvert dans la région Bonavau-Rossetan une zone d'écaillés d'autochtone dans le Flysch, se poursuivant en direction sur deux à trois kilomètres.

Des études en cours, plus détaillées, montreront si le train d'écaillés de la Saufle ne serait pas peut-être la réapparition, à l'état laminé, du noyau anticlinal du Malm de Sous-la-Dent.

Ce fait nouveau pose le problème de la séparation du Flysch de la Nappe de celui de l'Autochtone qui n'a pas encore été solutionné dans cette région.

Genève. Laboratoire de Géologie de l'Université.

Léon-W. Collet. — *Compléments sur la géologie de la région de Barme (Champéry).*

Stratigraphie. — De Loys, en 1928 (2) a donné comme suit la série stratigraphique dans les éléments autochtones de Barme; de bas en haut:

1. Malm;
2. Berriasien;
3. Valanginien;
4. Flysch.

Or Lugeon, en 1895 déjà, avait indiqué du *Nummulitique* à Barme dans sa carte géologique du Val d'Illiez (1, pl. VIII).

Gagnebin, en 1934, a introduit ce Nummulitique sur la feuille St-Maurice de l'Atlas géologique de la Suisse. Pour cet auteur le Nummulitique transgresse sur le Valanginien.

Des études détaillées que j'ai effectuées dans cette région m'ont montré la présence d'Hauterivien à *Toxaster neocomiensis* entre le Valanginien et le Nummulitique. Ce dernier transgresse donc sur l'Hauterivien.

L'Hauterivien de Barme débute, au contact stratigraphique avec les calcaires du Valanginien, par 5 m environ de calcaires siliceux qui passent à des marnes à Spatangues sur lesquelles transgresse le Nummulitique. Ces marnes sont entaillées par le chemin muletier qui du Plan de Barme conduit aux chalets du même nom, dans la traversée du « Mauvais pas ». Le sentier

que l'on suit des chalets de Barme pour atteindre le chalet de « Sous la Dent » passe sur cet Hauterivien marneux, ici renversé.

Sur le sentier qui du Plan du Miel conduit aux chalets de Barme, on voit, sur l'Hauterivien marneux, de l'*Urgonien* très réduit (4 m env.) sur lequel transgresse le Nummulitique. Ce dernier terrain a donc été déposé dans la région.

Le Nummulitique n'est pas limité à l'entrée du pâturage de Barme, comme l'indique la feuille St-Maurice, mais se retrouve dans le flanc renversé du Roc de Barme, au bord du torrent, sous l'Hauterivien.

Résumé. — La série stratigraphique dans les éléments autochtones de la région de Barme s'établit comme suit, de bas en haut :

1. Malm à Calpionelles;
2. Berriasien marneux;
3. Valanginien calcaire;
4. Hauterivien siliceux;
5. Hauterivien marneux;
6. Urgonien;
7. Nummulitique, brèches et calcaires;
8. Flysch argileux et schisteux.

Tectonique. — J'ai trouvé à l'ouest du chalet de « Sous la Dent » deux anticlinaux couchés de Malm et Berriasien, alors que la feuille St-Maurice n'en indique qu'un.

L'anticlinal inférieur, à charnière de Berriasien, domine le sentier à l'ouest du S de « Sous la Dent » (feuille St-Maurice de l'Atlas géologique). Plus à l'ouest un deuxième anticlinal, de Berriasien, à boutonnière de Malm, passe au-dessus du premier avec lequel il est raccordé par un synclinal de Berriasien.

L'anticlinal supérieur sort du glaciaire qui couvre les pentes au-dessus. En un point, des calcaires valanginiens recouvrent le Berriasien normal tandis qu'à quelques mètres à l'ouest c'est le Flysch.

Ces observations montrent que le Flysch de la Nappe a coupé irrégulièrement la série normale de l'anticlinal supérieur.

De Loys (2) a remarqué que le pli de la Saufle avait été

raboté par le Flysch qui « l'a tranché d'une ligne presque droite ».

Gagnebin (3) a observé que le Malm et le Berriasien de l'anticlinal qui domine le chalet de « Sous la Dent » sont coupés obliquement par le Flysch qui les recouvre, dans le deuxième ravin à l'est du chalet.

J'ai fait une observation semblable au *Dequemanlieu*. Le Flysch de la Nappe a coupé les têtes de couches verticales et les recouvre.

En résumé: Les observations de Loys, Gagnebin et les miennes se complètent et nous arrivons à la conclusion que *le rabotage des plis autochtones, par le Flysch de la Nappe, est un phénomène général dans la région de Barme.*

BIBLIOGRAPHIE

1. LUGEON, Maurice, *La Région de la Brèche du Chablais*. Bulletin Carte géologique de France, n° 49, 1895-1896.
2. LOYS, François DE, *Monographie géologique de la Dent du Midi*. Matériaux Carte géologique de la Suisse, nouv. série, liv. 58, 1928.
3. GAGNEBIN, Elie, *Champéry-Sezanfe-Salanfe-Salvan*. Excursion n° 15, p. 408-415. Guide géologique de la Suisse, 1934.

Publié avec l'autorisation de la Commission géologique de la Société helvétique des Sciences naturelles.

Genève. Laboratoire de Géologie de l'Université.

Léon-W. Collet et Charles Ducloz. — *Sur la présence de Malm autochtone à la base du Nummulitique du Pas d'Encel (cascade de la Saufle, en Rossetan).*

Dans une reconnaissance, signalée par Ducloz dans la première note de cette séance, nous avons eu l'impression que du Malm se trouvait dans la barre inférieure de Nummulitique, sous le Pas d'Encel, entre les points 1486 et 1380 (Feuille St-Maurice de l'Atlas géologique).

Les compléments sur la tectonique de la région de Barme, apportés par Collet dans la note précédente, nous amenèrent à chercher les deux anticlinaux autochtones de « Sous la