Zeitschrift: Archives des sciences [1948-1980]

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 9 (1956)

Heft: 1

Artikel: Observations sur le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur des

monts Euganéens, Padova (Saccocomas et Tintinnoïdiens)

Autor: Verniory, René

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-738961

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

- 3. Braenden, O. J., N. B. Eddy et H. Halbach, «Synthetic substances with morphine-like effect. Relationship between chemical structure and analgesic action. Problem of synthetic narcotic drugs». Commission on Narcotics drugs O.N.U., tenth session, 1955, 30 March.
- 4. ——and P. O. Wolff, «Synthetic Substances with Morphine-Like Effect — Chemical Aspects ». Bull. Wld Hlth Org., 1954, 10: 1003-1038.
- 5. Fromherz, K. und B. Pellmont, «Morphinantagonisten». Experientia, 1952, 8 (10): 394.
- 6. Gero, A., «Steric Considerations on the Chemical Structure and Physiological Activity of Methadone and Related Compounds ». Science, 1954, 119 (3082): 112-114.
- 7. Malorny, G., «Zur Wirkungsweise spezifischer Morphinantagonisten». Arzneimittel-Forschung, 1955, 252-259.
- 8. Radouco-Тномаs, C., «Les analgésiques-stupéfiants de synthèse en pharmacologie et thérapeutique». Compte rendu Inst. nat. genevois, 1956 (sous presse).
- 9. Rapport (4e) du Comité d'experts des drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie: « Substances synthétiques à effet morphinique ». Bull. des Stupéfiants, 1954, 6 (1): 48.
- Santarato, R., «Azione dei Farmaci sul Metabolismo del Piruvato nei feti e negli Animali giovani. II. Morfina e Morfinosimili di sintesi ». Boll. Soc. Ital. Biol. Sper., 1953, 29 (4): 628-630.
- 11. Schaumann, O., « Die Wirkungsspezifizität der Morphinähnlichen Analgetika ». Arzneimittel-Forschung, 1954, 4 (3a): 115-116
- 12. TAUBMANN, G., « Allylnorcodéine as an Antagonist to Morphine Effects ». Deut. Med. Wschr., 1954, 76 (35): 1302-1303.
- 13. Unterharnscheidt, Fr., « Morphi-Antagonisten ». Arzneimittel-Forschung, 1955, 11: 630-634.
- 14. Wolff, P.O., « Aperçu sur divers problèmes de la toxicomanie ». Schweiz. med. Wschr., 1953, 39: 932-936.
- 15. ZINDLER, M. von und P. GANZ, «Ein Antidot der Opiate». Deut. med. Wschr., 1954, 410-412.

Université de Genève. Institut de Thérapeutique.

René Verniory. — Observations sur le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur des Monts Euganéens, Padova (Saccocomas et Tintinnoïdiens).

Situation de l'affleurement et de l'échantillonnage.

A 31 km au SW de Padova s'étend la petite ville d'Este. Les carrières de Fontanafredda (seul affleurement de Jurassique de cette région) s'atteignent en allant à 9 km au nord de la ville.

De l'entrée de la carrière (au N du vallon), monter à la plate-forme supérieure d'exploitation. Près de la plaque tournante du decauville, une porte ferme un réduit dans le rocher. Les premiers échantillons sont pris au niveau de cette porte.

Description.

Le calcaire se présente en gros bancs (marbre de Fontanafredda) séparés par des niveaux noduleux de 5 cm d'épaisseur. Dimension des nodules: diamètre 6 à 10 cm, épaisseur 2 cm.

Les bancs, ainsi que les nodules, sont d'apparence spathique, de couleur gris beige à bleu clair; ils présentent de fines traînées plus foncées. La surface des bancs et des nodules est de teinte ocre, très claire.

Sous le microscope, c'est un calcaire fin, sans minéraux détritiques, dans lequel sont répandus en nombre variable (parfois jusqu'à 80-90% de la roche) des débris d'articles de Saccocoma [1], souvent en si mauvais état qu'il est difficile de les distinguer de simples fragments de calcite; ils sont cependant toujours nettement délimités.

Les secundibrachiales ont fréquemment leurs ailes brisées. Les traînées plus foncées du marbre ne sont que des accumulations de ces débris.

Les articles en bon état sont remarquables par leur épaisseur et leur solidité (caractère déjà signalé au Môle, Haute-Savoie [2], alors qu'en Provence les formes plus délicates prédominent).

Les sections les plus fréquentes sont comparables à celles des planches I et II [2]:

Planche I, fig. A2, A4, A10, A11; Planche II, fig. A4, A6, C4, C10, D1, D2.

A ces restes, il faut joindre quelques débris d'Aptychus.

La position stratigraphique de ces bancs est un peu incertaine:

D'après A. de Zigno [3], on serait en présence de l'Oxfordien.

Cependant Francesco Ferasin, dans une note [4], signale aux environs d'Udine, au-dessous du niveau à Calpionella alpina Lorenz, des calcaires noduleux riches en Aptychus et en articles de crinoïdes.

Plus haut, dans la carrière de Fontanafredda, on trouve un calcaire sublithographique compact, gris beige clair, un peu marneux, présentant des taches caractéristiques, ocreuses ou grises. La patine est crème ou jaunâtre très clair. Les cassures se font selon des dièdres à faces très lisses et planes.

Sous le microscope, on note la présence des Tintinnoïdiens suivants:

Calpionellites darderi Colom; Tintinopsella cadischiana Colom; Favelloides balearica Colom; Stenosemellopsis hispanica Colom,

espèces qui, selon leur auteur, sont toutes néocomiennes aux Baléares.

Il faut encore ajouter à cette liste des Radiolaires calcifiés. Les restes de Saccocoma sont absents.

Remarques et conclusion.

On doit relever la similitude des faunes entre les Monts Euganéens et le bassin du Rhône. Il semble judicieux de se demander si le premier niveau décrit n'est pas, topographiquement et stratigraphiquement, plus élevé que ceux étudiés par A. de Zigno. Une étude détaillée des bancs cités (qui ont livré deux ammonites corrodées et indéterminables) montrerait peut-être que l'on se trouve déjà dans le Séquanien.

L'absence de Calpionella alpina empêche de situer le début du Tithonique supérieur.

Le Néocomien est nettement déterminé par les Tintinnoïdes. Relevons la similitude de son facies avec celui de l'Ultrahelvétique.

Les formes puissantes des articles de Saccocoma, ainsi que leur fragmentation, laissent supposer une mer plus agitée qu'en Provence, mais cependant extrêmement propice à leur développement.

Université de Genève. Laboratoire de Géologie.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- 1. Verniory, R., « Eothrix alpina, Algue ou Crinoïde? ». Archives des Sciences, vol. 7, fasc. 4, 1954, pp. 327-330, 1 pl.
- 2. « La création du genre Lombardia Bronnimann est-elle justifiée ? ». Arch. des Sc., vol. 9, fasc. 1, 1956, pp. 85-92, 3 pl.
- 3. DE ZIGNO, A., «Sulla costituzione geologica dei Monti Euganei».

 Memoria letta all' I. R. Accad. di Scienze, Lett. ed. Arti di
 Padova nella Tornata del 10 febbr. 1861.
- 4. Ferasin, Fr., «Il Cretaceo nei dintorni di Cimolais (Udine) ». Rendiconti del Acc. Naz. dei Lincei, Classe di Sc. fisiche, matemat. e natur., serie VIII, vol. XVIII, fasc. 2, febbr. 1955.
- G. J. Béné. La résonance des électrons et des noyaux, et l'étude des champs magnétiques.

(Texte à paraître dans le numéro spécial des Archives des Sciences, consacré au colloque A.M.P.E.R.E, 1956.)