Zeitschrift: Archives des sciences [1948-1980]

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 14 (1961)

Heft: 3

Artikel: Le test du rongement du cobaye : comme expression de l'excitation

psychomotrice produite par l'amphétamine

Autor: Fleury, C. / Frommel, Ed. / Strassberger, L.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-739589

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

- Douxami, H. 1896. Etude sur les terrains tertiaires du Dauphiné, de la Savoie et de la Suisse occidentale. Ann. Univ. Lyon, sér. I, fasc. 2-7.
- Eprecht, W. 1948. Das Nummulitenerz von Lowerz (Schwytz). Beiträge zur Geol. der Schweiz. Geotechnische Serie, Kleinere Mitteilungen, Nr. 13.
- Feugueur, L. 1951. Nummulitique de la nappe de Morcles entre Arve et Suisse. B. S. G. F., Six. Série, tome 1, pp. 671-692.
- Gomez Llueca, F. 1929. Los Numulitidos de España. Com. invest. pal. y prehist. Mem., num 36, ser. pal. num 8, Madrid.
- Leutpold, W., Damian Buck, P. et Jeannet, A. 1932/35. Stratigraphische Profile des Nummulitikums von Einsiedeln-Iberg. Berichte der Schwytz. Naturforsch. Gesellschaft. Erstes Heft.
- LOMBARD, Aug. 1940. Géologie des Voirons. Mém. S.M.S.N., LXXIV, 1.
- Marie, P. 1957. Sur quelques gisements français à Microcodium. C.R. S.S.S. G.F., nº 9-10, pp. 171-175.
- Moret, L. 1934. Géologie du Massif des Bornes. Mém. Soc. Géol. Fr., T. X, fasc. 1-2.
- 1948/52. Curieux encroûtements de calcite attribués à des algues (Microcodium). Trav. Lab. géol. Grenoble, T. 30, p. 55.
- Lugeon, M. 1899/1900. Les dislocations des Bauges (Savoie). Bull. serv. carte géol. de la France, nº 77, t. XI.
- Perrier, R. 1960. Monts Margériaz et Colombier, vallées du Noyer et des Aillons. Tr. Lab. géol. Grenoble, T. 36, pp. 59-74.
- Traub, F. 1938. Geologische und Paläontologische Bearbeitung der Kreide und des Tertiärs im östlichen Rupertiwinkel nördlich von Salzburg. *Paläontolographica*, 88, Abt. A.
- —— 1938. Die Helvetische Kreide-Eozän-Serie des Haunsberges nördlich von Salzburg. Zeitschr. deutschen geol. Ges., 90.

C. Fleury, Ed. Frommel, et L. Strassberger. — Le test du rongement du cobaye, comme expression de l'excitation psychomotrice produite par l'amphétamine.


Nous avons décrit une technique pour l'inscription de l'excitation psychomotrice due à l'amphétamine chez la souris, celle de l'audiovibrographe qui inscrit la marche de l'animal [2]. Le cobaye, par contre, ne réagit pas comme la souris à l'injection d'amphétamine, il ne se déplace pas plus rapidement mais ronge ce qui se trouve à sa portée *.

Nous avons donc construit un appareil très simple capable d'inscrire la fréquence et l'intensité de ce rongement. Cinq cobayes par lot expérimental sont entreposés dans une caisse rectangulaire de bois de sapin (dimensions: $52 \times 24 \times 25$ cm). Les parois sont doublées à l'intérieur d'une planche de sapin de deux centimètres d'épaisseur dont le rebord supérieur est à la hauteur du museau des cobayes. Sur l'une des parois

^{*} Le cobaye injecté de cocaïne réagit de la même façon

externes nous plaçons un quartz (pick up) qui transmet les vibrations au Poliviso Sanborn à inscription thermoélectrique. L'expérience doit être communautaire, comme chez la souris, parce que les animaux s'excitent mutuellement sous l'influence de l'amphétamine (rôle de la vie communautaire sur la DL₅₀ de l'amphétamine chez la souris [1]).

Nous illustrons les résultats de cette technique par deux bandes d'inscriptions:



a) Cobayes injectés de 4 mg/kg s.c. d'amphétamine: rongement
b) Cobayes injectés de 4 mg/kg s.c. d'amphétamine et de 7 mg/kg s.c. de chlorpromazine: inhibition du rongement:

Conclusions.

Alors que la souris réagit à l'amphétamine par une accélération de la marche, le cobaye répond par le rongement.

L'inscription graphique nous permet d'estimer l'intensité et la fréquence du rongement, ce qui autorise à classer la technique décrite comme valable pour l'étude des drogues de psychopharmacie.

BIBLIOGRAPHIE

- 1. Chance, M. R. A. Aggregation as a factor influencing toxicity of sympathomimetic amines in mice. J. Pharmacol. exp. therap., 1946, 87, 214-219.
- 2. Strassberger, L., Frommel, E. et Fleury, C. Actographe électromagnétique et électronique des transmissions sonores ou vibratoires, l'audio-vibrographe. *Arch. Sci. Genève*, 1959, 12, 686-689.

Institut de Thérapeutique expérimentale de la Faculté de médecine de Genève.

Séance du 16 novembre 1961

A. Linder. — Principes et applications des méthodes statistiques à la recherche biologique.

Un article sur ce sujet paraîtra dans un prochain fascicule des Archives des Sciences.

Séance du 14 décembre 1961

W. H. Schopfer, Th. Posternak et Mlle D. Wüstenfeld. — Action spécifique de deux antagonistes du méso-inositol sur la cytogenèse d'une Levure, Schizosaccharomyces pombe Lindner.

L'isomytilitol (IM) (II) et l'oxyde de méthylène-2-pentahydroxycyclohexane-1, 3, 5/4,6 (OM) (III) sont des antagonistes du mésoinositol (MI) (I) exerçant une action inhibitrice marquée sur deux microorganismes auxo-hétérotrophes pour MI: Neurospora crassa « inositolless » et Schizosaccharomyces pombe. Ce dernier organisme a été l'objet de recherches approfondies.

Pour *S. pombe* en présence de 10γ de MI pour 10 cm^3 de milieu, le taux d'inhibition est voisin de 200 pour IM et de 600γ pour OM (sur milieu de Pennington modifié).

$$CH_2$$
 CH_2
 CH_2
 CH_2