Zeitschrift: Archives des sciences et compte rendu des séances de la Société

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 34 (1981)

Artikel: Pertubations métaboliques observées chez la souris swiss obèse

expérimentale exposée aux micro-ondes

Autor: Laurens, S. / Dumas, J.C.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-740048

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

PERTURBATIONS MÉTABOLIQUES OBSERVÉES CHEZ LA SOURIS SWISS OBÈSE EXPÉRIMENTALE EXPOSÉE AUX MICRO-ONDES *

PAR

S. LAURENS et J. C. DUMAS

RÉSUMÉ

Lors de travaux antérieurs nous avions observé chez différentes races de souris des perturbations métaboliques notables [1, 2, 3]. Nous avions constaté qu'à la suite d'irradiations chroniques, en cavités ou en chambre anéchoïque, certaines constantes physiologiques lipidiques présentaient une augmentation significative. Les micro-ondes ont donc un impact sur le métabolisme des graisses des animaux ne présentant par ailleurs aucun trouble pathologique. Nos recherches se sont donc naturellement orientées vers l'étude de l'influence possible des ondes électromagnétiques sur la souris atteinte d'obésité. Nous avons choisi comme substrat d'étude la souris SWISS présentant une obésité pathologique provoquée par un toxique: l'Aurothioglucose.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux d'expérimentation

Pour obtenir des souris obèses on peut faire appel à divers procédés. En 1949, G. Brecher et S. Waxler [4] ont montré que l'aurothioglucose ou A.T.G. provoquait chez la souris une hyperphagie suivie d'un important accroissement pondéral. Ces résultats furent confirmés plus tard par N.B. Marshall et coll. [5] qui montrèrent que ce syndrôme était dû à des lésions du noyau ventro-médian hypothalamique

Adresse des auteurs:

S. Laurens et J. C. Dumas Laboratoire de Physiologie et Hématologie U.E.R. de Sciences Pharmaceutiques Chemin des Maraîchers — Rangueil Université Paul-Sabatier 31077 — TOULOUSE — Cédex

^{*} Ces recherches ont été réalisées avec l'aide de la D.R.M.E.

par l'A.T.G. En outre, la toxicité de l'A.T.G., qui n'est pas négligeable, peut être diminuée par la technique de M. P. EDELMAN et coll. [6] en injectant préventivement aux animaux une solution de glucose hypertonique. Nous avons donc utilisé pour nos expérimentations la souris SWISS albinos. Nous avons injecté à ces souris, par voie intrapéritonéale, 0,25 ml d'une solution de glucose à 30%. L'hyperglycémie est atteinte au bout de 35 mn. On injecte alors aux souris, par voie intraveineuse, 0,20 ml d'une solution d'A.T.G. (750 mg/kg). Cette dose nous permet d'obtenir 89% de survivants et une forte proportion d'obèses au bout de 45 jours.

Les techniques d'irradiation

Nous avons retenu pour nos irradiations deux techniques: l'une en cavité, l'autre en chambre anéchoïque. La description de ces deux techniques a déjà fait l'objet de communications antérieures.




Fig. 1. — Variations des triglycérides sériques chez la souris obèse expérimentale SWISS exposée à une irradiation en cavité (2,40 GHz).

Durée de l'irradiation : 63 heures en continu ; puissance : 3,3 mW/cm² ; les chiffres dans les figures représentent les nombres d'animaux utilisés ; \triangle % : variations en pourcentage, entre animaux irradiés et animaux témoins. T : témoins ; Ir : irradiés ; Ic : intervalle de confiance.

Nous avons choisi, à titre comparatif, la même fréquence en cavité et en chambre anéchoïque (2,40 GHz) et une puissance comparable (3 à 5 mW/cm²).

Les paramètres biologiques retenus

Nous avons étudié les variations éventuelles des triglycérides, des β lipoprotéines, du cholestérol total et de la glycémie. Les techniques de dosages ont été déjà décrites dans le détail lors de communications précédentes.

RÉSULTATS

L'observation des figures 1 et 2 montre que les animaux irradiés ont un taux de T.G. toujours supérieur à ceux des témoins qu'elle que soit la méthode d'irradiation employée. La différence est significative lors d'une irradiation en cavité. Elle est plus faible et non significative lors d'une irradiation en chambre anéchoïque.




Fig. 2. — Variations des triglycérides sériques chez la souris obèse expérimentale SWISS exposée à une irradiation en chambre anéchoïque (2,45 GHz).

Durée de l'irradiation : 63 heures en continu ; puissance : $3 \pm 1 \text{ mW/cm}^2$; les chiffres dans les figures représentent les nombres d'animaux utilisés ; \triangle % : variations en pourcentage, entre animaux irradiés et animaux témoins.




Fig. 3. — ß lipoprotéines sériques des souris SWISS obèses expérimentales irradiées à la fréquence de 2,40GHz (en cavité).

Durée de l'irradiation: 63 heures; puissance: 3,3 mW/cm²; les chiffres dans les colonnes représentent les nombres d'animaux utilisés.

D 100 = D.0 × 100.




Fig. 4. — β lipoprotéines sériques de la souris obèse expérimentale SWISS, irradiées à la fréquence de 2,45 GHz (en chambre anéchoïque).

Durée de l'irradiation: 63 heures; puissance: $3 \pm 1 \text{ mW/cm}^2$.

Les β lipoprotéines augmentent de façon comparable chez les animaux exposés aux micro-ondes (fig. 3 et 4). Par contre la cholestérolémie diminue légèrement chez les animaux irradiés en chambre anéchoïque et en cavité. Cette variation n'est cependant pas significative (fig. 5).




Fig. 5. — Variations du cholestérol total chez la souris obèse expérimentale SWISS. Comparaison des effets obtenus par 2 méthodes d'irradiation.

T: témoins ; Ir: irradiés ; les nombres dans les colonnes indiquent le nombre d'animaux utilisés ; $puissance: 3 \pm 1 \ mW/cm^2$. CT: cholestérol total

Dans les mêmes conditions nous n'avons pas observé de variations de la glycémie de ces souris obèses exposées à ces irradiations non ionisantes.

Cette expérimentation, réalisée sur près de 150 animaux, montre que l'action des micro-ondes est plus importante sur la souris atteinte d'obésité que chez la souris normale. Il s'avère qu'une surcharge lipidique provoquée par une atteinte hypothalamique entraîne une sensibilisation de la souris obèse à ce type de rayonnement aux fréquences et à la puissance utilisées.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] Dumas, J. C. et S. Laurens (1977). Evolution des triglycérides sériques chez la souris exposée aux ondes électromagnétiques de 2 à 10 GHz. Arch. Sc. Genève, 30, fasc. 1, pp. 107-113.
- [2] Dumas, J. C., S. Laurens et G. Plurien (1977). Evolution des triglycérides et des lipoprotéines sériques chez la souris DBA 2 exposée aux ondes électromagnétiques. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 113, fasc. 1-2, pp. 157-163.
- [3] LAURENS, S., J. C. DUMAS et G. ROUX (1979). Modifications cinétiques des triglycérides sériques chez la souris DBA 2 soumise à un champ électromagnétique de 2,45 GHz en chambre anéchoïque. *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, 115, fasc. 1-2, pp. 65-70.
- [4] Brecher, G. and S. Waxler (1949). Obesity in albino mice due to single injections of Goldthioglucose. *Proc. Exp. Biol. Med.*, 70, pp. 498-501.
- [5] MARSHALL N. B., R. J. BARNETT and J. MAYER (1955). Hypothalamic lesions in Goldthioglucose injected mice. *Proc. Exp. Biol. Med.*, 90, pp. 240-244.
- [6] EDELMAN M. P., L. M. D. IRVING, M. D. SCHWARTZ, E. P. CRONKITE, G. BRECHER and L. LIVINGSTON (1965). The effect of hyperglycemia on hypothalamic gold uptake and hyperphagia in goldthioglucose treated mice. *Journ. Exp. Med.*, 121, pp. 403-413.