Zeitschrift: Archives des sciences et compte rendu des séances de la Société

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 39 (1986)

Heft: 3: Archives des Sciences

Artikel: Scaphisoma viti sp. n : un Scaphidiiae (Coleoptera) nouveau du

Pakistan

Autor: Löbl, Ivan

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-740373

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Arch. Sc. Genève	Vol. 39	Fasc. 3	pp. 387-390	1986	
				100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	

SCAPHISOMA VITI SP. N., UN SCAPHIDIIDAE (COLEOPTERA) NOUVEAU DU PAKISTAN

PAR

Ivan LÖBL

ABSTRACT

Scaphisoma viti sp. n. is described from Pakistan. A key to Pakistani species of the genus Scaphisoma Leach is given.

A ce jour, huit espèces du genre *Scaphisoma* Leach provenant du Pakistan ont été signalées (LÖBL, 1986b), toutes trouvées dans les régions septentrionales du pays, en moyenne à haute altitude (900-3000 m). Aucun Scaphidiidae, à part un exemplaire de *Baeocera ventralis* (Löbl) recueilli près d'Islamabad, n'a été, à ma connaissance, trouvé dans les plaines du Pendjab ni au sud du fleuve Kabul. En effet, le climat sec conjoint à la destruction avancée du milieu naturel y rend difficile la recherche de ces coléoptères hygrophiles et mycophages.

Toutefois, mon collègue Stanislav Vít (Genève) a découvert des sites favorables aux insectes hygrophiles dans les environs d'Islamabad, au cours d'un voyage au printemps 1986. Outre *Baeocera ventralis* (Löbl), *Baeocera serendibensis* (Löbl) et *Scaphisoma maindroni* Achard, espèces à vaste répartition, ces récoltes comportent une espèce nouvelle décrite ci-dessous.

Je tiens à remercier M. Vít pour tous ces Scaphidiidae qu'il a généreusement donnés au Muséum de Genève.

Scaphisoma viti sp. n.

Holotype &: Pakistan, environs d'Islamabad, forêt de plaine au sud-est de la ville, tamisage de la litière, 30.III.1986, leg. S. Vít (Muséum de Genève).

Paratype ♀, comme l'holotype.

Longueur 1,5-1,55 mm. Corps d'un brun rougeâtre très foncé (élytres plus clairs que l'avant-corps chez l'holotype). L'apex des élytres et l'apex de l'abdomen nettement

¹ Muséum d'histoire naturelle, case postale 434, CH-1211 Genève 6, Suisse.

plus clairs. Pattes d'un brun rougeâtre assez clair. Antennes modérément longues, articles I à VI jaunâtres, articles suivants rembrunis; rapport des longueurs des articles antennaires: III 5, IV 14, V 17, VI 19, VII 23, VIII 18, IX 22, X 20, XI 30 (holotype); IV grêle, V un peu plus large, VI nettement plus large que IV, chacun à peu près 4 fois plus long que large; VII et VIII chacun 3 fois plus long que large, VIII plus large que VI; XI presque 4 fois plus long que large, aussi large que VII. Pronotum large de 1,05 mm à la base; côtés régulièrement arrondis; carènes latérales non visibles en vue dorsale; ponctuation dense et très fine, à peine distincte au grossissement × 12 sur la base et au milieu, un peu plus forte et nettement plus dense à proximité du bord apical. Pointe du scutellum découverte. Elytres longs de 0,98-1,0 mm sur la suture (longueur maximum 1,10 mm), largeur maximum (1,15-1,20 mm) située devant le tiers intermédiaire de la longueur latérale; bord latéral légèrement arrondi; carène latérale découverte en vue dorsale, sauf en avant; bord apical tronqué; angle apical intérieur situé en arrière du niveau de l'angle extérieur; bord sutural relevé; strie suturale assez profonde, courbée en avant et prolongée le long du bord basal vers le milieu de sa




Fig. 1 et 2. — Scaphisoma viti sp. n., édéage.

largeur; espace juxtasutural étroit, avec une rangée de fins points; ponctuation fine à très fine sur le tiers basal (assez semblable à celle du pronotum), avec des points beaucoup plus petits que les espaces entre eux; ponctuation en arrière du tiers basal très dense et assez forte, constituée de points bien délimités, souvent aussi grands que les espaces entre eux. Pygidium dépourvu de microsculpture, sa ponctuation dense et relativement forte sur la moitié basale, plus espacée et très fine en arrière. Propleure lisse. Mésépimère très petit, à peu près aussi long que la moitié de la distance entre son sommet et la hanche II. Métasternum nettement convexe au milieu; pas de microsculpture ni de dépression; ponctuation éparse et très fine, un peu plus dense et mieux marquée sur sa partie médio-apicale. Aire mésocoxale longue de 0,05 mm, arrondie, à très fins points marginaux. Métépisternum plat, large de 0,12-0,14 mm, fortement rétréci en avant; suture intérieure rectiligne. Premier sternite abdominal apparent dépourvu de microsculpture, sa ponctuation relativement forte et très dense, constituée de points bien délimités, sauf à proximité du bord apical qui est très finement ponctué; aire postcoxale longue de 0,05 mm, arrondie, à forts points marginaux allongés. Sternites suivants ornés d'une microsculpture formée de points distincts au grossissement × 24. Tibias grêles et droits, les postérieurs longs de 0,50-0,51 mm.

Caractères sexuels du mâle. Articles I à III des tarses antérieurs légèrement élargis. Edéage (figs 1 et 2) long de 0,37 mm.

S. viti s'apparente à luctans Löbl et à sumatranum Löbl par les larges paramères à bord intérieur membraneux et le tubercule articulé du lobe médian bien développé, en diffère par la partie distale du lobe médian moins inclinée, et le sac interne pourvu d'une pièce médiane sclérotisée munie d'un crochet. Cette nouvelle espèce peut être distinguée facilement de ses congénères asiatiques à l'édéage similaire, par la combinaison des caractères suivants: article antennaire IV grêle, XI d'un tiers plus long que X; élytres à strie suturale prolongée le long du bord basal; ponctuation élytrale très fine sur le tiers basal, forte ensuite; premier sternite abdominal apparent dépourvu de microsculpture, sa ponctuation dense et forte, beaucoup plus forte que celle du métasternum; sternites suivants ornés d'une microsculpture formée de points.

Neuf espèces du genre *Scaphisoma* sont connues du Pakistan. Elles peuvent être séparées par le tableau suivant:

1	Stries suturales prolongées le long du bord basal des élytres	2	
_	Stries suturales plus ou moins courbées à la base des élytres, non prolongées		
	latéralement	5	
2	Segments abdominaux ornés d'une microsculpture formée de stries		
	transverses	3	
_	Microsculpture abdominale constituée de points	4	
3	Pronotum et élytres bicolores notatum	Löbl	
-	Pronotum et élytres unicolores noirâtres, avec l'apex des élytres plus clair		
	assimile curvistria Re	itter	

4	Ponctuation du premier sternite abdominal apparent éparse et très fine,
	comme celle du côté métasternal
_	Ponctuation du premier sternite dense et forte, beaucoup plus forte que
	celle du métasternum
5	Pas de microsculpture sur le premier sternite, sternites suivants ornés d'une
	microsculpture formée de points
—	Microsculpture abdominale formée de stries transverses 7
6	Articles antennaires IV et V courts, réunis plus courts ou aussi longs que
	l'article VI falciferum Löbl
_	Articles antennaires IV et V grêles, article V généralement nettement plus
	long que VImaindroni Achard
7	Elytres noirâtres, chacun orné d'une tache subbasale et d'une bande sub-
	apicale rougeâtres
_	Coloration des élytres différente
8	Pas de points en rangée transverse sur le côté métasternal. Elytres à étroite
	aire apicale claire. Espèce plus grande, longue de 1,75-2,0 mm
	forcipatum Champion
—	Côté métasternal avec des points en rangée transverse devant la hanche
	postérieure. Aire apicale claire des élytres large. Espèce plus petite, longue
	de 1,3-1,7 mm

BIBLIOGRAPHIE

Remarque. Les mensurations indiquées ont été effectuées comme dans mes études précédentes.

LÖBL, I. 1986a. Les Scaphidiidae (Coleoptera) du nord-est de l'Inde et du Bhoutan II. *Revue suisse Zool.* 93: 133-212.

— 1986b. Contribution à la connaissance des Scaphidiidae (Coleoptera) du nord-ouest de l'Inde et du Pakistan. Revue suisse Zool. 93: 341-367.