Zeitschrift: Archives des sciences et compte rendu des séances de la Société

Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève

Band: 45 (1992)

Heft: 1: Archives des Sciences

Artikel: Cucurbita Jablonsky et Urnulinella Borza et Samuel (foraminifères)

dans le Trias (Ladinien?-Carnien) méditerranéen en faciès recifal :

morphologie et taxonomie

Autor: Zaninetti, Louisette / Martini, Rossana

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-740329

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Archs Sci. Genève	Vol. 45	Fasc. 1	pp. 23-42	Mai 1992
-------------------	---------	---------	-----------	----------

CUCURBITA JABLONSKY ET URNULINELLA BORZA et SAMUEL (FORAMINIFERES) DANS LE TRIAS (LADINIEN?-CARNIEN) MEDITERRANEEN EN FACIES RECIFAL: MORPHOLOGIE ET TAXONOMIE

PAR

Louisette ZANINETTI* & Rossana MARTINI#

MOTS-CLEF: Trias, Foraminifères porcelanés, perforés, Pseudocucurbitidae, *Cucurbita*, *Urnulinella*, Sicile, Turquie, Taxonomie, Diagenèse.

KEY-WORDS: Triassic, porcelaneous, perforated Foraminifera, Pseudocucurbitidae, *Cucurbita*, *Urnulinella*, Sicily, Turkey, Taxonomy, Diagenesis.

ABSTRACT

The Triassic Foraminifers *Cucurbita* Jablonsky and *Urnulinella* Borza & Samuel (Pseudocucurbitidae Zaninetti *et al.*, 1982a) are redescribed and a new definition of the family Pseudocucurbitidae is proposed. The genera *Pseudocucurbita*, *Amphorella* and *Paratintinnina* are junior synonyms either of *Cucurbita* or *Urnulinella*. The effect of diagenesis on the structure and morphology of the tests is also discussed.

RÉSUMÉ

Les Foraminifères triasiques *Cucurbita* Jablonsky et *Urnulinella* Borza et Samuel (Pseudocucurbitidae Zaninetti *et al.*, 1982a) sont redécrits et une nouvelle définition de la famille des Pseudocucurbitidae est proposée. Les genres *Pseudocucurbita*, *Amphorella* et *Paratintinnina* sont considérés synonymes soit de *Cucurbita* soit d'*Urnulinella*. L'aspect morphologique des tests en fonction des transformations diagénétiques est également discuté.

RIASSUNTO

I Foraminiferi triassici *Cucurbita* Jablonsky e *Urnulinella* Borza e Samuel (Pseudocucurbitidae Zaninetti *et al.*, 1982a) sono ridescritti e viene proposta una nuova definizione della famiglia Pseudocucurbitidae. I generi *Pseudocucurbita*, *Amphorella* e *Paratintinnina* sono considerati sinonimi sia di *Cucurbita* sia d'*Urnulinella*. Viene discusso ugualmente l'aspetto morfologico del guscio, in funzione delle trasformazioni diagenetiche.

^{*} Département de Géologie et Paléontologie et Département de Zoologie, Université de Genève, 13, rue des Maraîchers, CH-1211 Genève 4, Suisse.

[#] Département de Géologie et Paléontologie, Université de Genève, 13, rue des Maraîchers, CH-1211 Genève 4, Suisse.

INTRODUCTION

Le «Carnien» en faciès récifal du domaine alpin méditerranéen renferme une microfaune très particulière de Foraminifères porcelanés, dont la validité des nombreux genres et espèces décrits (JABLONSKY, 1973; BORZA et SAMUEL, 1977a, b, 1978; SAMUEL et Borza, 1981; Samuel, Salaj et Borza, 1981; Senowbari-Daryan, 1983) mérite encore d'être discutée. Suite aux premières révisions taxonomiques (ZANINETTI et ALTINER, 1981, 1982; ZANINETTI et al., 1982a, b; Senowbari-Daryan, 1983, 1986, 1987), on peut déjà dire avec certitude que tous les noms appliqués à ces différentes formes se rapportent à un bien moins grand nombre de taxons, probablement à 5 ou 6 genres seulement et à une dizaine d'espèces. Ces divers Foraminifères sont des représentants de genres libres ou fixés, ils peuvent être enroulés, parfois avec une tendance assez marquée au déroulement, ou complètement déroulés; leurs tests porcelanés sont imperforés ou perforés. On rapproche habituellement ces Foraminifères soit du groupe des Ophthalmidium s.l. (Ophthalmidium, Paraophthalmidium, Spiriamphorella, Hydrania) pour les formes imperforées, enroulées ou peu déroulées, soit de genres déroulés et fixés tels que Cucurbita ou Urnulinella, à tests perforés. La structure thécale de ces deux derniers genres n'est pas sans évoquer celle de formes plus jeunes (Norien, Rhétien) du type Galeanella, avec toutefois un déroulement plus marqué et un dispositif particulier de fixation, le revêtement capillaire des loges, jusqu'ici jamais décrit chez les Galéanelles.

L'objet de cet article est de donner une description aussi complète que possible de Cucurbita Jablonsky, 1973, et d'Urnulinella Borza et Samuel, 1977a, ainsi que de la famille des Pseudocucurbitidae Zaninetti et al., 1982a, dans laquelle, après Senowbarl-Daryan (1987) et Loeblich et Tappan (1988), nous proposons également de regrouper ces deux genres. Les genres décrits par Borza et Samuel (1977a, b; 1978) Pseudocucurbita, Amphorella et Paratintinnina, sont considérés comme des synonymes soit de Cucurbita soit d'Urnulinella (voir synonymies).

Le matériel utilisé pour cette étude provient du Ladinien? – Carnien de Sicile (Formation Mufara, voir MARTINI et al., 1991a, b) et de faciès récifaux d'âge carnien du Taurus occidental (ZANINETTI et al., 1982a, b).

En Sicile, les Pseudocucurbitidae, représentés seulement par le genre *Cucurbita*, ont été observés dans des intercalations calcarénitiques de la Formation Mufara; ils sont associés à de très nombreuses *Hydrania dulloi* Senowbari-Daryan et à d'autres Foraminifères (MARTINI *et al.*, 1991a, b).

Dans les calcaires du Taurus, *Cucurbita* est associée à *Urnulinella* et à de nombreux autres Foraminifères (ZANINETTI et al., 1982a, b), tandis que la présence d'*Hydrania dulloi* y est douteuse.

Les espèces retenues pour les Pseudocucurbitidae de Sicile et de Turquie sont Cucurbita infundibuliformis Jablonsky et Urnulinella andrusovi Borza et Samuel.

LA FAMILLE DES PSEUDOCUCURBITIDAE

Miliolina Delage et Hérouard, 1896 Soritacea Ehrenberg, 1839 Pseudocucurbitidae Zaninetti *et al.*, 1982

La famille des Pseudocucurbitidae Zaninetti et al., 1982a, telle qu'elle est définie ci-dessous, se réfère à deux genres seulement, Cucurbita Jablonsky, 1973, espèce-type Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973, et Urnulinella Borza et Samuel, 1977a, espèce-type Urnulinella andrusovi Borza et Samuel, 1977a. Le rapprochement taxonomique des genres Cucurbita (= Pseudocucurbita) et Urnulinella dans la famille des Pseudocucurbitidae a déjà été proposé par Senowbari-Daryan (1987) et Loeblich et Tappan (1988).

DÉFINITION DE LA FAMILLE


Les représentants de la famille des Pseudocucurbitidae ont des tests fixés (et non libres comme indiqué in ZANINETTI et al., 1982a, et repris in LOEBLICH et TAPPAN, 1988), formés de loges arrangées en séries linéaires plus ou moins régulières ou partiellement enroulées; le proloculus et le stade initial sont inconnus; les loges, en forme d'urnes ou d'amphores, sont renflées à la base et se terminent par un col à paroi épaissie, qui s'étale distalement de manière à former un large plateau aréal, sur lequel est centrée l'ouverture; les loges, à l'exception du plateau aréal, sont munies d'un épais revêtement capillaire, formé d'abondants filaments radiaires ayant servi à la fixation et au piégeage de particules; ces filaments sont rarement conservés intacts (SENOWBARI-DARYAN, 1986), apparaissant le plus souvent sous la forme d'une masse micritique extrathécale (ZANINETTI et al., 1982a), homogène ou pouvant montrer des restes de l'orientation radiaire originelle des filaments; cette masse, de forme plus ou moins conique, est souvent érodée, elle peut disparaître complètement dans les calcaires recristallisés (Fig. 3). La paroi des loges est sombre, micritique, probablement originellement porcelanée, perforée; les perforations sont rarement visibles, on peut les identifier à la présence de lignes micritiques denses, perpendiculaires à l'axe des loges, généralement mieux conservées dans la région du col; la face orale est imperforée. Les tests sont souvent recristallisés et parfois affectés par un épaississement secondaire de la paroi résultant de l'accroissement des cristaux par néomorphisme («calcite overgrowth»). L'ouverture est simple terminale, en dépression au centre du plateau aréal.

EXTENSION STRATIGRAPHIQUE

La famille des Pseudocucurbitidae n'a des représentants qu'au Trias, dans l'intervalle du Ladinien? – Carnien.

LES GENRES CUCURBITA ET URNULINELLA

Les genres retenus valides (voir synonymie) appartenant à la famille des Pseudocucurbitidae sont *Cucurbita* Jablonsky et *Urnulinella* Borza et Samuel. Pour ce qui concerne l'architecture générale, la définition des deux genres correspond à celle de



A-F. Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973; diverses sections montrant une partie du test (2-4 loges alignées plus ou moins irrégulièrement), et la masse extrathécale qui représente le revêtement capillaire micritisé; celui-ci est en partie érodé. On notera la forme des loges en urne ou amphore à plateau aréal mince et très débordant; la paroi des loges est épaissie par accroissement néomorphique des cristaux («calcite overgrowth») et parfois déchirée par éclatement (spécimen B). Trias (Ladinien?-Carnien) de Sicile, Formation Mufara; A, E, F: éch. SI253; B, C: éch. SI252; D: éch. SI21b.

la famille; ces genres diffèrent toutefois entre eux par le diamètre de la loge, supérieur chez *Urnulinella*, par l'épaisseur de la paroi, plus fine chez *Cucurbita*, et par la forme de la loge; celle-ci se présente chez *Cucurbita* sous la forme d'un vase élancé et à col allongé, terminé par un large rebord, le plateau aréal; chez *Urnulinella*, la loge est subglobulaire, elle est munie d'un col court et épaissi, peu débordé par le plateau aréal; le diamètre de celui-ci est toujours inférieur au plus grand diamètre de la loge. Dans les deux genres, la cavité loculaire est identique, renflée à la base et effilée distalement.

ETAT DE CONSERVATION

Au sujet de l'état de conservation des Pseudocucurbitidae, il convient de remarquer que des exemples de tests encore entourés de la masse micritique extrathécale sont plus nombreux pour Cucurbita que pour Urnulinella, et des filaments capillaires conservés ne sont actuellement connus que chez Cucurbita (Senowbari-Daryan, 1986; SENOWBARI-DARYAN et ABATE, 1987; nos pl. 2, fig. 1; pl. 3, fig. 3, 5). Les meilleures illustrations montrant des restes du revêtement capillaire chez Urnulinella sont celles de SENOWBARI-DARYAN, 1987, et l'individu de notre pl. 4, fig. 6, dont l'interprétation schématique de Zaninetti et al., 1982a, fig. 1D, s'avère en conséquence non seulement incomplète, mais erronée. La présence de perforations, généralement soulignées par une micritisation précoce, peut être confirmée dans la paroi des deux genres; les perforations se présentent sous la forme de lignes sombres, parallèles au plateau aréal, généralement plus évidentes dans la région du col, surtout chez Cucurbita. SENOWBARI-DARYAN (1987, p. 258) considère que de telles structures sont le produit de phénomènes diagénétiques ayant affecté la paroi. Il semble plutôt à exclure que la recristallisation puisse introduire des structures aussi régulières et stables dans leur géométrie, leur orientation et leur position, que celles observées dans les tests de Cucurbita et Urnulinella. Les meilleurs exemples de conservation de ces structures sont ceux de BORZA et SAMUEL (1977a, pl. 7, fig. 1, holotype d'Urnulinella andrusovi, 1978; pl. 1, fig. 7, 8, Cucurbita), de Zaninetti et al., (1982a, pl. 2, fig. 3, 7, 8, Urnulinella) et de SENOWBARI-DARYAN (1983, pl. 12, fig. 2, 4, 5, Cucurbita); notre pl. 4, fig. 6, montre également les perforations chez Urnulinella.

LE GENRE CUCURBITA

CUCURBITA Jablonsky, 1973

Synonymes: *Pseudocucurbita* Borza et Samuel, 1978 *Amphorella* Borza et Samuel, 1977a, *pro parte Paratintinnina* Borza et Samuel, 1977b, *pro parte*

Espèce-type: Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973




Fig. 2.

A-J. Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973; même légende que pour la Fig. 1; l'éclatement de la paroi par accroissement néomorphique des cristaux est bien visible sur les spécimens A et F; l'individu J montre un revêtement capillaire conique, comparable à celui des spécimens illustrés par Senowbari-Daryan (1986, pl. 2, fig. 1) et Senowbari-Daryan et Abate (1987, pl. 10, fig. 1). K. Urnulinella

Synonymes: Paratintinnina tulipaformis Borza et Samuel, 1977b

Pseudocucurbita globosa Borza et Samuel, 1978

Pseudocucurbita subglobosa Borza et Samuel, 1978

Pseudocucurbita campanulaformis Borza et Samuel, 1978

Pseudocucurbita fusani Borza et Samuel, 1978

N.B. Senowbari-Daryan, en 1983, reconnut formellement l'identité de *Pseudo-cucurbita* et de *Cucurbita*, éliminant toutefois *Cucurbita*, nom déjà attribué à un Mollusque. Loeblich et Tappan (1988) rétablirent le genre *Cucurbita*, indiquant (p. 367-368) que «the previous use of *Cucurbita* for a mollusc was only a *nomen nudum* in a manuscript, hence does not preoccupy the present genus».

CUCURBITA INFUNDIBULIFORMIS Jablonsky, 1973

Pl. 1, Fig. 1-6; Pl. 2, Fig. 1-6; Pl. 3, Fig. 1-5; Pl. 4, Fig. 1-5. Fig. 1/A-F; Fig. 2/A-J; Fig. 3B.

- 1973 Cucurbita infundibuliforme, n. gen., n. sp., Jablonsky, Pl. 2, Fig. 1-4; Pl. 3, Fig. 1-6; Abb. 1.
- **1977a** *Amphorella subsphaerica* Borza et Samuel, Pl. 2, Fig. 10, 12.
- **1977a** *Amphorella bicamerata bicamerata* Borza et Samuel, Pl. 1, Fig. 8.
- **1977b** *Paratintinnina tulipaformis* Borza et Samuel, Pl. 70, Fig. 2-4.
- 1978 Pseudocucurbita globosa Borza et Samuel, Pl. 1, Fig. 1, 2.
- 1978 Pseudocucurbita subglobosa Borza et Samuel, Pl. 1, Fig. 3-6.
- 1978 Pseudocucurbita campanulaformis Borza et Samuel, Pl. 1, Fig. 7, 8; Pl. 2, Fig. 1-3.
- 1978 Pseudocucurbita fusani Borza et Samuel, Pl. 2, Fig. 4-6.
- 1981 Pseudocucurbita fusani Borza et Samuel Samuel et Borza, Pl. 21, Fig. 1; Fig. 4 (2/a-c).

andrusovi Borza et Samuel, 1977a; spécimen montrant deux loges de petite taille, appartenant à un stade jeune dans l'ontogenèse du Foraminifère. Le revêtement capillaire extrathécal est ici conservé et les perforations peuvent être observées dans la plus petite loge, sous la forme de lignes micritisées parallèles au plateau aréal. Trias (Carnien) récifal du Taurus (Turquie); A, B, C, E, F, H, J, K: éch. BT80-39b; D, G: éch. BT80-39a.

- 1981 *Pseudocucurbita subglobosa* Borza et Samuel Samuel et Borza, Pl. 21, Fig. 2; Fig. 4 (4/a, b).
- 1981 Pseudocucurbita campanulaformis Borza et Samuel Samuel et Borza, Fig. 4 (1/a-c).
- 1981 *Pseudocucurbita globosa* Borza et Samuel Samuel et Borza, Fig. 4 (3/a-c).
- 1981 Pseudocucurbita subsphaerica Borza et Samuel Samuel et Borza, Fig. 5/1.
- **?** *Galeanella infundibuliforme* (= *Cucurbita infundibuliforme* Jablonsky) Senowbari-Daryan, Pl. 10, Fig. 4, 5.
- 1982a Pseudocucurbita subsphaerica (Borza et Samuel) Zaninetti et al., Abb. 1/F-K; Pl. 1, Fig. 1-6, 8, 9.
- 1983 Paratintinnina tulipaformis Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 147, Fig. 8-10.
- 1983 Amphorella bicamerata bicamerata Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 148, Fig. 8.
- 1983 Amphorella subsphaerica Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 149, Fig. 10, 12, 14.
- 1983 *Pseudocucurbita globosa* Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 156, Fig. 1, 2.
- 1983 *Pseudocucurbita campanulaformis* Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 156, Fig. 7, 8; Pl. 157, Fig. 1-3.
- 1983 *Pseudocucurbita subglobosa* Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 156, Fig. 3-6.
- 1983 *Pseudocucurbita fusani* Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 157, Fig. 4-6.
- 1983 *Cucurbita infundibuliformis* Jablonsky Salaj, Borza et Samuel, Pl. 157, Fig. 7, 8.
- 1983 Pseudocucurbita infundibuliformis (Jablonsky) Senowbari-Daryan, Pl. 12, Fig. 1-8; Pl. 13, Fig. 1-11; Pl. 23, Fig. 11; Abb. 6-7.
- 1983 *Urnulinella andrusovi* Borza et Samuel Senowbari-Daryan, Pl. 18, Fig. 4.
- 1983 Pseudocucurbita subsphaerica (Borza et Samuel) Zaninetti et Altiner, Pl. 1, Fig. 4.
- 1986 Spiriamphorella? sp. Senowbari-Daryan, Pl. 1, Fig. 1.
- 1986 Pseudocucurbita infundibuliformis (Jablonsky) Senowbari-Daryan, Pl. 1, Fig. 2-4, 7, 9, 10; Pl. 2, Fig. 3; Abb. 2.
- 1986 *Pseudocucurbita*? sp. Senowbari-Daryan, Pl. 1, Fig. 6.

- 1986 *Pseudocucurbita infundibuliformis* ? (Jablonsky) Senowbari-Daryan, Pl. 2, Fig. 1,2; Abb. 1.
- 1987 *Pseudocucurbita infundibuliformis?* (Jablonsky) Senowbari-Daryan et Abate, Pl. 10, Fig. 1.
- 1987 *Pseudocucurbita infundibuliformis* (Jablonsky) Senowbari-Daryan, Pl. 1, Fig. 4-8.
- 1988 *Pseudocucurbita* Borza et Samuel Ciarapica *et al.*, Fig. 3/A-D.
- 1988 Pseudocucurbita subsphaerica (Borza et Samuel) Ciarapica et al., Fig. 3C.
- 1991 *Cucurbita* cf. *infundibuliformis* Jablonsky Martini *et al.*, Pl. 15, Fig. 1-8.

DESCRIPTION

HOLOTYPE

L'holotype de Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973, provient du Trias (Carnien inférieur) récifal des Carpates occidentales. Il s'agit d'un spécimen incomplet (2 loges), représenté par une section longitudinale centrée d'une loge en forme de vase élancé, cette même section atteignant tangentiellement la paroi d'une autre loge; cette dernière est donc orientée dans un plan différent de la précédente, ce qui confirme l'irrégularité de l'arrangement des séries de loges chez Cucurbita. Le nombre total des loges est inconnu. La cavité loculaire n'est visible chez l'holotype que dans la loge complète, qui montre également une paroi épaissie au niveau du col, ainsi que l'ouverture, toutefois peu distincte. Le plateau aréal est très prononcé et arqué, avec une concavité centrale dans laquelle se situe l'ouverture; le diamètre de ce plateau est égal à près de quatre fois le diamètre de la loge dans sa partie la plus renflée. La paroi est micritique, d'aspect opaque, elle est mince et ne s'épaissit qu'au niveau du col; à cet endroit, elle montre des alignements à peine perceptibles, plus sombres, parallèles au plateau aréal de la dernière loge. Ces alignements sont les témoins conservés de structures préexistantes, l'hypothèse la plus vraisemblable étant qu'elles se rapportent à un système de perforations du test. Le plateau aréal, fait de micrite dense, est imperforé. Le spécimen type de Cucurbita infundibuliformis peut dont être considéré comme un exemplaire bien conservé, au moins pour ce qui concerne le test, tandis que le revêtement capillaire est peu distinct; la finesse de la paroi montre aussi que le test n'a pas subi d'accroissement diagénétique de sa taille, comme on l'observe assez fréquemment chez les Pseudocucurbitidae.

Les autres individus illustrés par JABLONSKY (1973, pl. 2, fig. 1, 3; pl. 3, fig. 3, 5) se trouvent dans un état de recristallisation plus avancé que l'holotype; le col des tests apparaît en effet en zone éclaircie, interprétée par Jablonsky comme un espace libre à l'intérieur d'une paroi redoublée. L'ensemble du matériel de Jablonsky montre par ailleurs peu le revêtement micritique externe des tests, correspondant au reste micritisé des prolongements capillaires des loges chez les Pseudocucurbitidae.

EFFETS DIAGÉNÉTIQUES SUR LE TEST DE CUCURBITA INFUNDIBULIFORMIS

De nombreux individus attribués dans la littérature à plusieurs espèces des genres Pseudocucurbita, Amphorella (pro parte) et Paratintinnina (pro parte) (voir synonymie), semblent bien appartenir en réalité à Cucurbita infundibuliformis; non seulement l'espèce en effet se caractérise par une marge de variabilité assez importante pour ce qui concerne la forme de la loge, mais celle-ci peut encore subir des modifications secondaires de forme et surtout de taille consécutivement à des phénomènes de recristallisation, donc d'expansion de la paroi par «overgrowth» des cristaux de calcite. Dans de telles conditions, les tests «enflés» de Cucurbita ressemblent davantage à ceux d'Urnulinella (Fig. 1b; Fig. 2a), mais s'en distinguent toujours par un large plateau aréal débordant. La recristallisation en phase diagénétique a donc pour principal effet d'augmenter le volume des loges (Fig. 3), entraînant parfois des déchirures de la paroi (Fig. 1b, 2/a, f), mais elle tend aussi à réduire la cavité loculaire (Fig. 3/A, c), parfois jusqu'à disparition complète; de tels phénomènes s'accompagnent toujours d'une oblitération des perforations. Celles-ci seront en conséquence seulement visibles dans les tests peu recristallisés, sous la forme de lignes sombres parallèles au plateau aréal (SENOWBARI-DARYAN, 1983, pl. 12, fig. 2, 4).

LE GENRE URNULINELLA


URNULINELLA Borza et Samuel, 1977a. Synonyme: Amphorella Borza et Samuel, 1977a, pro parte.

Espèce-type: *Urnulinella andrusovi* Borza et Samuel, 1977a. Synonyme: *Spiriamphorella irregularis* Borza et Samuel, 1977a.

Urnulinella andrusovi Borza et Samuel, 1977a.
Pl. 4, Fig. 6.
Fig. 2K; Fig. 3A.

Fig. 3.

Schéma montrant l'évolution morphologique des tests des Pseudocucurbitidae en fonction de la diagenèse. A. Urnulinella andrusovi Borza et Samuel, 1977a. A1. Individu bien conservé, montrant le revêtement capillaire extrathécal micritisé, un plateau aréal nettement tracé et peu débordant, et quelques perforations (cf. Senowbari-Daryan, 1987, pl. 1, fig. 1-3, 9, 10); A2. Individu "overgrown" (cf. Zaninetti et al., 1982a, pl. 2, fig.1), montrant une paroi épaissie en "pied" de Galéanelle; la micrite de revêtement, ainsi que les perforations et le plateau aréal ont presque disparu. A3. Individu éclaté par accroissement diagénétique de la paroi et récristallisé (cf. Zaninetti et al., 1982a, pl. 2, fig. 3-5); la lumière loculaire apparaît réduite. B. Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973. B1. Individu bien conservé, loges à paroi mince et plateau aréal très débordant; perforations visibles au niveau du col et revêtement capillaire extrathécal conique, montrant encore l'orientation radiaire originelle des filaments (cf. pl. 2, fig. 1; pl. 3, fig. 3, 5; Senowbari-Daryan, 1983, pl. 13, fig. 1, 3, 4, 11); B/2, 3. Individus à paroi "overgrown", épaissie par diagénèse et parfois éclatée; masse extrathécale érodée ou disparue.



- 1977a *Urnulinella andrusovi*, n. gen., n. sp., Borza et Samuel, Pl. 7, Fig. 1-6.
- 1977a Amphorella subsphaerica Borza et Samuel, Pl. 2, Fig. 11?, 13?, 14?, non Fig. 10 et 12 (cf. synonymie Cucurbita infundibuliformis).
- **1977a** *Spiriamphorella irregularis* Borza et Samuel, Pl. 6, Fig. 1, 2, (3-8?).
- 1977 Galeanella panticae Zaninetti et Brönnimann Zaninetti, Pl. 1, Fig. 22-26.
- 1981 Urnulinella andrusovi Borza et Samuel Samuel et Borza, Pl. 21, Fig. 4; Fig. 5/2.
- 1982 Galeanella irregularis (Borza et Samuel) Zaninetti, Altiner, Dager et Ducret, Fig. 1/A-E; Pl. 2, Fig. 1-8.
- 1983 Urnulinella andrusovi Borza et Samuel Senowbari-Daryan, Pl. 17, Fig. 1-3, non Fig. 4; Pl. 23, Fig. 1, 2/A-B, 3B; Abb. 9.
- 1983 *Pseudocucurbita infundibuliformis* (Jablonsky) Senowbari-Daryan, Pl. 13, Fig. 2 (pro parte), 6.
- 1983 *Urnulinella andrusovi* Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 154, Fig. 1-6; Pl. 155, Fig. 1-6.
- 1983 Urnulinella irregularis (Borza et Samuel) Salaj, Borza et Samuel, Pl. 153, Fig. 1, 2, (3-8?).
- 1983 Amphorella subsphaerica Borza et Samuel Salaj, Borza et Samuel, Pl. 149, Fig. 11?, 13?.
- 1983 Galeanella irregularis (Borza et Samuel) Zaninetti et Altiner, Pl. 1, Fig. 3, 5-7.
- 1987 *Urnulinella andrusovi* Borza et Samuel Senowbari-Daryan, Pl. 1, Fig. 1-3, 9, 10.
- 1988 *Urnulinella*? sp. Pirdeni, Pl. 2, Fig. 5, 6.
- 1988 Urnulinella andrusovi Borza et Samuel, Loeblich et Tappan, Pl. 388, Fig. 6-9.

DESCRIPTION

HOLOTYPE

Le spécimen désigné pour holotype d'*Urnulinella andrusovi* par BORZA et SAMUEL (1977a, pl. 7, fig. 1) se présente sous la forme d'une seule loge, en section subverticale; l'holotype n'est donc pas représentatif du test complet et pluriloculaire d'*Urnulinella*, par ailleurs très semblable dans son architecture générale à celui de *Cucurbita*. La cavité interne arrondie, visible chez l'holotype, correspond à une coupe décentrée de la base renflée de la lumière loculaire, dont la forme générale est celle d'un vase muni d'un col,

comme on l'observe également chez *Cucurbita* ou chez de nombreux autres Miliolina. En aucun cas cette cavité ne saurait représenter la loge initiale, la région embryonnaire d'*Urnulinella* n'ayant à notre connaissance jamais été observée; ce fut pourtant l'interprétation donnée par BORZA et SAMUEL (1977a, p. 118-119), qui sans doute conduisit LOEBLICH et TAPPAN (1988, p. 368) à mentionner également l'existence d'un large proloculus chez *Urnulinella*.

L'holotype d'*Urnulinella andrusovi* ne donne en conséquence qu'une image très partielle du test de l'espèce, dont on ne connaît par ailleurs pas d'individus complets; à partir du spécimen type, on ne peut reconnaître que la forme en urne de la loge, avec son col large et court surmonté par le plateau aréal, au centre duquel se situe l'ouverture, peu distincte chez l'holotype.

La paroi enfin apparaît intensément recristallisée, en particulier dans la région du col, elle est aussi micritisée, en surface extérieure comme à l'intérieur de la loge. Quelques lignes plus ou moins continues, parallèles au rebord du col (plateau aréal) correspondent à des structures préexistantes micritisées, interprétées comme des perforations. Le plateau aréal est imperforé. A la surface externe de la paroi, aucun témoin net du revêtement capillaire extrathécal ne peut être décelé chez l'holotype.

AUTRES SPECIMENS D'URNULINELLA

Depuis la description d'*Urnulinella andrusovi* en 1977, l'espèce fut reconnue à plusieurs reprises dans le Trias alpin (Carpates, Dinarides, Alpes méridionales, Grèce, Taurus) et l'illustration actuelle offerte par la littérature permet de comprendre mieux la structure générale du test et de rapprocher *Urnulinella* de *Cucurbita*, proposition qui fut déjà celle de Senowbari-Daryan (1987) et Loeblich et Tappan (1988), dans la famille des Pseudocucurbitidae.

D'un point de vue structural, le test d'*Urnulinella* est en effet construit comme celui de *Cucurbita*, d'un enchaînement de loges s'accroissant rapidement, arrangées en une série irrégulière plus ou moins enroulée; les spécimens les plus complets montrent 4 à 5 loges mais le nombre total de celles-ci reste inconnu, le proloculus et le stade embryonnaire n'ayant jamais été observés. Par opposition au profil élancé des loges de *Cucurbita*, celles d'*Urnulinella* sont trapues et d'aspect robuste, étant solidement constituées d'une épaisse paroi, qui, dans sa partie distale, peut se développer en «pied» massif, à la manière des Galéanelles; ces dernières, d'ailleurs semblent proches d'*Urnulinella* (ZANINETTI *et al.*, 1982a), dont elles différeraient par l'absence du revêtement capillaire extrathécal et par l'enroulement du test.

EFFETS DIAGÉNÉTIQUES SUR LE TEST D'URNULINELLA ANDRUSOVI

Pour ce qui concerne la paroi, on ne connaît pas de spécimens d'*Urnulinella* ayant conservé la texture originelle porcelanée. Sans aucune exception, les exemples parvenus à notre connaissance (voir synonymie) présentent des tests sparitiques, munis d'un bord

micritique externe et interne, plus ou moins accusé. Des restes de perforations, plutôt rares, peuvent être observés dans la paroi; le plateau aréal est lui fait de micrite dense, il est en apparence imperforé. Dans quelques cas, notamment dans le matériel du Taurus, les tests d'*Urnulinella andrusovi*, comme ceux de *Cucurbita*, ont subi un accroissement diagénétique des cristaux («calcite overgrowth»), entraînant une expansion de la paroi, donc une augmentation parfois considérable du volume du test. De telles Urnulinelles adoptent alors un véritable profil de Galéanelles (Fig. 3/A, b, c), ce qui serait en faveur d'une certaine relation phylogénétique entre les Pseudocucurbitidae et les Galeanellidae.

CONCLUSION

Une étude des différentes coupes attribuées dans la littérature aux genres Cucurbita, Pseudocucurbita, Amphorella, Paratintinnina et Urnulinella montre, sur la base de l'orientation des coupes, sur la base également de critères de variabilité intraspécifique ou même d'ordre diagénétique, que seuls les genres Cucurbita et Urnulinella sont attribuables aux Pseudocucurbitidae; pour les mêmes raisons, toutes les espèces porcelanées à test perforé, fixées (avec pilosité extrathécale) et déroulées décrites dans la littérature dans les calcaires récifaux du Ladinien?-Carnien semblent bien se rapporter aux seules espèces-types de ces genres, Cucurbita infundibuliformis Jablonsky et Urnulinella andrusovi Borza et Samuel.

REMERCIEMENTS

La présente étude fait partie d'un projet de recherches biostratigraphiques et sédimentologiques sur le Trias téthysien, subventionné par le Fonds national suisse de la Recherche scientifique (L.Z. projet n° 21-27'699.89).

BIBLIOGRAPHIE

- BORZA, K. et O. SAMUEL (1977a). New genera and species (*Incertae sedis*) from the Upper Triassic in the West Carpathians. *Geol. Carpathica*, v. 28/1, pp. 95-119, Bratislava.
- BORZA, K. et O. SAMUEL (1977b). Paratintinnina tintinniformis and P. tulipaformis nov. gen. et nov. sp. (Incertae sedis) from Upper Triassic limestones of West Carpathians (Czechoslovakia). Z. K., Paleont., v. 2-3, pp. 143-150, Bratislava.
- BORZA, K. et O. SAMUEL (1978). *Pseudocucurbita* nov. gen. (*Incertae sedis*) from the Upper Triasic of the West Carpathians (Czechoslovakia). *Geol. Carpatica*, v. 29/1, pp. 67-75, Bratislava.
- CIARAPICA, G., S. CIRILLI, R. MARTINI, R. PANZANELLI FRATONI, G. SALVINI-BONNARD et L. ZANINETTI (1988). Spine e filamenti capillari nei Foraminiferi di ambiente recifale: esempi di adattamento nel Trias superiore. Atti 74° Congr. Soc. Geol. lt., v. B, pp. 125-131, Sorrente.
- JABLONSKY, E. (1973). Mikropoblematika aus der Trias des Westkarpaten. Geol. Carpathica, v. 42/2, pp. 415-423, Bratislava.

- LOEBLICH, A.R. Jr. et H. TAPPAN (1988). Foraminifera genera and their classification, 2 v., 970 pp., van Nostrand Reinhold Co., New York.
- MARTINI, R., L. ZANINETTI, B. ABATE, P. RENDA, J. DOUBINGER, R. RAUSCHER et B. VRIELYNCK (1991a). Données sédimentologiques et biostratigraphiques nouvelles sur le Trias (Formation Mufara) de Sicile (Italie). C. R. Acad. Sci. Paris, v. 312, II, pp. 1603-1608, Paris.
- MARTINI, R., L. ZANINETTI, B. ABATE, P. RENDA, J. DOUBINGER, R. RAUSCHER et B. VRIELYNCK (1991b). Sédimentologie et biostratigraphie de la Formation Mufara (Sicile occidentale): Foraminifères, Conodontes, Palynomorphes. *Riv. lt. Paleont. Strat.*, v. 97/2, pp. 131-152, Milan.
- PIRDENI, A. (1988). The Triassic Benthic Foraminifera of Albania. Rev. Paléobiologie., vol. spéc. Benthos'86, 2, pp. 145-152, Genève.
- SALAJ, J., K. BORZA et O. SAMUEL (1983). Triassic Foraminifers of the West Carpathians. *Geol. ustav. Dionyza Stura*, 213 pp., Bratislava.
- SAMUEL, O. et K. BORZA (1981). *Paraophthalmidium* nov. gen. (Foraminifera) from the Triassic of the West Carpathians. Z. K., Paleont., v. 6, pp. 65-78, Bratislava.
- SAMUEL, O., J. SALAJ et K. BORZA (1981). *Bispiranella* nov. gen. (Foraminifera) from Upper Triassic of West Carpathians. Z. K., Paleont., v. 6, pp. 87-91, Bratislava.
- SENOWBARI-DARYAN, B. (1981). Zur Paläontologie des Riffes innerhalb der Amphyclinen-Schichten bei Hudajuzna, Slowenien. Acad. Sci. Art. Slovenica, v. 23/3, pp. 103-118, Ljublijana.
- SENOWBARI-DARYAN, B. (1983). Zur Gattung *Pseudocucurbita* Borza & Samuel, 1978 (= pro *Cucurbita* Jablonsky, 1973) und Beschreibung vergleichbarer problematischer Organismen aus der Obertrias des alpin-mediterranen Raumes. *Riv. lt. Paleont. Strat.*, v. 88/2 (1982), pp. 181-250, Milan.
- SENOWBARI-DARYAN, B. (1986). Neue Erkenntnisse über die Morphologie der Gattung *Pseudocucurbita* BORZA & SAMUEL (Foraminifera). *Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österreich*, v. 32, pp. 137-147, Vienne.
- SENOWBARI-DARYAN, B. (1987). Nachweis der Pseudocucurbiten in den Alpen (Foraminifera; Obere Trias). Senckenb. Lethaea, v. 68/1-4, pp. 255-261, Francfort.
- SENOWBARI-DARYAN, B. et B. ABATE (1987). Zur Paläontologie, Fazies und Stratigraphie der Karbonate innerhalb der «Formazione Mufara» (Obertrias, Sizilien). *Naturalista Sicil.*, s. 4, v. 10/1-4, 1986, pp. 59-104, Palerme.
- ZANINETTI, L. (1977). Sur quelques synonymes du genre Galeanella Kristan, 1958, un Foraminifère de la Téthys triasique. Note Lab. Paléont. Univ. Genève, v. 2, pp. 1-3, Genève.
- ZANINETTI, L. et D. ALTINER (1981). Les Galéanelles (Foraminifères) et formes apparentées dans le Trias supérieur de la Téthys. *Note Lab. Paléont. Univ. Genève*, v. 8/4, pp. 41-44, Genève.
- ZANINETTI, L. et D. ALTINER (1982). Les Milioliporidae (Foraminifères triasiques): hypothèse sur leur origine et leur evolution itérative. Rev. Paléobiologie, v. 1/1, pp. 7-12, Genève.
- ZANINETTI, L. et D. ALTINER (1983). «L'effet de cavité» dans la paroi des Foraminifères porcelanés récristallisés: deux exemples, les Milioliporidae (Galeanellinae et Pseudocucurbitinae) et les Nubeculariidae (Ophthalmidiinae). Rev. Paléobiologie, v. 2/1, pp. 9-11, Genève.
- ZANINETTI, L., D. ALTINER, Z. DAGER et B. DUCRET (1982a). Les Milioliporidae (Foraminifères) dans le Trias supérieur a faciès récifal du Taurus, Turquie. I. Proposition pour une nouvelle subdivision. *Rev. Paléobiologie*, v. 1/1, pp. 3-103, Genève.
- ZANINETTI, L., D. ALTINER, Z. DAGER et B. DUCRET (1982b). Les Milioliporidae (Foraminifères) dans le Trias supérieur à faciès récifal du Taurus, Turquie. II. Microfaunes associées. Rev. Paléobiologie, v. 1/2, pp. 105-139, Genève.




PLANCHE 1




PLANCHE 2




PLANCHE 3




PLANCHE 4

PLANCHE 1

Figs 1-6

Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973. Sicile, Formation Mufara, Ladinien?-Carnien. 1, 2) SI252; 3, 5, 6) SI252; 4) SI21b.

PLANCHE 2

Figs 1-6

Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973. Sicile, Formation Mufara, Ladinien?-Carnien. 1, 2, 4, 6) SI253; 3) SI21; 5) SI261.

PLANCHE 3

Figs 1-5

Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973. Taurus (Turquie), Carnien.

Le spécimen Fig: 3, 5, présente un revêtement capillaire particulièrement bien conservé, montrant encore l'orientation radiaire des filaments.

1, 3, 5) BT80-39b; 2, 4) BT80-39a.

PLANCHE 4

Figs 1-5

Cucurbita infundibuliformis Jablonsky, 1973. Taurus (Turquie), Carnien. 1, 2, 4, 5) BT80-39b; 3) BT80-39a.

Fig. 6

Urnulinella andrusovi Borza et Samuel, 1977a. Taurus (Turquie), Carnien. 6) BT80-39b.