

Verzeichniss der interessantesten Pflanzen des Sempachersee's und seiner Umgebungen

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Mitteilungen der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft**

Band (Jahr): **4 (1886)**

PDF erstellt am: **22.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

danum Chabraei Rehb. Walterswil? (J.); *Galium rigidum* Vill. Wikon, Dagmersellen (Prof. Kaufmann), Born (M. in Rhiner flor. tab.); *Dipsacus laciniatus* L. Kölliken-Oberentfelden, zweimal in einer Kiesgrube (W.); *Scabiosa suaveolens* Desf. Südwestseite des Born, Kirchrud-Waltersholz (W.); *Centaurea nigrescens* (*transalpina* Schleich) Dagmersellen, Reiden (St; W.) = *C. Scabiosa* L. (Dr. Hofstetter nach Rhiner); *Crepis globifera* Hall. fil. Zofingen (Suter), war wohl zufällig verschleppt; *Hieracium cymosum* L. Waltersholz, Kühstelli (W.); *H. villosum* L. Bülchenfluh (R. F.), Standortsverwechslung? *Pirola media* Sw. Beenthalrain bei Schöffland (1868: W.); *Gentiana campestris* L. Stempfelberg bei Dagmersellen (St.), ist wohl nur *germanica*; *G. utriculosa* L. Gschweich (St.; W.); *Veronica opaca* Fr. Hirzenberg = *polita*; *Melampyrum silvaticum* L. Säckwald, Winikerwald (S.), Schiltwald (W.); *Calamintha Nepeta Claviv.* Lostorf (Z.), ist wohl *officinalis*; *Galeopsis speciosa* Mill. St. Urban, Boowald, Pfaffnau, Seiler b. Z. (W.); *Lysimachia punctata* L. Holziken (W.); *Polycnemum arvense* L. Ettiswil, Wigger- und Suhrenthal (St.) = *Scleranthus annuus*; *Rumex maritimus* L. Oberester bei Entfelden (W.); *Thesium montanum* Ehrh. Kulmerau (W.); *Parietaria officinalis* L. Früher beim Kapuzinerkloster in Olten (W.); *Ulmus effusa* Willd. Ebenberg ob Schönenwerd = *Acer platanoides*; Engelberg (W.); *Potamogeton compressus* L. Suhrenthal in Gräben (W.); *Orchis tephrosanthos* Vill. Waltersholz bei Rued (W.); *Allium carinatum* L. Gschweich bei Etzelwil (St.); *Juncus Tenageya* Ehrh. Bottenwil-Moosersäge, Weg auf der Kölliker Schorrüti (W.), aufzusuchen!; *Luzula nivea* D. C. Sälischloß, ist großblüthige *albida* (J.); *Heleocharis ovata* R. Br. Bottenwil (W.); *Scirpus trigonus* Roth. Suhrenthal (St.) = bei Aarau; *Carex caespitosa* L. Sumpf- und Moorboden der Ebene hin und wieder (St.), wohl kaum ächt!; *C. depauperata* Good. Lostorf = *silvatica forma major* (Morthier nach Rhiner); *Digitaria ciliaris* Köl. Im Ruederthal am Straßenbord, in Schöffland an Mauern und deren Fuß an der Straße nach Rued (W.); *Calamagrostis neglecta* Fr. am Mauensee (K. in St. und im Herb. helv.: 1823), aufzusuchen! *Deschampsia flexuosa* Trin. Waldwiesen im Jura (W.); *Lasiagrostis Calamagrostis* Link. Unterer Hauenstein, Lostorf (Z.) = *Melica glauca* (J.); *Poa bulbosa* L. in unserm Gebiet? z. B. Heiterplatz?; *P. serotina* Ehrh. Gründelbrücke beim Marchstein (S.); *Bromus inermis* Leyss. Schöffland (W.); *B. commutatus* Schrad. Entfelden (Z.); *Lolium speciosum* Bieb. Gegen die Reider Hochfluh (St.); *Botrychium rutae-folium* A. Br. An einer Stelle links am Wege Kirchrud-Wüestmatt (W.); *Osmunda regalis* L. Sumpfstelle im Schiltwald. (W.).

Verzeichniss

der

interessantesten Pflanzen des Sempachersee's und seiner Umgebungen.

Rüti-Rippertschwand: *Solanum Dulcamara*, *Carex vesicaria*.

Boden-Adelwil: *Galium rotundifolium*, *Solanum Dulcamara*.

Chüsirainwald: *Ranunculus Lingua*? *Viola palustris*, *canina*,

Oxalis stricta, *Comarum*; *Circaea alpina* (J.); *C. intermedia* (St.); *Chrysosplenium oppositifolium* (Müller); *Sanicula*, *Cicuta*, *Thysselinum*, *Lonicera Periclymenum*, *nigra*; *L. nigra* \times *xylosteum*?; *Galium rotundifolium*; *Cirsium hybridum* (St.); *Campanula Rapunculus* var. *flore albo*; *Vaccinium Vitis idaea*, *uliginosum*; *Oxycoccus*, *Andromeda*, *Menyanthes*, *Solanum Dulcamara*, *Atropa*, *Veronica montana*; *Salix repens*? *Sparganium simplex*; *Calla palustris* L. In Sumpf- und Abzugsgräben, circa 200 Schritte links des Weges Truttigen-Rothenburg (1839: Dr. Räber; St.; 1868: J.; Muret etc.), einziger Standort in der Schweiz, da sie bei Meggen-Adligenschwil ausgerottet worden ist; *Carex elongata*, *echinata*, *canescens*, *Pseudocyperus*, *Alopecurus fulvus*, *Lycopodium*, *annotinum*, *Blechnum*; *Aspidium cristatum* (St.), beruht wohl auf Verwechslung mit *spinulosum*!

Weiher bei Truttigen: *Ranunculus aconitifolius*, *Nymphaea alba*, *Carex flava*, *vesicaria*.

Dachsellernwald: *Trifolium minus*, *Gottsmänigen*; *Adoxa*, *Mühle*; *Lonicera nigra*; *Campanula Cervicaria*, *Truttigen-Gottsmänigen* am Waldrand (St.); *Carex remota*.

Steinibühl: *Nymphaea alba*, *Veronica montana*, *Carex vesicaria*

Schlachtkapelle: *Lappa minor*.

Schlichtenwäldli: *Impatiens*, *Trifolium hybridum*; *Phelipaea coerulea*, gegen *Sempach* (St.).

Seehüsi: *Ranunculus aconitifolius*, *Caucalis*, *Senecio paludosus*; *Alsine tenuifolia* und *Bromus arvensis* gegen die Station.

Seesatz (Seeufer, und gegen *Sempach*): *Hydrocotyle*, *Senecio paludosus*; *Digitaria filiformis* (St.); *Equisetum palustre* var. *polystachyum*.

Sempachersee: *Nymphaea*, *Nuphar*, *Iberis amara*, *Parnassia*, *Senecio paludosus*; *Taraxacum paludosum* Schlecht., am linken Ufer (St.); *Vaccinium Oxycoccus*, *Solanum Dulcamara* und *Pinguicula vulgaris* (St.); *Gratiola*?; *Lysimachia thyrsoiflora* (St.; Gremli); *Polygonum mite*, *Betula pubescens*, *Salix incana* und *Typha latifolia* (St.); *Ophrys apifera* (K.; St.); *Carex Goodenovii*, *Pseudocyperus*, 2 *Cyperus*, *Schoenus ferrugineus*, *Cladium*, *Heleocharis acicularis*.

Linkes Seeufer:

Nottwil: *Vicia tetrasperma*; *athyrus Nissolia* (Sd.); *Senecio paludosus*; *Carduus nutans*, gegen *Sursee* (Kt.; St.); *Centaurea Scabiosa* var. *flore albo*, gegen *Hutprächtigen* (St.); *Rumex pratensis* und *Polygonum dumetorum* (St.).

Buttisholz: *Fumaria Vaillantii*, gegen *Gattwil* (St. in litt.: S.); *Salix fragilis* (St.).

Oberkirch: *Epilobium palustre*, *Cicuta* und *Senecio paludosus* (1858); *Ballota* (St.); *Carex nitida* Host., gegen das *Zellmoos* an trockenen Stellen (St.)?

Zellmoos: *Thysselinum palustre*, *Salix repens* und *Potamogeton fluitans* (St.).

Maria Zell: *Reseda Luteola* (St.); *Orlaya*; *Senecio erucifolius*; *Verbascum Lychnitis*, *Sursee-Schenkon*; *Aceras*, *Sursee-Zell* (Joh. Pfenniger durch S.).

Rechtes Seeufer:

Sempach: *Silene gallica* und *Coriandrum* (Dr. Hofstetter); *Lathyrus Nissolia*, *Chaerophyllum aureum*, *Carduus nutans*, *Linaria Cymbalaria*, *Polygonum Bistorta*, *Scilla bifolia*, *Holcus mollis*.

Am See: *Ranunculus Lingua* (St.); *sceleratus* (K.; St.); *Se-*

necio paludosus; *Passerina* (St.); *Herminium* (K.; St.); *Bromus arvensis* (ist wohl Krauers: *inermis*).

Strasse nach Mettenwil: *Geum rivale* var. *monstrosum*, *Rosa arvensis* var. *umbellata* God., *Lamium album*, *Allium vineale*.

Seehüsli bis Schenk: *Iberis amara*, *Caucalis* (St.).

Sempach-Schenk: *Epilobium rosmarinifolium* Hänk. (K.; St.), ob noch?; *Sherardia*, *Hieracium praealtum*, *Stachys annua*.

Eich-Schenk: *Parnassia*; *Myricaria germanica* Desv. und *Inula Vaillantii* (K.; St.), jetzt wohl verschwunden! *Pulicaria dysenterica*; *Stachys recta*, im Kies (St.); *Ajuga genevensis*, *Teucrium Botrys*, *Anagallis coerulea*; *Triglochin palustre* (K.; St.); *Epipactis palustris*, *Juncus obtusiflorus*, *Schoenus nigricans*, *Carex Oederi*.

Eichberg: *Conyza* (bis Schenk); *Passerina* (bis Kulmerau), *Cephalanthera grandiflora*, *Epipactis latifolia*.

Schenk: *Coronilla varia*, an Straßenrändern (Meyenberg durch Rhiner); *Verbascum Lychnitis*, gegen Sursee (K; St.); *Linaria Elatine*; *Veronica Teucrium*, gegen Kommlenbach; *Melittis*, Burg; *Leonurus* (K.; St.); *Ajuga Chamaepitys*; *Euphorbia dulcis*, gegen Tann; *Leucjum*, *Gagea lutea*, *Scilla bifolia*.

Am See: *Pedicularis palustris* (Müller); *Lysimachia thyriflora*, gegen Zell; *Euphorbia Cyparissias*, *Scirpus pauciflorus*.

Tann: *Staphylea pinnata*, Buholz und *Lonicera alpigena*, Käserntobel (St.); *Lathraea*, unter Jnglans im Weiler (Dr. Irenaeus Häller † nach S.); *Salvia verticillata*, Diebletzen, Hofstetten; *Daphne Mezereum*; *Scilla bifolia* var. *flore albo* im Zopfenberg.

Sursee: *Ranunculus aquatilis*, Suhre (St.); *Iberis amara*, *Isatis*, *Rapistrum rugosum*, *Alsine tenuifolia*, *Trifolium arvense*, *Vicia tetrasperma*, *Lathyrus Nissolia*, *Oenothera*, *Portulaca*; *Saxifraga tridactylites*, Herrengaben (St.), Zollhaus (Müller); *Chaerophyllum aureum*, *temulum*, *Adoxa*, *Anthemis arvensis*; *Carduus crispus* var. *flore albo*, im Kleinfeld; *Linaria Elatine*, *Veronica Teucrium*, *Calamintha officinalis*, *Lamium album*, *Galeopsis dubia*, *Stachys annua*, *Ballota*; *Lysimachia thyriflora*, am Henkergraben (St.); *Anagallis coerulea*; *Chenopodium hybridum* (Steigers: *urbicum* L.); *Polygonum Bistorta*, *amphibium* var. *natans*, mite; *Mercurialis annua*, Kleinfeld-Surseeewald an der Straße (K.; St.; Hans Lüscher; Dr. Hofstetter!); *Urtica urens* (K.); *Carpinus*, Hasenwart. *Lemna arrhiza* L. in einem Morast bei Sursee (Höpfner, Magazin für die schweizerische Naturkunde, Bd. IV); *Scilla bifolia*; *Allium oleraceum* (1858); *A. vineale*; *Carex Hornschuchiana* und *filiformis*, am See; *Catabrosa*, gegen Mauensee, links der Straße (noch 1885!).

Surseeewald: *Ranunculus aconitifolius*; *auricomus* und var. *renifolius* Wirtg., gegen den Mauensee; *Nymphaea alba*, oberhalb dem Sennhaus; *Aconitum Lycoctonum*, *Actaea*; *Rhamnus cathartica*; *Lathyrus palustris*? *Pirus communis*, *Myriophyllum verticillatum*; *Dipsacus pilosus*, Sursee-St. Erhardt (K. St.); *Solidago serotina* Ait., Brücke unterhalb der Neumühle und gegen das Sennhaus am Suhrenufer gesellig und constant (1883, 1884); *Menyanthes*, *Atropa*; *Pulmonaria obscura*, Sursee-St. Erhardt im Wäldchen (St.); *Veronica montana*, *Utricularia vulgaris*, *Rumex nemorosus*. *Polygonum Bistorta*; *Asarum europaeum*, Sursee-Knutwil, häufig (St.); *Mercurialis perennis*; *Potamogeton crispus*, *perfoliatus* und *pusillus*; *Sparganium minimum* Fr., Neumühle - Sennhaus (1884); *simplex*; *Allium ursinum*; *Veratrum album* L., nahe der Schaubernmühle auf feuchten Matten (St; fand sich von da auch in den Herbarien zweier Trienger Bezirksschüler: S.), ob noch?

Juncus diffusus Hopp. (*effusus* \times *glaucus*) (St.); *Carex elongata* und *Goodenovii*, Lichtung zwischen Hitzligen und dem Geunensee'r Zollhaus, bei dem Häuschen nahe der Suhre ob dem Sennhaus (Gemeindegrenze); *C. longifolia*, *Alopecurus pratensis*; *Epipactis atrorubra*, rechts der Eisenbahn (St.), *Aspidium cristatum* (St.), wohl mit *spinulosum* verwechselt!

Solothurnerjura.

Oensingen: *Ranunculus auricomus*; *Erucastrum incanum*, Bahnhof, vorübergehend; *Alyssum calycinum*; *Reseda luteola* (Ziegelhütte); *Vaccaria*, auf Schutt, vorübergehend; *Staphylea*, *Lotus tenuis* Kit., *Thrinchia hirta* Roth und *Euphorbia Gerardiana* (Montandon); *Rosa glauca* Vill. und *ferruginea* Vill. Schwengimatt (Ch.); *Saxifraga tridactylites*, Clus (Müller); *Pirus Malus*, Straße nach Ballstall; *Bupleurum longifolium* (Sd.); *Chaerophyllum aureum*; *Asperula glauca*, *Lathraea* und *Leucocjum*, äußere Clus-Bahnhof; *Dipsacus silvestris*; *Inula Helenium*, verw.; *Carduus crispus* var. *flore albo*, am Dorfbach; *Vinca minor* var. *flore rubro* und *Buxus*, im Hinterdorf; *Linaria spuria*; *Veronica triphyllos* (E. Steiger, pharm.); *Ballota*, *Aristolochia*; *Carex tenuis* (Moritzi); *Taxus*, *Scolopendrium*.

Südlicher Fuss der Rafälle: *Tunica prolifera*, **Möhringia muscosa*, *Caucalis*, *Artemisia vulgaris*, *Barkhausia foetida*, *Verbascum Lychnitis*, *Orobanche Teucree*, *Ajuga chamaepitys*, *Orchis mascula*, *Muscari racemosum*.

Rafälle: *Ranunculus auricomus*, *Helleborus foetidus*; *Turritis*, *Arabis turrita*, alpina, **Draba aizoides*, **Kerneria*, **Thlaspi montanum*; *Iberis saxatilis* L., einzig hier in der Schweiz. (Oberlehrer Roth, etc.!), soll auch auf dem Sonnenwirbel vorkommen (Dr. von Arx in U.-Hallau); *Helianthemum vulgare* var. *grandiflorum* D. C. (Ch.; Sch.); **Polygala chamaebuxus*, auch mit rothen Flügeln; *Dianthus caesius* und var. *biflorus*; *Saponaria ocyroides*? (Ch.); **Rhamnus alpina*, *Coronilla emerus*, **vaginalis*, *Prunus mahaleb*, **Rosa alpina*, **spinosissima* und var. *mitis*; *tomentella* Lém. var. *concinna* Lagg. et Puget. (1871: Sd.); *vestita* God. (Shuttleworth in Godet); *Rosa rubella* Sm. var. *recurva* (Schmidt, Godet, Ch.) und *R. sabini* Woods. var. *ravellae* Chr., auf der vorderen Rafälle; 2 *Cotoneaster*, 2 *Pirus*, **Sorbus scandica*, *Aronia*, **Saxifraga aizoon*, **Libanotis*, *Athamanta*, *Laserpitium siler*, *Lonicera alpigena*; *Galium silvestre* var. **bocconeii* D. C.; var. *anisophyllum* Vill. (Ch.); var. *puberulum* Chr., beim Signal (Sd. etc.); var. *tenue* Vill. (Ch.); *Valeriana officinalis* var. *angustifolia* Tausch, **montana*, **tripteris*; **Bellidiastrum*, **Centaurea montana*, *Hieracium glaucum*, **humile*, **Phyteuma orbiculare*, *Campanula pusilla*, *rapunculoides*; *Erinus* (Ch.); *Orobanche Teucree*, *Thymus serpyllum* L., **Stachys recta*, **Teucrium montanum*, *Primula offic.* var. *suaveolens* Bert., annähernde Formen (Sd.); **Globularia cordifolia*, **Daphne laureola*; *Thesium montanum* Ehrh. (R. F.; Ch.), **alpinum*, *Asarum*, *Euphorbia amygdaloides*, etc., *Mercurialis perennis*; *Quercus pubescens* (Ch.); **Polygonatum officinale*; **Anthericum ramosum*, *Scilla*, *Carex alba*, *ornithopoda*, **humilis*, **Melica glauca*, **Pinus montana* var. *pumilio* Hänk., *Polypodium*, *Asplenium fontanum*, *A. adiantum nigrum* L.; *Viscum album*, auf Tilia.

Roggen- und Roggenfluh: Außer den, oben mit Sternchen bezeichneten Arten: *Trifolium ochroleucum*, südl. vom vordern Hofe

(Oensingerroggen); *Rosa alpina*; *alpina* \times *spinosissima* (*rubella* auct. (Jessler in Ch.); *R. rubiginosa* var. *comosa* Rip. ob Holderbank (Ch.); *sepium* Thuill. var. *typica* ob der Bechburg; *mollis* Sm. var. *typica* (Ch.); *dumetorum* Thuill. var. *trichoneura* Rip. (Ch.) und var. *urbica*; *Alchemilla montana*, *Cotoneaster tomentosa*, *Peucedanum Cervaria*, *Heracleum alpinum*, *Laserpitium latifolium*, *Asperula cynanchica*; *Galium tenue* Vill., dichte gelbe, moderig riechende Rasen bildend, beim Signal (Sd.); *Centranthus angustifolius* D. C. und *Scrofularia Hoppei* Koch. (1867: J.;!), *Rumex scutatus* und *Thesium montanum* im Gerölle und Felsenschutt südlich der Fluh, *Thesium* auch auf Felsköpfen beim Signal (J.;!); *Senecio spathulaefolius* D. C., Nordabhang gegen Ballstall, aufzusuchen; *Crepis praemorsa*, *Campanula persicifolia*, *glomerata*, *Vaccinium Myrtilus*; *Arctostaphylos uva ursi* Sprgl., westlich vom Signal (1883!); *Ilex Aquifolium* var. *inermis*, *Gentiana Crucjata*, *verna*; *Cynoglossum officinale*, ob Niederbuchsitten (J.); *Erinus* (Seßler in Godet); *Orobanche Epithymum*, auf *Thymus Serpyllum* L.; *Androsace lactea*, südöstlich ob dem Balsthalerroggen (J.; Sd.); *Daphne Cneorum* L.; *Thesium pratense* Ehrh. Westseite der Fluh, unter *Pinus montana*? *Th. intermedium* wächst nicht hier! *Arum*, Oensingerroggen (842 meter), wohl der höchste Standort in unserm Jura! *Orchis ustulata*, *Gymnadenia odoratissima*, *Coeloglossum viride*, *Ophrys fuciflora*, *Epipactis atrorubens*; *Crocus vernus*, Nordabhang: Brentenhübel-Balsthalerroggen auf Weiden (circa 800 meter) (1883: Paul Sprüngli;!); *Tamus*; *Festuca amethystina* L., Weg vom vordern Hofe auf die Fluh (1884: J.); *F. silvatica*, *Elymus*, *Taxus*, *Asplenium viride*.

Schloss Bechburg: *Cheiranthus* (E. Steiger); *Iberis saxatilis* L. Cult. im Schloßgarten (Dr. von Arx); *Genista tinctoria*; *Amorpha fruticosa* L. und *Rhus Cotinus* L., verwildert; *Rosa arvensis* var. *umbellata* God.; *R. mollis* Sm. var. *typica* (Ch.) und *dumetorum* Thuill. v. *Thuilleri* ob der B. (Ch.); *canina* L. var. *andegavensis* Bast. (Riggenbach); *Saxifraga Aizoon*, *Chaerophyllum aureum*; *Senecio spathulaefolius* (Montandon); *Rumex Patientia* und *Allium fistulosum* (Shuttleworth); *Asplenium fontanum*.

Klusserroggen: *Thalictrum minus*, *Iberis saxatilis*, *Dianthus caesius*, *Athamanta*, *Laserpitium Siler*, *latifolium*, *Orobanche Teucrii*, *Daphne Cneorum*, *Anthericum Liliago*, *Festuca glauca*.

Alt-Falkenstein (Blauenstein): *Thlaspi montanum*, *Polygala Chamaebuxus*, *Coronilla vaginalis*, *Rubus saxatilis*, *Rosa alpina* var. *pyrenaica*, *Laserpitium Siler*, *latifolium*; *Galium boreale* (Felsenband, häufig); *Valeriana montana*, *Bellidiastrum*, *Rumex scutatus*; *Daphne Cneorum* (1867: J.; noch 1885!); *Convallaria majalis*, *Carex alba*.

In der Clus überhaupt: *Ranunculus auricomus*; *Berberis*, *Turritis*, *Arabis Turrita*, *alpina*, *hirsuta*, *Thlaspi montanum*, *Draba aizoides*, *Polygala Chamaebuxus*; *P. depressa* Wendr. (Montandon)? *Dianthus caesius*, *Coronilla Emerus*; *Rubus tomentosus* (Ch.); *Ribes uva crispa*, *Hieracium humile* (schon: Caspar Bauhin), *amplexicaule*, *Gentiana verna*, *Globularia cordifolia*; *Daphne Cneorum* (Moritzi); *Scilla*; *Asplenium fontanum*, an der Straße in der Ebene.

Ballstall (Balsthal): *Ranunculus auricomus*; *Hesperis* und *Lunaria rediviva*, letztere am Steinbachwasserfall (H.); *Teesdalea nudicaulis* R. Br. (H.)?; *Polygala Chamaebuxus* (Muttergotteschühli: Müller); *depressa* Wendr. (Montandon)? *Dianthus caesius*, *Dipsacus silvestris*; *inula Helenium*, verw.; *Hieracium*, *glaucum* All. var. *bupleuroides*

Gmel. (Ch. in Rhiner flor. tab.); *H. pulmonarioides* Vill. (Seßler in Godet suppl.); *Senecio spathulaefolius* D. C. (Montandon); *Calamintha Acinos* var. *hirsuta* (H.); *Melissa officinalis* L., gegen Waldenburg (Suter); *Rumex scutatus*; *Ophrys*-Arten, ob der Kirche.

Neu-Falkenstein und St. Wolfgang: *Cardamine Impatiens* L. (Gaud.); *Arabis Turrita*; *Dianthus silvestris* Wulf. Falkenstein, Felsen links der Straße Ballstall-Langenbruck (Gagnebin in Haller, H.), aufzusuchen! *D. caesius*, *Cotoneaster vulgaris*, *Libanotis*, *Athamanta*; *Carduus crispus* var. *flore albo* (H.); *Hieracium glaucum* All. var. *bupleuroides* Gmel. (H.); *H. amplexicaule*, *Gentiana acaulis*, *Primula Auricula*; *Rumex alpinus* L., gegen Mümliswyl (H.); *Daphne alpina*, Fluh östlich der Ruine und östlicher Fuß der Holzfluh ob dem Bache (J.; Pierre Studer etc.); *Bromus tectorum* (J.).

Holderbank: *Polygala Chamaebuxus*; *Dianthus silvestris* s. oben; *Rosa rubiginosa* L. var. *comosa* Rip., Roggen ob H. (Ch.); *Digitalis ambigua*, gegen Ballstall (Haller); *D. media* Roth. (*ambigua* × *lutea*), Allmend (Ch.); *Dipsacus silvestris*.

Alt-Bechburg Ruine und Schlosshöhe bei Langenbruck: *Kernera saxatilis*; *Dianthus caesius* (nicht *deltoides*: Ch.); *Gentiana verna*, *Gymnadenia conopea* var. *flore albo*, *Taxus baccata*.

Baslerjura.

Mit Benutzung von: Christ, Dr. H., Langenbruck in botanischer Beziehung. Basel 1874.

Langenbruck (s. auch: Alt-Bechburg): *Anemone Hepatica* (H.); *Ranunculus aconitifolius*, *nemorosus*, *Aconitum Lycoctonum*, *Actaea*, *Cardamine amara*, *Arabis Turrita*, *Dentaria digitata*, *pinnata*, *Iberis amara*, *Parnassia*; *Polygala Chamaebuxus*, z. B. gegen Bärenwil! *P. depressa* Wendr. L., Hauenstein (Montandon)? *Dianthus superbus*; *Stellaria palustris* Ehrh., früher auf Weiden (H.); *Hypericum tetrapterum*; *Geranium phaeum* (früher: H.); *silvaticum* (H.); *sanguineum* ob. Hauenstein (H.); *Rhamnus alpina*; *Trifolium ochroleucum* (schon Caspar Bauhin); *Lathyrus hirsutus*, *silvestris*, *vernus*; *Rubus bifrons* Vest. (Ch.); *Rosa alpina*, *arvensis*, *tomentosa*, *dumetorum*, *coriifolia*; *glauca* var. *myriodonta*, am Kellenberg; *ferruginea* Vill., cult. im Felsengarten des Herrn J. Bider; *canina*; *Sorbus domestica* L. (H.)=*aucuparia*; *Circaea alpina*? *Lutetiana*, *intermedia*; *Epilobium adnatum*, *Bupleurum rotundifolium*; *Orlaya*, *Chaerophyllum Cicutaria*, *aureum*; *Coriandrum*, verw.; 2 *Adenostyles*, *Bellidiastrum*, *Buphthalmum*, *Antennaria dioica*; *Anthemis tinctoria* (ein einziges Mal); *Senecio Fuchsii* (ob Schwengi); *Ilex Aquifolium* var. *inermis* (H.); *Gentiana lutea* etc., *Salvia glutinosa*, *Melittis*, *Stachys alpina*, *Rumex scutatus*, *Polygonum Bistorta*, *Daphne Laureola*, *Thesium alpinum*, *Asarum*; *Buxus*, wild in Hrn. Biders Felsengarten; *Orchis ustulata*, *globosa*, *Anacamptis*, *Coeloglossum viride*, *Platanthera montana*, *Ophrys fuciflora*, *Cephalanthera ensifolia*, *Epipactis atrorubens*; *Leucojum*, gemein; *Narcissus Pseudonarcissus* auf der «Matte»; *Tamus*, *Lilium Martagon*, *Carex pendula*, *alba*, *Melica glanca*.

Langenbruck-Waldenburg: *Malva Alcea* var. *tenuifolia* (H.), *moschata*; *Tetragonolobus* und *Orobanche Galii*, rechts an der Straße; *Petasites albus*, *Cirsium rigens*, *Campanula pusilla* (H.); *Cynoglossum germanicum* Jacq. und *Elymus*: Neunbrunnen (H.); *Primula Auricula* und *Narcissus poëticus*: Schloß W. *Rumex alpinus* L. Bilstein (H.; Ch.); *Daphne alpina*, Richtenfluh (Richtiflüh) (Fr.); *Betula*.

Dürstel: *Geranium molle*, *pyrenaicum*; *Rosa mollis* Fr. var. *typica*, gegen Langenbruck am Wege, ein Strauch (Ch.); *Heracleum Sphondylium* L. var. *floribus roseis* (H.); *Chrysanthemum corymbosum*? *Orchis ustulata*; *Ophrys muscifera* etc.; *Cypripedium* (Ch.).

Schönthal: *Ranunculus auricomus*, *Arabis alpina*, *Isatis*; *Geranium palustre* und *Impatiens*, gegen L.; *Valeriana tripteris* (F.); *Globularia cordifolia*; *Polygonatum verticillatum*, ob Sch.; *Tamus*.

Rehhag: *Thalictrum minus* (H.); *Aconitum Napellus* (Ch.); *Actaea* (Fr.); *Vicia silvatica*; *Laserpitium Siler*, im Drachenloch (Frische-Joset); *Adenostyles alpina*, *Hieracium humile*, *Veronica montana*, *Primula Auricula*; *Daphne Cneorum* (Bernoulli); *Cypripedium* (H.); *Luzula silvatica*, *Carex pendula*, *Taxus*.

Geissfluh: *Thalictrum minus*, *Aconitum Napellus*, *Dianthus silvestris*, *Rhamnus alpina*, *Coronilla vaginalis*, *Heracleum alpinum*, *Lonicera nigra*, *Petasites albus*, *Centaurea montana*, *Gentiana acaulis*, *verna*, *Primula Auricula*, *Taxus*. Alle Angaben von H.

Eptingen: *Ranunculus auricomus*; *Actaea* und *Festuca silvatica*: *Wengen*; *Alyssum montanum* (Montandon)? *Reseda lutea*, *Hypericum quadrangulum*, *Geranium palustre*; *Vicia silvatica*, im Gestühl; *dumetorum*; *Seseli montanum* L., zwischen Läuferfingen und dem Bülchen (fol. radical.: Krieger nach Ch.); *Bellidiastrum*, *Globularia cordifolia*; *Salix grandifolia* (H.); *Carex sempervirens* (W.; Sd.), *humilis*, *Asplenium viride*.

Widwald: *Isatis*, *Acer platanoides*, *Coronilla vaginalis*, *Rubus saxatilis*; *Rosa trachyphylla* Rau., auf Weiden gegen die Wasserfalle (1819: H.); *Cotoneaster tomentosa*; *Bupleurum falcatum*, gegen E., *Laserpitium latifolium*, *Orobanche Galii*, *Thesium alpinum*; *Daphne Cneorum*, *Widwaldflühli* (H.; noch 1884!); *Quercus pubescens*? *Carex humilis*, *alba*, *Polygonatum officinale*, *Taxus*.

Walten: *Dianthus superbus*, *Sedum album* var. *montanum*, *Valeriana montana*; *Cirsium eriophorum* und *Anacamptis*: *Dietisberg-Schmutzberg*; *Hieracium humile*; *Thymus Chamaedrys* var. *lanuginosus* Schk., gegen Schmutzberg, ist wohl *Th. Serpyllum* L.; *Passerina*, *Ophrys muscifera*, *aranifera*; *Carex strigosa* (H.)=*silvatica*! Alle Angaben von H.

Dietisberg: *Anemone Pulsatilla*, *Aquilegia vulgaris* var.; *Arabis Turrita*, beim Wasserfall, *hirsuta*, *Kerneria*, *Hypericum quadrangulum*, *Geranium silvaticum*, *Rhamnus alpina*, *Ononis procurrens* var. *flore albo*, *Trifolium rubens*; *Tetragonolobus*, ob dem Föhrenhügel; *Coronilla vaginalis*; *Vicia tenuifolia* D. C. in trockenen Bergäckern häufig; *V. angustifolia*, *Rubus saxatilis*, *Bellardi* W. N., *Rosa alpina* var. *pyrenaica*; *trachyphylla* Rau (1819); *pomifera* v. *jurana*, *Cotoneaster tomentosa*; *Epilobium trigonum* Schrk.?, *Ribes alpinum*, *Chryso-splenium alternifolium*, *Laserpitium latifolium* var. *asperum* Cr., *Chaerophyllum Villarsii*, *Lonicera nigra*, *Galium ochroleucum* (verum \times *Mollugo*), *Mollugo* var. *scabram* With., *Valeriana montana* und var. *subquaternata*, *platyphylla* und *incisa*; *Knautia longifolia*, *Adenostyles alpina*, *Buphthalmum*, *Carduus defloratus* und var. *biceps* und *pinnatifidus*, *Cirsium rigens*, *Taraxacum paludosum*, *Hieracium amplexicaule*, *vulgatum*, *Pirola minor* und var., *Gentiana acaulis*; *Atropa*, i. d. *Hard*, häufig; *Veronica Teucrium* und *Varietäten*, z. B. var. *canescens*, im *Roßwaidli*; *Rhinanthus angustifolius*; *Melampyrum silvaticum*?, *Phelipaea coerulea*, bei der *Allee*; *Origanum*

vulgare var. flore albo, *Stachys alpina*, *Prunella grandiflora* var. flore albo; *Ajuga genevensis* und var. *triphyllos*, *Globularia cordifolia*, vulgaris und var. *elatior*, *Quercus pubescens*, *Triglochin*, *Orchis mascula* var. flore albo; *Gymnadenia odoratissima*, häufig, auch auf dem kleinen Dietisberg; *Coeloglossum viride*, *Aceras*, Läufeifingen-kleiner Dietisberg; *Epipactis palustris*, *Allium*, oleraceum, *Tofieldia*, *Juncus lamprocarpus* var. *viviparus*, *Scirpus compressus*; *Eriophorum gracile*, Läufeifingen-Dietisberg? *Carex Hornschuchiana*, alba, humilis; *Agrostis alba* und var. z. B. *major*, *Poa sudetica* Hänk., *pratensis* var. *anceps* Gaud., *Festuca rubra*, *silvatica*, *Bromus asper*. *Taxus*. Alle Angaben von H. *Viola canina* (Sch.); *Herminium* (Ch.); *Aspidium Lonchitis* Sw. Hard (Fr.). *Dianthus superbus*, Hard (Bernoulli).

Känerkinden: *Pirus communis*, *Lemna gibba*, *Ophrys fuciflora* (Fr.).

Häefelfingen: *Iberis amara*; *Rosa rubiginosa* L. var. *umbellata* Leers. und *comosa* Rip. a. d. Straße nach Zeglingen. *Carex flava*.

Häefelfingen-Ruine Homburg: *Aquilegia vulgaris* var. *atrata* Koch., *Rhamnus alpina*, *Rosa dumetorum* Thuill. var. *typica*, *Sorbus scandica*, *Hieracium humile*, *Quercus pubescens*, *Tamus*. Alle ob dem Katzenbach gegen den Homburg.

Ruine Homburg: *Rhamnus alpina*; *Rosa tomentella* Lém. var. *concinna* Lagg. et Puget (Burekhardt); var. *sinuatidens* Chr. (Ch.); *spinulifolia* Dem. var. *typica* (Ch.); *pomifera* Herrmann var. *jurana* (H.; Ch.;!), auch am Bachufer am Fußwege nach Läufeifingen; *dumetorum* Thuill. var. *typica*; *R. cinnamomea*, *Syringa vulgaris* und *Philadelphus coronarius* auf der Südostseite der Ruine, seit 1798 verwildert (Ch.); *Bupleurum falcatum* gegen L.; *Valeriana officinalis* var. *augustifolia* Tausch; *Buphthalmum*, *Artemisia vulgaris*, *Globularia cordifolia*, *Hieracium humile*, *amplexicaule*, *Orobanche Galii*, *Ophrys muscifera*, *Carex alba*, *Melica glauca*.

Läufeifingen: *Papaver dubium*, *Arabis Turrita*, *Cardamine amara*; *Dentaria digitata* (Fr.), *Sinapis alba*, verw., *Reseda lutea*; *Cerastium arvense*, gegen Eptingen (Risleten) und gegen Wysen (Gsteig-Bitzenfeld); *Geranium palustre*, *Rubus saxatilis*; *Rosa arvensis* var. *umbellata* God. (Ch.); *micrantha* Sm. var. *typica*, gegen Sommerau (Ch.); *Peucedanum Cervaria*, *Chaerophyllum aureum*, *Dipsacus silvestris*, *Bellidiastrum*, z. B. gegen Eptingen und Hauenstein; *Leucanthemum Parthenium*, *Scrofularia Neesii*; *Veronica urticifolia* (Sch.); *Alectrolophus hirsutus*, *Mentha viridis*, *Teucrium montanum*, *Amarantus retroflexus*; *Gymnadenia odoratissima*, ob L. (H.).

Läufeifingen-Hupp: *Rosa tomentosa*, *Buphthalmum*, *Centaurea montana*; *Eriophorum dubium* Heg., Hupp (10. Juni 1869: F.)?

Wisenberg (theilweise noch im Solothurnerjura): *Arabis hirsuta*, *Möhringia muscosa*; *Cerastium arvense*, beim Signal; *Rhamnus alpina*, *Coronilla vaginalis*, *Rubus saxatilis*, *Alchemilla montana*; *Sanguisorba* (F.); *Cotoneaster tomentosa*, *Sorbus scandica*; *scandica* × *aucuparia* und *Orobanche Scabiosae* Koch: Grat westlich vom Signal, ob der Hupp; *Heracleum alpinum*, *Laserpitium latifolium*, *Valeriana montana*; *Knautia longifolia* (Fr.); *Adenostyles albifrons*, *Bellidiastrum*, *Buphthalmum*; *Senecio viscosus* (Ch.); *Carduus Brunneri* A. Br. (deflorato × *nutans* Chr.) (August 1855: Ch.); *Centaurea montana*, *Crepis praemorsa*, *Hieracium praealtum*, *Phyteuma orbiculare*, *Campanula pusilla*, *Pirola rotundifolia*, *Gentiana verna*, *Verbascum Thapsus*; *Rhinanthus angustifolius*, z. B. am Abhang gegen Wisen

häufig (Ch.); *Salvia glutinosa*; *Thesium alpinum*, *Asarum*, *Ulmus montana*; *Orchis ustulata* (Fr.); *Platanthera montana*, *Cephalanthera grandiflora*, *Festuca silvatica*, *Asplenium viride*, *Phegopteris calcarea*.

Läufelfingen - Ramsach: *Dianthus superbus* (Sch.); *Alchemilla montana*; *montana* × *vulgaris*? *Rosa pomifera* (Ch.); *R. canina* var. *hirtella* Rip. (Fr.); *Crepis praemorsa*, *Globularia vulgaris*, *Salix incana*, *Anacamptis*, *Ophrys muscifera*, *aranifera* und *fuciflora*, *Hermannium Monorchis*, *Cephalanthera Xiphophyllum*, alle im Rothacker- und Ramsachackerwald; *Alopecurus pratensis*.

Ramsach: *Tetragonolobus*, gegen Hupp (Dr. Suter); *Rosa rubiginosa* var. *umbellata* Leers. (Burckhardt); *R. tomentella* Lém. var. *concinna* Lagg. et Puget. (Ch.), var. *sinuatidens* Chr. (Ch.; Fr.); *R. tomentosa* Sm. var. *subglobosa* Sm. (Ch.); *Sorbus Aria* × *scandica* (Ch. nach J.); *Circaea alpina* (Dr. W. Bernoulli); *Phyteuma orbiculare*, *Anacamptis*; *Gymnadenia conopea*, eine Monstrosität mit vierspaltiger Aehre (Dr. Suter); *Goodyera* (Ch.); *Tofieldia* (Sd.).

Ramsach-Wisenberg: *Rosa alpina* var. *pyrenaica* und *vulgaris*; *spinulifolia* Dem. (Ch.); *Ribes alpinum*; *Phyteuma orbiculare*.

Ramsach-Mapprach: *Sorbus scandica* × *aucuparia* und *Thymus Serpyllum*; Felsen rechts des Wegs (Geißhorn?) (Ch.; Sch.); oberhalb dieser Stelle, am buschigen Abhänge gegen den Wiesenberg, fand Schneider im Juni 1875 *Senecio spathulaefolius* D. C. (*Cineraria spatul.* Gmel.); aufzusuchen! *Erucastrum Pollichii*, *Reseda lutea*; *Tetragonolobus siliquosus*, am Fußwege ob dem Gute (Mapprachweid); *Cirsium rigens* und *Centaurea montana* (H.).

Mapprach-Burg: *Cirsium rigens* und *Tetragonolobus*, am Fußwege nach dem Grütli (Grüt), *Senecio spathulaefolius*, an schattigen Orten nahe dem Fußwege (Labram in Hag. suppl. 1843, und im Herb. helv.). Aufzusuchen! *Geum rivale* var. *monstrosum* (Labram).

Wisenfluh und benachbarte Weiden: *Thalictrum minus* (Z.; Ch.); *Ranunculus sardous* Cr. und *Alyssum montanum* (W.)? *Draba aizoides*, *Hypericum quadrangulum*, *Rubus saxatilis*, *Alchemilla montana*, *Prunus Mahaleb*, *Cotoneaster vulgaris*, *Sorbus scandica*, *Libanotis*, *Heracleum alpinum*, *Valeriana montana*, 2 *Adenostyles*, *Petasites albus*, *Bupthalmum*; *Doronicum Pardalianches* L., auf einem kleinen begrenzten Absatz auf der Nordseite (W. in H. und M.), 2 Mal von W. gefunden, 1880 von Sch. vergeblich gesucht! *Cirsium eriophorum* (W.); *Centaurea montana*, *Hieracium humile*; *Campanula Scheuchzeri* Vill. (W.)? *Gentiana verna*, *Teucrium montanum*; *Daphne alpina* (J.); *Salix grandifolia*, *Coeloglossum*, *Polygonatum officinale*; *Eriophorum angustifolium* (Z.)? *Carex sempervirens* (W.); *Festuca silvatica*, *Elymus*, *Asplenium viride*, *Aspidium lobatum*.

Wisen: *Rapistrum* (Ch.); *Cerastium arvense* (M.); *Geum intermedium* Ehrh., hinter dem Wiesen-Sennhaus ob Läufelfingen (Sch.); *Chaerophyllum aureum* (M.); *Aceras*, gegen Burg beim Waldaustritte (Sd.).

Wangen a. d. Aare: *Sanguisorba*; *Andromeda* (Gaudin); *Potamogeton pusillus*; *Alisma ranunculoides* L., hinter der Rothfarbe in Bächen (Morell und Dick etc.;!), 1881 und 1883 noch reichlich!

Aarwangen: *Sarothamnus*, gegen Dürrmühle, Bannwil und Wangen in Menge (Moritzi; J.); *Genista germanica*, mit vorigem und *Carex brizoides* gegen Oensingen (Seßler nach Rhiner); *Antirrhinum majus* (Moritzi).