

Zeitschrift: Revue suisse d'apiculture
Herausgeber: Société romande d'apiculture
Band: 131 (2010)
Heft: 7

Rubrik: Conseils aux débutants

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



« Les mûres ont des abeilles »

Citation du poète André Frédérique

Juillet 2010 – La boucle se boucle

La floraison voit son apogée derrière elle, même si quelques espèces telles que la ronce, le tilleul d'hiver ou le trèfle peuvent vous permettre de poser une seconde hausse ou de la remettre si, selon l'altitude à laquelle se trouve votre rucher, vous bénéficiez d'une chanceuse deuxième récolte.

Le solstice d'été est passé et nos protégées ont bien vu la longueur des jours diminuer. Le gros du travail étant derrière, les colonies cessent de se développer. La reine réduit fortement sa ponte et avec cela les activités qui y sont liées, les activités cirières, comme celles d'élevage diminuent. Rassurées par les réserves de provisions qu'elles ont su constituer et sans se douter que leur protecteur va être responsable tantôt de leur pillage, les abeilles prévoyantes préfèrent diminuer les bouches à nourrir en commençant par chasser leurs mâles de frères.

Avec la fin de la récolte et les pointes de chaleur de ce mois de juillet, les abeilles, ne trouvant plus guère de nectar, ont une tendance à aller fureter



Photo : ROSE AUBRY



chez les voisines. Il est essentiel, si vous observez des signes de pillage, de réduire les entrées de vos ruches en les adaptant à la force de la colonie et à la capacité de leurs gardiennes. L'ouverture d'une ruche ne devrait permettre l'entrée que d'une habitante à la fois. Un obstacle à contourner devant l'entrée peut augmenter l'efficacité des gardes. Prenez garde dans le même contexte de ranger toute matière sucrée qui pourrait les exciter. La nervosité et l'agressivité ayant tendance à augmenter, les interventions seront planifiées à l'aube ou en fin de journée car la nuit ramène la tranquillité et le calme dans les colonies.

Vos visites commenceront par trois coups d'enfumoir et un petit temps d'attente pour les laisser se gorger de miel et après quelques coups d'enfumoir après l'ouverture pour les plus tenaces vous concentrerez votre observation attentivement sur le couvain. Il doit se trouver à tous les stades de développement et chaque cadre aura sa réserve de pollen et de miel. Il est certain que du même coup d'œil vous vous assurez de la présence de la reine... et de son marquage bien sûr! Vert, une année, ok; rouge, votre reine a deux ans et bien qu'il soit choquant de devoir changer une si jeune reine et d'autant plus si elle a su vous donner satisfaction en étant calme, prolifique, propre et j'en passe, son remplacement ne peut être que positif. Une jeune reine vous donne l'assurance pour une ponte de qualité en bonne quantité ainsi qu'un gage pour une colonie saine, sans oublier que le risque à l'essaimage en sera réduit.

Un des bienfaits de ce mois est la fin de la période critique de l'essaimage. Soyez toujours positifs et pensez que si vous avez eu des déserteuses, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde... surtout par les temps qui cou-

rent, augmenter son cheptel n'est pas une chose facile, à voir le nombre de mails que je reçois à ce sujet.

Lorsque vous extrayez, n'oubliez pas que si nos protégées sont plus nerveuses que d'habitude, l'utilisation d'un chasse-abeille, quel que soit le modèle, vous sera d'une utilité non négligeable. Mis en place 24 heures avant, il vous permet de prélever les hausses vides ou quasi-vides d'abeilles, sans les exciter et sans piqure. L'inconvénient, selon le type de ruche, est sa mise en place sous la ou les hausses dont le poids et les manipulations peuvent vous mettre le tour de rein.*

Dès qu'il n'y a plus de récolte, on enlèvera les hausses et l'on peut administrer du sirop par petites quantités. Cela aura pour effet, en simulant une miellée, de relancer la ponte de la reine de manière à ce que la population de la ruche soit suffisante pour assurer sa survie pendant l'hiver... la boucle est ainsi bouclée.

Ne pensez pas que malgré la diminution du développement de vos colonies, le varroa sera moins destructor... tout le contraire ! Il règne peut-être déjà en maître et si le couvain en est par trop affecté, il y aura peu de chance pour que votre cheptel passe l'hiver. Vérifiez donc régulièrement sa chute naturelle qui ne doit en aucun cas dépasser plus de 4 cadavres journaliers (y compris ceux que vous aurez dévorés les fourmis). Si vous en comptiez 10 à fin juillet,



Photo: ROSE AUBRY



Photo : ROSE AUBRY

alors allez sur le site du Centre suisse de recherches apicoles (www.aproscope.admin.ch) et référez-vous aux traitements nécessaires. De toute façon il est nécessaire d'intervenir rapidement en juillet/août avec un traitement anti-varroa pour mettre la colonie en bonne condition pour bien passer l'hiver.

N'oubliez pas de prêter une attention particulière à vos essaims artificiels que vous aurez pris soin de constituer ne serait-ce que par sécurité. De même si vous ne voulez pas de mauvaises surprises avec votre réserve de cadres bâtis, il vaudrait mieux les souffrir.

Rémy Meier

**Des études récentes ont montré que la teneur en sucre du miel est plus utile que préjudiciable à la force du corps. Les personnes âgées qui prennent le miel et la cannelle en poudre, à parts égales, sont plus souples et plus éveillées. La recherche a démontré qu'une demi-cuillère à soupe de miel prise dans un verre d'eau et saupoudrée de cannelle pris vers 15 heures lorsque la vitalité de l'organisme commence à diminuer, augmente la vitalité de l'organisme en une semaine! vous prendrez ainsi facilement 2 hausses de plus!*