

Zeitschrift:	Revue suisse d'apiculture
Herausgeber:	Société romande d'apiculture
Band:	138 (2017)
Heft:	3
 Artikel:	Des levures de boulanger dans le miel?
Autor:	Roetschi, Alexandra / Kilchenmann, Verena / Kast, Christina
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-1068156

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Des levures de boulanger dans le miel?

Alexandra Roetschi, Verena Kilchenmann et Christina Kast

Agroscope, Centre de recherche apicole,

Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Bern

Des observations inattendues

Les analyses polliniques à l'aide du microscope permettent une reconnaissance des pollens présents dans le miel et déterminent ainsi l'origine botanique de ce dernier. Au cours de ces analyses, la présence de levures différentes des levures sauvages, naturellement présentes dans le miel, est parfois observée dans le sédiment (Figure 1). Cette présence peut être anecdotique mais il arrive que la quantité de ces autres levures soit trop importante pour ne pas penser à un ajout. Par conséquent, il y a lieu de se poser des questions sur leur identité et surtout sur l'origine de leur présence dans le miel.




Figure 1: Observation au microscope (agrandissement 40 fois) d'un sédiment de miel. **A:** des levures sauvages sont observables (flèches noires) ainsi que d'autres levures de plus grande taille (flèches blanches). **B:** une certaine quantité de levures non sauvages sont observées autour d'un grain de pollen (*p*).

Saccharomyces cerevisiae ou levure de boulanger


Une identification en laboratoire a démontré que ces levures inhabituelles appartiennent à l'espèce *Saccharomyces cerevisiae*, plus communément appelée «levure de boulanger». Ces levures ne sont toutefois plus vivantes dans le miel car il ne leur est pas possible de survivre dans un environnement autant sucré. Par conséquent, elles ne peuvent pas être tenues pour responsables d'une éventuelle fermentation du miel. Cependant, la présence dans le miel de ce type de levure n'est ni naturelle, ni compatible avec du miel de bonne qualité.

De ce fait, comment ces levures de boulanger sont-elles arrivées dans le miel? Dans la pratique apicole, il arrive que ce type de levure fraîche soit ajouté à la pâte de nourrissement comme

substitut de pollen. Cette pâte de nourrissement est préparée par les apiculteurs pour alimenter les abeilles en début de saison. Elle peut être aussi donnée entre les miellées lorsque les abeilles n'ont plus suffisamment de nourriture. Il est dit, parmi les apiculteurs, que les abeilles ne prennent que la quantité de pâte dont elles ont besoin, ne la stockant pas dans les cadres. Les observations faites au cours des analyses polliniques démontrent pourtant le contraire.

La preuve par un essai de terrain

Un essai de terrain impliquant deux ruchers (Witzwil (BE) et Bellechasse (FR)), avec chacun 10 colonies (5 colonies test, nourries avec de la pâte contenant de la levure de boulanger et 5 colonies contrôle, soit sans pâte de nourrissement) a permis de suivre ces colonies durant une saison apicole. Les colonies test ont été nourries hebdomadairement durant le mois d'avril avec de la pâte de nourrissement (500 g à la fois par colonie) puis des échantillons de nourriture ont été prélevés dans les cadres à fin avril, début juin, début août et mi-décembre. Les hausses ont été placées sur les colonies seulement deux semaines après le dernier nourrissement. La quantification des levures de boulanger dans tous les échantillons des cadres, ainsi que dans le miel de printemps (récolté en mai, 12 kg en moyenne par ruche) et d'été (récolté en août, 2.5 kg en moyenne par ruche) s'est effectuée par microscopie. Les résultats obtenus (Figure 2) démontrent clairement que les levures de boulanger sont stockées dans la nourriture des cadres ainsi que dans les cadres à miel lorsque les hausses ont été posées sur les colonies. Les quantités de levure de boulanger diminuent certes au fil des mois mais ces levures restent quand même présentes dans les colonies durant la saison apicole. A noter qu'aucune levure de boulanger n'a été quantifiable dans les colonies contrôle.






Figure 2: quantification des levures de boulanger dans les échantillons de nourriture (**A**) et de miel (**B**) des colonies de Bellechasse et Witzwil nourries avec de la pâte contenant de la levure de boulanger. Les résultats sont exprimés en nombre de levures de boulanger par gramme de miel (échelle logarithmique).

En parallèle des analyses microscopiques, une quantification des levures de boulanger a été réalisée par biologie moléculaire (recherche du matériel génétique spécifique à la levure). Les résultats obtenus sont similaires à ceux de la quantification par microscopie (voir référence).

Conclusions

L'essai de terrain a démontré que les abeilles stockent la pâte de nourrissement dans la colonie. Lorsque la place vient à manquer dans le corps de ruche, les abeilles déplacent leurs réserves dans les cadres à miel. Par conséquent, et contrairement à ce qui est pensé, la pâte de nourrissement n'est ni complètement consommée, ni consommée en fonction des besoins mais stockée dans la ruche. La présence de levures de boulanger dans le miel est donc un indicateur de la présence de sucre ajouté. Afin de produire du miel de bonne qualité, le surnourrissage des colonies avec du sucre avant une miellée ainsi que l'ajout de levure de boulanger ne doit pas avoir lieu.

Référence

Kast, C. and Roetschi, A. 2017. Evaluation of baker's yeast in honey using a real-time PCR assay. Food Microbiology 62: 282-287.

Journée portes ouvertes pour apicultrices et apiculteurs



24 juin 2017


9 à 16 heures

Schwarzenburgstrasse 161
Liebefeld (près de Berne)

**Les trois organisations apicoles
apiservice, Centre de recherche
apicole (CRA) d'Agroscope et Institut
pour la santé de l'abeille (IBH) de
l'Université de Berne offriront au public
l'occasion de découvrir des aspects
passionnantes de leur travail. Profitez
de cette occasion unique pour visiter le
complexe de Liebefeld, près de Berne**

Un programme passionnant et diversifié vous y attendra entre 9 et 16 heures : postes pratiques, démonstrations, dégustation et exposés – il y en aura pour tous les goûts. Passez nous voir et découvrez des aspects peu connus de notre travail ! Rencontrez des apiculteurs des quatre coins de la Suisse et apprenez à connaître nos collaborateurs.

Nous nous réjouissons de votre visite !



Abeille dotée d'une puce électronique



Présentation nettoyer/assainir



Pavillon des abeilles
à Liebefeld

Démonstrations (non-stop entre 9 et 16 heures)

Observations à la loupe binoculaire

Observez de près des abeilles et des ravageurs.

RFID (Radio Frequency Identification)

Découvrez des abeilles dotées d'une puce électronique et utilisées pour l'évaluation des risques des produits phytosanitaires.

Elevage de larves d'abeilles in vitro

Voyez comment les effets potentiels d'agents pathogènes ou de substances actives sur le développement du couvain sont étudiés.

Bandes fleuries

Découvrez les plantes mellifères présentes dans les bandes fleuries pour les polliniseurs.

Observation d'abeilles

Jetez un coup d'œil à l'intérieur d'une colonie en bâisse naturelle et d'une ruche d'observation utilisée pour la recherche.

Postes pratiques (en français)

Nettoyer / assainir	09h30 et 13h00
Formation d'une jeune colonie / sélection	10h30 et 14h00
Cycle de la cire	11h30 et 15h00
Reconnaître une infestation d'acariens	12h00
Dégustation de miel	4× durant la journée

Exposés (en français)

Brève présentation d'apiservice, du CRA et de l'IBH	09h00 et 12h30
Le concept d'exploitation du SSA	10h00 et 13h30
Aperçu des activités du CRA	11h00 et 14h30

Pour s'y rendre

En raison des possibilités de parage très limitées, il est recommandé de se rendre sur place en empruntant les transports publics.

La manifestation aura lieu par n'importe quel temps.

Une petite restauration sera à disposition des visiteurs.