Zeitschrift: Actes de la Société jurassienne d'émulation

Herausgeber: Société jurassienne d'émulation

Band: 118 (2015)

Artikel: Génomique de la spéciation et cohésion des espèces de

Tillandsioideae (Bromeliaceae) présentes dans les montagnes

néotropicales

Autor: La Harpe, Marylaure de

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-654519

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Génomique de la spéciation et cohésion des espèces de *Tillandsioideae* (*Bromeliaceae*) présentes dans les montagnes néotropicales

Marylaure de La Harpe et consortium Sinergia

Ce projet de recherche fait partie d'un consortium¹ composé de trois universités suisses principales ayant chacune une discipline spécifique de recherche (Lausanne: Prof. Nicolas Salamin, phylogénétique; Fribourg: Prof. Christian Lexer, génétique des populations; Zurich: Prof. Michael Kessler, écologie), quatre doctorantes et trois post-doctorants. L'équipe de recherche travaille en étroite collaboration avec les universités et jardins botaniques européens et sud-américains qui sont leurs principaux partenaires. Le financement du projet provient du Fonds national suisse de la recherche scientifique (F.N.S.).

La radiation adaptative des Broméliacées est l'une des plus diversifiées et des plus énigmatiques du Néotropique. La sous-famille des Tillandsioidées représente un système pertinent pour étudier les stratégies d'adaptation et de diversification des plantes. En effet, le nombre extraordinaire d'espèces au sein des 9 genres de Tillandsioidées, leur diversité tant écologique que morphologique et la taille relativement petite et constante du génome permettent une étude moléculaire prometteuse sur les mécanismes de spéciation. Nos buts principaux de recherche sont d'éclaircir les mécanismes génétiques qui favorisent et contraignent l'adaptation et l'évolution des différents clades distribués dans les montagnes néotropicales. Ainsi, nous utilisons l'échelle de temps microévolutionnaire pour élucider les causes de divergence et la structure génétique des populations qui composent les complexes d'espèces et mieux comprendre les mécanismes de cohésion et de spéciation des espèces. Pour cela, nous utilisons différentes approches moléculaires qui visent d'une part à décrire les mécanismes de divergence des populations et



Fig. 1: Vriesea heterostachys, Serra dos Orgaos, Brésil. @MdLH2015

d'autre part à identifier les gènes responsables des traits adaptatifs chez les Tillandsioidées.

Différentes espèces de Tillandsioidées ont été récoltées durant un intense travail de terrain en 2014 et en 2015 dans différentes régions d'Amérique centrale (Mexique et Costa Rica) et d'Amérique du Sud (Colombie, Brésil, Équateur et Pérou; fig. 1-3). Les populations de Tillandsioidées ont été échantillonnées suivant un protocole divisant la zone de récolte en carrés distribués le long d'un transect altitudinal (fig. 4). Cette méthode donne en particulier la possibilité d'identifier les espèces communes (réplicats géographiques) et les espèces endémiques (réplicats phylogénétiques). Ces taxons permettront de tester les mécanismes de spéciation et d'évolution parallèle des espèces dans leur habitat naturel. Nous avons choisi préférentiellement les réplicats géographiques pour tester les mécanismes génétiques de spéciation responsables de la cohésion entre les espèces. Nous utilisons notamment une approche d'analyse génomique qui combine le séquençage massif d'A.D.N. et le séquençage ciblé du génome afin d'identifier les régions génétiques qui sont sous l'influence de la sélection naturelle. Les



Fig. 2: Vriesea triligulata, Serra dos Orgaos, Brésil. @MdLH2015



Fig. 3: Tillandsia imperialis, Aztalan, Mexique. @MdLH2015

ACTES 2015 | SCIENCES

méthodes génétiques employées servent spécialement à caractériser le flux de gènes entre les populations et les mécanismes neutres et non neutres de sélection naturelle. Afin d'identifier les gènes responsables de l'évolution des groupes, nous sélectionnons des couples d'espèces parentes et nous



Fig. 4: Travail de terrain au Mexique: installation des carrés d'étude le long d'un transect *altitudinal*. @MdLH2015

étudions l'évolution d'un trait adaptatif. Le trait adaptatif sur lequel nous nous penchons actuellement est la photosynthèse. En effet, les couples d'espèces sélectionnés ont non seulement un temps de divergence similaire, mais ils démontrent également un changement du mécanisme photosynthétique: dans le couple d'espèces parentes, l'une est de type C3 et l'autre de type CAM.

Sans le matériel à disposition dans les collections vivantes des différents jardins botaniques d'Europe (Vienne, Genève, Heidelberg, Porrentruy) et d'Amérique du Sud (Rio de Janeiro), nous ne pourrions pas mener à bien notre analyse. En effet, ceux-ci donnent un accès rapide et fiable au matériel. Il va sans dire que c'est également une alternative économique et écologique pour répondre à des questions scientifiques de toute première importance en faveur de la conservation de la biodiversité. En particulier, les taxons du Jardin botanique de Jurassica à Porrentruy ont conduit à la constitution d'une large banque de données d'espèces de *Tillandsia*. Celle-ci permettra l'analyse ciblée des gènes intéressants dans la problématique de spéciation (fig. 5).



Fig. 5: *Tillandsia secunda*, spécimen provenant de la vallée d'Ona en Équateur et conservé au Jardin botanique de Jurassica à Porrentruy. @Gaël Comment 2015.

ACTES 2015 | SCIENCES

Marylaure de La Harpe, biologiste diplômée des universités de Neuchâtel et de Lausanne, est actuellement doctorante au sein du groupe de recherche du Prof. Christian Lexer de l'université de Fribourg et de l'université de Vienne. Son travail de recherche, qui fait partie du consortium Sinergia, se penche sur des questions fondamentales liées à la génétique des populations et aux modes de spéciation dans deux genres néotropicaux: Geonoma (Arecaceae) et Tillandsioideae (Bromeliaceae).

NOTE

¹ Sinergia, projet POPCORN: Using Population Genomics, Phylogenetics and Community Ecology to understand Radiations in Neotropical mountains.