

Zeitschrift: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse

Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft

Band: 6 (1896)

Heft: 6

Artikel: Ueber einige Flechten vom Monte Rosa

Autor: Müller-Argoviensis, J.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-7241>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ueber einige Flechten vom Monte Rosa

von

J. Müller-Argoviensis †.

Die folgende Notiz gründet sich auf eine kleine Flechten-Florula, die der Unterzeichnete am 11. September 1895 am «Sattel» des Monte Rosa bei 4354 m. ü. M. mit Professor Heim gesammelt hat. Dazu kommt ein Stück vom Gipfel mit *Buellia leptolepis*, das Herr Prof. Abeljanz herunterbrachte; wir kehrten wegen schlechten Wetters am Gipfelgrat um. Unser leider seither verstorbene Müller-Argoviensis hatte die Freundlichkeit, von seinem Prinzip, nur noch exotische Flechten zu untersuchen, in diesem Falle abzuweichen, und diese Cacuminal-Florula zu bestimmen. Wir lassen unten die Bestimmungen und die Diagnosen zweier neuer Varietäten folgen, wie sie sich in seinen Papieren voraufgefunden.

Das Gestein vom Sattel ist Gneiss und Glimmerschiefer, dasjenige vom Gipfel Quarzit.

C. Schröter.

Alectoria jubata Ach. v. *depressula* Müll.
Arg.; thallus depresso-cæspitosus, 1—2 cm.
latus, 2—4 mm. altus, rami primarii 2—5 mm.
longi, intricatim ramosi, laxe decumbentes,
olivaceo-nigricantes, opaci; haud sorediosi;

apices concolores. — Cæspites insigniter nani, laxe intricatim depresso. — *Saxicola*.

Parmelia lanata Wallr. f. *minuscula* Nyl.
Lapon. or. p. 120. —

Gyrophora anthracina Körb. Syst. p. 99.
specim. juvenilia, valde exigua (non v. *microphylla* Schær.).

Placodium concolor (Ram.) Körb. Syst. p. 118.
— — v. *angustum* Arnold, Brenner p. 234,
et Exs. n. 585. —

— — v. *pulvinatum* Müll. Arg.; thallus pulvinato-moriformis, cæsio-glaucus v. demum obscurior; pulvinuli 1—4 mm. lati, hemisphærici, basi constricti, demum varie confluentes, superficie valide granuloso-divisi; apothecia ignota. — *Saxicola*, cum var. præcedente.

Lecidea confluens Ach. v. *steriza* Müll. Arg.
Lich. Genève p. 55.

Lecidea vitellinaria Nyl. in Bot. Notis. 1852,
p. 177; in thallo sterili depauperato et obscurato
Placodii concoloris v. *angusti*.

Lecidea (s. Sporastatia) tephrodes Müll. Arg.
Lich. Valais. p. 7; *Sporastatia cinerea* Körb.
Par. p. 235.

Buellia (Karschia) leptolepis Bagl. in Comment. Soc. critt. it. II. p. 83. Parasitula in frustulis *Placodii concoloris* v. *angusti* ut videtur, ad Monte Rosæ cacumen leg. Prof. Abeljanz.

Rhizocarpon Oederi (Ach.) Körb. Parerga
p. 232.
