

Zeitschrift:	Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse
Herausgeber:	Schweizerische Botanische Gesellschaft
Band:	12 (1902)
Heft:	12
Artikel:	Beiträge zur Kenntnis der Laubmoosflora des Kantons Unterwalden
Autor:	Keller, Robert
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-12432

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Beiträge zur Kenntnis der Laubmoosflora des Kantons Unterwalden.

Von Dr. Robert Keller, Winterthur.

Zu Anfang der 90er Jahre hatte ich die Absicht, die Materialien zu einem Verzeichnis der Laubmoose des Kantons Unterwalden zu sammeln. Es blieb indessen nur bei einer einmaligen mehrtägigen Exkursion, die ich im Oktober 1891 in die Umgebung von Lungern ausführte. Wegen einer Reihe anderer Arbeiten, die während des letzten Dezenniums meine Zeit in Anspruch nahmen, blieb der grösste Teil des gesammelten Materials unbearbeitet, bis mein Freund und früherer Kollege, Dr. P. Culmann, die Bestimmung der Sammlung übernahm. Seiner mühevollen und gewissenhaften Arbeit, die ich ihm auch hier bestens verdanke, ist also die nachfolgende Mitteilung in erster Linie zu danken.

Da die Verwirklichung meines ursprünglichen Planes, wenn auch noch nicht endgültig aufgegeben, so doch auf spätere Zeit verschoben ist, will ich ein Verzeichnis meiner damals gesammelten Laubmoose veröffentlichen. Es dürfte das den schweizerischen Bryologen deswegen nicht ganz unwillkommen sein, weil unsere Kenntnisse von der Verbreitung der Laubmoose im Gebiete der Zentralschweiz noch sehr lückenhaft sind.

Bryineae.

I. Tribus Cleistocarpace.

Physcomitrella patens Bryol europ. c. fr. Aecker am oberen Ende des Sarnersees, ca. 470 m.

Microbryum Floerkeanum Bryol europ. c. fr. Maisfelder am oberen Ende des Sarnersees, ca. 470 m.

Phascum cuspidatum Schreb. c. fr. Diesselbach bei Lungern, ca. 650 m.

Astomum crispum Hampe. Brachäcker unterhalb Giswil, ca. 500 m. c. fr. Am Eisenbahndamm unterhalb Giswil; c. fr.

2. Tribus Stegocarpace.

A. Acrocarpae.

Gymnostomum rupestre. Schleicher c. fr. Nasse Felsen bei Kaiserstuhl, ca. 700 m. c. fr. Vor Lungern ca. 700 m c. fr. Diesselbach bei Lungern ca. 680 m c. fr.

Weisia viridula Hedw. c. fr. Hohlweg unterhalb der Staldenalp gegen Lungern, ca. 1000 m, c. fr.

Dichodontium pellucidum Schimp. c. fr. Unterhalb der Seewlialp bei Lungern gegen das Lauibachtobel, ca. 1000 m, c. fr.

Dicranella varia. Schimp. c. fr. Giswil, c. fr. Kaiserstuhl, c. fr. Staldenalp ca. 1100 m, c. fr. Seewlialp ca. 1000 m, c. fr.

Dicranum undulatum Ehrh. c. fr. Ob Giswil, ca. 600 m, c. fr.

Dicranum scoparium Hedw. c. fr. Um Lungern sehr häufig und meist c. fr. Lauibachtobel c. fr. Staldenalp c. fr. Im Lauibachtobel auch eine eigentümliche Form mit fast ganzrändigen Blättern.

Dicranum fuscescens. Limpr. c. fr. Auf faulem Holz ob Gspann am Brünigpass, ca. 1060 m.

Dicranodontium longirostre Schimper, c. fr. Am Brünig, Felsen unter der Kapelle ca. 1000 m, c. fr. Seewlialp ca. 1050 m. an faulem Holz, c. fr. Lauibachtobel bei Lungern ca. 900 m, auf humusreichem Boden, c. fr.

Leucobryum glaucum Schimpr. st. Lauibachtobel bei Lungern, ca. 900 m.

Fissidens adianthoides Hedw. c. fr. Giswil, st. Am Ausgang des kleinen Melchtales bei Melchen c. fr. Im Kaiserstuhler Wald c. fr. Diesselbach st. Lungern st. Am Brünig ca. 1000 m. c. fr.

Fissidens taxifolius L. c. fr. Kaiserstuhl c. fr. Staldenalp ca. 1100 m. Hüttställalp ob Lungern ca. 1300 m.

Seligeria tristicha Bryol europ. c. fr. Felsen im kleinen Melchthal

ob Melchen ca. 550 m. Hüttsällalp ca. 1300 m. Diesselbach. Staldenalp ca. 1100 m.

Seligeria recurvata Bryol. europ. c. fr. Staldenalp ob Lungern ca. 1100 m. Im kleinen Melchthal ob Melchen ca. 550 m.

Leptotrichum flexicaule Hampe st. Kaiserstuhl.

Distichum capillaceum Bryol. europ. c. fr. Seewlialp ob Lungern ca. 1160 m. An faulem Holz unterhalb der Staldenalp ob Lungern ca. 1000 m. Hüttsällalp ca. 1300 m.

Pottia minutula Bryol. europ. c. fr. Maisfelder unterhalb Giswyl. Äcker am Sarnersee.

Didymodon rigidulus Hedw. c. fr. Kaiserstuhl ca. 600 m. Seewlialp ob Lungern ca. 1100 m. Hüttsällalp ob Lungern ca. 1300 m. Brünig ca. 1000 m.

Trichostomum tophaceum Brid. c. fr. An Tuffsteinen bei Lungern. Hüttsällalp ca. 1300 m.

Barbula tortuosa Web. et Mohr. c. fr. Ob Giswyl ca. 600 m, c. fr. Kaiserstuhl c. fr. ca. 600 m. Lauibachtobel ob Lungern ca. 800 m, c. fr. Gegen den Brünig ca. 1000 m, c. fr. Lungern c. fr.

Barbula unguiculata Hedwig c. fr. Giswyl an Mauern.

Barbula fallax Hedw. c. fr. An Mauern bei Giswyl.

Barbula rigidula Dicks. c. fr. Giswyl, an Mauern ca. 500 m. Um Lungern an Felsen und Mauern ca. 700—900 m. Felsen am Brünig ca. 1000 m. Ob Gspann am Brünig ca. 1100 m.

Barbula paludosa Schleich. c. fr. Im kleinen Melchthal ob Melchen ca. 550 m. Kaiserstuhl. Lauibachtobel bei Lungern ca. 900 m.

Barbula muralis Timm. c. fr. Giswyl an Mauern. Diesselbach bei Lungern ca. 660 m. Am Brünig ca. 1000 m.

Barbula subulata Pal. Beauv. c. fr. Brünig ca. 900 m.

Barbula nivalis Hedw. c. fr. An Steinen ob Lungern ca. 800 m. Seewlialp ca. 1100 m. Staldenalp, an faulen Strünken ca. 1100 m.

Barbula acyphylla Bryol. europ. c. fr. Hornalp ob Lungern ca. 1800 m.

Grimmia apocarpa Hedw. c. fr. An Mauern bei Giswyl ca. 500 m. Kaiserstuhl ca. 700 m. Felsen an der Brünigstrasse ob Lungern ca. 750 m. Hüttsällalp ob Lungern ca. 1650 m.

Grimmia longidens Philibert c. fr. Diesselbach.

Racomitrium canescens Brid. Felsen unterhalb des Lungernsees ca. 700 m.

Hedwigia ciliata Ehrh. c. fr. Felsen ob Lungern ca. 950 m. Seewlialp, ca. 1100 m.

Orthotrichum anomalum Hed. β . *cylindricum* Schpr. c. fr. Felsen ob Lungern. Staldenalp ob Lungern ca. 1350 m.

Orthotrichum saxatile Schimp. c. fr. Melchen.

Orthotrichum leucomitrium Bryol. europ. c. fr. An Ahorn bei Lungern.

Orthotrichum pallens Bruch. c. fr. An Ahorn bei Kaiserstuhl.

Orthotrichum patens Bruch. c. fr. Lauibachtobel.

Orthotrichum fastigiatum Bruch. c. fr. An Ahorn bei Kaiserstuhl.

Orthotrichum speciosum Nees. c. fr. An Ahorn, Lungern.

Orthotrichum leiocarpum Bryol. europ. c. fr. An Ahorn, Kaiserstuhl. Lungern.

Encalypta vulgaris Hedw. c. fr. Hüttställalp, ca. 1500 m.

Encalypta rhabdocarpa Schpr. c. fr. Staldenalp; ca. 1350 m.

Encalypta contorta Lindl. st. Kaiserstuhl. Rudenzerwald.

Tetraplodon angustatus Schimpr. Hüttställalp ob Lungern, ca. 1600 m.

Tayloria serrata Schimpr. st. Hüttställalp ob Lungern, ca. 1600 m.

Tetraphis pellucida Hedw. c. fr. Staldenalp, ca. 1350 m. Brünig' ca. 1000 m.

Funaria hygrometrica L. c. fr. Etwas unterhalb der Kapelle am Brünig, ca. 990 m.

Webera elongata Schwaegr. c. fr. Seewlialp, ca. 1000 m.

Webera cruda Bruch. c. fr. Brünig, unterhalb der Kapelle, ca. 990 m.

Bryum cuspidatum Schimpr. c. fr. Kaiserstuhl.

Bryum capillare L. c. fr. Diesselbach bei Lungern.

Bryum elegans Nees v. Esenb. c. fr. Hüttställalp, ca. 1660 m.

Bryum argenteum L. c. fr. Kaiserstuhl.

Bryum pseudotriquetrum Hedw. c. fr. Am obern Ende des Sarnersees in Sumpfwiesen.

Rhodobryum roseum Limpr. Feuchte Waldplätze im kleinen Melchtal, ca. 600 m.

Mnium spinosum Voit. c. fr. Staldenalp ob Lungern, ca. 1100 m.

Mnium undulatum Weiss c. fr. Melchen. Lungern.

Mnium rostratum Schrad. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen. Seewlialp, ca. 1100 m.

Mnium stellare Reich. st. Im kleinen Melchtal ob Melchen, ca. 700 m.
Lungern, ca. 700 m. Unterhalb der Kapelle am Brünig,
ca. 1000 m.

Mnium punctatum Hedw. c. fr. Lungern gegen den Brünig,
ca. 750 m. Ob Gspann bei der Seewlialp ob Lungern,
ca. 1050 m. Seewlialp, ca. 1100 m.

Meesea trichodes Spruce, c. fr. Hüttställalp ob Lungern, ca. 1350 m.

Bartramia Halleriana Hedw. c. fr. Am Brünig, ca. 950 m.
Lauibachtobel, ca. 800 m. Seewlialp ob Lungern, ca. 1000 m.

Bartramia Oederi Sw. c. fr. Im kleinen Melchtal ca. 650 m.
Um Lungern und gegen den Brünig 700—1000 m, häufig.
Lauibachtobel bis zur Seewlialp, häufig.

Philonotis calcarea Bryol eur. c. fr. Felsen ob Kaiserstuhl. Sumpf-
wiesen am oberen Ende des Sarnersees.

Catharinea undulata Web. et Mohr. c. fr. Kaiserstuhl. Lungern.
Brünig. Seewlialp, ca. 1100 m.

Catharinea Hausknechtii Broth. c. fr. Unterhalb Seewlialp gegen
das Lauibachtobel, ca. 1000 m.

Polytrichum formosum Hedw. Ob Lungern gegen den Brünig,
ca. 1000 m. Lauibachtobel, ca. 700 m. Seewlialp, ca. 1100 m.

B. Pleurocarpae.

Leucodon sciurooides L. c. fr. Kaiserstuhl. Giswyl.

Neckera crispa Hedw. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen. An
Felsen zwischen Giswyl und Lungern.

Neckera complanata Hüb. st. Im kleinen Melchtal ob Melchen.
Giswyl. Im Walde ob Kaiserstuhl, ca. 700 m.

Anomodon attenuatus Schreb. st. Baumstrünke bei Melchen, ca.
500 m. Kaiserstuhl.

Anomodon viticulosus L. c. fr. Baumstrünke bei Melchen, ca. 500 m.
Mauern ob Giswyl, ca. 550 m.

Pterigynandrum filiforme Timm. c. fr. Baumstrünke ob Giswyl, ca.
700 m.

Ptychodium plicatum Schimp. c. fr. Staldenalp ob Lungern, ca.
1400 m. Hüttställalp, ca. 1660 m. st.

Pseudoleskea atrovirens Dicks. c. fr. Seewlialp, ca. 1100 m, st.
Staldenalp ob Lungern, ca. 1300 m. st. Hüttställalp ob Lun-
gern, ca. 1660 m. c. fr.

Pseudoleskea catenulata Brid. st. An Steinen bei Lungern, ca. 700 m.

Am Brünig, ca. 950 m. Staldenalp, ca. 1000 m. Seewlialp ob Lungern, ca. 1160 m.

Thuidium delicatulum Mitt. st. Lungern, ca. 700 m.

Thuidium Philiberti Limprecht st. Diesselbach, ca. 680 m.

Thuidium abietinum Bryol. europ. st. Kaiserstuhl, ca. 600 m. Lungern, ca. 700 m. Diesselbach bei Lungern, ca. 650 m. Seewlialp, ca. 1100 m.

Orthothecium rufescens Bryol. europ. st. Im kleinen Melchtal ob Melchen, ca. 600 m. Kaiserstuhl, ca. 600 m. Lauibachtobel, ca. 900 m. Seewlialp, ca. 1100 m. Hütställalp, ca. 1500 m.
Orthothecium intricatum Hartm. c. fr. Hütställalp ob Lungern, ca. 1660 m.

Cylindrothecium concinnum Schr. st. Giswyl. Kaiserstuhl. Diesselbach. Lungern. Seewlialp, ca. 1100 m.

Climacium dendroides Web. et Mohr. st. Giswyl, ca. 520 m. Kleines Melchtal ob Melchen. Seewlialp, ca. 1100 m.

Isothecium myurum Brid. c. fr. Lauibachtobel bei Lungern, ca. 900 m.

Brachythecium salebrosum Hoffm. c. fr. Giswyl, ca. 700 m.

Brachythecium populeum Bryol. europ. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen, ca. 500 m. Rudenzerwald, ca. 700 m. Giswyl. Kaiserstuhl, ca. 700 m. Diesselbach bei Lungern. Staldenalp ob Lungern, ca. 1300 m.

Brachythecium rutabulum Bryol. europ. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen, ca. 550 m.

Brachythecium laetum Bryol. europ. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen, ca. 550 m.

Brachythecium glareosum Bryol. europ. st. Diesselbach bei Lungern.

Brachythecium rivulare Bryol. europ. Lauibachtobel bei Lungern, ca. 900 m.

Eurhynchium striatum Bryol. europ. st. Im kleinen Melchtal ob Melchen.

Eurhynchium Tommasinii R. Ruthe. st. Kaiserstuhl.

Eurhynchium piliferum Bryol. europ. st. Diesselbach bei Lungern.

Eurhynchium praelongum Bryol. europ. st. Im kleinen Melchtal ob Melchen.

Rhynchostegium murale Bryol. europ. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen, ca. 550 m. Kaiserstuhl, ca. 700 m. Diesselbach bei Lungern.

Plagiothecium denticulatum Bryol. europ. c. fr. Staldenalp ob Lungern, ca. 1300 m.

Plagiothecium silesiacum Bryol. europ. c. fr. An faulem Holz auf der Staldenalp, ca. 1360 m.

Amblystegium subtile Hed. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen, ca. 550 m. Giswyl.

Amblystegium serpens Bryol. europ. c. fr. Giswyl. Rudenzerwald.

Hypnum Halleri Sw. c. fr. Kaiserstuhl st. Lauibachtobel bei Lungern, ca. 800 m, st. Hüttställalp ob Lungern, ca. 1600 m, c. fr. Brünig, ca. 1000 m, c. fr.

Hypnum Sommerfeltii Myrin. c. fr. Felsen etwas unterhalb des Lungernsees, ca. 650 m.

Hypnum elodes Spruce st. Sumpfwiesen am obern Ende des Sarnersees.

Hypnum chrysophyllum Brid. c. fr. Seewlialp ob Lungern, ca. 1150 m.

Hypnum protensum Brid. st. Ob Giswyl, ca. 700 m. Kaiserstuhl, ca. 700 m. Hüttställalp, ca. 1400 m.

Hypnum intermedium Lindb. st. Am obern Ende des Sarnersees in Sumpfwiesen. Giswyl.

Hypnum uncinatum Hedw. c. fr. Lauibachtobel bei Lungern, ca. 900 m.

Hypnum commutatum Hedw. st. Sumpfwiesen am obern Ende des Sarnersees. Giswyl. Kaiserstuhl, ca. 700 m. Diesselbach ca. 700 m. Lungern, ca. 700 m. Seewlialp ob Lungern, ca. 1100 m.

Hypnum filicinum L. st. Kaiserstuhl.

Hypnum falcatum Brid. st. Am obern Ende des Sarnersees. Staldenalp ob Lungern, ca. 1300 m. Hüttställalp, ca. 1660 m.

Hypnum sulcatum Schimper st. Hüttställalp ob Lungern, ca. 1600 m.

Hypnum subsulcatum Schimper. Hüttställalp ob Lungern, ca. 1660 m.

Hypnum irrigatum Zett. st. Lauibachtobel bei Lungern, ca. 900 m. Seewlialp, ca. 1100 m.

Hypnum crista Castrensis L. st. Am Stollen vom Lungernsee. Brünig, ca. 900 m. Lauibachtobel bei Lungern, ca. 900 m. Staldenalp, ca. 1200 m.

Hypnum molluscum Hedwig. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen.

Giswyl, ca. 700 m. Kaiserstuhl, ca. 700 m. Lauibachtobel bei Lungern.

Hypnum incurvatum Schrader c. fr. Lauibachtobel bei Lungern.

Hypnum cupressiforme L. c. fr. Im kleinen Melchtal ob Melchen, ca. 500 m. Giswyl, ca. 650 m. Staldenalp bei Lungern, ca. 1400 m.

Hypnum palustre Huds. c. fr. An Steinen im kleinen Melchtal ob Melchen.

Hypnum giganteum Schimper st. Sumpfwiesen am oberen Ende des Sarnersees. Lauibachtobel, ca. 900 m. Seewlialp ob Lungern, ca. 1160 m.

Hypnum cuspidatum L. st. Giswyl. Kaiserstuhl. Lungern.

Hylocomium splendens Schimp. c. fr. Zwischen Lungern und Kaiserstuhl, ca. 700 m. Lauibachtobel bei Lungern, ca. 900 m.

Hylocomium triquetrum L. st. Vor Lungern, ca. 700 m. Lauibachtobel, ca. 900 m.

Hylocomium squarrosum L. Rudenzerwald bei Kaiserstuhl; ca. 750 m.