**Zeitschrift:** Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la

Société Botanique Suisse

Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft

**Band:** 20 (1911)

**Heft:** 20

Bibliographie: Bryophyta

Autor: Schellenberg, G.

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Hymenomyceten.

Exobasidium Warmingii Rostr. auf Saxifraga aspera L., bei Gletsch am Rhonegletscher, 29. Juli 1910 leg. O. Jaap (17, Nr. 440).

Coprinus giganteus W. Rytz nov. spec. ad int., im Moos des dichten Fichtenjungwaldes oberhalb des Gürmschisteges, Kienthal (46).

## Gasteromyceten.

- Hydnangium Galathejum Quélet., Gegend zwischen Lons-le-Saunier und Clairvaux (Grenzgebiet) (36).
- Hydnangium Pila Patouillard nov. sp., Gegend zwischen Lons-le-Saunier und Clairvaux (36).
- Hydnangium carotaecolor Berk, Gegend zwischen Lons-le-Saunier und Clairvaux (36), Tannenwald bei Pontarlier (Grenzgebiet) (1).

### Imperfecten.

- Cercosporella Achilleae Jaap. auf Achillea macrophylla L., bei Gletsch am Rhonegletscher, 29. Juli 1910, leg. O. Jaap (17, Nr. 445).
- Myxosporium Pruni Mahaleb D. Cruchet nov. sp. auf Prunus Mahaleb L., am Fusse des Jura von Baulmes bis Vuitebœuf (32).
- Ramularia delphini Jaap nov. sp. auf Delphinium elatum L., Herrenrüti bei Engelberg, 15. August 1910, leg. O. Jaap (17, Nr. 447).
- Ramularia filaris Fresen. auf Senecio alpinus (L.) Scop, Rigi-Staffel (18, Nr. 348).

# Bryophyta.

(Referent: G. Schellenberg, Zürich.)

1. Bauer, E. Musci europaei exsiccati, Ser. XI—XV, Nr. 501 bis 750, 1910. Selbstverlag des Herausgebers, Preis der Halbcenturie M. 20.—.

Die Serie XI des Werkes enthält Sphagna, bearbeitet von C. Jensen-Hvalsö, die Serie XII Fontinalis (rev. Dr. J. Cardot-Charlesville), ausserdem die Fortsetzung des Systemes bis zu Hookeria, Serie XIII Hookeria bis Hygrohypnum, Serie XIV Campylium bis Scleropodium. Die Serie XV bringt Ergänzungen zu

dem bisher Erschienenen. Worte des Lobes erübrigen sich wohl für dieses Exsiccatenwerk. Die in den 1910 erschienenen Serien aufgelegten Schweizermoose finden sich unter den neuen Standorten aufgezählt.

2. Culmann, P. Contributions à la flore bryologique de la Suisse. Rev. Bryol, 37° année, 1910, n° 5, p. 93-99.

Die Arbeit enthält neue schweizerische Standorte von 23 Lebermoosen und von 43 Laubmoosen. Unter diesen sind zwei neue Varietäten zu verzeichnen.

3. Meylan, Ch. Contributions à la Bryologie jurassienne. Rev. bryol., 37e année, 1910, no 6, p. 108-109.

Meylan gibt in der vorliegenden Arbeit eine Liste seiner wichtigeren Funde im Jura während der Jahre 1908 und 1909. Aufgeführt werden 19 Lebermoose, 3 Sphagna und 24 Laubmoose. Davon sind einige neu für den Jura und finden sich bei den neuen Standorten. Eine Varietät ist neu für die Wissenschaft. Die Arbeit enthält ferner einen Schlüssel für Calypogeia suecica, C. trichomanis und C. Neesiana samt deren Varietäten.

4. Müller-Freiburg, K. Die Lebermoose. In Rabenhorst, Kryptogamenflora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Lief. 10, 11, 12, p. 577—768, 8°, Leipzig, Ed. Kummer, Preis: M. 2.40 pro Lief.

Die im Berichtsjahre erschienenen Lieferungen behandeln die Gattungen Jamesoniella (Schluss), Anastrophyllum, Sphenolobus, Lophozia, Gymnocolea, Dichiton, Anastrepta, Acrobolbus und den Anfang von Plagiochila in der beim Verfasser gewohnten trefflichen Weise.

5. Roth, Gg. Neuere und noch weniger bekannte europäische Laubmoose. Hedwigia IL, 1910, p. 213-229, tab. VII und VIII.

Wie der Titel angibt, eine Beschreibung einiger selteneren Laubmoose, in Anlehnung an des Verfassers Werk, "Die Europäischen Laubmoose". Auch die Tafeln sind in der selben Manier gehalten. In der vorliegenden Arbeit findet sich Cratoneuron ptychodioides aus der Schweiz, cf. "Neue Standorte".

6. Schiffner, V. Hepaticae europaeae exsiccatae, Serie VI bis VIII, Nr. 251—400, 1910. Selbstverlag des Herausgebers, Preis der Halbcenturie M. 20.—.

In den im Berichtsjahre erschienenen Lieferungen dieses äusserst kritischen Exsiccatenwerkes gelangen folgende Gattungen zur Ausgabe: Leptoscyphus (Forts.), Lophocolea, Chiloscyphus, Harpanthus, Geocalyx, Saccogyna, Gymnomitrium, Marsupella, Nardia, Southbya, Prasanthus, Gongylanthus und Aplozia. Die Nummern von schweizerischen Standorten finden sich unter "Neue Standorte" aufgenommen.

7. Winter, H. Generalbericht über sechs bryologische Reisen in Norwegen mit Berücksichtigung der selteneren von mir in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesammelten Laubmoose. Hedwigia IL, 1910, p. 268—291, Tab. IX und X.

In der Arbeit finden sich kritische Bemerkungen über Andreaea petrophila (p. 278), Bryum pallens (p. 346), Bryum pallescens (p. 353) und Bryum Mühlenbeckii (p. 359). Sonst enthält diese im übrigen sehr lesenswerte Arbeit nichts über schweizerische Moose. Eine neu aufgestellte Varietät von Bryum pallescens siehe bei "Neue Standorte".

# Neue oder bemerkenswerte Standorte; Exsiccaten-Nummern.

Darunter eine Anzahl Sphagna gesammelt von Herrn Dr. Baumberger in Hb. Turic. und ein Hygrohypnum gesammelt von Herrn Dr. Baumann in Hb. Turic. (Ich folge in der Anordnung der Gattungen und in der Nomenklatur Brotherus in Nat. Pfl. Fam. In Klammer füge ich den von Limpricht gebrauchten Namen bei, wenn dieser abweicht von dem von Brotherus gebrauchten.)

## Hepaticae.

Riccia bifurca Hoffm. Weiher von Bémont bei La Brévine (3). Palavicinia Flotowiana (Nees). Auf Tuff, 1780 m, Kaltenbrunnen, oberhalb Zweisimmen (2).

- Gymnomitrium concinnatum (Lightf.) Corda. An Granit, Nordseite des Düssistocks, ca. 2000 m, 30. Juni 1901, leg. K. Müller-Freiburg; Schiffner, Hep. Eur. Exs. Nr. 312 (6). Auf Gneisfelsen gegenüber Stein am Susten, ca. 1850 m, 24. Aug. 1907, Kanton Bern; leg. P. Culmann: Schiffner, Hep. Eur. Exs. Nr. 311 (6).
- Gymnomitrium corallioides Nees. Am Lötschenpass von 2600 bis 2680 m, c. fr. (2).
- Gymnomitrium revolutum (Nees). Lötschenpass, Bernerseite, 2680 m, mit dem vorigen (2).
- Nardia Breidleri (Limpr.) Lindb. Auf Kies, Daube, Gemmi, 2250 m, c. fr. (2). St. Gotthard, zwischen der Passhöhe und dem Lucendrosee, an Schneewässern, ca. 2100 m, 1. August 1906, leg. H. Freih. v. Handel-Mazzetti; Schiffner, Hep. Eur. Exs., Nr. 254 (6). Kanton Wallis: auf Glimmersand am Totensee auf der Grimsel und an den Bächen gegen das Siedelhorn, 2145 bis 2200 m, 30. August 1906, leg. P. Culmann; Schiffner, Hep. Eur. Exs., Nr. 356 (6).
- Nardia subelliptica Lindb. Kanton Bern: auf der Erde am Wege von Innertkirchen auf die Laubalm im Urbachtale, 1000 bis 1200 m, 2. September 1906, leg. P. Culmann; Schiffner, Hep. Eur. Exs., Nr. 378 (6). Auf den Rainen eines Hohlweges bei Arnensee, 1530 m, c. per. (2). Im Farnital bei Kiental, 1730 m, c. per. (2).
- Aplozia Breidleri K. Müll. Granges de Ste-Croix, Grandsonnaz und Grand Savagnier im Massif du Chasseron, 1100—1500 m (det. K. Müller) (3).
- Aplozia (Jungermannia) riparia (Taylor). Auf Kalktuffen im Rhein bei Konstanz, auch auf Schweizergebiet. Dr. Baumann in litt.
- Lophozia confertifolia Schiffn. c. fr. (teste K. Müller-Freiburg). Aufstieg von Grindelwald auf das Faulhorn (1600 m); Unteraarboden, Grimsel (1850 m); auf dem Sande der Aare, unterhalb des Steinengletschers (1900 m), auf Sand (2).
- Lophozia obtusa (Lindb.). Hahnenmoospass (1760 m), Seite von Lenk (2).
- Pedinophyllum interruptum (Nees). Schattwald bei Aeschi (1200 m), c. fr. (2).

- Mylia anomala (Hook.). Zwischen Sphagnum bei der Kleinen Scheidegg (2100 m) (2).
- Lophocolea minor Nees. Kaltenbrunnen, oberhalb Zweisimmen, auf Felsen (1500 m), c. fr. (2).
- Hygrobiella (Eremonotus) myriocarpus (Carr.) Spr. Gemmi oberhalb Kandersteg (1500 m) c. per.; Brünnli oberhalb Mürren (2050 m), nach der Griesalp zu; im Kiental (1400 m) (2).
- Cephaloziella bifida (Schreb.). Auf Rainen der Strasse zum Susten (840 m), zwischen Rasen von Pogonatum urnigrum, c. fr. (det. Douin) (2).
- Cephaloziella gracillima Douin. Vraconnaz (det. Douin) (2).
- Cephaloziella gracillima Douin var. viridis Douin. Hubelwald bei Thun (750 m) c. per. (det. Douin) (2).
- Cephaloziella Jackii (Limpr.). Kurzenberg oberhalb Gummen (790 m); Raine des Weges zum Susten (880 m); Sande unterhalb dem Steingletscher (1900 m) (det. Douin) (2).
- Odontoschisma denudatum (Nees). Bei Reutigen an mehreren Stellen (610-650 m); Kohlgrubenwald bei Därligen (660 m); Kiental (1070 m), immer auf faulenden Baumstümpfen (2).
- Odontoschisma Macounii (Aust.). Wasserfall unterhalb dem Tschingelgletscher (1950 m); auf Felsen an der Gemmi ob Kandersteg (1500 m) (2).
- Scapania Bartlingii (Hampe). Auf Felsen bei Gasteren (1600 m), c. per. (2).
- Scapania irrigua (Nees). Schwarzenegg, am Rande des Torfmoores (910 m) (2).
- Scapania Massalongii K. Müll. Beim Arnensee, mit Aneura palmata auf einem faulen Stamme (1540 m) (det. K. Müll.) (2).
- Scapania paludosa K. Müll. Engelalp, Kiental (1780—1800 m); bei der Handegg (1380 m) (2).
- Radula Lindbergii Gott. Farnital oberhalb Kiental (1480 m) auf einem Steine, planta masc. et fem. (2).
- Lejeunea ulicina Tayl. Im Walde beim Torfmoore von Schwarzenegg (910 m). Scheint sehr nasse Standorte zu lieben (2).
- Frullania Jackii Gott. In der Nähe der Kander (1130 m); Weg zur Gemmi oberhalb Kandersteg (1550 m) (2). Auf einem Findling oberhalb Rochefort (900 m) (3).

Sphagna.

- Sphagnum acutifolium Ehrh. var. densum W. f. purpurascens. Seebodenalp am Rigi, Grodbodenmoos hinter dem Hotel, VIII, 1907, leg. Dr. E. Baumberger.
- Sphagnum acutifolium Ehrh. var. gracile f. f. purpureum et purpurascens. Engelmoos bei Lenzingen, im kleinen Hochmoor, 1904, leg. Dr. E. Baumberger.
- Sphagnum cymbifolium Hedw. var. pycnocladum Mart. f. flavescens. Engelmoos bei Lenzingen, 1894, leg. Dr. E. Baumberger.
- Sphagnum brevifolium Rh. var. squamosum Ang. f. flavovirens. Engelmoos bei Lenzingen, 1904, leg. Dr. E. Baumberger.
- Sphagnum cymbifolium Ehrh. var. pycnocladum Mart. f. flavescens. Grosses Kläpfmoos am Burgäschisee, August 1897, leg. Dr. E. Baumberger.
- Sphagnum medium Spr. var brachycladum Card. f. f. pallido-virescens et purpurascens. Engelmoos bei Lenzingen, 12. Juli 1908, leg. Dr. E. Baumberger.
- Sphagnum medium Spr. var. densum Pohl f. purpurascens. Seebodenalp am Rigi, Grodbodenmoos hinter dem Hotel, August 1907, leg. Dr. E. Baumberger.
- Sphagnum riparium Aongstr. Tourbières des Rousses (3).
- Sphagnum Rothii Rh. var. deflexum Rh. f. flavovirens. Engelmoos bei Lenzingen, 1904, leg. Dr. E. Baumberger.

# Musci frondosi.

- Distichum inclinatum (Ehrh.) Br. eur. c. fr. operc. Bad Pfäfers, auf Mauern und Felsen in der Taminaschlucht, Juli 1905, leg. A. Wälde; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 735 (1).
- Brachydontium trichodes (Web. fil.) Bruch. Bei Kreuzweg Bannhalde, in der Umgebung von Schwarzenegg auf kleinen Steinen (930 m) (2).
- Seligera brevifolia Lindb. c. fr. Auf kalkfreien Felsen und Steinen am Wege, Dündenfälle im Kiental bei 1200 m, 18. August 1908, leg. P. Culmann; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 708 (1).
- Seligera erecta Phil. c. fr. (Syn.: S. recurvata (Hedw.) Br. eur. var. pumila (Lindb.) Jur. Kanton Bern: a) auf einem Felsblock an der Kander unterhalb Kandersteg (1140 m), 17. August 1909,

leg. P. Culmann; b) auf Felsblöcken bei Aris in der Nähe von Frutigen, 4. Aug. 1909. leg. P. Culmann.

"Die unter b) ausgegebenen Exemplare haben z. T. leicht gebogene Kapselstiele. Nichtsdestoweniger ist nach meiner Ansicht S. erecta mindestens eine Subspezies, welche durch die Blätter allein schon genügend charakterisiert ist. Dr. P. Culmann in litt."; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 709 (1).

- Dicranoweisia compacta (Schleich.) Schimp. Lötschenpass (2700 m), gegen das Hockenhorn; Sefinenfurka (2600 m) (2).
- Dicranum fulvum Hook. Auf erratischen Blöcken (Protogyn) des Osthanges von Premier in Solothurn (500—900 m), manchmal sehr reichlich (3).
- Dicranum strictum Schleich. An den Quellen der Simme, auf umgestürzten Baumstämmen (1430 m) (2).
- Dicranum viride Sull. et Lesqu.) Lindb. Kiental (1080 m), auf Buchen (2).
- Dicranum viride (Sull. et Lesqu.) Lindb. var. robustum Loeske ster. Kanton Bern: Auf einer Buche am Ufer der Kien (1100 m), 28. August 1910, leg. P. Culmann.

"Die grösseren Exemplare stimmen gut mit Originalien aus der Hand des Autors und zeigen in den älteren, aber nicht zu stark verfilzten Blättern das für die Varietät charakteristische Zellnetz, die jüngeren auf demselben Stamme gewachsenen Pflanzen nähern sich in bezug auf das Zellnetz dem Typus". Dr. P. Culmann in scheda; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 727 (1).

- Fissidens crassipes Wils. An Kalktuffen im Rhein von Konstanz bis Gottlieben, mehrfach, bis 6 m Tiefe; bei der Insel Werd bei Stein und im Rhein gegen Hemmishofen (Prof. Lauterborn und Dr. E. Baumann). Dr. E. Baumann in litt.
- Fissidens grandifrons Brid. An Kalktuffen im Rhein von Konstanz bis Gottlieben mehrfach. Dr. E. Baumann in litt.
- Hymenostomum microstomum Hedw. var. planifolium M. Fl. Vraconnaz (1100 m), an feuchten Orten (3).
- Weisia crispata (Br. germ.) Jur. Kalkfelsen der Simmenfluh bei Porte (640 m), c. fr. (2).

- Hymenostylium curvirostre (Ehrh.) var. cataractarum Schimp. Kalktuffbänke im Rhein bei Konstanz und Stein (Prof. Lauterborn und Dr. E. Baumann). Dr. E. Baumann in litt.
- Hymenostylium curvirostre (Ehrh.) Lindb. var. scabrum Lindb. c. fr. Bad Pfäfers, auf Kalkgestein in der Taminaschlucht, Juli 1905, leg. A. Wälde; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 713 (1).
- Molendoa (Anoectangium) Hornschuchianum (Funck.) Lindb. an partim c. fr. Am Bunstock im Kiental an feuchten Kalkfelsen bei 2450 m mit fruchtendem Anoectangium tenuinerve und ebenfalls fruchtenden Hymenostylium curvirostre, 19. Aug. 1908, leg. P. Culmann; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 715 (1).
- Trichostomum Baurianum Warnst. Entlibühl, Gottlieben, bei 6 m Tiefe (Prof. Lauterborn und Dr. E. Baumann). Dr. E. Baumann in litt.
- Trichostomum cylindricum (Bruch) C. Müll. Kienschlucht (850 m), ster.; Fankhausgraben (930 m), c. fr. (2).
- Didymodon rufus Lor. Lauberhorn (2400-2475 m) (2).
- Barbula bicolor (Br. eur.) Lindb. c. fr. Auf schwarzer Humuserde, über Felsen und zwischen Felsblöcken auf der Nordseite der Gemmi zwischen der Spitalmatte und Schwarzenbach; a) 1900 m, August 1904 und 1906; b) 2100 m, 31. August 1907, leg. P. Culmann; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 749 (1).
- Barbula Kneukeri Loeske et Osterwald, ster. Kanton Bern: Südabhang des Niesen, mit Stereodon Vaucheri auf Kalkfelsen 2250—2300 m, 17. September 1910, leg. P. Culmann; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 750 (1). Gipfel des Männlichen (2300 m), teste Loeske; Gipfel des Niesen (2360 m) (2).
- Pottia latifolia (Schwaegr.) C. Müll. Gipfel des Männlichen (2340 m), c. fr. (2).
- Pterygoneurum cavifolium (Ehrh.) Jur. Auf der Mauer der Strasse zwischen Reichenbach und Frutigen mit Aloina rigida (760 m), c. fr. (2).
- Campylostelium saxicola (W. et M.) Br. eur. Auf Kies, Obersuldtal (1160 m) (2).
- Grimmia andraeoides Limpr. Felsen am Gipfel des Männlichen (2300 m); Klus bei Kandersteg (1360 m); Suchet (1500 m), leg. Meylan (2).

- Grimmia anodon Br. eur. Hohkien nach der Hohmaad zu (2200 m), c. fr.; Schilthorn (2400 m), c. fr.; Sefinenfurka (1700 m), Seite des Kientals, c. fr.; Männlichen (2340 m), c. fr.; Gasterental (1365 m), c. fr. (2).
- Grimmia caespiticia (Brid.) Jur. Felsen im Süden der Kleinen Scheidegg (2100 m), c. fr. (2).
- Grimmia commutata Hüben. Auf einem Felsblock oberhalb Kiental (900 m), ster. (2).
- Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. Ziemlich häufig an der Kleinen Scheidegg, c. fr. Lötschenpass, Berner Seite (2600 m), c. fr. (2).
- Amphidium Mougeotii (Br. eur.) Schimp. Zwischen Grindelwald und der Kleinen Scheidegg, mit vorigem (1780 m). Geht herab bis 1000 m am Bochtenfall im Kiental (2).
- Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. Auf einer Buche im Kiental bei der Kien (1080 m) (2).
- Orthotrichum anomalum Hedw. var. nov. opacum Culm. Auf Felsen der alpinen Region. Sefinenfurka, Seite von Kiental (1700 m); zwischen Grindelwald und der Kleinen Scheidegg (1800 m); Gasterental (1360 m), mit weniger ausgeprägten Formen zusammen; Ebenalp (Kanton Appenzell); Bundstock, Kiental (2400 m), Form mit kürzeren Kapseln, ziemlich verschieden von den andern Formen (2).
- Orthotrichum leucomitrium Br. eur. Bei den Fällen der Simme (1125 m).
- Orthotrichum pallidum Grönv. Auf Bäumen am Rande des Weges zum Arnensee (1360 m). Bestimmung nicht ganz sicher (2).
- Orthotrichum paradoxum Grönv. Graubünden bis 1700 m, leg. Culmann, 1880, zwischen Vals und Zervreila. Von Warnstorf damals für O. stramineum gehalten (2).
- Orthotrichum paradoxum Grönv. var. leucomitrioides Limpr. Gasterental (1420 m), auf Bäumen (2).
- Orthotrichum rivulare Turn. Scheint im Jura zu fehlen. Früher dafür gehaltene Exemplare (leg. Meylan "au bord de l'Orbe près du Jura") erwiesen sich als O. pallens (2).
- Ulota Bruchii Hornsch. An einer Weisstanne bei Rohrimoos in der Umgebung von Schwarzenegg (925 m); Nordhang des Napf (1300 m) (2).

Tayloria Rudolphiana (Hornsch.) Br. eur. Im Farnital oberhalb dem Dorfe Kiental auf einer Erle (1450 m); auf einem Felsen oberhalb Gasteren (1590 m), in einem einzigen Rasen gemischt mit Mnium spinosum (2).

Tetraplodon angustatus (L. fil.) Br. eur. Bei den Quellen der Simme, auf einem umgestürzten Baumstamme mit Dicranum strictum

(1430 m) (2).

Pohlia (Webera) Ludwigii (Sprengl.) Lindb. Zwischen der Kleinen Scheidegg und dem Männlichen (2150 m) (2).

Pohlia (Webera) Rothii (Corr.) Broth. La Chaux und La Gittaz bei Ste-Croix (1100—1250 m) (3).

Bryum Blindii Br. eur. Am Ufer der Kander (1550 m), c. fr. (2).

Bryum pallescens Schleich. var. nov. pontresinae Winter. In Hedw., IL, 1910, p. 353—354, tab. X, Fig. 2. Bei Pontresina, Juli 1888, leg. Winter (7).

Bryum versisporum Bom. Am Ufer der Kander (1550 m), c. fr. (2). Mnium serratum Schrad. Mit schönen Früchten am Gipfel des

Männlichen (2300 m) (2).

Conostomum tetragonum (Dicks.) Lindb. (Syn.: C. boreale Sw.). Zwischen der Kleinen Scheidegg und dem Männlichen (2150 m), ster.; Lötschenpass (2680 m), ster. (2).

Webera sessilis (Schmid.) Lindb. (Syn.: Diphyscium sessile Lindb.).

Am Lauberhorn (2430 m), ster. (2).

Entodon Schleicheri (Br. eur.) Broth. (Syn.: Cylindrothecium Schl.). Auf einem Felsblock oberhalb Zweisimmen (1100 m) (2).

Pseudoleskea atrovirens (Dicks.) Br. eur. ster. (Syn.: Leskea patens Lindb.) teste Beste; a) Felsen auf dem Simplon (1800-2000 m), Juli 1903, leg. A. Wälde; b) Grimsel, auf Gneisdetritus oberhalb des Todtensees (2200 m), 7. Sept. 1908, leg. P. Culmann; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 622 (1).

Pseudoleskea filamentosa (Dicks.) var. tenuiretis Culm. In einer feuchten Einsenkung zwischen der Grimsel und dem Siedelhorn (2300 m) mit Ps. patens auf Silikat. "Cette variété sera distribuée dans la Bryotheca europaea de M. Bauer" (2).

Pseudoleskea decipiens (Limpr.) Kindb. Im Süden der Kleinen

Scheidegg (2100 m) (2).

Thuidium abietinum Br. eur. var. hystricosum (Mitten). Longeaigues im Val de Travers (800 m) (3).

- Cratoneuron ptychodioides Roth (1907 in litt. misit Dr. Röll). Kanton Tessin: Zwischen Faido und Dalpe, 27. Juli 1895, leg. Dr. Röll (5). Nach Mönkemeyer in Hedw. L, 1911, p. 270, ist dieses Moos als Cratoneuron commutatum var. ptychodioides (Roth) aufzufassen.
- Drepanocladium (Hypnum) Kneifii (Schimp.) Warnst. var. aquaticum Sanio. Untersee (Bodensee); Gehrenmoos bei Hegne, 12. August 1909, leg. Dr. E. Baumann.

Neu fürs Unterseegebiet! Dr. E. Baumann in litt.

- Hygrohypnum Smithii (Sw.) Broth. c. fr. (Syn.: Hypnum arcticum Somf.) Kanton Bern: Auf Steinen in einem kleinen Bache, ob Oberläger am Faulhorn (2000—2100 m), 10. August 1908, leg. P. Culmann; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 650 (1).
- Chrysohypnum (Hypnum) polygamum Bryhn. Wollmatingerried. Dr. E. Baumann in litt.
- Hylocomnium pyrenaicum (Spruce) Lindb. Gfällalp, Gasterental (1900 m), c. fr. (2).
- Stereodon (Hypnum) dolimiticum (Milde) Broth. Bei den Quellen der Simme (1400 m), in grosser Menge auf einem Felsen und einem Baumstamm. Lötschenpass, Berner Seite, 2180 m (2).
- Brachythecium collinum (Schleich.). Mont-Tendre (1670 m), am Rande der Schneetälchen, leg. Meylan (2).
- Brachythecium Geheebii Milde. Farnital, Kiental (1700 m), ster., auf Steinen unter Rhododendron (2); Hasenmatt auf Kalk und bei Bullet auf Erratikum, ster. (3).
- Brachythecium glaciale Br. eur., ster. Faulhorn, auf Felsen (Neocomien) am östlichen Abhange, welcher gegen das Schwarzhorn gerichtet ist. Wenn der Standort nicht genau der Originalstandort ist, so liegt er ihm jedenfalls sehr nahe (2500 m), 9. August 1905, leg. P. Culmann; Bauer, Musc. Eur. Exs., Nr. 686 (1).
- Brachythecium tromsoeënse Kaurin. Zwischen der Kleinen Scheidegg und dem Männlichen, c. fr. (Bestimmung nicht ganz sicher) (2).
- Eurhynchium diversifolium Br. eur. Gipfel der Dôle (1670 m) (3).
- Eurhynchium striatulum Spruce. Zwischen Kiental und Engelalp (1500 m). In der Nähe des Bochtenfalls (1000 m), ster. (2).