

Zeitschrift: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse
Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft
Band: 23 (1914)
Heft: 23

Bibliographie: Myxogasteres
Autor: Schinz, Hans

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 30.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Floristik und Fortschritte.

Myxogasteres.

(Referent: Hans Schinz, Zürich.)

1. **Lister, G.** New Mycetozoa. Journ. of Bot. LI (1913), 1—4.

Lamproderma columbinum (Pers.) Rost. var. *sessile* Lister (= *Physarum iridescens* Berk. = *Lamproderma iridescens* Rost.) wird zum Range einer Art erhoben und der Gattung *Leptoderma* G. Lister gen. nov. als *L. iridescens* (Berk.) G. Lister unterstellt (Tafel 524, Fig. 1—2b). Fundorte: Grossbritannien und Schweiz (Mürren und La Vaux im Neuenburger Jura). — *Diachæa cerifera* G. Lister nov. spec. (Tafel 525, Fig. 1 bis 3B), bekannt aus Norwegen, der Schweiz (Chasseron) und aus Japan.

2. **Lister, G.** Notes on Swiss Mycetozoa, 1912. Journ. of Bot. LI (1913), 95—100.

Die Verfasserin berichtet über ihre in Begleitung von Frl. A. Hibbert-Ware im Verlaufe des Sommers 1912 bei Luzern, an den Reichenbachfällen, auf Hohfluh ob Meiringen und in der Umgebung von Mürren gemachten Funde. Die kritischen Bemerkungen machen die kleine Publikation für den Schleimpilzforscher sehr wertvoll. Siehe Fortschritte.

3. **Meylan, Charles.** Myxomycètes du Jura. Annuaire du Conservat. et du Jard. bot. Genève, 15^e et 16^e année (1911 à 1913), 309—321 (als Sep. am 10. April 1913 ausgegeben).

Der durch seine frühern Publikationen über die jurassischen Schleimpilze bekannte Verfasser gibt uns hier eine Liste seiner Funde aus dem Jahre 1912, gleichzeitig an die namhaft gemachten Arten kritische Bemerkungen anknüpfend. Die neu aufgestellten

Arten, Varietäten und Formen, sowie die für die Schweiz neuen Arten sind in den Fortschritten berücksichtigt. Die Liste zeigt neuerdings, wie auffallend reich der Jura, verglichen mit dem Molasseland, an Schleimpilzen ist.

Für die Schweiz neue Arten, Varietäten und Formen.

(Die neu aufgestellten Arten, Varietäten und Formen sind fett gedruckt.)

Quellen:

Als Quellen für die nachfolgende Zusammenstellung dienten:

1. die vorstehend genannten Publikationen 1—3;
 2. mündliche und schriftliche Mitteilungen seitens Miss Gulielma Lister in Leytonstone (4), Fräulein Julie Schinz, Zürich (5).
- Physarum auriscalpium* Cooke, Hohfluh, Miss G. Lister und Miss Hibbert-Ware (2); Gorge de Longeaigues près Ste.-Croix, leg. Ch. Meylan (3).
- Diderma globosum* Pers. var. ***alpinum*** Meylan var. nov., repandue dans tout le Haut-Jura, de 1000—1500 m, au bord de la neige fondante, leg. Meylan (3). Der Typus ist bereits aus der Schweiz bekannt (Neuenburger Jura, côte de Montbenon, Meiringen [2]).
- Diderma umbilicatum* Pers. var. ***flavogenitum*** Meylan nov. var., La Vraconnaz près Ste.-Croix, leg. Meylan (3).
- Colloderma oculatum* (Lippert) G. Lister, Mürren, leg. Miss G. Lister und Miss Hibbert-Ware (2); La Vaux im Neuenburger Jura, leg. Ch. Meylan (3); Arosa, leg. G. Lister, Hibbert-Ware und Julie Schinz (4, 5).
- Diachæa cerifera* G. Lister, Chasseron, leg. Ch. Meylan (1, 3).
- Didymium Clavus* (Alb. et Schwein.) Rost., Hohfluh (Meiringen), leg. Miss Lister und Miss Hibbert-Ware (2).
- Leptoderma iridescens*** (Berk.) G. Lister (= *Lamproderma columbinum* Rost. var. *sessile* Lister = *Lamproderma iridescens* Rost. = *Physarum iridescens* Berk.), Mürren, leg. Miss G. Lister und Miss Hibbert-Ware (1, 2); La Vaux im Neuenburger Jura, leg. Ch. Meylan (3).

Stemonitis virginiensis Rex (= *Comatricha typhoides* var. *heterospora* Rex), zwischen Pouillerel und Le Locle, leg. Meylan (3). Meylan begründet an dieser Stelle auch die von ihm vorgenommene Ueberführung der *C. typhoides* var. *heterospora* in die Gattung *Stemonitis*.

Comatricha nigra (Pers.) Schröter var. *microspora* Meylan = *C. laxa* Rost. var. *microspora* Torrend in Bull. Soc. Vaud Sc. nat. XLIV (1908), 50 (3).

Cribraria ferruginea Meylan nov. spec., La Vaux supra Fleurier (Neuenburg), leg. Meylan (3).

Cribraria pyriformis Schrader var. *fusco-purpurea* Meylan nov. var., Chasseron, Aiguille de Baulmes leg. Meylan (3); am erstgenannten Standort auch die aus der Schweiz bis jetzt nur aus dem Kanton Zürich bekannt gewordene var. *notabilis* Rex (3).

Licea flexuosa Pers., Granges de Ste.-Croix, Chasseron, leg. Meylan (3); Mürren, leg. Miss Lister und Miss Hibbert-Ware (2); Vättneralp, leg. Julie Schinz (4, 5).

Licea pusilla Schrader, Mürren, leg. Miss G. Lister und Miss Hibbert-Ware (2); Ste.-Croix, Aiguille de Baulmes, Chasseron, leg. Meylan (3).

Liceopsis lobata (Lister) Torrend, Suchet, leg. Meylan (3).

Trichia contorta (Ditm.) Rost. f. *attenuata* Meylan nov. f., Jura, leg. Meylan (3).

Trichia decipiens (Pers.) Macbr. f. *rubiformis* Meylan nov. f., La Vaux, leg. Meylan (3).

Hemitrichia abietina (Wigand) Lister, Suchet, leg. Meylan (3); Arosa, leg. Miss Lister, Miss Hibbert-Ware und Julie Schinz (5).

Hemitrichia leiotricha Lister, Hohfluh, leg. Miss G. Lister und Miss Hibbert-Ware (2); Arosa, leg. G. Lister, Hibbert-Ware und Julie Schinz (5).

Arcyria digitata (Schwein.) Rost. f. *subglobosa* Meylan nov. f., Neuenburger Jura, leg. Meylan (3).

Arcyria globosa Schwein., La Chaux, leg. Meylan (3).