

Zeitschrift: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse

Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft

Band: 34 (1925)

Heft: 34

Bibliographie: Myxogasteres

Autor: Schinz, Hans

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Fortschritte in der Systematik, Floristik und Pflanzengeographie der Schweizerflora.

Myxogasteres.

(Referent: *Hans Schinz*, Zürich.)

A. Bibliographie.

Angesichts des Umstandes, dass wohl, abgesehen von den alpinen Arten, die meisten Vertreter der Myxogasteres kosmopolitischen Charakter haben, ist es notwendig, dass auch Notizen berücksichtigt werden, die sich auf vorderhand noch nicht in unserm Gebiete nachgewiesene Arten beziehen.

1. **Meylan, Ch.:** *Recherches sur les Myxomycètes du Jura en 1921-22-23.* Bul. Soc. Vaud. Sci. Nat. 55 1924 (237-249).
2. **Lister, G.:** *Mycetozoa from North India.* Journ. of Bot. 62 1924 (16).

[Zahlreiche Notizen, die auch für die Beurteilung der Variation der schweizerischen Belege bedeutungsvoll sind.]

Exsikkaten.

Brandza, Marcel: *Myxomycètes de Roumanie.* Serie IV und V.

[Ein auch für das Studium der schweizerischen Myxomyceten sehr wichtiges Exsikkatenwerk.]

Hintikka, T. J.: *Myxogasteres Fennici exsiccati.* Dec. I-II.

B. Fortschritte der Floristik und Systematik.

Für die Schweiz neue Arten, Varietäten und Formen, sowie sonstige bemerkenswerte Vorkommnisse, Nomenklaturberichtigungen oder Erweiterungen der Diagnosen, bezogen auf die Bearbeitung der Myxogasteres durch den Referenten in Rabenhorsts Kryptogamen-Flora.

Als Quelle für die nachfolgende Zusammenstellung diente die erste der beiden vorstehend erwähnten Publikationen.

Neu aufgestellte Arten, Varietäten und Formen sind durch * ausgezeichnet. Die Ziffern in Klammern beziehen sich auf die Seitenzahlen in Rabenhorsts Kryptogamen-Flora, X. Abteilung, Myxogasteres.

Badhamia viridescens Meylan kommt im Jura auch mit völlig kalkfreier Peridie und kalkfreiem, aus hyalinen Fäden bestehendem Capillitium vor.

Physarum bitectum Lister, Suchet 1200 m; neu für die Schweiz (144).

P. fulvum (Macbride) Lister, kommt mit sitzenden, verlängerten und teilweise plasmodiokarpfen Sporangien vor (124).

P. vernum Sommerfelt, Plasmodium schmutzigweiss (138).

P. alpinum (Lister) G. Lister, Plasmodium blaßschmutziggelb (151).

P. atrum Schwein., dürfte nach Meylans Feststellungen eine kalkfreie Form von *P. cinereum* (Patsch) Pers. sein, bemerkenswert ist immerhin, dass die unter der Bezeichnung *P. atrum* ausgehenden Sporangien ausnahmslos kalkfrei sind und keine Übergänge zu *P. cinereum* gefunden werden (139).

Fuligo septica (L.) Gmelin f. candida (Pers.) Meylan, scheint im Jura nicht selten zu sein (152).

F. rufa Pers. = F. septica (L.) Gmelin f. corticata Meylan. Meylan fasst seine forma corticata als nicht verschieden von *F. rufa* Pers., die er als gute Art anspricht, auf (154).

Diderma niveum (Rost.) Macbr. (179) * *f. endoleuca Meylan*, Peridie zweischichtig und Columella ganz weiss; Jura.

— — * *var. ferruginea Meylan*, Sporangien schneeweiss, innere Peridie und Columella fahlrostbraun; Jura.

* *D. microcarpum Meylan*, unterscheidet sich von *D. niveum* (Rost.) Macbr. durch kleinere Sporangien, die glänzend weiss sind,

blassviolette Capillitium und eine fahlrote oder gelbrote Columella. Jura 1150-1400 m.

Lepidoderma Carestianum (Rabenh.) Rost. (225) * *f. brunnescens* Meylan, Sporangien fahlbraun oder rötlich; um Ste. Croix, 1100-1300 m.

* *Lamproderma echinosporum* Meylan, Sporen 14 bis 16 μ , purpurschwarz, stark stachelig; Zentraljura, 1200-1450 m, am Rande der Schneeflecken.

L. columbinum (Pers.) Rost. (262) * *var. subglobosum* Meylan, Sporen nur 10 bis 12 μ gross, Sporangien kugelig oder genabelt, breiter als hoch; Jura.

Leptoderma iridescent (Berk.) G. Lister, mit dunkelgrauem Plasmodium; Jura (227).

Dictydium cancellatum (Batsch) Macbr. var. *alpinum* G. Lister = *Heterodictyon mirabile* Rost.; soll nach Meylan mindestens eine Unterart, wenn nicht gar eine selbständige Art sein, in letzterem Falle hat sie den Namen *D. mirabile* (Rost.) Meylan zu tragen; Jura (300).

Lycogala Epidendrum (L.) Fr. (325) * *var. exiguum* (Morgan) Meylan, häufig im Jura.

Trichia lutescens Lister (343) * *f. pedata* Meylan, Sporangien mit gelbem Stiel; Granges de Ste-Croix, 1200 m.

T. decipiens (Pers.) Macbr. var. *olivacea* (Meylan) Schinz, Plasmodium meist weiss, sodann nach und nach olivefarbig ohne rötlichen Stich (346).

T. contorta (Ditm.) Rost. (340) * *var. crenulata* Meylan, Elateren mit regelmässigen Spirallinien ohne Aufreibungen aber zerstreut stachelig und mit fein gekerbten Sporen; Granges de Ste-Croix, 1200 m.

A. cinerea (Bull.) Pers. *f. subglobosa* (Meylan) Schinz; Granges de Ste-Croix, 1100 m (1) (379).

A. incarnata Pers. var. *fulgens* Lister; Côte-aux-Fées (für die Schweiz neue Spielart) (383).