

<b>Zeitschrift:</b>	Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerische Botanische Gesellschaft
<b>Band:</b>	36 (1927)
<b>Heft:</b>	36
<b>Bibliographie:</b>	Flechten
<b>Autor:</b>	Frey, Eduard

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Flechten.

Referent: *Eduard Frey*, Bern.

### I. Bibliographie.

Es sind die Arbeiten aus dem Jahre 1926 erwähnt.

1. **Du Rietz, G. Einar:** *Vorarbeiten zu einer „Synopsis Lichenum“.* I. Die Gattungen Alectoria, Oropogon und Cornicularia. *Arkiv för Botanik.* 20 A Stockholm 1926 (1-43), 2 Tafeln u. 2 Textfiguren.
2. **Frey, Ed. und Ochsner, Fr.:** *Contributions à la connaissance de la végétation lichénique et muscinale.* Etudes phytosociologiques en Auvergne. Rapport sur une excursion inter-universitaire, rédigé par Jos. Braun-Blanquet. *Arvernia* 2 Clermont-Ferrand 1926 (57-84).  
[Die Arbeit enthält Vergleiche zwischen der Flora und Vegetation der Auvergne mit derjenigen der Schweiz.]
3. **Hillmann, Johannes:** *Beiträge zur Systematik der Flechten.* II. *Parmelia (Xantoparmelia) incurva* (Pers.) Fr. III. *Parmelia centrifuga* (L.) Aach. *Annales mycologici* 24 1/2 1926 (138-144).
4. **Meylan, Ch.:** La flore bryologique et lichnéologique du bloc erratique de la Grange-de-la-Côte. *Bull. soc. vaud. sc. nat.* 56 1926 (165-172) 2 fig.  
[Ein Gneisblock ruht auf einem Kalkblock. Von 45 Arten sind nur 2 Arten den beiden Substraten gemein, 22 Arten finden sich nur auf Gneis, 21 Arten nur auf Kalk.].
5. **Meylan, Ch.:** Nouvelle contribution à la connaissance des lichens du Jura, avec quelques indications de localités des Alpes. *Ibid.* (173-178).  
[Arten neu für den Jura und die Schweiz.]

6. **Motyka, J.**: *Die Pflanzenassoziationen des Tatragebirges.* VI. Teil. Studien über epilitische Pflanzengesellschaften. Bull. de l'Acad. Polon. sc. et lettres, classe sc. math. et nat., sér. B: sc. nat. 1926. Cracovie 1926 (189-227).  
[Verf. vergleicht seine Ergebnisse mit denjenigen von Frey aus den Alpen.]
7. **Nienburg, Wilhelm**: *Anatomie der Flechten.* Linsbauer, Handbuch der Pflanzenanatomie II. Abt. 1. Teil: Thallophyten, Band VI Berlin (Bornträger) 1926 (137 S. und 183 Textabb.).
8. **Zschacke, Hermann**: *Die Flechten des Davoser Tales.* Mitt. Naturf. Ges. Davos 1925/1926 Davos-Platz 1926 59 S.  
[Reiche Artenliste. Beschreibung neuer Formen. Neue Arten für die Schweiz. Morphologische und anatomische Bemerkungen über schon bekannte Arten und Formen.]

## II. Fortschritte der Floristik.

Als Quellen dienten die Nummern 4, 5 und 8, ferner persönliche Mitteilungen des Herrn Dr. Ch. Meylan an den Referenten. Neufunde des Referenten sollen in den nächsten Berichten geordnet werden.

\* neu für die Schweiz, R neu für Rhätien (Zschacke, J neu für Jura (Meylan)

### Verrucariaceae.

*Verrucaria anceps Krphb.* Davos, auf Dolomitblöcken in Wiesen (8).

\* *V. anulata* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926. Davos, auf Kalk (8).

\* *V. Anziana Garov.* Davos, im Dorfbache bei 2000 m/M., auf Si-Gestein.

\* *V. areolato diffracta* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 17. Davos, im Landwasser der Zügenstrasse auf Si-gestein (8).

*V. chlorotica Ach.* Davos, in einem Bache des Flüelatales 2200 m, im Dorfbache (8 R).

*V. coerulea* (Ram.) DC.

\* — *f. geographica* (Bagl.) Zsch. Davos, Zügenstrasse, Ca (8).

*V. controversa Mass.* Jura, Chasseron (5 J).

\* *V. cretacea* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 13. Davos, alte Zügenstrasse a. Dolomit (8).

\**V. davosensis* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926 p. 16. Davos, in Bächen über dem Rütiwege (8.)

*V. elaeomelaena* (Mass.) Arn.

\*— *f. alpina* Arn. Lich. exsicc. 129. Davos, in Bächen auf Si- und Ca-Gestein 2000 m/M. (8.).

\**V. endolithica* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 14. Davos, Strelaalp, 2300 m/M. auf Dolomit (8.).

\**V. erubescens* Zsch. Hedwigia 1926. Davos, auf Ca, am Landwasser (8.).

*V. Hochstetterii* Fr.

\*— *pl. alpina*. Davos, mehrfach auf Dolomit (8.).

\*— *f. octecta* (Arn.) A. Zahlbr. Schiatobel (8.).

\*— *f. praecellens* (Arn.) Zsch. Strelaalp 2200/400 m/M. (8.).

\*— *f. sepulta* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926 p. 14. Davos, Schiatobel (8.).

\*— *var. crustosa* (Arn.) A. Zahlbr. Davos, Schiatobel, annähernde Form (8.).

\*— *var. anularis* A. Zahlbr. Davos, Zügenstrasse (8.).

*V. interrupta* (Anzi) Steiner. Davos, alte Zügenstrasse a. Dolomit (8.).

\*— *V. laveata* Ach. Davos. Im Landwasser bei Schmelzboden auf Granit (8.).

*V. lecideoides* (Mass.) Trév. Jura, Granges de Ste-Croix 1100 m/M. (5 J.).

\*— *var. minor* (Hepp). Davos, a. Ca. (8.).

*V. pachyderma* Arn. Davos, in einem Bach des Flüelatales 2200 m/M. (8 R.).

*V. submersa* Schær. Davos, auf schiefrigem Gestein am Landwasser in der Zügenstrasse, auf Granit im Sertigbache (8.).

\**V. Wolferi* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 17. Davos, auf Ca im Dorfbache bei 2000 m/M. (8.).

*Thelidium absconditum* Krphb. Davos, an der Zügenstrasse, eine alpine Form mit etwas grösseren Sporen: 26-30 × 11-13 (8.).

*Th. papulare (Fr.) Arn.*

— *f. fuscum Zsch.* Davos, Zügenstrasse (8).

\**Polyblastia deminuta Arn.* Hohkien, Kiental, Berner Oberland,  
Ca (Frey), Davos, Schiahorn auf Ca (8).

\**P. deplanata (Arn.) Zsch.* Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926 p. 20.  
Davos, auf Dolomit bei 1800 m/M. (8).

*P. integrascens Vain.*

\*— *f. microcarpa Zsch.* Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 20.  
Davos, Schiatobel und Schiahorn auf Dolomit (8),

*Staurothele clopima (Wnbg.) Th. Fr.* Jura, Creux du Van 1300 m/M.  
(5 J.).

\**St. fuscocuprea (Nyl.) Zch.* Quellbäche auf dem Fauler, Erst-  
feldertal (Uri). Alpenbäche bei Davos, 2200 m/M., Engadin,  
in Gletscherbächen bei St. Moritz, Pontresina, Silvaplana, Alpen-  
bäche der Provinz Sondrio (Zsch. 1918. Siehe diese Berichte 32,  
1923, p. 54, Nr. 18, welche Angabe damals übersehen wurde),  
Val Scarl 1950 m/M., Gneis (Frey).

*f. rimosior (Nyl.) A. Zahlbr.* Val Scarl, Munt d'Astras  
2450 m/M., überspülter Gneis (Frey).

*Microglaena muscorum (Fr.) Th. Fr.* Davos, auf abgestorbenen  
Moosen in 1800 m Höhe (8).

#### Dermatocarpaceae.

*Dermatocarpon lachneum (Ach.) Smith.* Davos, auf dem Erdboden  
mehrfach (8).

#### Pyrenulaceae.

*Arthopyrenia conoidea (Fr.) A. Zahlbr.* Jura répandu (5 J.), Davos,  
auf Ca (8).

*Thelopsis melathelia Nyl.* Davos, grosses Schiahorn über Saxi-  
fragia (8).

#### Coniocarpineae.

*Calicium hyperrellum Ach.* Jura, Suchet 1250 m/M. (5 J.). Davos,  
an Fichten (8).

*C. praecedens Nyl.* Davos, *Alnus viridis*, 1700—1900 m/M. (8).

Graphidineae.

*Arthonia dispersa* (Schrad.) Hepp. Davos, Rinde von Alpenrosen (8).

*Encephalographa cerebrina* (DC.).

\*— var. *steriza* Anzi. Jura, Suchet 1590 m/M. (5 J).

*Opegrapha centrifuga* Mass. Davos, an Kalk im Schiatobel (8 R).

Lecideadeae.

*Lecidea armeniaca* (DC.) Fr.

\*— *f. agleodes* Nyl. Davos, Lochalp 2400 m/M., Jakobshorn 2100 m/M. (8).

\*— *f. nigrita* Schær. Davos, Jakobshorn und Flüelatal (8).

*L. assimilata* Nyl. Strelaalp, auf nackter Erde (8).

*L. auriculata* Th. Fr. Jura, Mont de Baulmes (5 J).

\*— var. *subinops* Vain. Davos, Seehorngipfel 2242 m/M. auf Glimmerschiefer (8).

*L. Dicksonii* (Ach.). Jura, entre Bullet et Mauborget et la Gittaz près Ste-Croix 1200 m/M. (5 J).

\**L. latypiza* Nyl. Davos, auf sonnigen Blöcken im Walde (8).

*L. macrocarpa* (DC.) Ach.

\*— *f. praetoria* Th. Fr. Davos, Klippen auf Lochalp 2200 m/M. (8).

\*— *f. flavigunda* Vain. Davos, auf Verrucano an der Zügenstrasse (8).

*L. neglecta* Nyl. Jura, répandu (5 J).

*L. pantherina* (Ach.) Th. Fr.

\*— var. *Achariana* Vain. Davos, auf Blöcken im Walde 1800 m, über Lochalp bei 2400 m/M., zwischen Schiahörnern und Dorfberg bei 2200 m/M. (8).

*L. petrosa* Arn. Jura, les Rasses près Ste-Croix (5 J).

*L. tesellata* Flk. La Thiole, sur Ballaigues (5 J).

*L. (Biatora) leucophaea* Flk. Mont de Baulmes et Suchet (5 J).

\**L. (B.) Nylandery* Anzi. Davos. auf Rhododendron ferr. (8).

*L. (B.) sanguineoatra (Wulf.).*

\*— var. *Templetoni* (Tayl.) Leight. Jura, près Ste-Croix, 1300 m/M. (8).

*Catillaria subnitida* Hellb. Davos, auf Ca am Rütiweg (8 R).

*Bacidia bacillifera* (Nyl.). Davos, auf Rhododendron ferr. über Lochalp (8).

\**B. olescurate* (Smf.) A. Zahlbr. Jura, Chasseron, Creux-du-Van usw. (5). Davos, Sertigtal, im Schiatobel, über Moosen (8).

*Toninia coeruleonigricans* (Lightf.) Th. Fr.

\*— var. *opuntioides* (Vill.) Nyl. Davos, Guggerbachschlucht, auf Ca (8).

\*— var. *subcandida* Vain. Davos, auf Ca, 1700 m/M. (8).

\*— var. *papillosa* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926 p. 34. Davos, auf Ca-Erde im Albertitobel (8).

\**T. intermedia* (Mass.) Th. Fr. Davos, Zügenstrasse, an senkrechten Felswänden, auf Ca 1600 m/M.

\**T. tristis* Th. Fr. Davos, alte Zügenstrasse, über Collema auf Ca-Erde (8).

*Rhizocarpon obscuratum* (Ach.) Mass. Jura, ici et là sur les erratiques (5 J). Davos, an Blöcken in der Zügenstrasse (8).

\*— f. *ecrustaceum* (Nyl.). Davos, Block im Wald 1800 m/M. (8).

### Gladoniaceae.

\**Cladonia acuminata* (Ach.) Arn. f. foliata (Arn.). Davos, auf Maueru im Dischmatal (8).

*C. chlorophaea* (Flk.) Sprgl.

\*— f. *pterigota* Flk. Zernez, Platuns 1500 m/M., fauler Alnus-stamm (Frey).

*C. cocciferea* L. (Willd.).

\*— var. *phylllocoma* Flk. Jura vaudois, Ste-Croix, La Sagne tourbière 1024 m/M. (5).

*C. cornutoradiata* (Coem.) Zopf.

\* — *var. capreolata* (Flk.). Bern, Könizbergwald, Wegränder, Kandergraben bei Thun, am Fuss von Kiefern (Frey).

\* *C. glauca* Flk. Environs de Ste-Croix (5 J).

*C. polydactyla* (Dicks.) Hoffm.

— *f. uliginosa* Meylan. Près Ste-Croix, fossé turbeux, les pieds dans l'eau, en compagnie de *Scapania paludicola* (5 J).

— *var. microcarpa* (Ach. Nyl.). Granges de Ste-Croix, Chasseron 1400 m/M. (5 J).

*C. turgida* (Ehrh.) Hoffm. Chasseron, Aiguilles de Baulmes, Suchet, Creux-du-Van, 1200 à 1400 m/M. (5 J).

#### Gyrophoraceae.

*Gyphora rugifera* (Nyl.) Th. Fr. Monte Leone 3550 m/M. (Meylan).

#### Acarosporaceae.

*Acarospora glaucocarpa* (Wnbg.) Krb.

\* — *f. pruinosa* (Kphb.). Davos, Zügenstrasse (8). [Nach Magnusson 1924 zu *f. depauperata* Krb. zu ziehen.]

\* — *f. conspersa* (Fr.) Th. Fr. Davos, die häufigste Form der Art auf Ca (8).

*A. hospitans* H. Magn. Granges de Ste-Croix 1100 m/M., sur les tuiles d'un toit (5, det. Magnusson).

*Biatorella cyclocarpa* (Anzi) Nyl. Davos, auf Ca am Rütiweg (8).

*B. hemisphaerica* (Anzi) Zsch. Davos, Schiatobel, bei 1900 m/M. auf Erde (8).

\* *B. platicarpoides* (Anzi) Th. Fr.

— *var. flexuosa* Bagl. et Car. Davos, auf Dolomit am Strelapass 2400 m/M., ohne Thallus (8).

#### Ephedaceae.

*Polychidium muscicolum* (Sm.) Gray. Jura, Suchet, 1200 m/M. (5 J), Davos, am Eingang des Schiatobels (8 R).

Pyrenopsidaceae.

\**Thyrea Gerardi* (Dur. et Mont.) Bagl. et Car. Davos, am Eingang des Flüelathales auf sonnigem Felsblock (8).

Collemaceae.

*Collema cheileum* Ach. Chasseron, 1300 m/M. c. fr. (5 J).

*Leptogium subtile* (Schrad.) Nyl. Ste-Croix 1100 m c. fr., Bienné 500 m/M (5 J).

Heppiaceae.

*Heppia virescens* (Despr. Nyl.). Fréquent dans le Jura central sur les endroits dénudés et décalcifiés, exposés au soleil (5, Chasseral Frey).

Pannariaceae.

*Placynthium nigrum* (Huds.) Gray.

— var. *caesium* (Hue). Davos, Zügenstrasse auf Dolomit (8).

Peltigeraceae.

*Peltigera erumpens* (Tayl.) Vain. Ste-Croix 1100 m/M., Vraconnaz, Côte-aux-Fées, c. fr. (5 J), Bern, am Gurten, 800 m/M., neu für Mittelland, Lötschental, Faldumalp 1700 m/M. am Weg auf Erde, Gneis (Frey).

*P. scutata* (Dicks.) Leight. Granges de Ste-Croix, ici et là sur les erratiques moussus (5 J).

*Solorina bispora* Nyl. Chasseron 1580 m/M. (5 J).

Pertusariaceae.

\**Pertusaria speciosa* Ove Hoeg. Aiguilles de Baulmes 1400 m/M. (5).

Lecanoraceae.

*Lecanora albella* (Pers.) Ach.

\*— var. *peralbella* Nyl. Davos, Wolfgang, Zaunholz (8).

*L. Bormiensis* Nyl. Col des Etroits près de Ste-Croix (5 J).

\**L. gangaleoides* Nyl. Jura vaud., Bloc erratique de Bon-Château près de l'abergement (5).

*L. sordida* (Per.) Th. Fr.

\*— var. *neglecta* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 45. Davos, auf einem sonnigen Block im Walde bei 1600 m/M. (8).

\**L. subplanata* Nyl. Davos, an Klippen über der Lochalp 2400 m/M. (8).

*L. symmicta* Nyl. Davos, an Alpenrosen, selten (8). [Wohl zum Teil als *L. symmictera* Nyl. aus den Alpen bekannt.]

*Aspicilia laevata* (Ach.) Arn.

\*— var. *albicans* Arn. Davos, auf Granit an Gewässern (8).

\**A. Maurittii* Hue. Davos, Findling im Walde bei 1700 m/M. (8).

*Haematomma ventosum* (L.) Mass. Suchet, près Noiraigues, sur erratiques (5 J). [Sehr tiefe Standorte.]

\**Candelariella superdistans* (Nyl.) Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 49. Davos, bei Frauenkirch, auf Lecanora dispersa (8).

Parmeliaceae.

*Parmelia cetrariooides* (Del.) Nyl. Davos, bemooster Felsblock im Wald (8). Ici et là dans les montagnes, entre Vuiteboeuf et Orges c. fr. (5 J).

*P. exasperatula* Nyl.

\*— f. *subrasa* Harm. Davos, Alnus incana b. Schmelzboden (8).

*P. isidiotyla* Nyl. Mt. de Baulmes, au-dessus de Buttes, sur des erratiques (5 J).

*P. omphalodes* Ach. var. *panniformis* (Wulf.) Ach.

— f. *cinereo-albida* Harm. Davos, am Grund von Larix (8).

— f. *nigrescens* Harm. Davos, Klippen Lochalp 2400 m/M. (8). [Die beiden letzteren Formen sind häufige Schatten- resp. Sonnenformen.]

*P. pubescens* (L.) Vain. Bözingerberg bei Biel (5 sub *Alectoria lanata* (L.) Minks). [Ausserordentlich tiefer Standort.]

*P. tubulosa* (Schrad.) Bitter. Jura, très commun sur le tronc et les branches des sapins, plus rarement sur d'autres essences, fréquemment fertile, mais toujours en faible quantité (5 J).

*Cetraria aculeata* (Schreb.) Fr. Entre Bullet et Mauborget  
1200 m/M. (5 J).

*C. chlorophylla* (Humb.) Schaer. Au-dessus de Ste-Croix (5 J).

*C. glauca* (L.) Ach.

— *f. coralloidea* (Wallr.) Harm. Davos, mehrfach an Fichten (8).

*C. saepincola* (Erh.) Ach. Jura, abondant dans les tourbières, sur-  
tout sur des rameaux malades des boulaux (5).

#### Caloplacaceae.

*Blastenia immersa* (Web.) Steiner. Davos, auf Ca. am Sertigfall (8).

*B. lamprocheila* (DC.) Arn. Davos, Dischmatal auf Mauer, bei Clavadel auf Block (8).

*Caloplaca caesiorufa* (Ach.) A. Zahlbr.

\*— *f. muscicola* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 55, nomen nudum. Davos, auf Moosen über der Lochalp 2300—2400 m/M.

*C. cerina* (Ehrh.) Nyl.

\*— *var. cyanolepra* (Fr.) Th. Fr. Davos, Dischmatal auf Sorbus Auc. an Salix bei Schmelzboden (8).

\*— *var. dispersa* Oliv. Davos, über Staurothele clopima mit Lecanora dispersa parasitans auf Granitblöcken im Bachbett bei Schmelzboden, am Sertigbache (8).

\*— *f. — — —* Zsch. Mitt. Naturf. Ges. Davos 1926, p. 55. Davos, an Zaun bei Wolfgang, mit dicht gedrängten, unregelmässig-eckigen Früchten (8).

\**C. fulva* (Anzi) Dalla T. u. Sarnth. Davos, auf Ca. Zügenstrasse (8).

*C. murorum* (Hoffm.) Th. Fr.

\*— *var. pulvinata* (Mass.) Jura, Granges-de-la-Côte (4).

#### Buelliaceae.

*Buellia alboatra* (Hoffm.)

\*— *var. dispersa* (Krpfb.) Davos, Strelapass 2400 m/M. auf Ca. (8 R).

*B. aethalea* (Ach.) Granges de Ste-Croix (5 J).

*B. parasema* (Ach.)

— var. *saprophila* (Ach.) Krb. Davos, Clavadel, auf Holze. Fichtenstumpfes (8 R).

*Rhinodina confragosa* (Ach.) Krb. Mt. de Baulmes et Grand Savagnier (5 J).

Physciaceae.

*Physcia aipolia* (Ach.) Nyl.

— var. *anthelina* Nyl. La Gittaz près Ste-Croix (5 J).

*P. caesia* (Hoffm.) Fr.

\*— *f. subalbinea* (Nyl.) Vain. Davos, über Moosen im Walde (8).