

Zeitschrift: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Botanique Suisse

Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft

Band: 40 (1931)

Heft: 1

Bibliographie: Pilze

Autor: Blumer, S.

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Pilze.

Referent: *S. Blumer.*

Neue oder bemerkenswerte Vorkommnisse und neu unterschiedene schweizerische Arten.

Die für die Schweiz neuen Vorkommnisse sind im folgenden Verzeichnis durch einen Stern (*) hervorgehoben; doch geschieht dies nur in den Gruppen, für die neuere, die ganze Schweiz umfassende Bearbeitungen vorliegen, die als Ausgangspunkt benützt werden können. Es bedeuten: Mit Stern versehene Pilznamen: Für die Schweiz neue Arten; mit Stern versehene Nährpflanzennamen: Für die Schweiz zum erstenmal angegebene Wirte. Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die Nummern des Literaturverzeichnisses am Schlusse der Zusammenstellung. Ausserdem bin ich Herrn *Prof. Dr. Ed. Fischer* in Bern, Herrn *Prof. Dr. E. Gäumann* in Zürich und Herrn *Dr. P. Cruchet* in Morges für ihre wertvollen Angaben zu grösstem Dank verpflichtet.

Peronosporeen.

Für die Gattung *Peronospora* diene als Ausgangspunkt: *E. Gäumann, Beiträge zu einer Monographie der Gattung Peronospora Corda.* — Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz 5, Heft 4, 1923.

* *Peronospora sparsa Berk.* — Auf *Rosa spec. cult.* Genf, März 1909, leg. A. Lendner.

Diese für die Schweiz neue Art wurde in den letzten Berichten (Heft 39, 1930) nur in der Bibliographie, aber nicht in den „Fortschritten der Floristik“ angeführt. Herr *Dr. P. Cruchet* in Morges machte den Ref. darauf aufmerksam. [Vgl. A. Lendner: Les maladies cryptogamiques du rosier. — *Revue horticole Suisse* 2 1929 (146-148).]

Saccharomycetaceen.

Galli-Valerio (5) beobachtet in Tieren folgende Hefen:

Saccharomyces guttulatus Rob. Häufig in *Kaninchen*, auch bei *Wildkaninchen* (Châteauneuf und St. Petersinsel), ferner im *Alpenhasen* (Val d'Arpette, 1600 m und Roc de Budri, 3000 m, Vallée Tourtemagne) und im *Edelmarder* (Carnate, Veltlin),

1200 m. Eine ähnliche Form fand er auf der *Spitzmaus* (Chamblandes-dessus bei Lausanne).

Blastocystis muris Galli-Valerio in *Hausratten* und *Wander-
ratten* in Lausanne.

Blastocystis avium Galli-Valerio. Im Darm von *Carduelis elegans* (*Distelfink*) in Lausanne.

Zygosaccharomyces alvei Galli-Valerio. Im Darm von *Bienen*, sowie im Honig, von dem die Bienen sich nährten.

Hansenia apiculata Lindner. Im Darm der *Stubenfliege* (Lausanne) und der *Dungfliege*, *Scatophaga stercoraria* (Haut Darbignon, Valais, 1621 m; Pas de Cordaz, Vaud, 2136 m).

Plectascineen.

Aspergillus fumigatus Fres. in den Luftsäcken eines *Papageis* (*Psittacus erythacus*) in Lausanne. Galli-Valerio (5).

Gymnoascus setosus Eidam. Auf einer *Bienenwabe* aus Siglistorf (Aargau), det. A. Maurizio (11).

Erysiphaceen.

Ausgangspunkt für die folgende Aufzählung: Eug. Mayor, *Contribution à l'étude des Erysiphacées*. Bull. Soc. Neuchâteloise des Sciences nat. 35 p. 43 ff., sowie „*Fortschritte der Floristik*“ Heft 28-39.

Erysiphe polygoni DC. em. Salm. auf * *Lupinus luteus* L. Morges, dans un jardin, 21. Sept. 1919, leg. Dr. P. Cruchet (Mitteilung von Herrn Dr. Cruchet).

Erysiphe cichoracearum DC. em. Salm. auf * *Centaurea imperialis* Hort. (= *C. odorata* Burm. \times *C. moschata* L.?) — Morges, jardin, 21. Sept. 1929, leg. Dr. P. Cruchet. (Mitteilung von Herrn Dr. Cruchet.)

Myrangiaceen.

* *Adelopus* sp. (vielleicht identisch mit *A. balsamicola* (Peck) Theissen auf * *Pseudotsuga Douglasii* Carr. Seit 1925 in Hardern bei Lyss (Bern) von Oberförster H. v. Greyerz beobachtet.

Die Gattung *Adelopus* steht zwischen den Myrangiaceen und den Sphaeriaceen (Gäumann, 6).

Discomyceten.

<i>Helvella elastica</i> Bull.	Bei Chiasso, leg. C. Benzoni (2).
<i>Geopyxis cupularis</i> L.	„ „ „ „
<i>Discina venosa</i> Pers.	„ „ „ „
<i>Lachnea scutellata</i> L.	„ „ „ „
<i>Helotium albidum</i> Rob.	„ „ „ „

Uredineen.

Als Ausgangspunkt dieser Zusammenstellung dienen: *Ed. Fischer, Die Uredineen der Schweiz*, Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz 2 Heft 2 1904, sowie die „*Fortschritte der Floristik*“ in den Heften 15-39 dieser Berichte.

Uromyces hippocrepidis Eug. Mayor auf *Hippocrepis comosa* L. Genf, Herb. Müller-Arg., det. Eug. Mayor. Dieser mediterrane Pilz wurde in der Schweiz erst einmal von Mayor bei Brig beobachtet (Mayor, 12).

Uromyces rumicis (Schum.) Winter auf * *Rumex aquaticus* L. und auf * *Rumex aquaticus* L. × *Hydrolapathum* Huds. — Wunderklingen an der Wutach (Schaffhausen), leg. W. Koch (nach Mitteilung von Herrn Prof. Gäumann).

Puccinia arenariae (Schum.) Winter auf * *Sagina ciliata* Fr. — Coeuve bei Pruntrut, leg. H. Jenni (nach Mitteilung von Herrn Prof. Gäumann).

Puccinia taraxaci (Rebent.) Plowr. II auf * *Taraxacum levigatum* Willd. — Genthod, Genève, Herb. Müller-Arg., det. Eug. Mayor (Mayor, 12).

Puccinia veratri Duby II, III, auf *Veratrum album* L., var. * *Lobelianum* Bernh. — Reculet, Herb. Müller-Arg., det. Eug. Mayor (Mayor, 12).

Puccinia mirabilissima Peck auf *Mahonia aquifolium*. — Nach *Ed. Fischer* (4) wurde diese Art von Mayor auch in Boudry beobachtet.¹

Puccinia circaeae-caricis Hasler III auf *Carex elata* All. — Mellingen, Okt. 1927, leg. A. Hasler (7).

¹ Über die gegenwärtige Verbreitung dieser Art vgl. H. Pöeverlein (*Annales Mycologici* 28 1930, S. 421-426).

Ausser auf *Carex elata* bildet diese Art ihre Uredo- und Teleutosporien auch auf *C. polygama* und *C. fusca* aus. Rückinfektionen ergaben Aecidien auf *Circaea lutetiana*, *C. alpina* und *C. intermedia*, sowie Pykniden auf *Fuchsia*. Der Zusammenhang mit dem *Aecidium circaeae* Cesati et Mont. ist damit sichergestellt.

Puccinia ribesii-caricis Kleb. f. sp. *ribis-nigri-lasiocarpae* Hasler. I auf *Ribes*. — In Bünzen (Aargau) leg. A. Hasler (4); II und III auf *Carex lasiocarpa* Ehrh. im Bünzer-Moos, leg. A. Hasler.

Im Experiment wurden auf *Ribes nigrum*, *R. aureum* und *R. rubrum* spärlich Aecidien gebildet. Uredo- und Teleutosporien auf *Carex lasiocarpa*, aber nicht auf *C. gracilis* und *C. Pseucyperus*.

Puccinia ribesii-pseudocyperii Kleb. II, III. — Bünzer-Moos bei Muri (Aargau), leg. A. Hasler (4).

Durch Infektionsversuche stellte Hasler fest, dass auf *Ribes rubrum* Pycnidien gebildet wurden. (Vgl. diese Berichte, Heft 23, 1914, S. 46.)

Puccinia centaureae-caricis Tranzschel f. sp. *scabiosae-sempervirentis* Hasler II, III. — Auf *Carex sempervirens*. — Rigi, Pilatus, Stanserhorn, leg. A. Hasler (4).

Diese Art ist morphologisch nicht von *P. caricis-montanae* Ed. Fischer verschieden, bildet aber die Aecidien auf *Centaurea Scabiosa*, auf *C. Jacea* nur Pycnidien.

Puccinia paludosa Plowr. I. — Auf *Pedicularis palustre*. — Alter Reussarm in der Ebene zwischen Reuss und Lorze (Zug), leg. A. Hasler (4).

Infektionsversuche ergaben wenige Uredolager auf *Carex elata* All. und *Carex fusca* All.

* *Puccinia Oederi* Blytt 0, III. — Auf *Pedicularis Oederi*. — Unter dem Kriesloch am Pilatus, Aug. 1928, leg. A. Hasler (4).

Die Form stimmt morphologisch nicht genau mit der nordischen *P. Oederi* überein (Hasler, 4).

Gymnosporangium torminali-juniperinum Ed. Fischer I auf *Sorbus torminalis* (L.) Crantz. — Bois du Vengeron, Genève. *Herb. Müller-Arg.*, det. Eug. Mayor (Mayor, 12).

Ustilagineen.

Als Ausgangspunkt dienen: *H. C. Schellenberg, Die Brandpilze der Schweiz. Beitr. zur Kryptogamenflora der Schweiz 3 Heft 2 1911*, sowie die „*Fortschritte der Floristik*“ in Heft 15-38 dieser Berichte.

Tilletia decipiens (Pers.) Winter. — In den Ovarien von *Agrostis capillaris* L., f. * *humilis* A. et G. — Bei Zermatt. Herb. Müller-Argov., det. Eug. Mayor (Mayor, 12).

Hymenomyceten.

Amanita abietum (Secretan) Gilbert. — Nach Konrad (9) selten, Juli bis September. Lausanne (leg. Secretan, 1833), Jura (leg. Konrad).

* *Omphalia candida* Bres. — Auf Wurzeln von *Symphytum officinale* L. September bis Dez. 1927-1929 von verschiedenen Standorten im Sottoceneri (Morbio Inf., Chiasso, Balerna, Novazzano), leg. C. Benzoni (1). Diese Art wurde bis jetzt erst einmal von Bresadola in Italien gefunden. Benzoni unterscheidet eine f. *robusta*, die im September und Oktober vorkommt und eine f. *gracile*, die im Dezember auftritt. Es dürfte sich dabei wohl um Modifikationen handeln.

Pleurotus petaloides Bull. Bei Chiasso, leg. C. Benzoni (2).

Lactarius lignyotus Fr. — Nach Konrad (8) in feuchten Bergwäldern selten (Torfmoor von Pouillerel, Neuenburg, 1250 m und Champex, Wallis, 1500 m).

Psilocybe uda (Fr. ex Pers.) Gillet. — Marais tourbeux des Saignolis chaîne de Pouillerel, Neuchâtel, leg. P. Konrad (10), Sept. 1928.

Nematoloma Polytrichi Fr. Standort wie vorige Art. Selten. Konrad (10).

Crepidotus (Dermium) mollis Schaeff. — Bei Chiasso, leg. C. Benzoni (2).

Pluteus ephesus Fr. — Bei Chiasso, leg. C. Benzoni (2).

Boletus parasiticus Bull. — Auf *Scleroderma vulgare*. Bei Giebenach (Baselland), leg. Ritter (Schneider, 15).

Boletus cyanescens Bull. — Umgebung von Winterthur, selten,
leg. F. Thellung (16).

Boletus erythropus Pers. — Umgebung von Winterthur, selten,
leg. F. Thellung (16).

Gyrodon (Boletus) lividus Bull. — Umgebung von Winterthur,
ziemlich selten, aber hie und da gesellig, leg. F. Thellung (16).

Boletus versicolor Rostk. — Bei Chiasso, leg. C. Benzoni (2).

Boletus (Suillus) castaneus Bull. " " " " (2).

Lenzites variegata Fr. " " " " (2).

Hydnum (Caldesiella) crinale Fr. " " " " (2).

Guepinia merulina (Pers.) Qél. " " " " (2).

Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat. — Bei Chiasso, leg. C.
Benzoni.

Gastromyceten.

Nach E. Nüesch (13) kommen in St. Gallen und Appenzell folgende Varietäten von *Lycoperdon umbrinum* Pers. vor:

Var. atropurpureum Vitt., *var. stellare* Peck, *var. glabellum* Peck, *var. asterospermum* Dur. et Mont., *var. cupricum* Bon.

Lycoperdon pratensis Lloid. — Bei Chiasso, leg. C. Benzoni (2).

Geaster minimus (Chev.? = G. Schmideli Vitt.?) — Bei Chiasso,
leg. C. Benzoni (2).

Scleroderma verrucosum Bull. — Bei Chiasso, leg. C. Benzoni (2).

Cyathus strictus Huds. " " " " (2).

Fungi imperfecti.

* *Achorion Schoenleinii* Remak. *var. muris*. — Diese wohl zu den hyalinsporigen Mucedineen (*Oospora* oder *Sporotrichum?*) gehörende Art wurde von Galli-Valerio in Lausanne auf Mäusen gefunden. (5).

* *Stemphylium maculans* (Macrosporiaceen). — Auf Äpfeln wohl verbreitet. Zum ersten Mal 1926 in Trübbach-Sevelen, St. Gallisches Rheintal beobachtet (*Osterwalder*, 14).

* *Pionnotes Biasoletiana* (Corda) Sacc. — Im Tessin häufig auf Stämmen von *Fraxinus*, *Betula*, *Ostrya*. Eine etwas abweichende, kleinere Form beobachtete *Benzoni* (3) unter der Rinde von *Sophora* im Parco Ciani bei Lugano.

Zitierte Literatur.

1. **Benzoni, Carlo:** *Un Fungo nuovo per la Svizzera.* — Schweiz. Zeitschr. für Pilzkunde 8 1930 (5-6).
2. **Benzoni, Carlo:** *Un piccolo orto micologico.* — Schweiz. Zeitschr. für Pilzkunde 8 1930 (31-35).
3. **Benzoni, Carlo:** *Rarità Ticinesi.* — Schweiz. Zeitschr. für Pilzkunde 8 1930 (91-92).
4. **Fischer, Ed.:** *Eine Krankheit von Mahonia aquifolium.* — Schweiz. Obst- und Gartenbauzeitung 32. Jahrg. 1930 (289-290).
5. **Galli-Valerio, B.:** *Observations et recherches sur les parasites et les maladies parasitaires des animaux sauvages.* — Bull. de la Murithienne Fasc. XLVII 1929/30 (50-89).
6. **Gäumann, E.:** *Über eine neue Krankheit der Douglasien.* — Schweiz. Zeitschr. für Forstwesen 1930 (63-67) 4 Abb.
7. **Hasler, Alfred:** *Beiträge zur Kenntnis einiger Carex-Puccinien.* — Annales Mycologici 28 1930 (345-357) 1 Abb.
8. **Konrad, P.:** *Lactarius fuliginosus Fr., ssp. picinus Fr., Lactarius squalidus Krombh. et Lactarius lignyotus Fr.* — Schweiz. Zeitschr. für Pilzkunde 8 1930 (30-31).
9. **Konrad, P.:** *Amanita abietum (Secretan) Gilbert.* — Schweiz. Zeitschr. für Pilzkunde 8 1931 (98-99).
10. **Konrad, P.:** *Psilocybe uda, Nematoloma polytrichi et Nematoloma elongatum.* — Bull. de la Soc. Linnéenne de Lyon 18 1929 (2 S.).
11. **Maurizio, Anna:** *Gymnoascus setosus Eidam, ein saprophytischer Pilz aus Bienenwaben.* — Mitteil. naturf. Gesellsch. Bern (Sitzungsberichte der Bern. Bot. Ges.) 1930 1931.
12. **Mayor, Eug.:** *Les „Fungi centrali-europaei“ de Jean Müller Arg.* — Candollea IV 1930 (166-179).
13. **Nüesch, Emil:** *Die Variabilität von Lycoperdon umbrinum Pers.* — Jahrbuch der St. Gallischen naturwissenschaftl. Ges. 65 1929/30 (123-125).
14. **Osterwalder, A.:** *Von einer bisher unbekanntem Fleckenkrankheit an unreifen Äpfeln.* — Schweiz. Zeitschr. für Obst- und Weinbau. Jahrg. 39 1930 (406-409) 3 Abb.
15. **Schneider, A.:** *Neue Pilzfunde.* — Schweiz. Zeitschr. für Pilzkunde 8 1930 (67-68).
16. **Thellung, F.:** *Zu den Röhrlingen der Schweiz.* — Schweiz. Zeitschr. für Pilzkunde 8 1930 (2).