**Zeitschrift:** Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft = Bulletin de la

Société Botanique Suisse

Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft

**Band:** 87 (1977)

**Heft:** 1-2

Artikel: Coniosporium aeroalgicolum sp. nov., moisissure Dématiée semi-

lichénisante

Autor: Turian, Gilbert

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-61652

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Coniosporium aeroalgicolum sp. nov., moisissure Dématiée semi-lichénisante

par Gilbert Turian

Département de Biologie végétale de l'Université de Genève

Manuscrit reçu le 22 février 1977

Depuis notre mise en évidence d'une moisissure Dématiée du type Coniosporium (cellules conidiogènes thalliques méristématiques selon Ellis, 1971) dans toutes les populations d'algues vertes aériennes observées (Turian, 1975a), nous avons recherché à en préciser la distribution en fonction tant de la spécificité algale que des supports – écorces (corticoles) ou roches (saxicoles) – de ces algues dites atmophytiques.

Voici nos principaux prélèvements et identifications de la forme algicole de *Conio-sporium* sur des populations d'algues ainsi semi-lichénisées:

Pleurococcus vulgaris Naeg. sur écorce de tronc d'Acer pseudoplatanus du Parc des Bastions (dominance algale, peu de conidies fongiques), de l'Avenue de Champel (équilibre algo-fongique, peu de conidies noires), du Boulevard du Théâtre (dominance totale, nombreuses conidies noires), tous en ville de Genève (voir Turian, 1975b);

- P. vulgaris Naeg. (type Apatococcus vulgaris Brand) sur écorce de tronc d'Aesculus hippocastanum aux Bastions et au Grand-Lancy à 3 km du centre de Genève (dominance algale, peu de conidies, Fig. 1a);
- P. vulgaris Naeg. sur écorce de tronc de Carpinus Betulus au Grand-Lancy (dominance algale);
- P. vulgaris sur écorce de branches de Juglans regia au Grand-Lancy (dominance fongique, conidies noires, Fig. 1b);
- P. vulgaris Naeg. sur écorce de branches de Populus alba aux Palettes (Grand-Lancy) (forte dominance fongique, conidies noires, Fig. 1c);
- P. vulgaris Naeg. sur écorce de troncs d'Acer sp. (dominance fongique, conidies noires) et de Populus sp. (équilibre algo-fongique, peu de conidies noires) à East Lansing, Michigan (U.S.A.);

Pleurococcus vulgaris Menegh. (= Cystococcus humicola Naeg.) et Chlorococcum sociabile Brand sur rebord de plateau d'amiante au Grand-Lancy (croûte fongique brun verdâtre, conidies noires dispersées, voir Turian, 1977);




Fig. 1:
Conidies de Coniosporium aeroalgicolum sp. nov.:
chaînettes didymo-phragmosporées, l'une implantée par un court conidiophore sur (dans ?)
un élément pleurococcoïde (a, x 300), l'autre libre, à cloisonnement oblique (b, x 400);
dictyospores à granulosités (flèche) fortement mélanisées (c, x 450; d, focalisation sur surface,
immersion x 1400).

P. vulgaris Menegh. (= C. humicola) mêlé à du Gloeocapsa sanguinea (Ag.) Kütz. (Cyanophyta) sur pilier de roche granuleuse en bord de route au Grand-Lancy et formant ainsi un "consortium" trivalent (Turian, 1977) avec chaînettes conidiennes noires;

Trentepohlia abietina Hansg. sur tronc d'Abies alba aux Diablerets (val du Dard, Vaud) en colonies algo-fongiques brunâtres équilibrées, à prévalence de didymoconidies (Fig. 2a-c);

Trentepohlia umbrina Born. sur branches de Populus tremula dans les bois de Bernex à 6 km. de Genève (dominance algale, quelques chaînettes de conidies brun noirâtre).

L'ensemble de ces observations nous montre donc que cette forme de Coniosporium est liée au type d'algue aérienne, sans apparente spécificité pour Pleurococcus versus Trentepohlia, plutôt qu'au type de support, écorce versus roche. Même si l'association algo-fongique prévaut sur les écorces d'où la première désignation d'algicorticole (Turian, 1975b), elle se retrouve, bien que plus discrètement, sur les roches indifféremment calcaires ou siliceuses.

Cela nous a ainsi conduit à considérer notre Coniosporium comme espèce propre aeroalgicolum, distincte du Coniosporium purement xylicole = Sirodesmium granulosum




Fig. 2:
Chaînettes conidiennes de *Coniosporium aeroalgicolum* sp. nov. en contact avec des cellules jaune orange (gouttelettes lipidiques caroténifères) plus ou moins saines de *Trentepohlia abietina*. Eléments didymo-phragmosporés (a et b) et zone dictyosporée (c). x 300.

De Not. décrit et illustré par Hughes (1952) comme la forme imparfaite d'Hysterium insidens et synonyme des Septonema spilomeum Berk. et Bonordeniella aspera Lind. souvent trouvés aux U.S.A. sur le bois mort (voir Ellis, 1971).

Les principales raisons qui nous conduisent à la description de la forme algicole de Coniosporium comme espèce nouvelle sont les suivantes:

- 1) Son association constante avec l'une ou l'autre des populations d'Algues aériennes, plus particulièrement celles constituant le *Pleurococcetum vulgaris* Schorler sensu Hilitzer mais aussi le *Trentepohlietum abietinae* Ochsner (voir Barkman, 1958);
- 2) l'absence de sporodoques typiques, coussinets conidifères bien délimités sur le substrat chez le Coniosporium = Sirodesmium granulosum, mais chez C. aeroalgicolum remplacés par de petits amas stromatiques de cellules conidiogènes subhyalines au contact ou entre les groupes d'algues; les amas stromatiques sont générateurs de conidiophores semi-macronématiques, se cloisonnant en éléments progressivement mélanisés didymo-, phragmo- et dictyosporés.




Fig. 3:

Divers types conidiens de Coniosporium aeroalgicolum sp. nov.

A gauche, chaînette d'éléments dictyosporés formés par cloisonnement secondaire du court conidiophore implanté directement sur une cellule pleurococcoïde. En bas, séquence sporogène basipète, dictyo-phragmo-didymospores. Au-dessus, longues dictyospores, l'une à conidiophore basal incorporé, l'autre à compartimentation terminale triple. Noter la plus forte granulosité de l'épispore mélanisée des compartiments apicaux. x 800.

3) les dimensions très inégales des éléments sporaux pouvant se former selon les circonstances (effet de répression algale?), des petites didymospores (Fig. 1a, 2b) aux grosses dictyospores (Fig. 1c-d) parfois à compartimentation triple (Fig. 3).

Le Coniosporium algicole sur Algues aériennes, donc aéroalgicole, peut dès lors être décrit comme nouvelle Adélomycète Dématiée Tuberculariacées à conidies les plus développées de type phaeodictyosporé (Fig. 3) et répondant aux doubles diagnoses latine et française suivantes:

Coniosporium aeroalgicolum sp. nov.

Stroma epialgaceum subhyalinum fungo dominante. Sporodochia typica nulla, conidiophora brunneola laevia, ex algis affectis sine transitu genita. Conidia catenata, oblonga, ad extremitates rotundata, primum transversa nonnumquam oblique septata (didymosporae-phragmosporae) deinde longitudinaliter 1-2-septata (dictyosporae); si bina septa adsunt, unum obliquum est (segmentatio lateralis triplex). Phragmosporae et praesertim dictyosporae granulosae atro-brunneae usque atrae,  $28-45~\mu$  x  $10-19~\mu$  (dictyosporae plerumque  $35-40~\mu$  x  $15-18~\mu$ ).

Species pervulgata, algas aerias pleurococcoideas corticolas saxicolasque Pleurococceti vulgaris et algas corticolas Trentepohlieti abietini obtegens.

Helvetia, Europa; America borealis (U.S.A., Michigan).

Stroma épialgal subhyalin si dominance fongique. Sporodoques typiques absents, conidiophores brunâtres et lisses pouvant naître sans transition d'algues affaiblies (différenciation prématurée). Conidies en chaînes, oblongues arrondies à leurs extrémités, au début avec septa transversaux parfois obliques (didymospores-phragmospores), plus tardivement avec 1 à 2 septa longitudinaux (dictyospores), si deux, l'un oblique (compartimentation latérale triple). Phragmo- et surtout dictyospores granuleuses brun foncé à noir,  $28-45 \times 10-19 \mu$  (dictyospores communément  $35-40 \times 15-18 \mu$ ). Très commun sur algues aériennes pleuro-coccoïdes corticoles et saxicoles du *Pleurococcetum vulgaris* et corticoles du *Trentepohlietum abietinae*. Suisse, Europe; U.S.A. (Michigan).

Des différences d'ordre cultural et morphogénétique ont confirmé la séparation de notre nouveau Coniosporium aeroalgicolum du Coniosporium = Sirodesmium granulosum considéré comme la forme imparfaite d'Hysterium insidens Schw. (Hughes, 1952; Ellis, 1971).

A partir des "poudrages" algofongiques vert brunâtre (Parc des Bastions) et noir verdâtre (Boulevard du Théâtre) de deux morceaux d'écorce d'Acer pseudoplatanus, nous avons en effet pu isoler deux souches, apparemment identiques, de Coniosporium aeroalgicolum en culture pure. Sur plaques de milieu synthétique de Westergaard et Mitchell (1952) au saccharose-nitrate agarisé, nos deux souches ont formé un même type de colonie à pourtour lobé, s'épaississant en son centre (2-3 mm.) au cours d'une croissance lente (env. 2 cm. diamètre en 3 semaines à 25 °C), à revêtement irrégulièrement plissé, brun foncé à noir charbon et mat par zones. Sur plaques du même milieu de Westergaard et Mitchell, Hysterium insidens Schw. (No 238.34 Collection Baarn, Hollande) a formé dans les mêmes conditions des colonies de diamètre presque égal mais peu épaissies et à contour plus régulier, à revêtement uniformément velouté brun grisâtre clair. Les plis du revêtement devenant croûte épaisse et très mélanisées de C. aeroalgicolum contiennent des éléments conidiens allongés, plus ou moins bien différenciés (zones murales à cloisons obliques) alors que le revêtement hyphal velouté d'H. insidens est resté stérile même sur milieu plus riche "oatmeal-agar". Comme critère supplémentaire différenciant nettement H. insidens = C. granulosum de notre C. aeroalgicolum, il faut mentionner un pigment brunâtre diffusant à partir de la marge des colonies d'H. insidens âgées de plus de 10 jours sur milieu nitraté, pratiquement absent sur le pourtour de nos souches de C. aeroalgicolum même après 1 mois de culture.

Nous remercions Mademoiselle Dr. A. STORK du Conservatoire Botanique de Genève pour la version latine de notre diagnose et Monsieur Dr. O. REYMOND, assistant, pour la microphotographie 1d.

#### Résumé

La Dématiée de type *Coniosporium* vivant en parasitisme balancé avec diverses algues aériennes est décrite comme espèce nouvelle *Coniosporium aeroalgicolum* distincte du *Coniosporium* xylicole = *Sirodesmium granulosum*, forme imparfaite d'*Hysterium insidens*. L'absence de sporodoques typiques et la réduction souvent extrême des conidiophores sont les principaux critères morphologiques différentiels.

## Zusammenfassung

Ein mit verschiedenen Luftalgen in einem ausgeglichenen Parasitismus lebender, dematialer Pilz wird als neue Art Coniosporium aeroalgicolum beschrieben. Er ist von dem die Nebenfruchtform von Hysterium insidens bildenden, holzbewohnenden Coniosporium (= Sirodesmium granulosum de Not.) verschieden. Die Hauptunterschiede bestehen im Fehlen von typischen Sporodochien und oft extreme Reduktion der Conidiophoren.

## Summary

The dematiaceous fungus *Coniosporium* living in balanced parasitism with several aerial algae is described as the new species *Coniosporium aeroalgicolum*. The absence of typical sporodochia and the often extreme restriction of the conidiophores are the main morphological differences from the xylicolous *Coniosporium = Sirodesmium granulosum*, imperfect stage of *Hysterium insidens*.

## Bibliographie

Barkman J.J. (1958). Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes. Assen, Netherlands: Van Gorcum, 450 pp.

Ellis M.B. (1971). Dematiaceous Hyphomycetes. C.M.I., Kew, England, 608 pp.

Hughes S.J. (1952). Sirodesmium granulosum and Torula diversa. The Naturalist, Univ. Leeds. 1952, 93-98.

- Turian G. (1975a). "Coniosporium", une Moisissure-Dématiée demi-lichénisante et maxi-tolérante à la pollution atmosphérique. C.R. des Séances, Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, NS. 10, 176-181.
- (1975b). Maxi-toxitolérance d'une Moisissure-Dématiée algicorticole du genre *Coniosporium*. Bull. Soc. bot. suisse. 85, 204-209.
- (1977). Croissance sélective de moisissures algi-saxicoles et de lichénoïdes sur gel de silice.
   Bull. Soc. bot. suisse 87, 25-33.

Westergaard M. et Mitchell H.K. (1947). Neurospora V. A synthetic medium favoring sexual reproduction. Amer. J. Bot. 34, 573-577.

Prof. G. Turian Département de Biologie végétale Université de Genève CH-1211 Genève 4