Zeitschrift: Botanica Helvetica

Herausgeber: Schweizerische Botanische Gesellschaft

Band: 115 (2005)

Heft: 1

Artikel: Les pelouses à Festuca paniculata du Tessin (Suisse) dans un contexte

Alpin

Autor: Vittoz, Pascal / Selldorf, Paolo / Eggenberg, Stefan

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-744

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Botanica Helvetica

Les pelouses à *Festuca paniculata* du Tessin (Suisse) dans un contexte Alpin

Pascal Vittoz¹, Paolo Selldorf², Stefan Eggenberg³ et Stéfanie Maire⁴

- Université de Lausanne, Département d'écologie et d'évolution (Faculté de biologie et de médecine) et Faculté des géosciences et de l'environnement, Bâtiment de biologie, CH-1015 Lausanne; e-mail: pascal.vittoz@unil.ch
- ² Via Campagna 19, CH-6926 Montagnola; e-mail: paolosel@ticino.com
- ³ UNA, Mühlenplatz 3, CH-3011 Bern; e-mail: eggenberg@unabern.ch

⁴ Tecc du Pitor, CH-6677 Aurigeno

Manuscrit accepté le 10 février 2005

Abstract

Vittoz P., Selldorf P., Eggenberg S. and Maire S. 2005. *Festuca paniculata* meadows in Ticino (Switzerland) and their Alpine environment. Bot. Helv. 115: 33–48.

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thellung locally dominates montane and subalpine meadows of the Alps and other mountains of southern Europe. Vegetation relevés were carried out in Switzerland and northern Italy to study the site conditions under which Festuca paniculata meadows occur in this part of the Alps, their species composition and phytosociological status, and their relationship to Festuca paniculata meadows described previously from the French Alps (Centaureo-Festucetum spadiceae) and Austrian Alps (Hypochaerido uniflorae-Festucetum paniculatae). The Swiss meadows were found to have a similar ecology to those in France and Austria. They occur mostly between 1600 and 2100 m a.s.l on steep slopes with southern aspect, generally on crystalline rocks, but sometimes on calcareous rocks if soils have been decalcified. The species composition of the Swiss meadows is closer to the Austrian than to the French communities, and we attribute them to the association Hypochaerido uniflorae-Festucetum paniculatae with the new subassociation polygaletosum chamaebuxi. Climate is probably the main factor separating vegetation units in the Alps: the Centaureo-Festucetum spadiceae occurs where summers are dry, whereas the Hypochaerido uniflorae-Festucetum paniculatae occurs where rainfall is not a limiting factor in summer.

Key words: Phytosociology, Caricetea curvulae, Festucion variae, Alps, subalpine grasslands.

Introduction

Festuca paniculata (L.) Schinz et Thellung est présent dans les différentes chaînes de montagnes du Sud de l'Europe ainsi qu'au Maroc. En Suisse, l'espèce n'est connue que dans la moitié sud du Tessin et dans le Val Calanca aux Grisons (Welten et Sutter 1982; Hess et al. 1976).

De nombreuses associations dominées par *F. paniculata* ont déjà été décrites en Europe. Lors d'une synthèse, Sburlino et al. (1996) ont mis en évidence des compositions différentes entre massifs montagneux. Dans les Alpes, les deux principales associations appartiennent au *Festucion variae* (ordre des *Festucetalia spadiceae*, classe des *Caricetea curvulae*; Theurillat et al. 1995):

- (1) Le Centaureo-Festucetum spadiceae, décrit par Guinochet (1938) dans les Alpes maritimes, s'étend dans toutes les Alpes austro-occidentales, des Alpes ligures (Barbero 1970) au Piémont (Kaplan 1983), en passant par les Alpes occidentales (Braun-Blanquet 1972). Ces pelouses ont leur optimum à l'étage subalpin, entre 1900 et 2300 m, mais avec des extrêmes à 1500 m et 2800 m. Elles occupent le plus souvent des pentes comprises entre 10° et 40°, en exposition sud (sud-est à sud-ouest). L'association se rencontre sur des roches siliceuses, avec des sols parfois riches en éléments grossiers (Barbero 1970), ou sur des roches carbonatées, mais les sols sont alors profonds, évolués et déjà partiellement acidifiés en surface (pH 5.4-6.1, Lacoste 1971; pH 6.0-6.8, Guinochet 1938). Ces pelouses sont en général secondaires, prairies de fauche ou pâturages gagnés sur la forêt, souvent abandonnés maintenant. Cependant, elles peuvent être primaires lors d'avalanches fréquentes (Braun-Blanquet 1972), à l'étage alpin inférieur (Guinochet 1938) ou comme formation colonisatrice de pierriers (Barbero 1970). D'autres associations ont été décrites dans les Alpes occidentales (Lacoste 1971; Nègre 1950), mais la synthèse de Sburlino et al. (1996) semble indiquer qu'elles pourraient toutes être regroupées sous une même entité.
- (2) L'Hypochaerido uniflorae-Festucetum paniculatae, décrit par Hartl (1983) et Theurillat (1989) en Autriche, est connu dans le Tyrol oriental, les Hauts Tauern et en Carinthie jusqu'à la Koralpe en Styrie (Hartl 1983). L'association se trouve également au Tyrol du Sud (Italie). L'optimum altitudinal se situe entre 1800 et 2000 m, avec des extrêmes à 1500 et 2500 m, sur des pentes raides exposées au sud. Elle se trouve exclusivement sur des roches carbonatées, mais avec un horizon superficiel légèrement acide (pH 5–7; Peer et Hartl 1976; Hartl 1983). Ces pelouses étaient le plus souvent fauchées, parfois pâturées, mais sont maintenant en général abandonnées (Hartl 1983; Theurillat 1989). Elles peuvent néanmoins être d'origine primaire sur des pentes raides.

Entre le Centaureo-Festucetum des Alpes occidentales et l'Hypochaerido-Festucetum de Styrie, une grande lacune existe dans la connaissance de ces pelouses. Elles n'ont encore été que peu étudiées au Tessin, et leur position phytosociologique n'est pas claire. Jäggli (1908) et Bär (1914) mentionnent cette formation dans leurs monographies consacrées respectivement au Camoghè et au Val Onsernone et la classent comme variante des pelouses à Carex sempervirens. Aucune mention plus récente n'a été trouvée pour la Suisse, à part Hess et al. (1976) qui indiquent que l'espèce occupe des pâturages sur pentes exposées au sud, sur sol pierreux et généralement pauvre en calcaire. Finalement, Antonietti (2002) a trouvé neuf stations de cette espèce dans la vallée Ossolane (Italie), entre 600 et 2130 m, dans des prés et pâturages le plus souvent abandonnés. Selon Lacoste (1971), le Centaureo-Festucetum spadiceae s'étendrait jusqu'au Tessin, ce que Lippmaa (1933) et Guinochet (1938) avaient déjà suggéré. Par




Fig. 1. Répartition de *Festuca paniculata* au Tessin et environs. Aire grisée: répartition selon Welten et Sutter (1982); ■ relevés phytosociologiques inclus dans cette étude; ● autres observations récentes (Antonietti 2002, Staehli com. pers.); ○ observations historiques (Jäggli 1908; Chenevard 1910; Bär 1914; Conert et al. 1994).

contre, Braun-Blanquet (1972) exclut de cette association les pelouses de la Savoie et du Tessin, mais ne donne aucun autre nom.

Par cet article, nous avons voulu étudier l'écologie des pelouses à *F. paniculata* en Suisse et dans les environs immédiats, leur composition floristique et leur appartenance phytosociologique par rapport aux deux associations décrites dans les Alpes. Bien peu de formations végétales aussi voyantes et caractéristiques que ces pelouses sont encore si mal connues en Suisse.

Matériel et méthodes

Notre étude se base sur 43 relevés effectués selon la méthode phytosociologique (Braun-Blanquet 1964) et couvrant la moitié sud du Tessin, ainsi que le Monte Zeda en Italie (Fig. 1 et annexe 1), avec une amplitude altitudinale allant de 900 à 2180 m. Les relevés des différentes régions ont à l'origine été effectués indépendamment dans le cadre de projets divers, si bien que la surface relevée varie entre 17 et 100 m². Afin de concentrer notre étude sur les pelouses dominées par *F. paniculata*, et ne pas considérer toutes les formations où l'espèce peut être présente, nous n'avons retenu pour les analyses que les 30 relevés où l'espèce apparaît avec un indice d'abondance-dominance égal ou supérieur à 2. Ces relevés couvrent l'essentiel des localités tessinoises où l'espèce est actuellement connue pour former des pelouses importantes.

La nomenclature utilisée suit Aeschimann et al. (1996) et pour les espèces absentes de Suisse, Tutin et al. (1964-80). Les relevés rassemblés se basant sur différentes flores, plusieurs petites espèces et sous-espèces ont été réunies au sein de l'espèce collectives (par ex. Galium pumilum s.l., Leucanthemum vulgare s.l., Festuca rubra aggr., etc.)

La classification des relevés a été réalisée avec le logiciel MULVA-5 (Wildi et Orloci 1996), en utilisant un groupement hiérarchique agglomératif des relevés (pondération selon l'indice d'abondance-dominance, indice de ressemblance de van der Maarel), après avoir supprimé les espèces n'apparaissant qu'une ou deux fois. Les espèces ont ensuite été classées selon leur appartenance phytosociologique, en suivant Theurillat et al. (1995). Un relevé synthétique, basé sur la fréquence relative, a été calculé pour l'ensemble du tableau (r: <10 %; I: 10–20 %; II: 21–40 %; III: 41–60 %; IV: 61–80 %; V: > 80 %).

Afin de comparer les relevés du Tessin et environs avec les deux associations décrites dans les Alpes, nous avons cherché dans la littérature des relevés couvrant l'ensemble des régions alpines où l'espèce a été étudiée (Fig. 2, annexe 3). Un relevé synthétique a été calculé pour chaque tableau phytosociologique, en choisissant la sous-association la plus proche écologiquement des pelouses tessinoises lorsqu'un choix était possible. Seules les espèces avec une fréquence supérieure à 20 % dans au moins une région ont été retenues pour les analyses. Un groupement agglomératif hiérarchique des relevés à l'aide de MULVA-5 (présence-absence, indice de ressemblance de van der Maarel) a été effectué sur l'ensemble des relevés synthétiques alpins, complété par une analyse factorielle des correspondances (AFC en présence-absence). L'ordre des espèces dans le tableau 2 a été choisi de manière à mettre en évidence les espèces différentielles entre régions géographiques.

Résultats et discussion

Ecologie des pelouses tessinoises

Festuca paniculata a été observé au Tessin approximativement au sud d'une ligne passant par le haut du Val Verzasca et Biasca (Welten et Sutter 1982). Cependant, les relevés que nous avons pu recueillir sont limités à la partie la plus méridionale, au sud de Locarno et Bellinzona (Fig. 1). Les pelouses dominées par F. paniculata sont réparties essentiellement entre 1600 m et 2180 m d'altitude, à l'étage subalpin, comme ailleurs dans les Alpes. L'espèce peut croître également plus bas, par exemple à 900 m dans le Malcantone, voire à 205 m au bord du Lac Majeur (Conert et al. 1994, observations non confirmées récemment). Cependant, à basse altitude elle n'est plus domi-




Fig. 2. Localisation des relevés du Tab. 2. A: Koralpe, B: Alpes centrales autrichiennes, C: Tessin et environs (ce travail), D: Val Grisanche, E: Lautaret, F: Meije-Ecrins-Pelvoux, G: Alpes sudoccidentales, H: Bassin de la Tinée, I: Alpes maritimes et ligures (voir annexe 3). Le pointillé délimite les Alpes.

nante mais subordonnée à *Pteridium aquilinum*, *Molinia arundinacea*, *Nardus stricta* ou d'autres graminées (relevés non retenus). La pente (généralement entre 20 et 40°) et l'orientation (entre ESE et SW) correspondent également aux autres observations. Géologiquement, les relevés se trouvent essentiellement sur des gneiss de roches cristallines, avec éventuellement un peu d'amphibolite au Camoghè, et sur des calcaires du Lias au Monte Generoso (Quervain et al. 1967). *F. paniculata* semble donc indifférent au substrat, pouvant occuper aussi bien des sols sur roches siliceuses que sur roches calcaires.

L'exploitation des pelouses tessinoises à *F. paniculata* est mal connue. Comme ailleurs dans les Alpes, elles étaient vraisemblablement pâturées ou fauchées même si, malgré leur haut rendement, elles étaient haïes des bergers qui considéraient la fétuque comme une mauvaise herbe ne pouvant être fauchée (Bär 1914, 1915). Un important recul de l'agriculture de montagne a été enregistré dans ce canton ces dernières décennies (Donati 1992) et la plupart des pentes raides et sèches ont été abandonnées. Il semble cependant que bovins, ovins et caprins parcourent encore certaines de ces pelouses (Gridone, Monte Gazzirola, Pizzo Leone et Camoghè). Bien que l'écologie et la dynamique des pelouses à *F. paniculata* soient encore mal connues (Grabherr 1993), il est vraisemblable que l'abandon des pratiques pastorales sera néfaste à celles situées dans le domaine potentiel de la forêt.

Tab. 1. Relevés des pelouses à *Festuca paniculata* du Tessin et environs (voir Tab. 2 pour les fréquences, annexes 1 et 2 pour la localisation et les espèces accidentelles). Ce tableau peut être déchargé comme fichier électronique sous http://www.birkhauser.ch/00035

	30 1780 1780 15 20 20 100 19	- S				
	8 S W S O 16		- 0 +	+	-	
	29 20 20 20 20 100 100 100	4 +	+ ~ +	+	N +	
	Mte Zeda 28 28 0 1490 1	ι ν +	N + +		+	
	27 1380 20 20 20 100 100	v +	N +	+	+	
	26 1520 20 20 20 100 13	v +	- +	+		
o Leone	25 Pizzo 8 8 8 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	v + −	N	L	+	-
<u>ن</u>	maro 24 24 1920 30 30 20 100 0	m + N	++- + ~		0	-
	Mte Tamaro 23 23 1770 1920 30 30 ESE SW 20 100 0	7	+ ++ + +		+	+
	SSE 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 +	+ +	+ -	+ +	+ +
	Mte Gridone 20 21 22 25 25 25 25 25 25 25 25 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	4 +	N-+ +- ++	+	+ +	+ +
	Mte 2060 7 2060 7 2060 7 2060 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	æ -	m - + + + + +	+	+ 0	2 -
Gridone	35 SSE SSE 31	4	+~~ + +	++++	+ +	+
Generoso	118 30 30 30 100 95 46	2		£.	++-+ +-	
	201A 1.400 SW 35 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019 0019	4	- +	+ + -	+	2
	16 1800 S 28 32	4 +	- +-+ + -	- +	+ +	+ -
10	115 1850 S 28 30	m	-+ - +	- + +	+	+
	obbia 14 1700 35 SSE 25 25 95 5	2 +	+ - +	+ -	+ ++ -	+
2 90	Val Morobbia 13 14 1810 1700 36 35 5 SSE 25 25 70 95 20 5 42 34	N + +	+		+ ++ +-	2 +
adhous	12 1940 S 28 28	m +	+++	- +		- +
	11 1640 33 SSE 17.5 55 25 47	2	+- +-++ +	+++ -	+ +	- +
	10 1720 SE 28 35	2	+0 +- + -	- ~ -	- 2 -	2
	1939 S 2 70 V0 04	w-+ -	+ +++ + + ++	N + N	+ ++	2
	amoghė 8 1790 35 SSW 50 95 0	N + +	+-++++ ++ +	-+0+-+	+ ++ +	N +
	Ca 7 7 1630 23 SSW 50 90 0	m +	+ + +	++0+ -+	+ + +	2
	595 50 50 50 50	27 -	+ + +	++-+	-++++-	+
	2090 30 30 SE 40 70 0	N +	+ ++++-+ +++	++ -	+ +	N +
	2100 40 86 0 53	ю <u>-</u> -	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+- +	+	+ ~
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Camoghè 5 3 4 5 5 2 3 4 4 5 5 2 3 4 4 5 5 2 3 4 5 4 6 2 5 6 2 5 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4	+-+-++N+ -	+	+ + +	
5	Ca 2130 2130 40 858 40 90 0	۰ +	+-0+++0 +	-	++	
	2070 2 25 25 SSW 40 80 0	٠ +	+N-++++ + +	<u>-</u> +	+ +	2 -
	6]	Festucatalia spadiceae Festuca paniculata Paradisea Ililastrum Potentilia grandiflora Festuca acuminata Pulmonaria angustifolia Laserpitum hallen Caricera curvulae	Phyteuma betonicifolium Mardus stricta Mardus stricta Leontodon helveticus Arnica montana Arnica montana acaliis Trifolium alpinum senisphaericum Juncus trifidus Phyteuma hemisphaericum Phyteuma hemisphaericum Agrostis schraderiana Alucusiu kusana Heracium hoppeanum Agrostis arriedus Agrostis schraderiana Heracium hoppeanum Agrostis aurea	Estito-abranetea Carlina acaulis simplex Galium pumilum s.i. Brachypodium pinnatum Scabiosa columbaria Carex caryophyllea Prunella grandiflora Prunella grandiflora	Totus conniculates s.l. Anthoxanthum odoratum s.l. Anthoxanthum odoratum s.l. Grocus albifilorus Achillea millefolium s.l. Tifolium pratense Stachys officinalis Leontodon hispidus s.l. Arielanthum officinalis Arielanthum officinalis Arielanthum officinalis Arielanthum officinalis	Calluna vulgaris

=	====	>>>>>>=================================	
30		+ + -+ + ++	+
4 5		+ + +	+
58		+ + - +	+
27		+ -+++	L -
56		- + - + +	+
25	S.	+ +	
24	+	++-+- +++ ++	+ + +
23		N + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	m +
22		+~++++ + ~ ~ - +	+
2 +		+- ++ + + +	
1 20		+ 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
9	+ - +	+-++ + + +	+ +
18	+	- +-+ + ++ m ++	+
71	+ +	- N + + m ←	-
16	+ + +	+- ++ - 0 + +	+ +
15	++ + -		+
4	+++ + + + +	-+-++ 0 +	+ +-
13	+++-+ + + + -	-++ + + 0	+ ++
2	-+-	+-+ ++ ++	
= ++	++ + +	* * * * • • * * * * * * * * * * * * * *	+
01	+0	NN- + -NN	Par s
თ	+ ~	+ M + + M + + M + - M + M +	+ +
ω	+ +++- +	N++++-++++	+
~	+ ++++ -++	+-+- + +0+	+ -++ +
9 +	++-++++++++	-+++ ++-N+ + - + +	+ - +
ν-ν ν-		+ \(\operatorname{A} + \operator	L L
4 + + + + + +		+ N + + + + + + + + + + + + + + + + + +	+ -+
m + -		EN++ +++ E ++	
N+- N +			
-+0+		+++++0+++ +	*
N° relevé Rhododendron ferrugineum Rhododendron ferrugineum Vaccinium gaultherioides Lunipeus communis nana Autres différentielles du gr. 1 Agrostis alpina Soldanella alpina Festuca violacea aggr.	densitize germanica du sur conditives du restructura de l'unica glabba (Cuciata glabba Carex omithopoda Silene nutans Silene nutans Silene nutans densita tinctoria sol. Genista tinctoria sur compesitire su Commaderia conopsea Briza media Viola canina sul. Succisa pratensis Succisa pratensis Acontum napellus sul. Acontum napellus sul.	Potentilla erecta Carex sempervirens Hypochoeris urilfora s.l. Polygala chamaebuxus Vaccinum myrtillus Campanula scheuchzeri Rahunculus montanus s.l. Thymus serpyllum s.l. Festuca ovina aggr. Averalia flexuosa Astrantia minor Astrantia minor Astrantia minor Solidago virgaurea s.l. Molinia auruchiacea/caerulea Solidago virgaurea s.l. Molinia auruchiacea/caerulea Solidago virgaurea s.l. Molinia auruchiacea/caerulea Solidago virgaurea s.l. Planeacium murorum s.l. Plantago serpentina Aster alpinus Aster alpinus	Protentila crantzii Phyteuma scheuchzeri Leucanthenum vulgare s.l. Luzula nivea Luzula nivea Burheurum raunrouloides Danthonia decumbens Antennaria diolea Carex firtschii diolea Calamagrostis arundinacea Carduus defloratus s.l. Luzula multiflora

Composition floristique

D'une manière générale, les pelouses à *Festuca paniculata* montrent une grande diversité floristique, avec souvent plus de 40 espèces par relevés (maximum de 60 espèces), et plus de 170 au total pour le tableau 1. La grande amplitude altitudinale explique sans doute la richesse floristique totale, alors que la diversité des relevés individuels est corrélée positivement à leur surface et négativement au recouvrement de *F. paniculata* (résultats non montrés). Les analyses numériques mettent en évidence trois groupes régionaux, reportés dans le tableau 1.

Groupe 1. Cinq relevés du Camoghè situés au-dessus de 2000 m, caractérisés par une bonne présence des espèces des Caricetea curvulae et des Loiseleurio-Vaccinietea. La flore reflète donc avant tout une altitude assez élevée (étage subalpin supérieur).

Groupe 2. Cinq relevés du Camoghè, six relevés du Val Morobbia et trois relevés isolés tous entre 1400 et 1940 m (Tab. 1). La flore différentielle correspond à des espèces des *Festuco-Brometea* et des *Molinio-Arrhenatheretea*, ainsi que d'autres espèces propres aux prairies et pâturages des étages montagnard et subalpin inférieur. Il s'agit donc vraisemblablement de formations secondaires issues d'une exploitation agricole.

Groupe 3. Onze relevés de différents sommets, caractérisés par une composition intermédiaire aux deux autres groupes, ou par un petit nombre d'espèces (Monte Zeda). Le recouvrement de *F. paniculata* est par contre très élevé (souvent supérieur à 50 %) et pourrait résulter du surpâturage qui aurait favorisé *F. paniculata*, non brouté, au détriment des autres espèces préférées par le bétail.

Importance pour la protection de la nature

Malgré leur répartition suisse limitée au sud des Alpes, ces pelouses ne contiennent que peu d'espèces austro-alpines ou figurant sur la liste rouge suisse (Moser et al. 2002). Seules Chamaecytisus supinus, Asphodelus albus, Asperula cynanchica, Scorzonera humilis, Inula hirta, Paeonia officinalis, Narcissus verbanensis et Orobanche gracilis sont classées comme vulnérables. Elles n'apparaissent généralement que dans un seul relevé, pour la plupart au Monte Generoso. C'est donc plus pour leur répartition géographique limitée en Suisse que pour leur composition floristique que ces pelouses méritent d'être conservées. Elles ont d'ailleurs été retenues par le projet «Prairies et pâturages secs de Suisse» (Eggenberg et al. 2001) comme une des communautés dignes de protection et 41.3 ha ont été inventoriés et cartographiés entre le Val Morobbia et le Camoghè.

Comparaison entre pelouses tessinoises, françaises et autrichiennes

Dans l'analyse factorielle des correspondances, le relevé synthétique tessinois occupe une position intermédiaire entre les relevés autrichiens d'une part, les relevés français et celui du Val Grisanche (Italie) d'autre part (Fig. 3). Le groupement hiérarchique (résultat non montré) met en évidence trois groupes (Tab. 2): d'abord l'Autriche et le Tessin, puis le Val Grisanche avec la région Meije-Ecrins-Pelvoux, et enfin les autres relevés français.

Selon Hartl (1983), l'Hypochaerido uniflorae-Festucetum paniculatae d'Autriche est caractérisé par F. paniculata et deux espèces limitées aux Alpes orientales, toutes deux peu fréquentes (Tab. 2). Grabherr (1993) complète la description par douze espèces constantes de l'association (Tab. 2). Toutes ces espèces sont présentes dans l'ensemble des Alpes, mais leur fréquence est généralement plus élevée dans les relevés autrichiens que français. De son côté, Guinochet (1938) donne seize espèces caractéris-




Fig. 3. Axe 1 (23.8% de la variance) et axe 2 (14.2%) de l'analyse factorielle des correspondances sur les relevés du Tab. 2 (mêmes abréviations que Fig. 2). ★ Autriche, ○ Tessin et environs, □ Val Grisanche (Italie), ◆ France.

tiques pour le *Centaureo-Festucetum paniculatae*, dont également *F. paniculata*. La plupart sont rares ou absentes des relevés autrichiens. Selon la synthèse effectuée ici, d'autres espèces différentient également ces deux associations: une douzaine d'espèces sont fréquentes dans l'*Hypochaerido-Festucetum* mais rares ou absentes du *Centaureo-Festucetum*, et c'est l'inverse pour une trentaine d'autres (Tab. 2). Les deux associations vicariantes se distinguent donc bien l'une de l'autre.

La composition spécifique tend à rapprocher les pelouses tessinoises de l'Hypochaerido-Festucetum autrichien plutôt que du Centaureo-Festucetum français (Tab. 2, Fig. 3). Le nombre d'espèces en commun avec l'Autriche et la France est assez similaire. Quelques espèces caractéristiques françaises sont présentes au Tessin, mais elles sont plutôt rares. Bien que Knautia longifolia et Dianthus barbatus, espèces caractéristiques de l'association autrichienne, soient absentes de Suisse, plusieurs constantes de l'association proposées par Grabherr (1993) y sont fréquentes (Potentilla erecta, Vaccinium vitis-idaea, Carlina acaulis, Campanula scheuchzeri, Hypochaeris uniflora). Pour sa part, l'unique relevé du Val Grisanche semble un peu plus proche de l'association française, mais d'autres relevés seraient nécessaires pour confirmer cette affinité.

La chorologie n'explique pas les différences de composition spécifique entre les deux associations de pelouses à *Festuca paniculata* étant donné que la majorité des espèces sont présentes sur l'ensemble des Alpes (Tab. 2). On peut par contre y voir l'influence d'une variation du climat le long de la chaîne alpine (Walter et Lieth 1967): plutôt frais et humide en Autriche avec un maximum estival des précipitations (pluies fréquentes), chaud et humide au Tessin avec des pluies importantes toute l'année (violents orages espacés en été), chaud et sec au sud-ouest des Alpes avec des étés secs (Theurillat com. pers.).

Les montagnes tessinoises et autrichiennes partagent donc des étés humides où l'eau n'est en général pas un facteur limitant pour la croissance des plantes, contrairement aux Alpes sud-occidentales. Ces précipitations induisent vraisemblablement une acidification des sols plus marquée au Tessin et en Autriche qu'en France. Ces condi-

Tab. 2. Relevés synthétiques des pelouses à *Festuca paniculata* le long de l'arc alpin (codes des régions comme Fig. 2, voir annexes 3 et 4 pour l'origine des relevés et les espèces avec une fréquence de 20–40%). Fréquences: r=0–10%, I=10–20%, II=21–40%, III=41–60%, IV=61–80%, V=80–100%, x = présent (dans le seul relevé); * espèces constantes de l'*Hypochaerido-Festuce-tum* selon Grabherr (1993); E, W: taxon limité aux Alpes orientales (E) ou occidentales (W) d'après Tutin et al. (1964-80). Les lignes verticales séparent les trois groupes mis en évidence par une analyse de groupement hiérachique.

				Je.						
				nc						
			_	isa						
			SSi	Ğ						
	Aut	riche	Tessin	Val Grisanche			France	•		
	Α	В	С	D	F	Е	G	Н	1	
NII			N-EN						1	
Nbre de relevés	9	46	30	1	6	5	22	10	32	
Nbre total d'espèces	66	202	174	45	46	71	219	95	96	
Festuca paniculata	V	V	V	Х	V	V	V	V	V	
Caractéristiques de l'Hypochaerido uniflorae	e-Fest	ucetu	m pani	culat	ae (se	elon F	lartl 19	983)		
Knautia longifolia		П								Ε
Dianthus barbatus		1								Ε
Caractéristiques du Centaureo-Festucetum	spadie	ceae	(selon	Guin	ochet	1938)			
Silene nutans s.l.		П	1	Х	V	Ш	IV	Ш	Ш	
*Arnica montana	III	V	Ш			Ш	Ш	Ш	1	
Potentilla grandiflora			1		V	Ш	V	V	V	
Trifolium montanum		IV		Х		IV	V	V	V	
Hypericum richeri					IV	Ш	Ш	П	Ш	W
Centaurea uniflora						V	V	V	V	W
Pulmonaria angustifolia			1			IV	IV	1		
Paradisea liliastrum			III	х			II	Ш	II I	
Anemone narcissiflora	1					ı	Ш	П		
Luzula nutans							Ш	1	r	W
Asphodelus albus	1					ı	1	Ш	~	W
Hieracium peletieranum				×			11	1		W
Lilium bulbiferum s.l.	1							1	1	
Hieracium intybaceum	1		r					ı	12907	
Hypochaeris maculata	1							Ī		
Différentielles d'Autriche										
Silene vulgaris s.l.	11	Ш		X			r	1		
Thesium alpinum	1	Ш	1				r			
Potentilla aurea	П	11	1				r			
Helictotrichon versicolor	1	Ш	r					1		
Dianthus superbus s.l.	III	11	r							
*Trollius europaeus	1000	IV	r				1			
Homogyne alpina	l II	11	r							
Bartsia alpina		111	r				1			
Pulsatilla vernalis	1	Ш	r				r			
Luzula luzuloides	IV	П								
Luzula campestris s.l.		IV	- 1							
Thymus praecox polytrichus		111	1							
Autriche et Suisse										
*Potentilla erecta	1	V	V			ı				
Pedicularis tuberosa		Ш	Ш			1	r			
Leontodon helveticus	1	1	Ш						r	
Calluna vulgaris	V	IV	IV							
*Vaccinium vitis-idaea	1	IV	Ш							
Différentielles de Suisse										
Polygala chamaebuxus			IV							
Viola thomasiana			Ш							
Crocus albiflorus		r	Ш				r			
France et Suisse										
Trifolium alpinum		r	11	х	V	Ш	Ш	Ш	1	
Thymus serpyllum s.l.			Ш	х	V	Ш	IV	IV	Ш	

Tab. 2 suite

	Α	В	С	D	F	Е	G	Н	1	
Plantago serpentina			11	Х	Ш		IV	V	Ш	
Festuca ovina aggr.			III	X			III	Ш	II	
Poa violacea		940	II		13.7		1		IV	
Centaurea nervosa Différentielles de France		r	11		IV					
Senecio doronicum			-	v	V	Ш	IV	Ш	111	
Leucanthemum vulgare s.l.		r	r I	X	V	III	II		111	
Veronica allionii		1		^	V	ii	ï	1	11	w
Meum athamanticum					٧	Ÿ	v	v	ï	
Cerastium arvense s.l.				Х		i	III	ΙV	iii	
Dianthus pavonius						1	Ш	Ш	III	W
Rhinanthus alectorolophus			r			III		1	Ш	
Sempervivum arachnoideum					IV		1	1	1	
Campanula rotundifolia			r		٧		1	ı		
Linum catharticum		1		Х	IV		r	1		
Galium rubrum			r				r	11	Ш	
Hieracium hoppeanum			1		V				IV	
Pedicularis gyroflexa					IV		II		Ш	W
Gentiana campestris Viola calcarata					V	1	Ш	11	15.7	
Onobrychis montana						l I	Ш	 	IV	
Euphorbia cyparissias				х		i	III	ï		
Euphrasia alpina				^			r	i	IV	
Oxytropis campestris		r			IV		i			
Plantago atrata		r					i		Ш	
Pedicularis rostratospicata							r	IV	r	
Trifolium alpestre						III	Ш			
Bupleurum stellatum			r		٧					
Festuca varia aggr.			1						Ш	
Plantago alpina			r			Ш				
Centaurea triumfetti		r					Ш			
Alchemilla saxatilis					V					
Gentiana nivalis					V				15.7	
Agrostis rupestris Minuartia verna								Ш	IV	
Phyteuma scorzonerifolium							Ш	Ш		w
Phyteuma spicatum						III	Ш			**
Polygala vulgaris						""			Ш	
Autres espèces									1000	
*Carex sempervirens	IV	IV	IV	×	V	11	V	V	Ш	
Gentiana acaulis	ı	Ш	Ш	X	٧	III	II	Ш	Ш	
*Geum montanum	III	IV	I		V	II	V	1	1	
Botrychium lunaria	- 1	11	1		IV	Ш	1	1	111	
Lotus corniculatus (y.c. L. alpinus)		IV	IV	X	П	111	IV	IV	IV	
*Avenella flexuosa	V	IV	Ш		٧	IV	- 1		II	
Anthoxanthum odoratum s.l.	Ш	IV	Ш	X		IV	11	Ш	Ш	
Helianthemum nummularium s.l.		III	r	X	٧	IV	V	II	III	
*Festuca rubra aggr.	III	V III	II .			Ш	II III	II II	II II	
Trifolium pratense s.l. *Carlina acaulis s.l.		V	I IV	X	III	111	 	П	11	
*Hypochaeris uniflora s.l.	ı III	ΙV	IV		1111	ı	111		11	
Pulsatilla alpina s.l.	ίV	III	Ĭ	X	IV	i	II			
Ranunculus montanus s.l.		ï	iii		V	III	ï	П		
Briza media		iii	1	Х		III	١V	Ī	II	
Antennaria dioica		II	i	X	V	1	0.0	Ĥ	III	
Nardus stricta	Ш	Ш	Ш	х			r	111	r	
Crepis conyzifolia	1	1	r	Х		IV	Ш		Ш	
Vaccinium gaultherioides	Ш	11	1		V		r	1	2500	
Nigritella rhellicani		Ш	r	X	1		r	II	1	
Galium pumilum s.l.	11.7	IV	III	X	V	V	V			
Vaccinium myrtillus	IV	11	IV	X	V		ı			li.

Tab. 2 suite

	A	В	С	l p	F	Е	G	Н	1	ı
Nigritella rhellicani	^	III	r	X	Ì	_	r	11	i	
Galium pumilum s.l.		ïV	iii	x	v	V	V		•	
Vaccinium myrtillus	IV	II	IV	x	V	•	i			
Polygonum viviparum		iii		_ ^	v	Ш	İV	II		
*Campanula barbata	1111	V	II		•	iii	ii			
Phyteuma orbiculare		iii	110			iii	r	V	Ш	
Achillea millefolium s.l.		ΙV	П	X			iii	i	ii.	
Gymnadenia conopsea		V	î	×			ï	ĺ	III	
Leontodon hispidus s.l.		īV	i	×		1	i	iii		
Biscutella laevigata		iii	•		1	•	iii	ī	111	
Luzula multiflora	III		ī		v		r	•	ï	
Scabiosa lucida	1 1	П	r		•	- 1	Ш			
*Campanula scheuchzeri		V	١V	×		1151	II.	1		
Rhododendron ferrugineum	IV	r	П		V			9.40		
Phyteuma betonicifolium			IV	×	IV	1	Ĩ			
Anthyllis vulneraria s.l.		Ш	ACAR		- 1.5		ì	Ш	II	
Juniperus communis nana		II	1	×	V		r			
Aster alpinus		ii	i		V		r			
Alchemilla xanthochlora aggr.		ii	r		•	11	·	IV		
Festuca violacea aggr.			ì	x		-	П	III	ı	
Erigeron alpinus		r	r		V		r			
Lilium martagon		II	-		-	IV	ii .			
Laserpitium latifolium	ŀ	II		×		II	Ш			
Astrantia minor		100	Ш	400	Ш		12.00			W
Calamagrostis villosa	111		П							-
Cruciata glabra	1		П				Ш			
Rhinanthus glacialis	ľ	Ш		x			1			
Hieracium lactucella		567120					-27	1	Ш	
Espèces supplémentaires	33	131	95	6	1	18	131	30	38	

tions écologiques sont soulignées par les espèces différentielles avec une bonne présence d'espèces acidophiles en Autriche et au Tessin (par exemple *Potentilla aurea*, *Helictotrichon versicolor*, *Homogyne alpina*, *Luzula luzuloides*, *Calluna vulgaris*) contre des espèces de pelouses sèches en France (par exemple *Sempervivum arachnoideum*, *Linum catharticum*, *Galium rubrum*, *Pedicularis gyroflexa*, *Festuca varia*).

Appartenance phytosociologique des pelouses tessinoises

La composition floristique et le climat rapprochent les pelouses tessinoises et autrichiennes. Cependant, neuf espèces sont différentielles du Tessin (*Polygala chamaebuxus*, *Viola thomasiana*, *Crocus albiflorus*, *Carex ornithopoda*, *Hieracium murorum*, *Genista germanica*, *Molinia arundinacea/caerulea*, *Scabiosa columbaria*, *Senecio abrotanifolius*; Tab. 2 et annexe 4), les trois premières avec une fréquence supérieure à 40 %. La majorité des relevés contient au moins trois espèces différentielles. Nous considérons que cela ne justifie pas une nouvelle association régionale, mais nous proposons une nouvelle sous-association: *Hypochaerido uniflorae-Festucetum paniculatae polygaletosum chamaebuxi* subass. nov. hoc loco, holotypus relevé 7 (Tab. 1).

Ce travail comble partiellement une lacune dans la connaissance des pelouses à *Festuca paniculata* en Suisse et dans les Alpes. Toutefois, d'autres recherches seraient nécessaires pour mieux cerner leur position intermédiaire dans le contexte alpin, notamment pour les régions situées entre le Tessin et le Tyrol oriental pour lesquelles nous ne possédons pas de données alors que, selon Aeschimann et al. (2004), *F. pani*-

culata est présent dans toutes les Alpes italiennes. Une meilleure compréhension de l'écologie et de la dynamique de ces pelouses (caractéristiques pédologiques, rôle du pâturage et des incendies) est souhaitable dans la perspective du maintien de ce patrimoine particulier.

Nous remercions les participants au stage de Vegetatio Helvetica qui a permis d'initier cette étude en juillet 1996 (A. Antonietti, N. Zimmermann, M. Bichsel, A. Persico et K. Marti) pour leur participation aux relevés et leurs commentaires sur le manuscrit, ainsi que A. Stampfli, A. Antonietti et C. Staehli pour avoir mis à notre disposition leurs relevés. Nos sincères remerciements également à J.-P. Theurillat et F. Klötzli pour leur lecture critique du manuscrit qui nous ont permis de nombreuses améliorations.

Références

Aeschimann D., Heitz C., Palese R., Perret P. et Moser D.M. 1996. Index synonymique de la Flore de Suisse et territoires limitrophes (ISFS). CRSF, Genève.

Aeschimann D., Lauber K., Moser D.M. et Theurillat J.-P. 2004. Flora Alpina. Belin, Paris.

Antonietti A. 2002. Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefässpflanzen). 64. Folge (Primo contributo alla conoscenza della flora delle Valli Ossolane). Bot. Helv. 112: 173–200.

Bär J. 1914. Flora des Val Onsernone (Bezirk Locarno, Kt. Tessin). Floristische und pflanzengeographische Studie. Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 59: 224–563.

Bär J. 1915. Flora des Val Onsernone (Bezirk Locarno, Kt. Tessin). Floristische und pflanzengeographische Studie. II. Teil. Verzeichnis der wildwachsenden Pflanzen und wichtigsten Kulturpflanzen und ihrer Standorte. Boll. Soc. Ticinese Sci. Nat. 70: 1–413.

Barbero M. 1970. Les pelouses orophiles acidophiles des Alpes maritimes et ligures, leur classification phytosociologique: *Nardetalia strictae*, *Festucetalia spadiceae* et *Caricetalia curvulae*. Ann. Fac. Sci. Marseille 43B: 173–195.

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl., Springer, Wien/New-York.

Braun-Blanquet J. 1972. L'alliance du *Festucion spadiceae* des Alpes sud-occidentales. Bull. Soc. Bot. Fr. 119: 591–602.

Chenevard P. 1910. Catalogue des plantes vasculaires du Tessin. Kündig, Genève.

Conert H.J., Jäger E.J., Kadereit J.W., Schultze-Motel W., Wagenitz G. und Weber H.E. (Hrsg.) 1994. Hegi, Illustrierte Flora Mitteleuropa. Band I, Teil 3. 3. Aufl. Blackwell, Berlin.

Donati A. 1992. Monti, uomini e pietre. Collana Quaderni ticinesi 18: 1-24.

Eggenberg S., Dalang T., Dipner M. et Mayer C. 2001. Cartographie et évaluation des prairies et pâturages secs d'importance nationale. Rapport technique. Cahier de l'environnement n° 325. OFEFP, Berne.

Ernet D. 1998. Verbreitung und Lebensraum des Gold-Schwingels, *Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell., im Gebiet des Grossen Speikkogels der Koralpe (Steiermark/Kärnten). Not. Fl. Steiermark 15: 27–49.

Grabherr G. 1993. *Caricetea curvulae*. In: Grabherr G. und Mucina L. (Hrsg.) Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil II. Natürliche waldfreie Vegetation. Fischer, Jena, 343–372.

Guinochet M. 1938. Etudes sur la végétation de l'étage alpin dans le bassin supérieur de la Tinée (Alpes Maritimes). Thèse de doctorat ès sciences, Grenoble. Bosc Frères & Riou, Lyon.

Hartl H. 1983. Einige ostalpine Vorkommen des Goldschwingelrasens (*Hypochoeris uniflora-Festucetum paniculatae* Hartl 1983). Carinthia 173: 43–54.

Hess H.E., Landolt E. und Hirzel R. 1976. Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. Band I: *Pteridophyta* bis *Caryophyllaceae*. 2. Aufl. Birkhäuser, Basel.

Jäggli M. 1908. Monografia floristica del Monte Camoghè (2232 m; presso Bellinzona) e Vette circostanti. Boll. Soc. Ticinese Sci. Nat. 4: 1–247.

Kaplan K. 1983. Über Gesellschaften des *Festucion variae*-Verbandes in den östlichen Grajischen Alpen (Aosta, Italy). Ber. Geobot. Inst. ETH Stiftung Zürich Rübel 50: 97–118.

Lacoste A. 1971. Les groupements à *Festuca spadicea* L. des Alpes maritimes et la définition d'un *Festucetum spadiceae* des Alpes austro-occidentales. Cah. Géogr. Besançon 21: 43–62.

- Lippmaa T. 1933. Aperçu général sur la végétation autochtone du Lautaret (Hautes-Alpes). Avec des remarques critiques sur quelques notions phytosociologiques. Acta Inst. Horti Bot. Tartuensis 3: 1–104.
- Moser D.M., Gygax A., Bäumler B., Wyler N. et Palese R. 2002. Liste rouge des fougères et plantes à fleurs menacées de Suisse. Série OFEFP «L'environnement pratique». OFEFP, Bern, CRSF, Chambésy, Conservatoire et jardin botaniques de la ville de Genève, Chambésy.
- Nègre R. 1950. Contribution à l'étude phytosociologique de l'Oisans: la Haute vallée du Vénéon (Massif Meije-Ecrins-Pelvoux). Phyton 2: 23–50.
- Peer T. und Hartl H. 1976. Beziehungen zwischen Pflanzendecke und Nährstoffhaushalt im Boden am Beispiel einiger subalpiner und alpiner Gesellschaften im Raum des Tappenkars (Salzburg) und der Fragant (Kärnten). Carinthia 166: 339–371.
- Quervain de F., Frey D., Hofmänner F. und Jenny V. 1967. Geotechnische Karte der Schweiz. Blatt Nr. 4, St. Moritz-Bellinzona. 2. Aufl. Schweiz. Geotechnische Kommission.
- Sburlino G., Buffa G. e Ghirelli L. 1996. L'analisi corologica nell'interpretazione sintassonomica: l'esempio delle praterie a *Festuca paniculata* (L.) Sch. et Th. Giorn. Bot. Ital. 130: 236–247.
- Theurillat J.-P. 1989. Excursion de la Société botanique de Genève dans les Alpes autrichiennes (10–19 juillet 1988): notes phytosociologiques. Saussurea 20: 71–88.
- Theurillat J.-P., Aeschimann D., Küpfer P. and Spichiger R. 1995. The higher vegetation units of the Alps. Coll. Phytosociol. 23: 189–238.
- Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M. and Weeb D.A. (eds.) 1964–80. Flora Europaea. Vol. 1–5. Cambridge University Press, Cambridge.
- Walter H. und Lieth H. 1967. Klimadiagramm-Weltatlas. Fischer, Jena.
- Welten M. und Sutter R. 1982. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. Vol. 2. Birkhäuser, Basel.
- Wildi, O. and Orloci L. 1996. Numerical exploration of community patterns: a guide to the use of MULVA-5. 2. ed., SPB Academic Publishing by, Amsterdam.

Suppléments électroniques

- Version courte anglaise (Résumé, tableaux, figures) en format PDF
- Tableau de végétation (Tab. 1) en format texte Excel (avec tabulateurs)

Ces suppléments peuvent être déchargés gratuitement sous http:// www.birkhauser.ch/00035

Annexes

Annexe 1. Localisation des relevés du tableau 1. Ils ont été réalisés par différents auteurs dans le cadre de projets indépendants et ont été retenus pour l'abondance de *F. paniculata*. Ils sont représentatifs des principales régions où l'espèce est actuellement connue pour former des pelouses importantes au Tessin et dans les environs immédiats. Ordre des informations: auteur, coordonnées selon le réseau topographique suisse, année.

Rel. 1: Vegetatio Helvetica, 725.930/110.340, 1996. 2: Vegetatio Helvetica, 725.915/110.420, 1996. 3: Vegetatio Helvetica, 725.625/110.535, 1996. 4: Vegetatio Helvetica, 725.660/110.415, 1996. 5: Vegetatio Helvetica, 725.550/110.280, 1996. 6: Vegetatio Helvetica, 725.100/109.350, 1996. 7: Vegetatio Helvetica, 725.320/109.480, 1996. 8: Vegetatio Helvetica, 725.290/109.710, 1996. 9: C. Staehli, 725.025/110.000, 2003. 10: G. Maspoli, 725.350/109.850, 2001. 11: P. Selldorf, 728.050/115.600, 1982. 12: S. Eggenberg, 730.700/115.350, 2001. 13: P. Selldorf, 729.350/115.450, 1982. 14: P. Selldorf, 729.300/115.250, 1982. 15: S. Eggenberg, 730.300/115.300, 2001. 16: S. Eggenberg, 729.950/115.400, 2001. 17: W. Dietl, 1981. 18: P. Selldorf, 722.150/87.310, 1985. 19: A. Stampfli, N. Zimmermann, 1994. 20: S. Eggenberg, 694.150/107.800, 1992. 21: S. Eggenberg, 694.200/107.650, 1992. 22: S. Eggenberg, 694.300/107.500, 1992. 23: N. Zimmermann,

712.075/107.580, 1993. **24**: S. Eggenberg, 710.300/106.750, 1992. **25**: C. Staehli, 695.700/110.580, 2003. **26**: S. Eggenberg, 687.500/99.700, 1992. **27**: S. Eggenberg, 688.400/99.250, 1992. **28**: S. Eggenberg, 687.800/99.700, 1992. **29**: S. Eggenberg, 685.550/99.850, 1992. **30**: S. Eggenberg, 686.950/99.800, 1992.

Annexe 2. Espèces accidentelles dans les relevés du tableau 1.

Acinos alpinus 13(+); Agrostis gigantea 24(+); Ajuga pyramidalis 7(r); Alchemilla alpina aggr. 30(+); A. xanthochlora aggr. 18(+); Allium montanum 6(+), 7(+), 8(r); Alnus viridis 13(+), 14(+), 19(+); Anthericum liliago 19(+); Arctostaphylos uva-ursi 11(1); Astrantia major 18(+); Bartsia alpina 4(+); Betula pendula 11(+); Bupleurum stellatum 5(r), 9(+); Campanula rotundifolia 2(+), 12(+), 15(+); Carex brunnescens 26(+), 30(+); C. digitata 18(+); C. montana 18(+), 25(+); C. pilulifera 17(1), 19(1); Chaerophyllum hirsutum 23(+); C. villarsii 3(r), 4(r), 18(1); Cirsium erisithales 18(r); Clinopodium vulgare 18(+); Coeloglossum viride 6(r); Crepis conyzifolia 6(+); Cytisus scoparius 17(+); Dianthus carthusianorum 14(+); D. superbus 6(+), 13(r); Erica sp. 18(r); Erigeron alpinus 9(1); Euphrasia hirtella 12(+); Festuca diffusa 29(+); F. halleri aggr. 12(2), 16(+); Fourraea alpina 7(+); Galium rubrum 12(1), 16(+); Genista sp. 9(+); Gentiana purpurea 30(+); Geranium sylvaticum 18(+); Helianthemum nummularium s.l. 11(+); Helictotrichon versicolor 3(+); Helleborus viride 18(+); Hieracium intybaceum 9(r); Homogyne alpina 5(r), 23(+); Hypericum maculatum 4(+); Laserpitium krapfii gaudinii 4(r), 7(+); Leontodon autumnalis 11(+); Maianthemum bifolium 26(+); Melittis melissophyllum 18(r); Narcissus x verbanensis 18(+); Nigritella rhellicani 5(+), 6(+), 8(+), Ononis sp. 13(+); Orobanche gracilis 7(r); Paeonia officinalis 18(r); Phleum alpinum rhaeticum 3(r); Picea abies 11(1); Pimpinella major 6(1); Plantago alpina 10(1), 11(+), 12(+); Platanthera sp. 19(1); Polygala alpestris 14(+); P. alpina 13(r); Polygonum bistorta 3(+), 18(+); Primula elatior 18(+); P. hirsuta 5(r); Prunella vulgaris 10(1); Pteridium aquilinum 14(+); Pulsatilla vernalis 5(1), 7(r); Rhinanthus alectorolophus 6(1), 11(+); Rosa canina s.l. 18(r); R. pendulina 4(+), 7(+); Rubus idaeus 8(+), 25(+); Rubus sp. 14(+), 15(+), 18(r); Rumex acetosa 18(r); R. scutatus 6(+), 7(1); Salix appendiculata 25(r); Scabiosa lucida 4(+), 13(+); Senecio doronicum 5(+), 8(r); Sesleria caerulea 18(r); Teucrium scorodonia 25(r); Trollius europaeus 18(+); Veronica chamaedrys 18(r); V. officinalis 25(1), 27(+); Vicia sp. 18(r); Viola hirta 12(1); V. rupestris 4(+).

Annexe 3. Origine des relevés du tableau 2. Ordre des informations: auteur et année, n° du tableau, nom d'association utilisé.

Colonne A: Ernet 1998, Tab. 1. **B**: Hartl 1983, Tab. 2 (sauf rel. 25–27), *Hypochoeris-Festucetum paniculatae*. **C**: ce travail, Tab. 1, *Hypochaerido uniflorae-Festucetum paniculatae polygaletosum chamaebuxi*. **D**: Kaplan 1983, Tab. 2, *Festuca paniculata*-Rasen. **E**: Lippmaa 1933, Tab. 8, association à *Festuca spadicea*. **F**: Nègre 1950, Tab. 1, *Junipereto-Festucetum*. **G**: Braun-Blanquet 1972, Tab. 1, *Centaureo-Festucetum spadiceae*. **H**: Guinochet 1938, Tab. 48, ass. à *F. spadicea* et *Centaurea uniflora*. **I**: Barbero 1970, Tab. 2, *Centaureo-Festucetum spadiceae*.

Annexe 4. Espèces du tableau 2 apparaissant avec une fréquence relative comprise entre 20 et 40 % (II).

Différentielles d'Autriche: Cerastium fontanum B(II); Euphrasia roskoviana B(II); Gentiana germanica B(II); Gentiana pannonica A(II); Hypericum maculatum A(II), B(II), C(R), G(R); Phyteuma confusum A(II); Phyteuma zahlbruckneri A(I), B(II); Picea abies A(II), B(I), C(r); Pseudorchis albida A(II), B(II); Ranunculus nemorosus s.l. B(II), G(r); Rhinanthus pulcher A(II); Valeriana officinalis s.l. B(II). **Autriche et Suisse**: Daphne striata B(I), C(II); Hieracium pilosella B(II), C(II), E(I), G(r). **Différentielles de Suisse**: Carex ornithopoda C(II); Genista germanica C(II); Hieracium murorum s.l. C(II), G(r); Molinia arundinacea/caerulea C(II); Scabiosa columbaria C(II); Senecio abrotanifolius B(r), C(II). **France et Suisse**: Brachypodium pinnatum C(II), G(II), I(I); Bupleurum ranunculoides C(I), D(x), E(II), G(II), I(II); Hippocrepis comosa B(r), C(I), E(I), G(I), H(I), I(II); Laserpitium halleri C(I), D(x), E(II), G(I); Luzula lutea C(I), I(II). **Différentielles de France**: Alchemilla hybrida s.l. G(II), I(II); Alopecurus gerardii H(II); Astragalus danicus G(II); Cirsium acaule E(II), G(II); Crepis bocconei B(r), E(II), G(r); Galium boreale G(II); Galium verum E(II), G(II), H(I), I(I); Gentiana lutea G(II), H(I); Gentiana verna G(r), H(II); Helianthemum alpestre B(r), G(I), H(II), I(I); Hieracium angustifolium D(x), G(r), H(II),

I(II); Hieracium prenanthoides E(II); Hieracium valdepilosum G(II); Knautia timeroyi I(II); Lathyrus pratensis B(r), E(I), G(II); Luzula sieberi E(II); Luzula spicata s.l. G(r), H(II), I(II); Pedicularis comosa G(I), I(II); Pedicularis kerneri I(II); Peucedanum oreoselinum I(II); Phyteuma michelii I(II); Polygonum bistorta C(r), D(x), G(II), H(II); Potentilla valderia I(II); Ranunculus kuepferi E(I), G(r), H(II); Scabiosa vestina I(II); Sempervivum tectorum G(II); Stachys monieri C(r), G(II); Tragopogon dubius I(II); Trifolium pannonicum I(II); Trisetum flavescens B(r), E(I), G(II). Autres espèces: Acinos alpinus B(I), C(r), D(x), G(II); Carduus defloratus s.l. B(II), C(I), G(I), H(I), I(II); Euphrasia minima B(I), I(II); Geranium sylvaticum A(I), B(II), C(r), E(I), G(II); Juncus trifidus A(I), B(I), C(II), G(r), I(II); Leuzea rhapontica s.l. D(x), I(I); Myosotis alpestris B(I), G(II), H(II), I(II); Phleum alpinum s.l. B(II), C(r), G(II), H(I); Poa alpina B(I), G(II), H(II); Polygala alpestris B(II), C(r), H(I); Potentilla crantzii B(I), C(I), G(II), H(I); Primula veris A(I), G(II), H(I), I(II); Sesleria caerulea B(II), C(r), G(II); Silene rupestris B(r), C(II), G(r), I(II); Solidago virgaurea s.l. A (II), B(II), C(II), G(I); Veratrum album A(I), B(r), E(I), G(r), H(I), I(II); Veronica fruticans B(r), F(I), G(I), I(II).



To access this journal online: http://www.birkhauser.ch