

Zeitschrift:	Boissiera : mémoires de botanique systématique
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève
Band:	10 (1964)
Artikel:	Les genres de Polygonacées
Autor:	Roberty, Guy / Vautier, Simone
Kapitel:	Nomenclature et description sommaire des genres et de leurs principales espèces
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-895679

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

- 1211 → 0211 = Rumex (1.5).
- 1011 = Lastarriaea (3.3).
- 1101 → 1001 = Leptogonium (2.1).
 - 1102 = Antigonon,
 - 1201 = Gymnopodium (2.3).

Niveau F :

- 1111 → 1110 → 1010 → 1020 = Antenoron,
- 1101 → 1100 → 2100 = Harpagocarpus (1.3).
 - 2101 = Calligonium (2.4).
- 2111 → 2121 → 2021 = Fagopyrum (1.3). Pterogonium (3.3).
 - 2120 = Pteroxygonum (1.3).
 - 2122 → 2022 = Pleuropteropyrum (1.3). Rheum (1.4). Oxyria (1.5).
 - 2112 = Pteropyrum (2.4).
 - 2011 = Koenigia (1.3).

NOMENCLATURE ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES GENRES ET DE LEURS PRINCIPALES ESPÈCES¹

Polygonaceae Lindl. 1836 : 211; Benth. & Meisn. 1856 : 1; Benth. & Hook. 1880 : 88; Dammer 1891 : 1; Polygoneae [ordo] Juss. 1789 : 82.

1 = Subfam. **Polygonoideae**.

Polygoneacearum subfamilia stipulis ochreaceis.

Notre définition de la sous-famille, d'après la présence d'un ochréa soudé prolongeant les stipules, diffère de celle primitivement admise par DAMMER (1891 : 8, 25) et donc en modifie la délimitation, assez légèrement d'ailleurs.

1.2 = Trib. **Coccolobeae** C. A. Meyer 1840 : 146.

Polygoidearum tribus mediocriter entomogama, subtribum unam includens.

1.2(2) = Subtrib. **Coccolobineae**

Coccolobearum subtribus stigmatibus parvulis, ad faciem tamen internam stylorum plus minusve decurrentibus.

1.2(2).2 = Cohors **Coccolobastreae**

Coccolobinearum cohors genus unum includens, fructibus plus minusve carnosis.

1.2(2).2(1) = **Coccoloba** P. Browne ex L. 1759 : 997, 1007, 1367, orth. & nom. cons. = *Coccolobis* P. Browne 1756 : 209, orth. rejic. = *Guaiabara* P. Mill. 1754, nom. rejic. = *Guaiabara* Adans. 1763 : 563, non P. Mill. 1754 = *Naucorephes* Raf. 1837 : 34.

— .7 = Sectio **Paniculatae** Meisn. 1855 : 43. Espèce type : *C. latifolia*.

¹ Sauf indications contraires, tous les spécimens cités font partie des collections du Conservatoire de Genève (G).

- .9 = Sectio **Campderia** Lindau 1891 : 121, 209 = genus *Campderia* Benth. 1846 : 159, non Lag. 1821, nec A. Rich. 1822. Espèce type : *C. venosa*.
- 10 = Sectio **Coccoloba** = genus *Uvifera* O. Ktze. 1891 : 561. Espèce type : *C. uvifera*.
- 11 = Sectio **Rhigia** Griseb. 1866 : 283. Espèce type : *C. armata*.
- C. acuminata* H. B. K. 1817 : 141 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Krukhoff* 4715 (Amazonie); *Yuncker & al.* 8034 (Honduras).
- C. albicans* Ekm. in Schmidt 1929 : 103 = *C. venosa* s.l. Specim. vis. : type, *Ekman* 10720 (Haïti).
- C. armata* Wright ex Griseb. 1866 : 62, 283. Specim. vis. : type, *Wright* 2250 (Cuba).
- C. ascendens* Duss ex Lind. 1891 : 156 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Hahn* 1005 (Martinique).
- C. australis* Forst. = *Muehlenbeckia australis*.
- C. barbadensis* Jacq. 1760 : 37 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Hahn* 1187 (Martinique).
- C. barkeri* Ekman & Schmidt in Schmidt 1929 : 104 = *C. venosa*. Specim. vis. : type, *Ekman* 6464 (Haïti).
- C. candolleana* Meisn. 1855 : 41 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Blanchet* 159 (Brésil).
- C. caracasana* Meisn. 1856 : 157 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Pittier* 12111 (Venezuela); *Tucker* 961 (San Salvador).
- C. cordata* Cham. 1833 : 133 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Balansa* 3277 (Paraguay); *Sello* 5361 (Brésil).
- C. cubajensis* Wedd. 1850 : 259 = *C. venosa* s.l. (e litt.).
- C. excelsa* Benth. 1845 : 624 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : type, *Schomburgk* 400 (Guyane).
- C. excoriata* L. 1759 : 1007 = *C. tenuifolia* (« there is no doubt that *C. e.* is an adventitious shoot of *C. t.*, HOWARD 1957 : 93) = *C. venosa*. Specim. vis. : *Hahn* 1182 (Antilles).
- C. floribunda* Lindau 1891 : 217 = *Campderia floribunda* Benth. 1846 : 159. tab. 52 = *C. venosa* s.l. Specim. vis. : *Andrieux* 444 (Mexique).
- C. gracilis* Auct. non H. B. K. = *Campderia gracilis* Meisn. 1855 : 23. tab. 6 = *C. venosa*. s.l. Specim. vis. : type, *Spruce s.n.* [1850-51] (Brésil).
- C. latifolia* Lam. 1804 : 61. Specim. vis. : *Hostmann* 682 (Guyane).
- C. laurifolia* Jacq. 1798 : 9. tab. 267 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Ekman* 3819 (Haïti).
- C. longiochreata* Hassler 1915 : 162 = *C. cubajensis* = *C. venosa* s.l. Specim. vis. : type, *Fiebrig* 1443 (Paraguay).
- C. nitida* H. B. K. 1817 : 140 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Blanchet* 3160 (Brésil).
- C. nivea* Jacq. 1760 : 19; 1763 : 115. tab. 78 = *C. venosa* s.l. (e litt.).
- C. ovata* Benth. 1845 : 627 = *C. venosa* s.l. Specim. vis. : type, *Schomburgk* 531 (Guyane).
- C. paraguariensis* Lindau 1891 : 218 = *C. venosa* s.l. Specim. vis. : type, *Balansa* 2060 (Paraguay).
- C. platyclada* F. v. Mueller = *Muehlenbeckia platyclada*.

- C. polystachya* Wedd. 1850 : 261 = *C. latifolia* s.l. Specim. vis. : Spruce 956 (Amazonie).
- C. populifolia* Wedd. 1850 : 257 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : type, *Blanchet* 1486 (Brésil).
- C. pubescens* L. 1763 : 523 = *C. uvifera* s.l. Specim. vis. : *Ekman* 336 (Haïti).
- C. punctata* L. 1759 : 1007 = *C. venosa* s.l. (e litt.).
- C. sagittifolia* Ortega = *Muehlenbeckia sagittifolia*.
- C. tenuifolia* L. 1759 : 1007 = *C. venosa* s.l. *Harris* 5391 (Jamaïque).
- C. uvifera** L. 1759 : 1007 = *Polygonum uvifera* L. 1753 : 365. Specim. vis. : *Curtiss* 2439 (Floride).
- C. venosa** L. 1759 : 1007. Specim. vis. : *Broadway* 2788 (Trinidad).

La sous-tribu, réduite à son genre-type, est nettement définie : par des stigmates très petits mais toujours \pm ondulés, bosselés ou lobés.

Le genre est défini, théoriquement, par ses fruits charnus. Cette caractéristique prête à discussion; STANDLEY & STEYERMARK, notamment, signalent que les fruits du *C. caracasana* « 5 mm long when dry », c'est-à-dire en herbier, sont à l'état vivant « much larger, white and juicy ». On peut admettre qu'il en va toujours de même et, raisonnablement, tenir pour fallacieuse une distinction générique entre *Coccoloba* sensu stricto, à fruits vraiment charnus, et *Campderia* sensu BENTHAM, à fruits simplement coriaces.

Pratiquement, le genre est bien isolé : par ses fruits de tous les autres genres de Polygonacées sauf deux, *Ampelygonum* et *Muehlenbeckia*, dont le port est très différent.

Ce port et ces fruits sont également malaisés à mettre en herbier. Aussi de nombreuses espèces ont été créées dont la comparaison et le regroupement posent des problèmes irritants et souvent insolubles. HOWARD, spécialiste actuel du genre, n'a pas encore proposé un système général pour son classement intérieur. Nous avons donc admis les sections créées jadis par LINDAU (1890). Chacune d'elles est centrée sur une forme écologiquement et morphologiquement bien définie. Il est toutefois certain que leurs limites sont imprécises. Dans chacune des sections nous n'avons retenu qu'une seule espèce. La clef ci-après y conduit :

Axes florifères allongés, infrutescences racémeuses :

Ces racèmes toujours et abondamment composés, apparemment paniculés ; arbrisseaux à bois \pm dur et branches hautement lianescentes ; feuilles moyennes, ovales, subcoriaces (.7 = *Paniculatae*) **C. latifolia**

Ces racèmes simples ou pauvrement composés, apparemment spiciformes

Arbustes ou arbres à bois \pm dur et tronc nettement défini ; feuilles moyennes, ovales, subcoriaces (.9 = *Campderia*) **C. venosa**

Arbustes ou arbrisseaux à bois \pm mou et branches densément ramifiées ; feuilles majeures, arrondies, épaisses (10 = *Coccoloba*) : **C. uvifera**

Axes florifères nuls, infrutescences fasciculées, pauvres ou très pauvres ; arbrisseaux à bois \pm grêle et branches pauvrement ramifiées ; feuilles mineures, aiguës, subcoriaces (11 = *Rhigia*) **C. armata**

Nous distinguons ainsi, d'une part, des sciaphytes, d'autre part, des héliophytes. Les premiers, par compensation, cherchent à exposer leurs fleurs et fruits au soleil; les seconds, par la compensation inverse, cherchent à les en protéger.

Les valeurs adaptatives prises en compte traduisent :

le port, lianescient = 0 / 2 = frutescent;
l'étalement des rameaux flori- et fructifères, maximum = 0 / 2 = minimum.

.7 — La section *Paniculatae* n'est connue que sous deux formes lianescentes, proches parentes, localisées dans la forêt dense amazonienne : *C. latifolia* et *C. polystachya* qui est un peu plus ramifiée.

.9 — La section *Campderia* s'étend caractéristiquement dans les savanes et forêts sèches d'Amérique subtropicale : sur les collines en Amérique centrale, insulaire ou continentale (*C. venosa* s. str.); dans le Chaco sud-américain (*C. paraguariensis*), alors avec, parfois, des ochréas d'une longueur extrême (*C. cubajensis*). Toutefois elle a aussi été rencontrée dans la forêt dense amazonienne, probablement en clairières (*C. ovata*).

10 — La section *Coccoloba* et le genre ont pour type muséologique une forme probablement surspécialisée, littorale et donc très charnue dans tous ses organes. Il existe dans maintes autres familles des exemples de cette même surspécialisation : *Canavalia (ensiformis) maritima*, *Ipomaea pes-caprae*, *Spermacoce (ocimoides) serrulata*, etc.

Cette forme écologique surspécialisée est reliée aux formes non littorales par des transitions apparemment continues : collinéennes en Amérique centrale, insulaire surtout (*C. laurifolia*, *C. pubescens*); amazoniennes, en bordure du littoral (*C. populifolia*) ou dans des clairières sans doute ± palustres (*C. acuminata*, *C. nitida*); subdéserticoles dans le Chaco paraguayen (*C. cordata*). Ces deux derniers sous-ensembles géographiques présentent d'étroites liaisons avec la section *Campderia*. Notons, en outre, qu'un très grand nombre de spécimens ont été élevés au rang d'espèce d'après seulement la forme ou la pubescence des feuilles; or ce sont là des caractéristiques possiblement saisonnières et non pas héréditaires.

11 — La section *Rhigia* n'est connue que sous une seule forme, à feuilles piquantes (*C. armata*), endémique et rare dans l'île de Cuba.

1.3 = Trib. **Polygoneae.**

Polygonoidearum tribus media, subtribus duas includens stigmatibus vel terminalibus integrisque, vel adaxialibus et divisis.

Nous réunissons ici deux sous-tribus : Emicinées, Polygoninées.

1.3(1) = Subtrib. **Emicineae** Roberty & Vautier subtrib. nov.

Polygonearum subtribus stigmatibus ad faciem internam stylorum elongatis laciniatisque.

1.3(1).4 = Cohors **Emicastreæ.**

Emicinarum cohors fructibus plus minusve spinosis.

1.3(1).4(.5) = *Emex* Campdera 1819 : 56, nom. cons. = *Emex* Neck. 1790 : 214, nom. illeg. = *Centopodium* Burchell 1822 : 340 = *Centropodium* Burchell ex Lindl. 1836 : 442 = *Nibo* Moench ex Steud. 1821 : 553 = *Vibo* Medic. 1789 : 178, nom. rejic. Espèce type : *E. spinosa*; autre espèce, de même section : *E. australis*.

E. australis Steinh. 1838 : 196. tab. 7, fig. 16. Specim. vis. : *Curtiss* 6868 (Floride); *Drummond* 290 (Australie); *Zeyher & Ecklon* 83 (Afrique du Sud).

E. spinosa Campdera 1819 : 58. tab. 1, fig. 1 = *Rumex spinosus* L. 1753 : 337. Specim. vis. : *Bornmueller* 621 (Perse); *Bourgeau s.n.* [1852] (Espagne).

La sous-tribu, réduite à son genre-type, est nettement définie par des stigmates adaxiaux, allongés, ± finement laciniés ou découpés sur leurs marges; seuls ainsi dans l'ensemble des Polygonacées.

Le genre est bien caractérisé par des fruits formés par la concrescence avec l'hypanthe des trois seuls tépales externes, dont le sommet, rabattu presque à angle droit, devient épineux.

Les *Emex* sont des sous-arbrisseaux herbacés, ± prostrés, lâchement branchus, glabres, à feuilles assez longuement pétiolées, leur limbe ovale à subtriangulaire; monoïques, les fleurs femelles et donc les fruits disposés en petits fascicules axillaires.

Les deux espèces peuvent être distinguées comme il suit :

Fruits majeurs à base obtusément triédrique	E. australis
Fruits mineurs à base nettement tricorne	E. spinosa

Les valeurs adaptatives prises en compte traduisent donc les dimensions générales du fruit : majeur = 0 / 2 = mineur; et une spinescence basale, supplémentaire, du fruit : présente = 0 / 2 = absente.

E. australis s'étend de l'Afrique du Sud à l'Australie; serait subspontanée et non pas indigène en Californie et Floride (GOODMAN 1932 : 21).

E. spinosa s'étend dans tout le bassin méditerranéen, en Asie mineure et en Perse.

1 3(3) = Subtrib. **Polygonineae**.

Polygonearum subtribus stigmatibus ad apicem stylorum parvulis integrisque.

La sous-tribu type, caractérisée dans sa sous-famille par des stigmates petits et globuleux ou capités, terminaux, comprend 12 genres, partagés entre 6 cohortes et 3 niveaux différents de l'involution familiale.

Chacun des genres admis par nous possède un type central nettement distinct, espèce ou forme. Toutefois, autour de ces points de repère systématiquement précis s'étendent des aires de variation aux marges souvent rejoignes ou même interpenetrées. Tel est, notamment, le cas dans la séquence suivante, étendue sur les trois niveaux d'involution :

Bilderdykia convolvulus → *Polygonum aviculare* → *P. divaricatum* → *Fagopyrum*
→ *Pleuropteropyrum*

Tel est également le cas entre les *Polygonum* et, d'une part les *Ampelygonum* à fruits charnus, d'autre part les *Atraphaxis* à fruits largement ailés, dans l'un et l'autre cas par modification des tépales après l'anthèse.

1.3(3).2 = Cohors **Ampelygonastreae** Roberty & Vautier cohors nov.

Polygoninearum cohors fructibus plus minusve carnosis.

1.3(3).2(.3) = **Ampelygonum** Lindl. 1838 : 63 = *Chylocalyx* Hassk. 1842 : 20 = p.p. *Echinocaulos* Spach ex Hassk. 1844 : 85. Espèce type : *A. chinense*; autres espèces, de même section, *A. molle*, *A. perfoliatum*.

A. chinense Lindl. 1838 : 62 = *Polygonum chinense* L. 1753 : 363. Specim. vis. : *Bartlett* 8330 (Sumatra); *Elmer* 5901 (Philippines); *Kajewski* 1669 (îles Salomon); *Walker* s.n. [1846] (Ceylan); *Zimmermann* 1302-bis (Népal).

A. molle Roberty & Vautier comb. nov. = *Polygonum molle* D. Don, février 1825 : 72 = *P. paniculatum* Blume, décembre 1825 ou, plus probablement, janvier-février 1826 : 533 = *P. frondosum* Meisn. 1856 : 137 = *P. rude* Meisn. 1856 : 137. Specim. vis. : Cult. J. Bot. Genève; *Biswas* 9751 (Himalaya oriental); *Schneider* 2725 (Yun-Nan); *Zimmermann* 1216 & 1691 (Népal).

A. perfoliatum Roberty & Vautier comb. nov. = *Polygonum perfoliatum* L. 1759 : 1006 = *Chylocalyx perfoliatus* Hassk. 1842 : 20 = *Echinocaulos perfoliatus* Hassk. 1844 : 85. Specim. vis. : *Balansa* 4889 (Tonkin); *Clarke* 36129-B (Sikkim); *Karo* 156 (Sibérie maritime); *Lin-Yu-Taï* 11035 (Chine maritime); *Togasi* 884 (Japon).

Le genre est bien caractérisé par son fruit étroitement et complètement inclus dans les tépales tous épais, charnus (ou parfois coriaces ?) et à bases brièvement concruescentes. Les réserves déjà faites au sujet du fruit des *Coccoloba* (p. 28) sont également valables ici; autour du fruit mûr, les tépales peuvent être ± nettement épais et donc différents de ceux, membraneux, des *Polygonum*; il semble cependant qu'existe une discontinuité assez large sur cette limite de genres.

Les *Ampelygonum* sont des sous-arbrisseaux herbacés, buissonnants et parfois assez élevés. Les trois espèces peuvent en être distinguées comme il suit :

Grappes simples, toutes terminales **A. perfoliatum**
Grappes composées, terminales ou axillaires

Obpyramidales en pseudocorymbe **A. chinense**
Subpyramidales en pseudopanicule. **A. molle**

Les valeurs adaptatives prises en compte traduisent la disposition et la forme des infrutescences : toutes terminales = 0 / 1 = terminales et axillaires; allongées = 0 / 2 = abrégées; élargies = 0 / 2 = étrécies. Comme chez les *Coccoloba*, ces valeurs opposent des tendances, ici également compensées dans chaque espèce, entre la sciaphytie et l'héliophytie.

Le genre s'étend sur l'Extrême-Orient et les îles du Pacifique, sous climat tempéré à équatorial mais alors littoral ou montagnard.

A. perfoliatum a une aire assez continue, de la Sibérie maritime au Sikkim et au Tonkin. Ses tiges portent généralement des poils aigus et rétroflechis; ses limbes foliaires sont deltoïdes et parfois, rarement, peltés; ces deux caractéristiques, très

apparentes mais assez instables, se retrouvent chez les *Polygonum* de section *Echinocaulon*. En outre, les *A. perfoliatum* ont des ochréas très souvent prolongés par une collerette herbacée, large et ronde.

A. chinense a une aire très discontinue, montagnarde, insulaire ou himalayenne. Ses pseudocorymbes sont souvent très caractéristiques. Il en va de même pour ses ochréas, très grands, foliacés, largement bilobés ou auriculés.

A. molle semble spontané seulement dans l'Himalaya. Il ne présente pas comme ses congénères de caractéristiques végétatives notables.

1.3(3).4 = Cohors *Antenorastreae* Roberty & Vautier cohors nov.

Polygoninearum cohors fructibus plus minusve spinosis.

Nous réunissons ici trois genres à fruits diversement épineux, toujours ainsi dans deux genres, dans le troisième parfois ailé, fusiforme ou même charnu. Ce dernier appartient à un niveau inférieur de l'involution familiale, ses fruits étant formés par une concrescence, ± imparfaite, de l'hypanthie et du périanthe; les deux autres genres appartiennent à son niveau supérieur mais spécialisent, l'un ses sutures carpellaires, l'autre ses styles persistants.

Il est bien certain que ces trois genres n'appartiennent pas à une même séquence évolutive : les *Oxygonum* sont nettement archaïques; les *Harpagocarpus* dérivent très certainement des *Fagopyrum*; les *Antenoron* occupent une position très particulière, au terme d'une tendance évolutive dont les autres genres de Polygonacées n'offrent actuellement plus aucune ébauche.

1.3(3).4.(2) = *Oxygonum* Burchell ex Campdera 1819 : 18.

— .7 = Sectio *Xyloxygonum* Roberty & Vautier sect. nov. Espèce type : *O. tristachyum*; autre espèce : *O. fruticosum*.

Oxygoni sectio habitu frutescente, fructibus non alatis nec spinosis.

— .9 = Sectio *Pyroxygonum* Roberty & Vautier sect. nov. Espèce type : *O. pachybasis*.

Oxygoni sectio caespite perenni incrassatoque, culmis annuis.

— 10 = Sectio *Oxygonum* = genus *Ceratogonon* Meisn. in Wall. 1832 : 15 = *Ceratogonum* Meisn. ex Wall. 1840 : 146 = *Diplopyramis* Welw. 1859 : 1, 591. Espèce type : *O. alatum*; autre espèce : *O. atriplicifolium*.

O. acetosella Welw. 1869 : 60 = *O. alatum*. Specim. vis. : type, *Welwitsch* 1757 (Angola).

O. alatum Burchell 1822 : 548. Specim. vis. : type, *Burchell* 2074 (Afrique australe); *Welwitsch* 1755 (Angola).

O. atriplicifolium Martelli 1886 : 69 = *Ceratogonon atriplicifolium* Meisn. in Wall. 1832 : 63 = *Diplopyramis aethiopica* Welw. 1859 : 1, 591. Specim. vis. : type, *Wallich* 1719, cult. in J. Bot. Calcutta (graines dites originaires de la côte orientale d'Afrique); *Anonyme s.n.* s.d. cult. in J. Bot. Antibes, graines provenant de Madagascar, ce spécimen est pratiquement identique au type.

- O. canescens* Sond. 1850 : 100 = *O. alatum* s.l. Specim. vis. : *Galpin M-305* (Afrique australe).
- O. cordofanum* Benth. & Hook. ex Dammer 1893 : 30 = *Ceratogonon cordofanum* Meisn. 1856 : 39 = *O. atriplicifolium* s.l. Specim. vis. : type, *Kotschy 117* (Nubie); *Kotschy 94 & 95* (Kordofan).
- O. delagoense* O. Ktze. 1898 : 268 = *O. alatum* s.l. Specim. vis. : *Schlechter 12013* (Mozambique).
- O. dregeanum* Meisn. 1840 : 487 = *O. dregei* fide Meisn. 1856 : 38 = *O. alatum*.
- O. dregei* Meisn. 1856 : 38 = *O. alatum* s.l. Specim. vis. : type, *Krauss 283* (Afrique australe). Nous n'avons pu comprendre pourquoi MEISNER avait lui-même jugé utile de modifier la forme de cette épithète. Il en a résulté une effroyable confusion, notamment autour des spécimens *Zeyher 1451, 1451-a et 1451-b*; voir SONDER 1850 et GRAHAM 1957. Le problème ainsi créé nous paraît finalement aussi insoluble qu'inutile.
- O. fruticosum** Dammer ex Milne-Redhead 1933 : 142. Specim. vis. : type, *Baum 221* (Angola).
- O. junodii* De Wild. 1928 : 314 = *O. delagoense*. Specim. vis. : type, *Junod 25* (Angola Sud).
- O. leptopus* Mildbr. 1933 : 810 = *O. alatum* s.l. Specim. vis. : type, *Schlieben 2324* (Tanganyika).
- O. maculatum* Graham 1957 : 163 = *O. alatum* s.l. Specim. vis. : topotype, *Bally B-11526* (Kenya).
- O. pachybasis** Milne-Redhead 1933 : tab. 3215.
- O. Schliebenii* Mildbr. 1938 : 103 = *O. alatum* s.l. Specim. vis. : type, *Schlieben 6475* (Tanganyika).
- O. sinuatum* Dammer 1895 : 170 = *Ceratogonum sinuatum* Hochstett. & Steud. ex Meisn. 1856 : 40 = *O. atriplicifolium* s.l. Specim. vis. : type, *Schimpfer 264* (Ethiopie).
- O. tristachyum** Perrier 1936 : 59 = *Polygonum tristachyum* Bak. 1882 : 244. Specim. vis. : *Humbert & Capuron 25648* (Madagascar).
- O. tenerum* Milne-Redhead 1933 : tab. 3216, e deser. = *O. pachybasis* s.l.
- O. zeyheri* Sond. 1850 : 100 = *O. alatum* s.l. Specim. vis. : *Schlieben 5415* (Tanganyika), 7852 (Transvaal).

Le genre est très nettement défini par ses fruits à hypanthe mal séparé de la base soudée et concrescente des tépales, dont la partie supérieure, libre, non accrue, devient fanée.

En revanche, le classement des espèces est malaisé : en taxonomie car entre des fruits très différents, notamment dans l' *O. alatum* sensu lato, apparaissent des transitions continues; en nomenclature car sur cette complexité des faits s'est greffée une effroyable complication éruditionnelle. Nous avons signalé ci-avant un exemple de cette complication et notre position à ce propos, qui est celle d'une indifférence volontaire.

Quant aux faits, il semble certain que la différence entre fruits ailés, de « genre » *Oxygonum* et fruits cornus, de « genre » *Ceratogonon* est sans valeur absolue. BENTHAM (1880 : tab. 1321) décrivant avec sa minutie usuelle l' *O. alatum* sensu

stricto le dit à fruits « membranaceo-alatis vel medio-cornutis ». Nous-mêmes avons observé, sur un des fruits du spécimen *Welwitsch 1755* (*O. alatum*), des ailes bien développées mais comportant une portion médiane épaisse en forme de corne pointue. Il est par ailleurs unanimement admis (et nous-mêmes l'avons constaté) que les fruits, théoriquement fusiformes, de l'*O. dregeanum* (ou *dregei*) portaient souvent et parfois bien développées des ébauches d'aile ou de corne.

Quant à la variation des limbes foliaires elle semble, toujours dans l'*O. alatum* sensu lato, anarchique à l'extrême; ils peuvent être, en effet : entiers et lancéolés ou oblongs, sinon parfois auriculés, plus souvent découpés et parfois finement mais toujours de façon irrégulière.

Ceci admis, nous avons classé les *Oxygonum* à partir des caractéristiques et valeurs adaptatives suivantes :

- arbrisseaux buissonnants = 0 / 2 = sous-arbrisseaux herbacés;
- fruit à évaginations trilatérales, nulles = 0 / 2 = constantes et profondes;
- ces évaginations ou le corps du fruit à texture : épaisse, charnue ou indurée = 0 / 2 = membraneuse.

Sur ces données, les différentes (principales) espèces peuvent être distinguées ainsi qu'il suit.

Arbrisseaux buissonnants (.7 = <i>Xyloxygonum</i>)	
Fruits charnus, obtusément tricuspidés	<i>O. tristachyum</i>
Fruits secs, longitudinalement côtelés	<i>O. fruticosum</i>
Sous-arbrisseaux à fruit sec	
Géopyrophytiques (.9 = <i>Pyroxygonum</i>)	<i>O. pachybasis</i>
Herbacés (10 = <i>Oxygonum</i>)	
Fruit fusiforme à membraneusement triptère	<i>O. alatum</i>
Fruit trièdrique et fortement tricorne	<i>O. atriplicifolium</i>

Ces spécialisations peuvent traduire une progression du genre vers un habitat subdésertique (dans le temps plutôt que dans l'espace ?).

.7 — Les deux espèces de notre section *Xyloxygonum* sont très différentes.

O. tristachyum, endémique dans le Sud de Madagascar, a des fruits « definitely succulent » (GRAHAM 1957: 157), des rameaux mollement ligneux, aux feuilles longuement pétiolées, ovales et cuspidées.

O. fruticosum, rare en Angola et Rhodésie, est, sauf par son port, très voisin de la section suivante.

.9 — La section *Pyroxygonum* n'est ici donnée qu'à titre d'hypothèse. L'un d'entre nous a l'expérience directe des formes géopyrophytiques tropicales, qui se rencontrent dans les familles les plus diverses : *Cissus corylifolia*, *Acridocarpus orientalis*, *Combretum herbaceum*, etc. Il ne croit pas que de telles formes puissent dériver d'un ancêtre suffrutescent ni engendrer de descendants totalement herbacés; en fait, ce sont là, toujours, des formes plus ou moins fixées, dérivant d'un ancêtre lianescent ou même arbustif et souvent susceptibles d'en reprendre le port si on les protège des feux de brousse.

Nous n'avons vu aucun spécimen d'*O. pachybasis* et *O. tenerum*. En revanche les description et dessin de ces espèces, par un botaniste dont la compétence ne peut

être discutée, nous permettent d'avoir à leur sujet une opinion précise. Par tous caractères autres que ceux de leur port, à souche épaisse et pérennante, ce pourraient être là des *O. alatum* sensu lato.

Pour les raisons ci-avant indiquées, nous ne croyons pas que cette ressemblance des inflorescences et des fruits implique une proche parenté; d'où la création, provisoire et donc sans diagnose latine, d'une section dont l'espèce-type a été choisie pour son épithète, *pachybasis*, exactement descriptive.

10 — Dans la section *Oxygonum* nous distinguons deux espèces (principales).

O. alatum comprend des formes à fruits fusiformes, souvent côtelés, parfois ± triptères. Cette espèce s'étend en Afrique australe, tropicale et subtropicale; elle est, nous l'avons dit, très variable.

O. atriplicifolium peut correspondre à une extrémité de la variation précitée. Toutefois, mis à part les spécimens cultivés, cités sous *O. atriplicifolium* et de provenance plus ou moins certaine, son aire est nettement séparée de celle des *O. alatum*. On n'en signale, en effet, les formes sauvages, *O. cordofanum* et *O. sinuatum* qu'au Nord et non pas au Sud de l'Equateur, en Afrique. En outre, tous les spécimens, sauvages ou cultivés, présentent constamment des fruits très fortement tricornes et des feuilles à limbe découpé.

1.3(3).4(10) = **Antenoron** Raf. 1817: 28 = *Sunania* Raf. 1837: 95 = *Tovara* Adans. 1763: 276, 612, nom. rejic. Espèce type : *A. virginianum*; autre espèce de même section : *A. filiforme*.

[*apoense*] *Polygonum apoense* Elmer 1915: 2796 = *Tovara apoensis* Li 1952: 25 = *T. virginiana* var. *apoensis* Steward 1930: 15. tab. 1, fig. c = *A. filiforme* s.l. Specim. vis. : type, Elmer 10754 (Philippines).

A. filiforme Roberty & Vautier comb. nov. = *Polygonum filiforme* Thunb. 1784: 163 = *Sunania filiformis* Raf. 1837: 95 = *Tovara filiformis* Nakaï 1926: 8. Specim. vis. : Chiao 2863 (Chine, Chan-Tung); Delavay 5025 (Chine, Yun-Nan); Faurie 1473 (Japon).

A. racemosum Raf. 1817: 28 = *A. virginianum*.

A. virginianum Roberty & Vautier comb. nov. = *Polygonum virginianum* L. 1753: 360 = *Tovara virginiana* Raf. 1837: 12. Specim. vis. : Clark 2350 (U.S.A. Oklahoma); Poeppig s.n. [1824] (U.S.A. Pennsylvanie); Rouleau 1036 (Canada, Québec); Tracy 8767 (U.S.A. Missouri).

Le genre est bien caractérisé par ses fruits, inclus dans le périanthe persistant, prolongés par les deux styles indurés et crochus. Il comprend des sous-arbrisseaux herbacés, à inflorescences terminales, graciles et longues.

Les deux espèces peuvent être distinguées ainsi :

Inflorescences grêles, périanthe à maturité verdâtre **A. virginianum**
Inflorescences filiformes périanthe à maturité coloré **A. filiforme**

Les valeurs adaptatives prises en compte traduisent la disposition des fruits : lâche = 1 / 2 = très lâche; et la couleur à maturité du périanthe non accru : attractive = 0 / 1 = banale.

A. filiforme s'étend en Extrême-Orient, sous climat tempéré à subtropical. La forme-type en est nettement caractérisée mais elle se situe au centre d'un ensemble assez largement variable et dont les formes extrêmes peuvent être pratiquement identiques à l'espèce suivante.

A. virginianum s'étend en Amérique du Nord, occidentale, sous des latitudes et climats correspondants à ceux de l'aire de l'espèce précédente; malgré cette large dispersion elle est très peu variable.

1.3(3).4(16) = **Harpagocarpus** Hutch. & Dandy 1926 : 364. Espèce type : *H. snowdenii*.

[*ciliatus* :] *Fagopyrum ciliatum* Jacques-Félix 1946 : 409 = *H. snowdenii* s.l. Specim. vis. : type, P, Jacques-Félix 2692 (Cameroun, monts Bambutto, vers 2200 m).

H. snowdenii Hutch. & Dandy 1926 : 364. tab. : 365. Specim. vis. : BR. Bruce 356 (Tanganyika); Humbert 7423; Scaetta 745 (Congo, montagnes orientales).

Le genre, à port et aspect général de *Fagopyrum*, est caractérisé par des fruits très particuliers : l'achaine bien dégagé du périanthe non ou peu accru, ses six marges carpellaires évaginées et pectinées, chaque dent rigide et terminée par une glochidie. Les fruits sont disposés en grappes axillaires, longues et lâches, portés chacun par un pédicelle fin et nettement plus long que la bractéole ochréiforme qui le sous-tend.

Le spécimen-type a été récolté, au mont Elgon, en Uganda, vers 2.000 m d'altitude; dans un sous-bois, sur un sous-arbrisseau herbacé ± grimpant. Les spécimens vus par nous ont été récoltés en clairières de moyenne ou haute montagne, sur des sous-arbrisseaux herbacés ± prostrés.

1.3(3).5 = Cohors **Polygonastreae**.

Polygoninearum cohors media, periantho plus minusve accrescente.

Les quatre genres que nous plaçons dans cette cohorte-type ont des fruits à périanthe persistant et ± modifié; ils appartiennent à l'avant-dernier niveau de l'involution familiale.

1.3(3).5(.2) = **Polygonella** Michx. 1803 : 240 = *Lyonella* Raf. 1818 : 266 = *Lyonia* Raf. 1808 : 353, nom. rejic., non *Lyonia* Nutt. 1818, nec Ell. 1817 = *Psammogonum* Nieuwl. 1914 : 171 = *Stopinaca* Raf. 1837 : 11.

— .7 = Sectio **Thysanella** Roberty & Vautier sect. nov. = genus *Thysanella* A. Gray ex Engelmann & Gray 1845 : 24. Espèce type : *P. fimbriata*.

— .8 = Sectio **Delopyrum** Roberty & Vautier sect. nov. = genus *Delopyrum* Small 1913 : 65. Espèce type : *P. articulata*.

— .9 = Sectio **Dentoceras** Roberty & Vautier sect. nov. = genus *Dentoceras* Small 1924 : 388. Espèce type : *P. myriophylla*.

— 10 = Sectio **Polygonella** = genus *Gonopyrum* Fisch. & Mey. ex Mey. 1840 : 144. Espèce type : *P. americana*; autre espèce : *P. polygama*.

P. americana Small 1894 : 141 = *Gonopyrum americanum* Fisch. & Mey. ex Mey. 1840 : 144, tab. = *Psammogonum americanum* Nieuwl. 1914 : 171. Specim. vis. : Lindheimer 168 (Texas).

- P. articulata** Meisn. 1841 : 228 = *Psammogonium articulatum* Nieuwl. 1914 : 171
 = *Delopyrum articulatum* Small ex Rydberg 1932 : 281 = *Polygonum articulatum* L. 1753 : 363 Specim. vis. : *Blake* 10748 (U.S.A. Nevada); *Calder* 7529 (Canada, Québec).
- P. brachystachya** Meisn. 1856 : 80 = P. polygama s.l. Specim. vis. : *Cowles* S.24.19 (Floride).
- P. ciliata** Meisn. 1856 : 81 = *Delopyrum ciliatum* Small 1913 : 65 = P. articulata s.l. Specim. vis. : *Tracy* 7131 (Floride).
- P. ericoides** Engelm. & Gray 1845 : 23 = P. americana s.l. Specim. vis. : type, *Drummond* 348 (Texas).
- P. fimbriata** Horton 1963 : 190 = *Polygonum fimbriatum* Ell. 1821 : 583 = *Thysanella fimbriata* A. Gray in Engelm. & Gray 1845 : 24. Specim. vis. : *Wilbur & Webster* 2718 (Floride).
- P. gracilis** Meisn. 1856 : 80 = *Delopyrum gracile* Small 1913 : 65 = *Polygonum gracile* Nutt. 1818 : 255 non Salisb. 1796 = P. articulata s.l. Specim. vis. : *Cowles* 03.6 (Floride).
- P. meisneriana** Shattl. ex Meisn. 1856 : 81 = P. americana. Specim. vis. : type, *Rügel* s.n. [1843] (Alabama).
- P. myriophylla** Horton 163 : 196 = *Dentoceras myriophylla* Small 1924 : 389. Specim. vis. : *Small & de Winkeler* 11500 (Floride).
- P. parvifolia** Michx. 1803 : 2, 241 = P. polygama.
- P. polygama** Engelm. & Gray 1845 : 23 = *Polygonum polygamum* Vent. 1801 : 65. tab. Specim. vis. : type, *Ventenat* s.n. s.d. (U.S.A., Caroline); *Curtiss* 5525 (Floride).
- [*robusta*:] *Thysanella robusta* Small 1909 : 159 = P. fimbriata s.l. Specim. vis. : type, *Tracy* 7638 (U.S.A. Floride).

Le genre est ici défini, théoriquement, par ses tépales autour du fruit mûr : les internes seuls accrus, rarement en corbeille close, le plus souvent élargis et membraneux ou découpés.

Pratiquement, il comprend des sous-arbrisseaux herbacés à gracielement ligneux, aux tiges sèches et dures, aux feuilles généralement petites, étroites ou même aciculaires et densément voisines ; se rencontrant sur terrain sec et ensoleillé mais à proximité de mares ou de marécages. Les inflorescences sont très caractéristiques, à bractées ou bractéoles ochréiformes, contiguës ou même imbriquées en de faux épis graciles et longs. En revanche, l'accrescence du périanthe présente des modalités très diverses et passablement variables, ainsi les tépales externes, tout en demeurant mineurs comparativement aux internes peuvent être eux-mêmes non à ± accrus.

Les cinq espèces (principales) admises ici se distinguent facilement au moyen de la clef analytique suivante.

Tépales externes diversement accrus

- | | |
|---|----------------------|
| Tépales accrus ± finement découpés (.7 = <i>Thysanella</i>) | P. fimbriata |
| Tépales accrus ± largement aliformes (.8 = <i>Delopyrum</i>) | P. articulata |

Tépales externes non aceris, les internes \pm largement aliformes :

- Tépales externes non nutants (.9 = *Dentoceras*) P. *myriophylla*
- Tépales externes abruptement nutants (10 = *Polygonella*)

 - Inflorescences non abrégées ni ramifiées P. *americana*
 - Inflorescences toujours abrégées et ramifiées P. *polygama*

Nous avons admis que le développement du périanthe après l'anthèse avait un rôle de protection mais aussi de voilure; celui des inflorescences étant interprété, comme ci-dessus, dans le cadre d'une héliophytie héliophobe. Les valeurs adaptatives prises en compte traduisant donc :

- l'accroissement des tépales externes, forte = 0 / 2 = nulle;
- la découpe des tépales accrûs, profonde = 0 / 2 = nulle;
- le développement des axes florifères, allongé = 0 / 2 = abrégé, et ramifié = 0 / 2 = simple.

.7 — La section *Thysanella* se rencontre au Sud-Est des Etats-Unis. Elle comprend des plantes annuelles, à tige dure mais sèche, à feuilles éricoïdes au limbe articulé sur l'ochréa, lui-même \pm adnés à la branche-mère s'il en précède une ramification. Les tépales externes sont accrûs, moins que les internes et, comme eux mais moins finement, ils ont des marges découpées.

.8 — La section *Delopyrum* se rencontre au Nord-Est des Etats-Unis. Elle comprend des plantes annuelles, à tiges fermement herbacées, à feuilles fugaces et au limbe très étroit. Les tépales externes sont accrûs mais, autour du fruit mûr, nettement plus étroits et plus courts que les internes; ceux-ci peuvent être fonctionnellement aliformes.

.9 — La section *Dentoceras* se réduit à une espèce endémique et monotypique des dunes basses de Floride centrale: pérennante et suffrutescente, avec des tiges sèches et \pm ligneuses, des feuilles \pm oblongues, durablement persistantes, disposées en spirale très dense. Les fruits, au sommet d'un pédicelle très long, ont leur chaîne étroitement inclus dans les tépales internes seuls accrûs.

10 — La section *Polygonella* comprend deux espèces (principales), toutes deux suffrutescentes et séchement herbacées, à tépales externes nutants et tépales internes \pm largement aliformes autour du fruit mûr.

Le *P. polygama* a des feuilles spatulées, des inflorescences ramifiées, nettement abrégées sinon contractées, à bractées ochréiformes \pm étroitement contiguës.

Le *P. americana* a des feuilles aciculaires, des inflorescences \pm allongées, simples ou presque, des bractées ochréiformes très nettement imbriquées.

1.3(3).5(.4) = *Atrapaxis* L. 1753 : 333 = *Artaphaxis* P. Mill. 1754 = *Atrapax*
L. ex Scop. 1777 : 344 = *Pedalium* Adans. 1763 : 277, 589, non L. = *Tephis*
Raf. 1837 : 11, non Adans. = *Tragopyron* Marsch.-Bieb. ex Wittstein 1852 :
888 = *Tragopyrum* Marsch.-Bieb. 1819 : 284. — Espèce type : *A. spinosa*;
autres espèces, de la même section : *A. frutescens*, *A. pungens*.

- A. angustifolia* Jaub. & Spach 1844 : 15, 21. tab. 115 = *A. frutescens* s.l. Specim. vis. : type, *Aucher-Eloy* 2564 (Arménie).
- A. aucheri* Jaub. & Spach 1844 : 15, 20. tab. 114 = *A. frutescens*. Specim. vis. : type, *Aucher-Eloy* 5271, en très mauvais état; *Bormüller* 8114 (Perse).
- A. billardieri* Jaub. & Spach 1844 : 14, 17. tab. 111 = *A. pungens* s.l. Specim. vis. : *Heldreich* 617 (Grèce); *Bourgeau* 252 (Asie mineure).
- A. buxifolia* Jaub. & Spach 1844 : 14 = *Polygonum buxifolium* Marsch.-Bieb. 1808 : 300 = *Tragopyrum buxifolium* Marsch.-Bieb. 1819 : 284 = *A. frutescens* s.l. Specim. vis. : *Hohenacker* s.n. [1838] (Caucase).
- A. frutescens** Ewersm. 1823, fide Pavlov 1936 : 520 = *Polygonum frutescens* L. 1753 : 359. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; *Roschevitz* 699 (Turkestan).
- A. grandiflora* Jaub. & Spach 1844 : 15, 19. tab. 113 = *Polygonum grandiflorum* Willd. 1799 : 440 = *Tragopyrum grandiflorum* Marsch.-Bieb. 1819 : 285 = *A. frutescens* s.l. Specim. vis. : type, *Aucher-Eloy* 2565 (Asie mineure).
- A. pungens* Jaub. & Spach 1844 : 14 = *Tragopyrum pungens* Marsch.-Bieb. 1819 : 285. Specim. vis. : *Bové* 36 (Egypte, Sinaï); *Brocherel* 253 (Chine, Sin-Kiang); *Chaffanjon* 1356 (Mandchourie); *Turczaninow* s.n. [1841] (Sibérie, Minoussinsk).
- A. spinosa* L. 1753 : 333 = *Tragopyrum spinosum* Presl 1844 : 109. Specim. vis. : *Jung* s.n. [1907] (Crimée).
- A. suaedifolia* Jaub. & Spach 1844 : 15 = *A. pungens* s.l. Specim. vis. : type, mêlé à du *Polygonum aviculare*, *Aucher-Eloy* 5272 (Perse).
- A. undulata* L. = *Polygonum undulatum*.
- A. variabilis* Jaub. & Spach 1844 : 11, 16. tab. 110 = *A. pungens* s.l. Specim. vis. : *Haradjian* 1300 (Syrie Nord).

Le genre est bien défini par ses fruits largement auréolés ou encorbellés par les tépales internes, ainsi que par son port, buissonnant, et son habitat, désertique et asiatique sous climat méditerranéen à sibérien. L'espèce la plus commune, *A. pungens*, se rencontre dans toute cette aire, très étendue, sous des formes pratiquement identiques.

Avant tout, les *Atraphaxis* sont des xérophytes. Nous y avons reconnu trois espèces (principales), d'après la clef analytique suivante :

Rameaux spinescents absents ou florifères

Les rameaux spinescents toujours absents ; toujours 3 tépales acrus ; feuilles \pm coriaces, ovales à linéaires **A. frutescens**

Les rameaux florifères souvent spinescents ; parfois 2 tépales acrus (mais le plus souvent 3) ; feuilles \pm charnues, obovées à minimes **A. pungens**

Rameaux spinescents nombreux et stériles ; toujours 2 tépales acrus **A. spinosa**

Les valeurs adaptatives, compensées, prises en compte sont fondées sur :

le nombre des tépales, 4 dont 2 accrus = 0 / 2 = 5 dont 3 accrus;
les rameaux spinescents, absents = 0 / 2 = présents et stériles.

Les rameaux épineux sont un classique indice de xérophytie. Quant au nombre des tépales, nous considérons que l'unité de propagation est véhiculée par le vent,

non pas en planant mais en roulant sur le sol; ce dont les *Calligonum* nous fourniront ci-après des exemples très caractéristiques. Ainsi, la forme en corbeille, à 3 tépales, constitue-t-elle un dispositif anémochore plus efficace que la forme simplement diptère.

A. frutescens est un buisson non épineux, passablement polymorphe. La forme-type en est aussi la forme centrale, peu différenciée. *A. grandiflora*, souvent cultivé comme plante d'ornement, a effectivement des fleurs nettement majeures, en outre des feuilles ovales. Chez *A. angustifolia* les feuilles sont étroitement lancéolées, les fleurs assez grandes, ce qui différencie cette forme de celle nommée *A. aucheri* où les fleurs sont petites. *A. buxifolia* est caractérisé par des feuilles petites et très coriaces, rappelant celles du buis.

A. pungens, sous sa forme-type, est un buisson aux rameaux florifères ± spinescents. Nous lui rattachons, tout au moins par hypothèse provisoire, les formes hyperxérophytiques «en tabouret», *A. billardieri*, ou halophytiques et ± naines avec des feuilles petites et ± charnues, *A. suaedifolia*.

A. spinosa, souvent surabondamment florifère, très fortement épineux, semble peu variable. Assez rare dans la nature, semble-t-il, en revanche il est assez souvent cultivé en haies vives, de défense et d'ornement.

1.3(3).5(10) = **Polygonum** L. 1753 : 359 = *Poligonon* L. ex St.-Lager 1880 : 113 & 132 = *Polygonum* L. ex Neck. 1768 : 1, 183. Espèce type : *P. aviculare*.

— .6 = Sectio **Aconogonium** Meisn. 1826 : 43 = genus *Aconogonium* Reichenb. 1837 : 236 = *Gononcus* Raf. 1837 : 16. Espèce type : *P. divaricatum*.

— .7 = Sectio **Bistorta** L. 1753 : 360 (linneon); Meisn. 1826 : 43 = genus *Bistorta* Adans. 1763 : 2, 277, 525 = *Colubrina* Montandon 1856 : 268, non L. C. Rich. Espèce type : *P. bistorta*; autres espèces : *P. amplexicaule*, *P. vaccinifolium*.

— .8 = Sectio **Persicaria** Meisn. 1826 : 43 = genus *Persicaria* P. Mill. 1754 = *Amblygonum* Reichenb. 1837 : 236 = *Chulusium* Raf. 1837 : 14 = *Dioctis* Raf. 1837 : 15 = *Discolenta* Raf. 1837 : 15 = *Goniaticum* J. Stokes 1812 : 338 = *Hepatarina* Raf. 1837 : 15 = *Lagunaena* Lour. ex Ritgen 1831, 2 : 135 = *Laginea* Lour. 1790 : 219, 220 = *Mitesia* Raf. 1837 : 15 = *Peutalis* Raf. 1837 : 14 = *Pogalis* Raf. 1837 : 15. Espèce type : *P. persicaria*; autre espèce *P. orientale*.

— .9 = Sectio **Echinocaulon** Meisn. in Wall. 1832 : 58 = genus *Echinocaulon* Spach 1841 : 521 = *Cephalophilum* Börner 1912 : 276 = *Echinocaulos* Spach ex Hassk. 1844 : 85 = *Tracaulon* Raf. 1837 : 13 = *Truellum* Houtt. 1777, 2 (8) : 427. Espèce type : *P. sagittatum*.

— 10 = Sectio **Cephalophilon** Meisn. in Wall. 1832 : 59 = genus *Cephalophilon* Meisn. in Spach 1841 : 521. Espèce type : *P. capitatum*; autre espèce : *P. nepalense*.

— 11 = Sectio **Eleutherosperma** Hook.f. 1886 : 24. Espèce type : *P. delicatulum*.

— 12 = Sectio **Polygonum** = *Avicularia* Meisn. in Steud. 1840, 1 : 174 = *Centinodia* Reichenbach 1837 : 236 = *Centinodium* Montandon 1856 : 270 = *Cnopus*

Raf. 1837 : 13 = *Duravia* Greene 1904 : 23 = *Pleurostena* Raf. 1837 : 12. Espèce type : *P. aviculare*.

— 13 = Sectio *Tephis* Meisn. 1856 : 84 = genus *Tephis* Adanson 1763 : 276. Espèce type : *P. undulatum*.

P. acaule Hook.f. 1885. tab. 1490 e descr. = *P. divaricatum* s.l.

P. acetosifolium Vent. = Muehlenbeckia australis s.l.

P. acuminatum H. B. K. 1817 : 178 = *Chulusium acuminatum* Raf. 1837 : 14 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Roberty 13744* (Côte d'Ivoire).

P. adpressum Labill. = Muehlenbeckia australis.

P. affine D. Don 1825 : 70 = *P. bistorta* s.l. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; *Zimmermann 1481* (Népal).

P. alaskanum Wight ex Hulten 1944 : 610 = *P. alpinum* var. *alakanum* Small 1895 : 33 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : *Mexia 2163* (Alaska).

P. alpinum All. 1785 : 206. tab. 68, fig. 1 = *Pleuropteropyrum alpinum* Kitagawa 1937 : 295 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; *Baker 1379* (U.S.A. Nevada); *Becherer s.n.* [1950] (Valais); *Faurie 20687* (Japon); *Meebold 3905* (Cachemire); *Sintenis 7068* (Arménie); *Sovetkina s.n.* s.d. (Kirghiztan).

P. amphibium L. 1753 : 361 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Vautier 180* (lac de Neuchâtel).

P. amplexicaule D. Don 1825 : 70. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; *Schmid 228* (Cachemire).

P. angustifolium Pall. 1776 : 230 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : *Popov & Andreeva 3807* (Sibérie, Transbaïkalie).

P. apoense Elmer = *Antenoron filiforme* s.l.

P. arenarium Waldst. & Kit. 1801 : 69. tab. 67 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : *Hohenacker s.n.* [1838] (Caucase).

P. argyrocoleon Steud. ex Kunze 1847 : 17 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : type, *Kotschy 440* (Irak).

P. arifolium L. 1753 : 364 = *Tracaulon arifolium* Raf. 1837 : 3, 13 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis. : *Fernald 205* (U.S.A. Maine).

P. articulatum L. = *Polygonella articulata*.

P. asperulum Wall. ex Meisn. in Wall. 1832 : 58 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis. : type, *Wallich 1724* (Népal).

P. atraphaxoides Thunb. 1794 : 77 = *P. undulatum*.

P. aubertii = *Bilderdykia multiflora* s.l.

P. australe = Muehlenbeckia australis.

P. aviculare L. 1753 : 362. Specim. vis. : Ubiquiste, commun en Suisse et en France.

P. axillare Hook.f. = Muehlenbeckia complexa s.l.

P. baldschuanicum Regel = *Bilderdykia baldschuanica*.

P. barbatum L. 1753 : 362 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Gressitt 796* (Chine, île de Haï-Nan).

P. bellardii All. 1785 : 207. tab. 90, fig. 2 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : *Lange 178* (Espagne, Castille); *Meyers & Dinsmore 5250* (Palestine).

- P. bidwelliae* S. Wats. 1879 : 294 = *Duravia bidwelliae* Greene 1904 : 23 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : type, *Bidwell s.n.* [1878] (Californie).
- P. bistorta* L. 1753 : 360. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève, commun dans les prairies de montagne, notamment en Suisse et en France.
- P. bolanderi* Brewer ex A. Gray 1872 : 400 = *Duravia bolanderi* Greene 1904 : 23 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : *Heller 11584* (Californie).
- P. californicum* Meisn. 1856 : 100 = *Duravia californica* Greene 1904 : 23 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : type, *Hartwegg 1944* (Californie).
- P. campanulatum* Hook.f. 1886 : 51 = *Reynoutria campanulata* Moldenke 1941 : 675 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : *Forrest 24622* (Chine SW); *Wyss-Dunant 1197* (Népal).
- P. capitatum* Hamilt. ex D. Don 1825 : 73. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; *Stewart & Cheo 82* (Chine, Kwang-Si).
- P. cashmirensis* H. Gross 1913 : 2, 342 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : *Rechinger 4199* (Perse).
- P. chinense* L. = *Ampelygonum chinense*.
- P. chinense* Houtt. non L. = *Bilderdykia multiflora*.
- P. chlorocoleon* Steud. = *P. chlorocoleum* Boiss. 1879 : 1034 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : type, *Kotschy 231* (Kurdistan).
- P. cilinode* Michx. = *Bilderdykia convolvulus* s.l.
- P. coarctatum* Dougl. ex Meisn. 1856 : 101 = *P. aviculare*. Specim. vis. : *Piper 1853* (U.S.A. Washington).
- P. complexum* Cunn. = *Muehlenbeckia complexa*.
- P. convolvulus* L. = *Bilderdykia convolvulus*.
- P. cristatum* Engelm. & Gray = *Bilderdykia scandens* s.l.
- P. cunninghamii* F. v. M. = *Muehlenbeckia juncea* s.l.
- P. cuspidatum* Sieb. & Zucc. = *Reynoutria japonica*.
- P. cyanandrum* Diels 1912 : 257 = *P. delicatulum* s.l. Specim. vis. : *Soulié 106, 307* (Tibet oriental).
- P. cymosum* Trev. = *Fagopyrum esculentum* s.l.
- P. delicatulum* Meisn. 1856 : 127. Specim. vis. : *Polunin & al. 5307* (Népal).
- P. diclinum* F. v. M. = *Muehlenbeckia australis* s.l.
- P. divaricatum* L. 1753 : 363 = *Pleuropteropyrum divaricatum* Nakaï 1926 : 296. Specim. vis. : *Faurie 556* (Corée); *Turczaninow s.n.* [1830] (Sibérie orientale).
- P. douglasii* Greene 1885 : 125 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : *Heller 12769* (Californie).
- P. dumetorum* L. = *Bilderdykia dumetorum*.
- P. ephedroides* Hook. f. = *Muehlenbeckia juncea* s.l.
- P. equisetiforme* Sibth. & Smith 1809 : 266 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : *Bourgeau 430* (Espagne).
- P. erectum* L. 1753 : 363 = *P. aviculare* var. *erectum* Roth ex Meisn. 1826 : 88.
- P. fagopyrum* L. 1753 : 364 = *Fagopyrum esculentum*.

- P. filicaule* Wall. ex Meisn. in Wall. 1832 : 59 = *Koenigia nepalensis* D. Don 1825 : 74 = *P. delicatulum* s.l. Specim. vis. : *Ludlow & al.* 16726 (Bhutan).
- P. filiforme* Thunb. = *Antenoron filiforme*.
- P. fimbriatum* Ell. = *Polygonella fimbriata*.
- P. fistulosum* Perr. in sched. = *P. senegalense* Specim. vis. : type, *Perrottet s.n.* [1825] (Sénégal).
- P. forrestii* Diels 1912 : 258 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : *Rock* 22244 (Tibet S-E).
- P. frondosum* Meisn. = *Ampelygonum molle*.
- P. frutescens* L. = *Atraphaxis frutescens*.
- P. fruticosum* Walp. = *Muehlenbeckia complexa* s.l.
- P. gilesii* Hemsley = *Fagopyrum gilesii* s.l.
- P. glabrum* Willd. 1799 : 447 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Schlieben* 826 (Tanganyika).
- P. gracile* Salisb. 1796 : 259 = *P. persicaria* s.l.
- P. gracile* Nutt. non Salisb. = *Polygonella articulata* s.l.
- P. gracilipes* Hemsley = *Fagopyrum gilesii* s.l.
- P. graminifolium* Wierzb. ex Meisn. 1856 : 95 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : *Schulz* 2982 (Serbie).
- P. grandiflorum* Willd. = *Atraphaxis frutescens* s.l.
- P. grandiflorum* Bertol. = *Antigonon leptopus* s.l.
- P. hirsutum* Walt. 1788 : 132 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Tracy* 6844 (Floride).
- P. hispidum* H. B. K. 1817 : 178 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Hassler* 2667-a (Paraguay).
- P. hookeri* Meisn. 1866 : 352 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : type, *Hooker* 70 (Sikkim).
- P. hydropiper* L. 1753 : 361 = *P. persicaria* s.l. Specimen. vis. : banal en Suisse et en France.
- P. hydropiperoides* Michx. 1803 : 1, 239 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Baehni* 64 (U.S.A. Indiana).
- P. islandicum* Hook. f. = *Koenigia islandica*.
- P. islandicum* Meisn. ex Small 1895 : 108, non Hook. f. = *P. aviculare* s.l.
- P. japonicum* Meisn. 1856 : 112 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : type, *Zollinger* 205 (Japon).
- P. junceum* Cunn. = *Muehlenbeckia juncea*.
- P. junceum* Ledeb. 1850 : 529, non Cunn. = *P. aviculare* s.l.
- P. kelloggii* Greene 1891 : 134 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : topotype, *Heller* 14456 (Californie).
- P. koul* Leprieur in sched. = *P. pulchrum*. Specim. vis. : type, *Leprieur* s.n. [1827] (Sénégal).
- P. lanigerum* R. Br. 1810 : 419 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Roberty* 7223 (Guinée, Sigiri).
- P. lapathifolium* L. 1753 : 360 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : Ubiquiste, commun en Suisse et en France.
- P. laxmannii* Lepechin 1797 : 414 & tab. 13 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : *Turczaninow* s.n. [1830] (Sibérie, lac Baïkal).

- P. leptopodium* Diels = *Fagopyrum gilesii* s.l.
- P. limbatum* Meisn. 1856: 123 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis.: *Roberty 10394* (Mali).
- P. macrophyllum* D. Don 1825: 70 = *P. bistorta* s.l. Specim. vis.: *Schneider 2206* (Yun-Nan), *Zimmermann 1478* (Népal).
- P. mairei* Léveillé = *Fagopyrum gilesii* s.l.
- P. maritimum* L. 1753: 361 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis.: *Guinea 3442* (Espagne, Biscaye); *Rechinger 16370* (Grèce).
- P. microcephalum* Don 1825: 72 = *P. capitatum* s.l. Specimen. vis.: *Biswas 9312* (Himalaya Est).
- P. minus* Huds. 1762: 148 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis.: Ubiquiste, peu commun en Suisse et en France.
- P. mite* Schrank 1789: 668 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis.: banal en Suisse et en France.
- P. molle* D. Don = *Ampelygonum molle*.
- P. molliforme* Boiss. 1846: 84 = *P. aviculare* s.l. type: *Kotschy 778* (Perse).
- P. multiflorum* Thunb. = *Bilderdykia multiflora*.
- P. muricatum* Meisn. 1826: 74 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis.: type, *Wallich 1697-1, 1697-2* (Népal).
- P. nepalense* Meisn. 1826: 84. tab. 7, fig. 2. Specim. vis.: *Fan & Li 634* (Chine); *Schimpfer 293* (Abyssinie); *Schoch 262* (Yun-Nan); *Zimmermann 1387* (Népal).
- P. nummulariifolium* Meisn. 1856: 127 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis.: *Smith & Cave 2514* (Sikkim).
- P. ochreatum* L. 1753: 361 = *P. divaricatum*.
- P. orientale* L. 1753: 362 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis.: *Maire s.n. [1912]* (Chine, Yun-Nan).
- P. palmatum* Dunn 1912: 341 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis.: *Tsang 23124* (Chine, Kwang-Si).
- P. paniculatum* Blume = *Ampelygonum molle*.
- P. paronychia* Cham. & Schlecht. 1828: 51 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis.: *Rose 56094* (Californie).
- P. paronychioides* C. A. Mey. in Hohenacker 1838: 356 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis.: *Schmid 275* (Cachemire).
- P. patulum* Marsch.-Bieb. 1808: 304 = *P. aviculare*. Specim. vis.: *Aellen 848* (Perse N).
- P. pedunculare* Wall. ex Meisn. in Wall. 1832: 58 = *P. strigosum*. Specim. vis.: type, *Wallich 1718* (Inde N).
- P. pennsylvanicum* L. 1753: 362 = *Dioctis pennsylvanica* Raf. 1837: 15 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis.: *Heller 14236* (U.S.A. Pennsylvanie).
- P. perfoliatum* L. = *Ampelygonum perfoliatum*.
- P. persicaria* L. 1753: 361. Specim. vis.: Ubiquiste, commun en Suisse et en France.
- P. phytolaccifolium* Meisn. ex Small 1892: 360 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis.: *Kruckerberger 3189* (U.S.A. Idaho).

- P. pilosum* Maxim. ex Forbes & Hemsley 1891 : 345 = *Koenigia pilosa* Maxim. 1881 : 531 = *P. delicatulum* s.l. Specim. vis. : *Ludlow & Sheriff* 8923 (Tibet); *Potanin* s.n. [1885] (Chine, Kan-Su).
- P. platycladum* F. v. M. = *Muehlenbeckia platyclada*.
- P. plebeium* R. Br. 1810 : 420 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis. : *Chevalier* 749 (Mali, Sikasso).
- P. polygamum* Vent. = *Polygonella polygama*.
- P. polymorphum* Ledeb. 1850 : 524 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : *Karo* 27 (Sibérie, Dahurie).
- P. polystachyum* Wall. ex Meisn. in Wall. 1832 : 61 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : type, *Wallich* 1686 (Himalaya).
- P. pterocarpum* Wall. = *Bilderdykia scandens* s.l.
- P. pulchrum* Blume 1826 : 530 = *P. persicaria* s.l. Specimen, vis. : *Snowden* 1762 (Uganda).
- P. ramosissimum* Michx. 1803 : 1, 237 = *Cnopus ramosissimum* Raf. 1837 : 13 = *P. aviculare* var. *erectum*.
- P. repens* Wall. ex Meisn. 1832 : 60 = *P. capitatum* s.l. Specim. vis. : type, *Wallich* 1699 (Assam).
- P. rude* Meisn. = *Ampelygonum molle*.
- P. runcinatum* Hamilt. ex D. Don 1825 : 73 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis. : *Wallich* 1698 (Népal).
- P. sachalinense* Schmidt = *Reynoutria japonica* s.l.
- P. sagittatum* L. 1753 : 363 = *Tracaulon sagittatum* Small 1903 : 381. Specim. vis. : *Fan & Li* 535 (Chine, Hou-Nan); *Faurie* 1158 (Japon); *Karo* 117 (Sibérie Est); *Victorin & al.* 46656 (Canada, Québec).
- P. salicifolium* Brouss. ex Willd. 1809 : 428 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Abdul Khalil* s.n. [1896] (Birmanie Nord), *Asplund* 746 (Îles Canaries), *Gautier* 4237 (Languedoc), *Hildebrandt* 2912 (Madagascar), *Roberty* 10455 (moyen Niger), 12295 (basse Côte d'Ivoire).
- P. scandens* L. = *Bilderdykia scandens*.
- P. senegalense* Meisn. 1826 : 54 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis. : *Roberty* 3229 (Mali, Goundam); 10184 (Mali, Bamako); 10814 (Guinée).
- P. senticosum* Franch. & Sav. 1875 : 401 = *Chylocalyx senticosum* Meisn. in Miq. 1865 : 65 = *Truellum* Houtt. 1777 : 427. tab. 48 = *T. senticosum* Danser 1926 : 31. = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis. : *Hb. Burmann* « *Truellum mihi* », G. (Japon); *Lau* 4800 (Chine, Kiang-Si).
- P. sericeum* Pall. 1776 : 286 = *P. divaricatum* s.l. Specim. vis. : *Hb. Burmann*, *Demidoff* s.n. s.d. (Sibérie).
- P. serratum* L. 1753 : 360 = Bistorte « folio oblongo crenato... habitat in Mauritania »; rien de tel n'a été retrouvé en Mauritanie ou Afrique du Nord : nomen dubium.
- P. serrulatum* Lag. 1816 : 14 = *P. persicaria* s.l.
- P. sieboldii* Meisn. 1856 : 133 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis. : *Odashima* 17826 (Japon).

- P. spergulariiforme* Meisn. ex Small 1892: 366 = *P. aviculare* s.l. Specim. vis.: *Harris, Ludwig & Tracy* 942 (Californie).
- P. sphaerocephalum* Wall. ex Meisn. in Wall. 1832: 60 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis.: type, *Wallich* 1703 (Himalaya).
- P. sphaerostachyum* Meisn. 1826: 53 = *P. macrophyllum* fide Meisn. 1856: 125.
- P. statice* Léveillé = *Fagopyrum gilesii* s.l.
- P. staticiflorum* Wall. ex Meisn. 1832: 60 = *P. microcephalum*. Specim. vis.: type, *Wallich* 1704-1 (Népal).
- P. strictum* Ledeb. 1830: 86 = *P. aviculare*. Specim. vis.: *Turczaninoff* s.n. [1829] (Sibérie, Transbaïkalie).
- P. strigosum* R. Br. 1810: 420 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis.: *Merrill* 730 (Chine, Kwan-Tung).
- P. tannifolium* = *Muehlenbeckia australis* s.l.
- P. tataricum* L. = *Fagopyrum esculentum* s.l.
- P. thunbergii* Sieb. & Zucc. 1846: 208 = *P. sagittatum* s.l. Specim. vis.: *Hb. Burmann* « *Polygonum sagittatum* ? », G. (Japon); *Hooker & Thomson* « *Polygonum* (58) » (Assam).
- P. tinctorium* Ait. 1789: 31 = *P. persicaria* s.l. Specim. vis.: *Iisiba* s.n. [1908] (Japon).
- P. tomentosum* Schrank 1789: 689; Willd. 1799: 447 = *P. persicaria* s.l.
- P. tripterocarpum* A. Gray = *Pleuropteropyrum tripterocarpum*.
- P. tristachyum* Bak. 1882: 244 = *Oxygonum tristachyum*.
- P. tristachyum* Léveillé 1912: 297 = *Fagopyrum esculentum* s.l.
- P. tubulosum* Boiss. 1846: 83 = *P. aviculare* s.l.! *Kotschy* 48 & 500 (Perse).
- P. undulatum** Berg. 1767: 135 = *Atraphaxis undulata* L. 1753: 333 Specim. vis.: *Schlechter* 9759 (Afrique du Sud).
- P. undulatum* Murray 1775: 34. tab. 5, non Berg. = *P. divaricatum* s.l.
- P. urophyllum* Bur. & Franch. = *Fagopyrum gilesii* s.l.
- P. uvifera* L. = *Coccoloba uvifera*.
- P. vacciniifolium** Wall. ex Meisn. in Wall. 1832: 54. Specim. vis.: type, *Wallich* 1695 (Himalaya S); *Zimmermann* 1441 (Népal).
- P. virginianum* L. = *Antenoron virginianum*.
- P. viviparum* L. 1753: 360 = *P. bistorta* L. s.l. Specim. vis.: *Vautier* 100 (Suisse, Grisons).
- P. volcanicum* Benth. = *Muehlenbeckia complexa* s.l.
- P. wallichii* Meisn. 1826: 23 & tab. 7,1 = *P. capitatum* s.l. Specim. vis.: type, *Wallich* 1702 (Népal).
- P. weyrichii* Schmidt = *Pleuropteropyrum weyrichii*.

Le genre est défini par l'indifférenciation de ses quatre caractéristiques, celle-ci n'allant pas sans quelque variabilité, ce qui fait de ce genre-type un genre central et mal séparé d'un assez grand nombre de ses voisins, notamment : *Ampelygonum*, *Polygonella*, *Fagopyrum*, *Pleuropteropyrum* et *Bilderdykia*.

Il va de soi qu'entre les groupes rejetés ici en sections et non pas traités en genres distincts, les solutions de continuité sont très souvent plus incertaines encore. Ainsi la clef ci-après, menant aux huit sections et aux douze espèces (princi-

pales) que nous avons admises, ne conduit avec certitude qu'aux formes centrales de ces unités d'analyse.

Inflorescences visiblement terminales ou sinon pseudoaxillaires (au terme de rameaux \pm abrégés), nettement séparées des feuilles qui les précèdent, ces feuilles parfois \pm réduites

Inflorescences composées, les rameaux florifères toujours (mais parfois très brièvement) divisés (.6 = *Aconogonium*) **P. divaricatum**

Inflorescences simples, les pédoncules nus parfois divisés (mais toujours bien en deçà des premières fleurs) :

Toutes les inflorescences visiblement terminales (.7 = *Bistorta*) :

Au sommet d'une tige herbacée à feuilles basales **P. bistorta**

Au sommet de plusieurs branches, à feuilles alternes

Ces branches ligneuses, les feuilles petites **P. vaccinifolium**

Ces branches fistuleuses, les feuilles grandes **P. amplexicaule**

Certaines des inflorescences apparemment axillaires

Inflorescences nettement plus longues que larges (.8 = *Persicaria*)

Fleurs majeures et toujours d'un rose vif **P. orientale**

Fleurs moyennes (sinon mineures) et généralement d'un rose pâle (sinon blanches ou même verdâtres) **P. persicaria**

Inflorescences sensiblement aussi larges que longues

Inflorescences en majorité visiblement terminales, pluriflores à parfois multiflores

Rameaux à entrenœuds toujours allongés et généralement couverts d'aiguillons rétroflechis (.9 = *Echinocaulon*) **P. sagittatum**

Rameaux à entrenœuds non allongés et toujours dépourvus d'aiguillons rétroflechis (10 = *Cephalophilon*)

Inflorescences en agglomérats irréguliers, généralement subsessiles **P. nepalense**

Inflorescences en capitules réguliers, gracielement pédonculés . . **P. capitatum**

Inflorescences en majorité apparemment axillaires, pauciflores à pauvrement pluri-flores (11 = *Eleutherosperma*) **P. delicatulum**

Fleurs visiblement axillaires ou sinon pseudoterminales (au sommet de rameaux \pm contractés), non séparées des feuilles qui les précèdent, ces feuilles parfois \pm modifiées

Sous-arbrisseaux herbacés, \pm graciles ou prostrés (12 = *Polygonum*) . . **P. aviculare**

Sous-arbrisseaux ligneux, \pm trapus et dressés (13 = *Tephis*) **P. undulatum**

Nous distinguons ainsi : d'une part, des cryo- ou scia-phytes, d'autre part, des thermo- ou héliophytes; de façon, d'ailleurs, assez peu certaine; les *Polygonum* des principales sections, *Persicaria* et *Polygonum* s.s. sont en réalité des ubiquistes, \pm paludicoles dans le premier groupe, \pm rudérales dans le second. Les *Aconogonium*, en revanche, sont toujours des cryophytes et les *Tephis* toujours des xérophytes.

Les valeurs adaptatives prises en compte traduisent :

le développement caulinaire, à entrenœuds, allongés = 0 / 2 = abrégés;

la localisation des inflorescences, terminales = 0 / 2 = axillaires;

leur position relativement au feuillage, dégagée = 0 / 2 = protégée;

le développement de l'axe florifère, allongé = 0 / 2 = contracté ou nul (les fleurs fasciculées sinon solitaires);

le périanthe, vivement coloré autour du fruit mûr = 0 / 1 = non ainsi.

.6 — La section *Aconogonium* s'étend sur toute la Sibérie. Elle y présente des formes \pm fixées : à feuilles étroites, *P. divaricatum* s.s.; à port \pm traînant, *P. laxmannii*; à indument végétatif soyeux, *P. sericeum*.

Au-delà du détroit de Behring, l'aire du *P. divaricatum* s.l. se prolonge, en Alaska et jusque vers la partie centrale des Montagnes Rocheuses par des formes à feuilles majeures : *P. alaskanum*, *P. phytolaccifolium*.

Dans l'Himalaya, ont été trouvées de nombreuses formes souvent très caractérisées : *P. forrestii*, macranthe et latifoliée, ressemblant un peu à un cyclamen ; *P. hookeri* à feuilles et inflorescences disposées en petits bouquets assez distants au long d'une tige traînante ; *P. nummulariifolium* dont chaque individu forme, en haute montagne, un très typique « tabouret » parfois minuscule.

En haute montagne dans l'hémisphère Nord, en Eurasie et en Amérique, le *P. alpinum*, à feuilles assez larges, est banal sinon commun.

Entre ces diverses aires et dans elles se rencontre le très justement nommé *P. polymorphum* dont les peuplements présentent une variabilité comparable à celle de l'espèce, formes himalayennes exclues.

.7 — Dans la section *Bistorta* nous reconnaissions trois espèces principales ; toutes ne se rencontrent qu'en montagne, haute ou moyenne, d'Europe, Asie et Alaska.

P. bistorta s.s. s'étend sur presque toute cette aire. La forme-type est nettement caractérisée par sa tige longuement nue, l'inflorescence nettement séparée du feuillage. *P. viviparum* en est une forme très particulière, à fleurs presque blanches et non pas d'un rose franc ou même vif; en outre, la plupart des bourgeons floraux se transforment en bulbilles. *P. macrophyllum* se rattache à l'espèce-type mais la tige florifère est beaucoup moins longuement dégagée du feuillage et l'inflorescence, d'un rose vif, est en ovale arrondi, non pas allongée. *P. vaccinifolium*, à port et feuilles de myrtille, est localisée dans l'Himalaya ; ses inflorescences, longues et vivement colorées succèdent presque immédiatement aux feuilles supérieures. *P. amplexicaule* se situe près de la limite des bistortes et des persicaires ; c'est un haut buisson herbacé, abondamment rameux, à inflorescences précédées par un long pédoncule nu.

.8 — Nous avons admis deux espèces (principales) dans la section *Persicaria*.

P. orientale se situe assez près de la limite des persicaires et des bistortes. La forme-type est un haut buisson herbacé, à inflorescences très denses et vivement colorées, fruits nettement majeurs ; on la trouve en Extrême-Orient, tropical, subtropical et montagnard ; le *P. tinctorium*, de Chine et Japon, s'en différencie par ses inflorescences irrégulièrement discontinues.

P. persicaria se rencontre sur toute la surface du globe, climats très froids seuls exclus, en terrain humide, ruisseaux, canaux, marais, etc. Il en a été décrit un très grand nombre de formes, principalement tropicales, « espèces » nominales plutôt que réelles.

Certaines de ces formes ont été spécifiées en raison de leur indument végétatif : soyeux, *P. pulchrum*; nul *P. glabrum*; hirsute, *P. hirsutum*; râche, *P. hispidum*; laineux, *P. lanigerum*... Dans les marais du moyen Niger, la gamme complète de ces variations vestimentaires peut se trouver rassemblée à l'intérieur d'un seul et même peuplement ; en outre, ces variations peuvent être liées à l'âge de la plante ou même de ses rameaux : l'un de nous y a observé que des feuilles typiquement de forme « *lanigerum* », densément recouvertes d'une laine gris pâle, pouvaient, parvenues à un certain âge, devenir

typiquement de forme « *glabrum* » après avoir été agitées par le vent ou la main d'un botaniste.

D'autres « espèces » ont été fondées sur une particularité de l'ochréa : prolongé par un limbe foliacé, *P. limbatum*; ou encore par de longues pointes sétuleusement rigides, *P. salicifolium*; parfois tubulaire et glabre, *P. lapathifolium*; parfois barbu et plutôt évasé, *P. barbatum*... Ces microcaractéristiques, étudiées sur le vif, ne sont pas constantes; elles peuvent servir à définir des génotypes, non pas à définir des écotypes ni donc des espèces au sens utile de ce mot.

Cette même variation sur le vif a été observée par l'un de nous, dans les marges des lacs helvétiques et non plus dans les marais ouest-africains, entre le *P. persicaria* proprement dit et le groupe, à fleurs typiquement plus petites, pâles et distantes, qui réunit : *P. hydropiper* à feuilles poivrées, *P. mite* à feuilles non poivrées, *P. minus* à inflorescences filiformes, etc.

.9 — La section *Echinocaulon* est définie à première vue par des aiguillons rétrobarbelés, dont nous avons déjà signalé qu'ils se rencontraient assez généralement sur les *Ampelygonum perfoliatum*. Les formes que nous réunissons ici dans une seule (grande) espèce ont en outre des feuilles à limbe souvent très caractéristique : palmairement lobé, *P. palmatum*; basalement hasté à trilobé, *P. thunbergii*; sagitté longuement, *P. sagittatum* s.s., ou largement, *P. arifolium*; banalement lancéolé, *P. pedunculare*... Les inflorescences, généralement géminées, parfois solitaires, parfois en fausses grappes à feuilles \pm réduites chez certaines formes particulièrement vigoureuses, peuvent être largement et \pm régulièrement capitées à très irrégulièrement sphéroïdes ou ovoïdes. Les aiguillons rétrofléchis sont particulièrement abondants et piquants chez les *P. arifolium*, très variablement nombreux et développés chez les *P. strigosum*, souvent \pm totalement absents chez les *P. runcinatum*...

Presque toutes les formes connues de cette section sont présentes dans les montagnes d'Asie subtropicale. En outre, le *P. sagittatum* sensu stricto se rencontre depuis la Sibérie centrale jusqu'à l'Est du Canada mais aussi en Floride et en Assam. Le *P. pedunculare* a une aire tropicale, en Afrique, en Asie et en Australie mais, en Afrique tout au moins, seulement au-dessus de 600 à 800 mètres d'altitude. Le *P. arifolium* n'a été récolté qu'aux Etats-Unis; des transitions continues le relient à la forme-type. Quant aux formes à feuilles grandes et diversement découpées, *P. palmatum*, *P. thunbergii*, etc., elles semblent localisées sur le pourtour de la Mer Jaune.

10 — Nous distinguons deux espèces (principales) dans la section *Cephalophilon*.

P. nepalense peut être considéré comme se situant à la limite des *Cephalophilon*, et avec les *Echinocaulon* et même avec les persicaires. C'est une espèce banale sinon commune entre les tropiques, en Afrique et en Asie : gracile, ascendante ou prostrée; à feuilles ovales, souvent pseudopétiolées au-delà de leur ochréa; les capitules, terminaux ou subterminaux, en général ovoïdes et petits, étroitement géminés, d'un rose \pm vif.

P. capitatum peut être considérée comme une forme extrême de l'espèce précédente, comme elle sans doute originaire de l'Himalaya mais y demeurant confinée et s'y pulvérisant en jordanons \pm distincts. La forme-type a des tiges rampantes,

des branches florifères dressées, nombreuses, densément feuillues, terminées par des capitules \pm sphériques de fleurs dont les tépales deviennent d'un rose vif; elle est cultivée avec succès, comme plante d'ornement, au Jardin Botanique de Genève. *P. microcephalum* en est une forme à très petits capitules.

11 — La section *Eleutherosperma* se caractérise par des inflorescences très pauvres et brièvement pédonculées, localisées vers le sommet des tiges et paraissant axillaires; ainsi relie-t-elle les sections précédentes aux suivantes.

On la rencontre dans tout l'Himalaya et, au Nord, jusque dans le Kan-Su. La forme-type, *P. delicatulum*, est une petite annuelle, à port et aspect général de *Koenigia*, à feuilles très petites et glabres; les feuilles du *P. filicaule* sont ovales et \pm râchement hispides sur leurs deux faces; celles du *P. pilosum* sont ovales et marginalement ciliées.

12 — La section *Polygonum* se rencontre sur toute la surface du globe mais avec une seule forme tropicale et plutôt rare, *P. plebeium*. Il en a été décrit un très grand nombre de formes, généralement érigées en espèces. Nous avons cru assez longtemps qu'il était possible de reconnaître deux espèces (principales): d'une part, le *P. aviculare* sensu stricto, à port traînant; d'autre part, le *P. erectum* à port dressé; en fait, ces deux formes extrêmes, comme l'avait déjà constaté ROTH (ex MEISNER 1826), ne sont que des variations d'un même ensemble.

Parmi les formes — et non pas espèces, à notre avis — les plus remarquables, peuvent être citées: *P. equisetiforme* du bassin méditerranéen, à tiges allongées, \pm dressées, feuilles minimes, fleurs apicales; *P. maritimum*, forme littorale du bassin méditerranéen mais aussi de l'Atlantique Nord, à grands ochréas hyalins; les formes naines de Californie, *P. californicum*, etc., et de Perse, *P. molliforme*, etc.; le *P. paronychioides* himalayan \pm en « tabouret »... Les flores locales, notamment nord-américaines et méditerranéennes donnent à ce sujet toutes les précisions voulues; une classification microspécifique des *Polygonum* sensu stricto nous entraînerait trop loin au-delà des limites d'une étude sur les genres.

13 — La section *Tephis*, en revanche, est monotypique, endémique en Afrique du Sud, sous climat subdésertique et paralittoral. La forme unique, *P. undulatum*, est un sous-arbrisseau \pm ligneux, à port buissonnant, rappelant un peu celui des *Atraphaxis*; le périanthe comporte toujours 4 tépales, grands pour le genre (4-5 mm) et devenant membraneux autour du fruit mûr.

1.3(3).5(15) = ***Koenigia*** L. 1767: 3, 35, non *Konig* Adans. 1763, nec *Koniga* R. Br. 1826, nom. rejic. = *Bergeria* Koenig ex Steud. 1840: 849 = *Macounastrum* Small in Britton & Brown 1896: 541. Espèce type: *K. islandica*.

K. islandica L. 1767: 35 = *K. fuegiana* Dusen 1900: 191. tab.: 192 = *K. monandra* Decne, ex Cambess. 1844: 142. tab. 147 = *Macounastrum islandicum* Small in Britton & Brown 1896: 542 = *Polygonum islandicum* Hook. f. 1886: 24. Specim. vis.: *Drège s.n.*, s.d. (Hémisphère Sud « fl isl »: îles Falkland ?); *Holmen s.n.* 1949 (Groenland); *Macoun s.n.* [1897] (île Saint-Paul, mer de Behring); *Polunin & al.* 3563 (Népal).

K. pilosa Maxim. = *Polygonum pilosum*.

L'appartenance tribale est discutable car les stigmates, terminaux, capités, très petits, paraissent parfois bosselés. Le genre est mal défini : l'achaine, ovoïde et largement dégagé des 2 à 4, généralement 3, tépales non ou faiblement accrus. L'espèce, en revanche, est très précisément définie et apparemment très voisine des *Polygonum* de section *Eleutherosperma*.

Les *Koenigia* se rencontrent sous tous les climats très froids du globe, arctique, antarctique et himalayen. Ce sont des sous-arbrisseaux annuels, herbacés, petits à minimes, dressés à prostrés, non ou peu branchus. Les ochréas, toujours bien développés, sont assez largement évasés; au long de la tige, ils sous-tendent 1 ou 2 feuilles, parfois opposées; à son sommet, l'ochréa terminal sous-tend plusieurs feuilles et un nombre égal de fleurs; il peut y avoir, sur les spécimens les mieux développés, en outre 1 à 2 fleurs à l'aisselle des feuilles immédiatement inférieures.

1.3(3).6 = Cohors **Fagopyrastreae** Roberty & Vautier cohors nov.

Polygoninearum cohors perianthio non vel paulo accrescente, fructibus imperfecte alatis.

Nous rattachons à cette cohorte deux genres, tous deux au fruit mûr largement dégagé du périanthe, dérivant très certainement d'un proche ancêtre commun.

1.3(3).6(11) = **Fagopyrum** P. Mill. 1754 = *Fagopyron* P. Mill. ex Raf. 1837 :

10 = *Fagopyrus* P. Mill. ex Hassk. 1844: 85 = *Helxine* O. Ktze. 1891: 552, non Requien 1825, nec Raf. 1837 = *Kunokale* Raf. 1837: 12 = *Phegopyrum* Peterm. 1841: 92.

— .8 = Sectio **Fagopyrum**. Espèce type : *F. esculentum*.

— .9 = Sectio **Polygonopsis** Roberty & Vautier sectio nov. Espèce type : *F. gilesii*.

Fagopyri sectio fructibus parvulis.

F. balschuanicum Gross = *Bilderdykia balschuanica*.

F. ciliatum Jacq.-Fél. = *Harpagocarpus snowdenii*.

F. convolvulus Gross = *Bilderdykia convolvulus*.

F. cymosum Meisn. 1832: 63 = *Polygonum cymosum* Trev. 1826: 177 = *P. tristachyum* Léveillé 1912: 297 = *F. esculentum* s.l. Specim. vis. : *Zimmermann* 1832 (Népal).

F. dumetorum Schreb. = *Bilderdykia dumetorum*.

F. esculentum Moench 1794: 290, typ. cons. = *F. sagittatum* Gilib. 1792: 435, rejic. = *F. vulgare* Hill 1756: 486, illeg. = *Polygonum emarginatum* Roth 1797: 48 = *P. fagopyrum* L. 1753: 364. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; communément cultivé sous climat tempéré, notamment en Suisse et en France.

F. gilesii Hedberg 1946: 390 = *Polygonum gilesii* Hemsley 1888. tab. 1756. Specim. vis. : *Schmid* 2412 (Cachemire).

- F. gracilipes* Hemsley ex Dammer 1900 : 315 = *Polygonum gracilipes* Hemsley in Forbes & Hemsley 1891 : 340 = *F. gilesii* s.l. Specim. vis. : *Maire s.n.* [1912] (montagnes de Chine Sud).
- F. leptopodum* Hedberg 1946 : 390 = *Polygonum leptopodum* Diels 1912 : 260 = *F. gilesii* s.l. Specim. vis. : *Schneider 3110* (montagnes de Chine Sud).
- F. mairei* Gross 1913 (3) : 25 = *Polygonum mairei* Léveillé 1909 : 338 = *F. gilesii* s.l.
- F. multiflorum* Grintz = *Bilderdykia multiflora*.
- F. scandens* Gross = *Bilderdykia scandens*.
- F. statice* Gross 1913 (3) : 26 = *Polygonum statice* Léveillé 1909 : 338 = *F. gilesii* s.l. Specim. vis. : *Maire s.n.* [1913] (montagnes de Chine Sud).
- F. tataricum* Gaertn. 1791 : 182. tab. 119, fig. 6 = *Polygonum tataricum* L. 1753 : 364 = *F. esculentum* s.l. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; *Billot 3770* (Rhénanie, rudéral); *Serre 2388-bis* (Chine maritime Nord); *Soulié 247* (Tibet).
- F. tristachyum* Gross 1913 (3) : 26 = *F. cymosum*.
- F. urophyllum* Gross 1913 (3) : 21 = *Polygonum urophyllum* Bur. & Franch. 1891 : 150 = *F. gilesii* s.l. Specim. vis. : *Schneider 1141* ou *1753*? (montagnes de Chine Sud).

Le genre est défini par ses fruits au périanthe non ou peu accru d'où émerge longuement un achaine trigone, les angles aigus et parfois prolongés par une évagination membraneuse étroite et ± découpée ou même dentée vers sa base. Cette définition le sépare assez mal : d'une part, des *Polygonum* de section *Aconogonum* à l'achaine trigone toujours quelque peu exsert du périanthe faiblement accru; d'autre part, des *Pteroxygonum* dont toutefois l'hypanthie est, à maturité, longuement accru, et des *Pleuropteropyrum* aux chaînes, en principe, largement ailés, enfin des *Harpagocarpus* aux chaînes nettement épineux.

Pratiquement les *Fagopyrum* sont assez faciles à reconnaître. Ils ont des feuilles à base cordée ou sagittée, ce qui les sépare du plus grand nombre des Polygoninées. Quant aux autres, ils ont des inflorescences très différentes de celles des *Polygonum* de section *Echinocaulon*, des fruits très différents de ceux des *Bilderdykia*, *Pteroxygonum*, *Harpagocarpus* et *Pleuropteropyrum*, sous réserve, toutefois, de possibles transitions progressives vers ces derniers.

Le sarrazin, *F. esculentum*, est cultivé encore assez communément sous tous les climats froids ou tempérés-froids du globe; en général sur des sols granitiques et pauvres. Toutes les formes sauvages ont été trouvées, sous climat froid, dans l'Himalaya et ses prolongements en Chine méridionale ou vers la Sibérie. Ce sont là des pays encore mal prospectés. Nous n'avons donc admis que deux espèces (principales) :

Fruits majeurs, 5 à 7 mm (.8 = <i>Fagopyrum</i>)	<i>F. esculentum</i>
Fruits mineurs, 2 à 4 mm (.9 = <i>Polygonopsis</i>)	<i>F. gilesii</i>

.8 — Nous réunissons dans la section *Fagopyrum*, avec la forme communément cultivée, *F. esculentum*, aux fruits à angles aigus et aux inflorescences plutôt denses : d'une part, les *F. tataricum*, à fruits souvent très étroitement ailés et inflorescences longues et lâches ou même interrompues, et les *F. cymosum*, qui n'existent qu'à

l'état sauvage, ont des fruits très semblables à ceux des *F. tataricum* mais des inflorescences composées, en cymes \pm pauvres et lâches.

.9 — Les formes sauvages de la section *Polygonopsis*, qui n'en comprend pas de cultivées, se présentent en herbier sous des aspects très différents, dont la stabilité demeure inappréciable. *F. gilesii*, la première décrite de ces formes, en est sans doute la mieux caractérisée, notamment par un port éphédroïde, des feuilles petites et probablement fugaces. *F. statice* présente de longues et grêles tiges dressées, à partie florifère presque totalement dépourvue de feuilles. Il en va de même chez *F. urophyllum* dont la souche est plus robuste et \pm ligneuse. *F. leptopodium* semble en être une forme herbacée, plus grêle. *F. gracilipes*, à feuilles plus abondantes et inflorescences moins allongées, peut relier cet ensemble au *F. cymosum*.

1.3(3).6(14) = **Pteroxygonum** Dammer & Diels ex Diels 1905 : 36. Espèce type : *P. giraldii*.

P. giraldii Dammer & Diels ex Diels 1905 : 36. Spécim. vis. : type, B, *Giraldi* 828; UPS, Smith 6402 (Chine centrale).

Le genre est très nettement caractérisé par des fruits à hypanthe longuement accru, assez épais; le périanthe peu accru, à la base du fruit triédrique, aux sutures évaginées; chaque évagination découpée en une dent basale et une aile apicale.

Cette forme d'achaine existe parfois chez certains fruits de *Fagopyrum* (voir notamment un des fruits du spécimen *Zimmermann* 1862, sous *F. cymosum*). En revanche, l'accrescence de l'hypanthe constitue une caractéristique originale.

La plante paraît avoir un port \pm prostré; tiges herbacées, feuilles subtriangulaires à base cordée et assez long pétiole; fleurs axillaires, solitaires ou par 2 à 3, rarement plus.

Endémique et rare, en Chine centrale, ce genre dérive très probablement des *Fagopyrum*.

1.3(3).7 = Cohors **Pleuropteropyrastreae** Roberty & Vautier cohors nov.

Polygoninearum cohors perianthio non accrescente, fructibus perfecte alatis.

1.3(3).7(.5) = **Pleuropteropyrum** Gross 1913 (3) : 8. Espèce type : *P. weyrichii*.

P. alpinum Kitagawa = *Polygonum divaricatum* s.l.

P. divaricatum Nakaï = *Polygonum divaricatum*.

P. tripterocarpum A. Gray in Rothrock 1867 : 453 (note). Specim. vis. : type, P, C. Wright s.n. [1853-56] (île Arakamtchetchene, détroit de Behring).

P. weyrichii Gross 1913 (3) : 9 = *Polygonum weyrichii* Schmidt in Maxim. 1859 : 234. Spécim. vis. : Czernjaeva 3859 (U.R.S.S., île Sakhalin); Yatabé s.n. [1882] (Japon, Yéso).

Le genre, dans son espèce-type, est très nettement caractérisé par des achaines obovées à ronds, largement et membraneusement triptères à maturité.

P. weyrichii est une plante herbacée, ascendante ou dressée, rameuse et vigoureuse, à feuilles grandes, largement lancéolées, densément couvertes, en général,

sur leur face inférieure d'une pubescence tomenteuse et pâle, étendue parfois sur les jeunes rameaux. Les fleurs sont disposées en grappes terminales et subterminales, irrégulièrement et surabondamment ramifiées; le périanthe est petit et le demeure; à maturité l'achaine est bien dégagé, avec ses 3 sutures évaginées chacune en aile membraneuse, large et régulièrement arrondie.

Par toutes ses caractéristiques sauf celles du fruit, pour nous les seules ayant valeur générique, le *P. weyrichii* indiscutablement ressemble à certains *Aconogonum*, *Polygonum divaricatum* s.l. Certains botanistes ont donc transféré tous les *Aconogonum* dans le genre *Pleuropteropyrum*: transfert incorrect puisque le genre *Aconogonum*, créé en 1837, aurait alors priorité, transfert accompagné d'une surabondante floraison d'épithètes et combinaisons nouvelles pour lesquelles nous renvoyons aux ouvrages spécialisés.

En réalité, le *P. weyrichii* possède, quant à ses fruits, chez les Polygoninées, une originalité profonde : par leur forme, ovoïde à obovoïde, ils diffèrent totalement de ceux des Fagopyrastreées qui sont eux pyramidalement triédriques et avec des crêtes suturales ondulées ou même découpées.

P. tripterocarpum nous est mal connu. Le port est celui d'un *Aconogonum* majeur ou d'un *Pleuropteropyrum*; les fruits du specimen-type sont jeunes et leurs sutures ne présentent qu'une crête mince, brièvement évaginée. Il est donc malaisé d'en préciser le statut.

1.3(3).8 = Cohors **Bilderdykiastreæ** Roberty & Vautier cohors nov.

Polygoninearum cohors tepalis externis et hypanthio concrescentibus plus minusve alatis.

1.3(3).8(.1) = **Bilderdykia** Dumortier 1827: 18 = ? *Fallopia* Adans. 1763: 277, 557, nom. rejic. = *Helxine* Raf. 1837 non Requien 1825 = *Pleuropterus* Turcz. 1848: 587 = *Tiniaria* Reichenb. 1837: 236. Espèce type : *B. convolvulus*; autres espèces de même section : *B. dumetorum*, *B. multiflora*, *B. scandens*.

B. aubertii Moldenke 1939: 29 = *Polygonum aubertii* Henry 1907: 82 = *Reynoutria aubertii* Moldenke 1941: 675 = *B. multiflora* s.l. Specim. vis. : Soulié 219 (Tibet).

B. baldschuanica Hort. (hortorum nomen, infraspecificum sensu nostro) = *Fagopyrum baldschuanicum* Gross ex Janchen 1950: 75 = *Polygonum baldschuanicum* Regel 1883: 684. tab. 10 = *Reynoutria baldschuanica* Moldenke 1941: 675 = *B. multiflora* s.l. Specim. vis. : Zaprjagaev 3955 (Turkestan); très communément cultivé de nos jours sous climat tempéré, notamment en Suisse et en France.

B. ciliatoides Greene 1904: 23 = *Polygonum ciliatoides* Michx. 1803: 1, 241 = *B. convolvulus* s.l. Specim. vis. : Maxon & Weatherby 1045 (U.S.A. Maine).

B. convolvulus Dumortier 1827: 18 = *Fagopyrum convolvulus* Gross 1913 (3): 21 = *Polygonum convolvulus* L. 1753: 364. Specim. vis. : commun en Suisse et en France.

[*cordata*:] *Pleuropterus cordatus* Turcz. 1848: 587 = *B. multiflora* s.s. Specim. vis. : type, Fortune A.22 (Chine).

B. cristata Greene 1904: 23 = *Polygonum cristatum* Engelm. & Gray 1845: 51 = *B. scandens* s.l. Specim. vis. : Curtiss 5802 (Floride).

- B. dumetorum** Dumortier 1827 : 18 = *Fagopyrum dumetorum* Schreber 1771 : 42 = *Polygonum dumetorum* L. 1762 : 552. Specim. vis. : commun en Suisse et en France.
- B. multiflora** Roberty & Vautier comb. nov. = *Fagopyrum multiflorum* Grintz in Savulescu 1952 : 476 = *Polygonum multiflorum* Thunb. 1784 : 169 = *Polygonum chinense* Houtt. non L. Specim. vis. : Faurie 762 (Formose).
- B. pterocarpa** Greene 1904 : 23 = *Polygonum pterocarpum* Wall. ex Meisn. in Wall. 1832 : 62 = B. scandens s.l. Specim. vis. : type : Wallich 1690 (Inde Nord, en montagne).
- B. scandens** Greene 1904 : 23 = *Fagopyrum scandens* Gross 1913 (3) : 22 = *Polygonum scandens* L. 1753 : 364. Specim. vis. : Weatherby & Smith 1135 (U.S.A. Massachussets).

Le genre est très bien caractérisé, dans les Polygoninées, par ses achaines inclinées à maturité dans l'ensemble du périanthe et de l'hypanthie concrescents, les tépales externes développant sur leur nervure médiane, soit une crête, soit une aile membraneuse, longuement décurrente.

Cette même unité de propagation, toutefois, se retrouve chez les *Reynoutria*, Polygonoïdées Reynoutriinées, à stigmates pénicillés ou tout au moins évasés et finement plurilobulés, non pas globuleusement capités, ainsi que chez les *Podopterus*, Calligonoïdées. Ces derniers sont des arbustes; les *Reynoutria* sont des sous-arbrisseaux herbacés, hautement dressés, ± rameux.

Les *Bilderdykia* sont des plantes herbacées, rampantes ou plus souvent grimpantes, à feuilles cordées. Nous y avons reconnu quatre espèces (principales), réunies dans une même section et, dans la nature, indiscutablement reliées entre elles par des formes de transition progressive; ainsi les *B. dumetorum* peuvent présenter des unités de propagation soit ailées seulement dans leur partie supérieure, la crête membraneuse médiotépalaire non ou peu décurrente sur l'hypanthie, soit non ailées. Sous cette réserve, la clef analytique suivante conduit à ces quatre unités.

Fleurs en grappes composées (généralement surabondantes); unités de propagation toujours et parfaitement ailées, majeures à mineures (8 à 18 mm)	B. multiflora
Fleurs en grappes simples (parfois pauvres)	
Unités de propagation toujours et parfaitement ailées, majeures (12 à 24 mm)	B. scandens
Unités de propagation non ou imparfaitement ailées	
Moyennes (8 à 12 mm) et généralement ailées	B. dumetorum
Mineures (3 à 6 mm) et non ailées	B. convolvulus

Les valeurs adaptatives prises en compte traduisent :

l'abondance de l'ensemble fructifère, extrême = 0 / 2 = faible;
le volume de l'unité de propagation, majeur = 0 / 2 = mineur;
son alature, nulle ou presque = 0 / 2 = large et décurrente.

B. multiflora dans sa forme-type est sauvage en Asie orientale, sous climat subtropical à tempéré; ses unités de propagation, longues d'environ 8 à 12 mm, sont à maturité d'un blanc crémeux ou légèrement verdâtre. Aux deux extrêmes de la variation qui lui est ici accordée, se rencontrent : *B. aubertii* à unités de propagation petites (6 à 10 mm) et blanchâtres; *B. baldschuanica* à unités de propagation

grandes (16 à 18 mm) et d'un blanc nacré. Ce sont là des plantes grimpantes à souche \pm lignifiée, très communément cultivées, surtout sous la forme *B. baldschuanica*, renouée de Boukhara, très robuste et ornementale.

B. scandens dans sa forme-type est une plante nord-américaine, assez commune sous climat tempéré; *B. cristata* en est une forme moins florifère; toutes deux ont des unités de propagation longues d'environ 12 mm. Celles du *B. pterocarpa*, plante asiatique et des climats subtropicaux, montagnards, atteignent 20 à 24 mm.

B. dumetorum est une herbe volubile, commune sous climat tempéré en Europe et en Amérique du Nord.

B. convolvulus est une mauvaise herbe très commune sous climats tempérés ou modérément froids, en Europe, Asie, Afrique et Amérique.

1.4 = Trib. **Rheae** Dumort. 1829 : 18, emend.

Polygonoidearum tribus mediocriter anemogama, stigmatibus ad apicem stylorum elatis vel ad eorum superiorem partem divisit.

Nous réunissons ici deux sous-tribus : Reynoutriinées, Rhénées.

1.4(1) = Subtrib. **Reynoutriinae** Roberty & Vautier subtrib. nov.

Rhearum subtribus stigmatibus ad stylorum partem superiorem plus minusve penicillatis.

1.4(1).8 = Cohors **Reynoutriastreæ**.

Reynoutriinearum cohors tepalis externis et hypanthio concrescentibus plus minusve alatis.

1.4(1).8(.1) = **Reynoutria** Houtt. 1777 : 639 = *Reynouthria* Houtt. ex Steud. 1821 : 684. Espèce type : *R. japonica*.

R. aubertii Moldenke = Bilderdykia multiflora.

R. baldschuanica Moldenke = Bilderdykia baldschuanica.

R. campanulata Moldenke = Polygonum divaricatum s.l.

[*cuspidata*] *Pleuropterus cuspidatus* Gross ex Loesener 1919 : 114 = *Polygonum cuspidatum* Sieb. & Zucc. 1846 : 208 = *R. japonica* s.s.

R. japonica Houtt. 1777 : 640 = *Tiniaria japonica* Hebd. 1946 : 399. Specim. vis. : Chiao 18539 (Chine, Kian-Si); Faurie 2031 (Corée); Togasi 1264 (Japon Sud); Vautier 473 (Genève).

R. multiflora Moldenke = Bilderdykia multiflora.

R. sachalinensis Nakaï 1919 : 18 = *Polygonum sachalinense* Schmidt in Maxim. 1859 : 233 = *Tiniaria sachalinensis* Janchen 1950 : 75 = *R. japonica* s.l. Specim. vis. : Faurie 1505 (Japon Nord); Gizha & Motorina 3858 (Sachalin); Vautier 74-bis (Genève).

La sous-tribu est caractérisée par des stigmates pénicillés mais \pm finement et profondément ainsi divisés.

Le genre est caractérisé par des achaines inclus à maturité dans l'ensemble du périanthe et de l'hypanthe concrescents, les tépales externes développant toujours sur leur nervure médiane une aile membraneuse et longuement décurrente.

Pratiquement, comme nous l'avons dit plus haut (p. 55), les *Reynoutria* ont des fruits très voisins sinon identiques à ceux de certains *Bilderdykia*, d'espèce *B. multiflora*, et ne s'en distinguent nettement que par leur port. Ce sont, en effet, des sous-arbrisseaux herbacés généralement robustes, à port évoquant plutôt celui de certaines Monocotylédones tropicales que celui usuel aux Dicotylédones de même hauteur et vigueur; les tiges peuvent atteindre 2 mètres ou plus, demeurent vertes et fistuleuses, se divisent à leurs sommets en rameaux florifères, à inflorescences axillaires en grappes composées de faux épis allongés; les feuilles sont grandes, obtusément cordées à leur base, abruptement et longuement cuspidées à leur sommet.

On rencontre de nos jours des *Reynoutria* un peu partout en Eurasie et Amérique septentrionales. Toutefois le genre n'est sauvage et largement étendu qu'en Extrême-Orient, près du littoral, sous climat tempéré ou froid; partout ailleurs ses peuplements sont ± visiblement adventices.

On peut y distinguer deux formes. *R. sachalinensis*, dont l'habitat naturel est sous climat froid, présente des feuilles assez nettement majeures, des inflorescences mollement retombantes, des périanthes translucides et verdâtres. *R. japonica* s.s., d'habitat naturel moins septentrional, a des inflorescences dressées, des périanthes opaques mais nacrés.

Subspontanées l'une près de l'autre sur les bords du lac et en marge immédiate du Jardin Botanique de Genève, ces deux formes y végétent vigoureusement mais en donnant, toutes deux, un très haut pourcentage de fleurs stériles. Nous en connaissons un autre peuplement, où n'existe que la forme-type, et dont l'origine est inconnue : il s'étend depuis quelques années, avec vigueur et proliférité, dans les terrains vagues entre le canal de l'Ourcq et le Centre Scientifique et Technique de Bondy, en banlieue parisienne.

1.4(2) = Subtrib. **Rheineae**

Rheum subtribus stigmatibus ad stylorum apicem magnis, elatis et plus minusve undulatis.

1.4(2).7 = Cohors **Rheastreae**

Rheinarum cohors perianthio non accrescente, fructibus perfecte alatis.

1.4(2).7(.5) = **Rheum** L. 1753 : 371 = *Rhabararum* Adans. 1763 : 277.

— .8 — Sectio **Monticolae** Maxim. 1880 : 503, emend. Espèce type : *R. spiciforme*.

— .9 = Sectio **Deserticolae** Maxim. 1880 : 503, emend. Espèce type : *R. ribes*.

— 10 = Sectio **Rheum**. Espèce type : *R. rhabonticum*.

R. alexandrae Batalin 1894 : 384. Specim. vis. : Soulié 883 (Tibet) = *R. ribes* s.l.

R. compactum L. 1762 : 531 = *R. rhabonticum* s.l.

R. delavayi Franch. 1895 : 212. Specim. vis. : Schneider 3603 (Yun-Nan) = *R. spiciforme* s.l.

R. emodi Wall. ex Meisn. in Wall. 1832 : 65. Specim. vis. : type, Wallich 1727 (Népal) = *R. rhabonticum* s.l.

- R. forrestii* Diels 1912 : 262. Specim. vis. : Schneider 1983 (Yun-Nan) = *R. ribes* s.l.
R. globulosum Gage 1908 : 181. Specim. vis. : Ludlow & Sherriff 9609 (Tibet)
= *R. spiciforme* s.l.
R. kialense Franch. 1895 : 212. Specim. vis. : type, Soulié 498 (Tibet) = *R. spiciforme* s.l.
R. laciniatum Prain 1908 : 182 = *R. rhabonticum* s.l.
R. moorcroftianum Royle 1836 : 318 = nomen delendum (fondé sur deux spécimens différents et déjà autrement nommés).
R. nobile Hook. f. & Thoms. in Hook. 1855 : tab. 19. Specim. vis. : Ludlow & al. 4806 (Tibet) = *R. ribes* s.l.
R. officinale Baill. 1872 : 246. Specim. vis. : Schneider 2416 (Yun-Nan) = *R. rhabonticum* s.l.
R. palmatum L. 1759 : 1010. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève = *R. rhabonticum* s.l.
R. rhabarbarum L. 1753 : 372 = *R. rhabonticum* s.l.
R. rhabonticum L. 1753 : 371. Specim. vis. : communément cultivé en Europe septentrionale.
R. ribes L. 1753 : 372. Specim. vis. : Labillardière s.n., s.d. (Syrie).
R. spiciforme Royle 1836 : 318. tab. 78. Specim. vis. : Ludlow & al. 16299 (Bhutan).
R. strictum Franch. 1895 : 213. Specim. vis. : type, Soulié 539 (Tibet) = *R. spiciforme*.
R. tanguticum Tschirch. 1910 : 292 = *R. rhabonticum*.
R. tataricum L. f. 1781 : 229. Specim. vis. : Bornmuller 1704 (Perse) = *R. ribes* s.l.
R. tibeticum Maxim. ex Hook. 1886 : 56. Specim. vis. : type, Hooker & Thomson « *Rheum* n° 6 » (Himalaya SW) = *R. spiciforme* s.l.
R. undulatum L. 1762 : 531 = *R. rhabonticum* s.l.

La sous-tribu, réduite à son genre-type, est nettement définie par des stigmates volumineux, ± onduleusement capités au sommet d'un style très court.

Le genre est lui-même bien défini par des fruits dégagés du périanthe non accru, aux 3 sutures carpellaires évaginées, ± largement et membraneusement ailées. Ce même type de fruit se retrouve dans maints autres genres mais les *Rheum* en diffèrent nettement, non seulement par leurs stigmates, mais encore par leur port qui est très caractéristique.

Les *Rheum*, communément connus et souvent cultivés sous le nom de « rhubarbe » sont des sous-arbrisseaux herbacés, à système radiculaire très développé, durablement persistant. Le système épigé ne comporte, en revanche, que des pousses annuelles dont chacune comprend une hampe florale entourée à sa base par des feuilles souvent très grandes et longuement pétiolées, toujours palminervées.

Si le genre est facile à définir et donc isoler, en revanche ses espèces constituent un ensemble extrêmement complexe et encore très mal connu. D'une part, nous l'avons vu, ce sont là des plantes cultivées et depuis la préhistoire sans doute. D'autre part, ce sont des plantes généralement volumineuses et en partie charnues, très difficiles à sécher et mettre en herbier : certaines feuilles peuvent atteindre plus d'un mètre de diamètre.

Nous avons ici admis, très provisoirement, trois sections, à une seule espèce (principale) chacune. La clef ci-après y conduit :

Hampe fructifère haute de 5 dm ou moins (.8 = <i>Monticolae</i>)	R. spiciforme
Hampe fructifère haute de 5 dm ou plus	
haute de 5 à 12 dm, non à la fois rameuse et feuillue (.9 = <i>Deserticolae</i>) . . .	R. ribes
haute de 12 à 24 dm, toujours à la fois rameuse et feuillue (10 = <i>Rheum</i>)	

R. rhabonticum

Nous distinguons ainsi : d'une part, des formes naines, de montagne; d'autre part, des formes majeures, cultivées. La corrélation écologique est évidente mais il n'est pas du tout certain qu'elle corresponde effectivement à une ségrégation irréversible et naturelle.

.8 — La section *Monticolae* a pour type nominal une forme répandue depuis le Tibet jusqu'en Afghanistan, haute de 15 à 30 cm, à feuilles basales entières, largement ovales, à hampe florale simple et nue, terminée par un faux épi allongé mais dense, *R. spiciforme*. Le *R. globulosum* en est un écotype extrême, trouvé à 4.650 m d'altitude, au Tibet, nettement nain : les feuilles larges au plus de 3 cm, la hampe haute au plus de 7 cm, simple et nue, terminée par une boule de fleurs. En revanche, les *R. delavayi* du Yun-Nan, à inflorescences condensées, et *R. kialense* du Tibet, à inflorescences graciles, relient \pm cette section à la suivante, notamment par leurs hampes florales généralement \pm feuillues.

.9 — La section *Deserticolae* comprend elle aussi des formes de montagne et qui la relient \pm à la section précédente.

Dans ce sous-ensemble géographique, *R. alexandrae* et *R. nobile*, écotypes de marais, présentent des hampes florales épaisse et couvertes par de nombreuses feuilles membraneuses et imbriquées.

R. forrestii, du Yun-Nan, présente des inflorescences pauvrement ramifiées, au sommet d'une hampe grêle.

Dans le sous-ensemble proprement désertique : *R. tataricum*, qui s'étend de l'Afghanistan à la Russie méridionale, présente une inflorescence en panicule largement étalée au sommet d'une hampe nue; les fruits à maturité atteignent 15 mm de diamètre, en y incluant leurs ailes qui sont membraneuses et larges.

R. ribes a des fruits aussi volumineux mais bien différents, à ailes peu développées, à corps \pm charnu et vivement coloré en rouge-sang; l'inflorescence est paniculée au sommet d'une hampe progressivement défeuillée; cette forme se rencontre dans toute l'Asie Mineure, en Perse et en Arabie.

10 — La section type a des représentants sauvages en Asie centrale, de la Sibérie méridionale jusqu'au Nord de la Birmanie.

Ses formes de montagne, du Népal notamment, *R. australis*, diploïde ($n = 44$) à fruits majeurs (12 mm) et en tout plus robuste mais très proche de *R. emodi*, haploïde ($n = 22$) et généralement mineure, sont assez peu différenciées relativement à la forme-type.

Celle-ci, *R. rhabonticum* s.s. a des représentants sauvages dans les monts Altaï et les pays voisins; c'est la rhubarbe commune. *R. officinale* en est une forme méridionale et \pm géante, récoltée notamment en Birmanie. *R. compactum* et *R. rhabarbarum* ont l'aire de la forme-type; en différent, l'une par ses rameaux fructifères pendants, l'autre par ses feuilles très ondulées. *R. palmatum*, à feuilles très profon-

dément et diversement découpées, n'est très probablement qu'une forme accidentelle, récoltée à l'état sauvage au Tibet comme en Chine septentrionale, maintenue et « améliorée » dans les jardins chinois et européens.

1.5 = Trib. **Rumiceae** Dumort. 1829 : 18, sensu restricto.

1.5(1) = Subtrib. **Rumicineae**

Rumicearum subtribus unica, stigmatibus ad apicem stylorum magnis laciniatisque.

Dans cette tribu, anémogame extrême et donc à une seule sous-tribu, les stigmates sont à la fois terminaux et finement laciniés. Nous y situons deux cohortes : Rumi-castrées, Oxyriastrées.

1.5(1).5 = Cohors **Rumicastreae**

Rumicinarum cohors media, perianthio partim et plus minusve accrescente.

1.5(1).5(.5) = **Rumex** L. 1753 : 333 = *Lapathum* Adans. 1763 : 277.

- .8 = Sectio **Platypodium** Willk. in Willk. & Lange 1862 : 284 = sectio *Heterolapathum* Nyman 1881 : 635 = subgenus *Platypodium* Reching. f. 1958 : 355 = genus *Bucephalophora* Pau 1887 : 24. Espèce type : *R. bucephalophorus*.
- .9 = Sectio **Rumex** = genus *Analiton* Raf. 1837 : 46 = sectio *Lapathum* Campd. 1819 : 63; Meisn. 1856 : 42 = subgenus *Lapathum* Reching. f. 1937 : 6 = genus *Lapathon* Raf. 1838 : 51 = *Lapathum* P. Mill. 1754 = genus *Rhodoptera* Raf. 1837 : 45. Espèce type : *R. patientia*; autres espèces *R. maritimus*, *R. pulcher*, *R. venosus*, *R. verticillatus*, *R. vesicarius*.
- 10 = Sectio **Acetosa** Campd. 1819 : 67, sensu restricto; Meisn. 1856 : 60 = subgenus *Acetosa* Reching. f. 1937 : 6 = genus *Acetosa* P. Mill. 1754 = *Menophyla* Raf. 1837 : 45. Espèce type : *R. acetosa*; autre espèce : *R. lunaria*.
- 11 = Sectio **Acetosella** Meisn. 1856 : 61 = subgenus *Acetosella* Reching. f. 1937 : 6, ex Raf. 1837 : 46 = genus *Acetosella* Meisn. ex Fourr. 1869 : 161 = *Oxys* P. Mill. 1754 = *Pauladolfia* Börner 1912 : 277. Espèce type : *R. acetosella*.

R. acetosa L. 1753 : 337. Specim. vis. : Ubiquiste, commun en Suisse et en France.

R. acetosella L. 1753 : 338. Specim. vis. : Ubiquiste, commun en Suisse et en France.

R. aculeatus L. 1759 : 991 = *R. bucephalophorus*.

R. acutus L. 1753 : 335 = *R. patientia* an *R. pulcher*.

R. aegyptiacus L. 1753 : 335 = *R. maritimus* s.l. Specim. vis. : *Danser* 5113 (Egypte).

R. alismaefolius Fresen. 1828 : 602 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Schimp* 152 (Abyssinie).

R. alpinus L. 1753 : 334 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Schulz* 1646 (Carpathes); *Sennen* 9767 (Pyrénées); *Sieber* 146 (Alpes du Dauphiné).

R. altissimus Wood 1847, fide Rechinger 1937 : 45 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Eggleson* 4450 (Kentucky); *Kiener* 19217 (Nebraska).

- R. angiocarpus* Murb. 1891 : 46 = *R. acetosella* s.l. Specim. vis. *Rothmaler* 14777 (Portugal Sud); *Sennen* 5187 (Espagne Nord).
- R. aquaticus* L. 1753 : 336 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Lindberg* 1907 (Finlande); *Schultz* 907 (Alsace).
- R. arifolius* All. 1774 : 94 = *R. acetosa* s.l. Specim. vis. : *Andersson* 178 (Scandinavie); *Kralik* 757 (Corse); *Ziesché* s.n. [1898] (Carpates).
- R. bipinnatus* L. f. 1781 : 211 = *Analiton bipinnatus* Raf. ex Jacks. 1893 : 116 = *R. vesicarius* s.l. Specim. vis. : *Gattefossé* 127-b (Afrique du Nord).
- R. brasiliensis* Link 1821 : 349 = *R. pulcher* s.l. Specim. vis. : *Glaziou* 13131 (Brésil, Rio de Janeiro); *Lorentz* s.n. [1879] (Argentine Nord).
- R. britannica* L. 1753 : 334 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Rolland-Germain* 178 (Canada, Québec).
- R. brownii* Campd. 1819 : 64, 81 = *R. maritimus* s.l. Specim. vis. : *Patterson* s.n. [1958] (Australie, New South Wales).
- R. bucephalophorus* L. 1753 : 336. Specim. vis. : *Asplund* 87 (Iles Canaries); *Billot* 1060 (France, Roussillon); *Rechinger* 16177 (Grèce, île d'Eubée).
- R. conglomeratus* Murray 1770 : 52 = *R. pulcher* s.l. Specim. vis. : *Billot* 3766 (France, Languedoc).
- R. crispus* L. 1753 : 335 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Hjelt* 183 (Finlande); *Ross* 766 (Sicile); *Toepffer* 1763 (Bavière).
- R. cyprius* Murb. 1907 : 20 = *R. vesicarius* s.l. Specim. vis. : *Haradjian* 373 (Chypre).
- R. dentatus* L. 1771 : 226 = *R. pulcher* s.l. Specim. vis. : *Faurie* 506 (Formose); *Gordon college* 70 (Pakistan Ouest); *Schneider* 163 (Yun-Nan).
- R. digynus* L. = *Oxyria digyna*.
- R. flexuosus* Soland. ex Forst. in Spreng. 1825 : 162 = *R. pulcher* s.l. Specim. vis. : *Travers* s.n. [1908] (Nouvelle-Zélande).
- R. hastatus* Don 1825 : 74 = *R. acetosa* s.l. Specim. vis. : *Schneider* 2880 (Yun-Nan); *Webster & Sack* 5679 (Pakistan Ouest).
- R. hastulatus* Smith = *Muehlenbeckia australis* s.l.
- R. hydrolapathum* Huds. 1778 : 154 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Becherer* s.n. [1925] (Alsace); *Clarke* 134-19 (Angleterre); *Pohjala* 1140 (Finlande).
- R. longifolius* D. C. 1815 : 368 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Sennen* 4521 (Pyrénées); *Thorlaksson* s.n. [1937] (Islande).
- R. lunaria* L. 1753 : 336. Specim. vis. : *Asplund* 334, 988 (Iles Canaries).
- R. luxurians* L. 1767 : 64 = nomen incertae sedis.
- R. maritimus* L. 1753 : 335. Specim. vis. : *Billot* 1948 (Prusse); *Michelet* 32 (France, Jura).
- R. nepalensis* Spreng. 1825 : 159 = *R. maritimus* s.l. Specim. vis. : *Bornmuller* 1387 (Liban, vers 1.600 m); *Perrottet* s.n. s.d. (Deccan Sud, Nil-Gherries).
- R. nivalis* Hegetschw. 1840 : 345 = *R. acetosa* s.l. Specim. vis. : *Branger* 36 (Suisse, Grisons).
- R. obtusifolius* L. 1753 : 335 = *R. pulcher* s.l. Specim. vis. : *Flora U.R.S.S.* 3030 (Kirghizstan); *Gérard* 3106 (Alsace).

- R. palustris* Sm. 1800 : 394 = *R. maritimus* s.l. Specim. vis. : *Baldacci* 94 (Monte-negro); *Billot* 1760 (Berlin); *Samuelsson* 657 (Suède).
- R. patientia** L. 1753 : 333. Specim. vis. : disséminé en Suisse et en France.
- R. persicarioides* L. 1753 : 335 = *R. pulcher* s.l. Specim. vis. : *Bush* 11963 (U.S.A. Missouri).
- R. pulcher** L. 1753 : 336. Specim. vis. : *Clarke* 47552 (Angleterre, Cornouailles); *Parlatore* s.n. [1841] (Sicile).
- R. roseus* L. 1753 : 337 = *R. vesicarius* s.l. Specim. vis. : *Meyers* B.2346 (Palestine).
- R. salicifolius* Weinm. 1821 : 28 = *R. patientia* s.l. Specim. vis. : *Ewan* 10419 (Californie).
- R. sanguineus* L. 1753 : 334 = *R. pulcher* s.l. Specim. vis. : *Gaudetroy* s.n. [1881] (Bassin parisien).
- R. scutatus* L. 1753 : 337 = *R. acetosa* s.l. Specim. vis. : *Briquet* 925 (Jura); *Moricand* s.n. s.d. (Sicile); *Samuelsson* 659 (Suède).
- R. spinosus* L. = *Emex spinosa*.
- R. simpliciflorus* Murb. 1899 : 11 = *R. vesicarius* s.l. Specim. vis. : type, *Balansa* 1028 p.p. (Algérie).
- R. venosus** Pursh 1814 : 733 Specim. vis. : *Macbride* 178 (U.S.A. Idaho).
- R. verticillatus** L. 1753 : 334. Specim. vis. : *Roy* 3813 (Canada).
- R. vesicarius** L. 1753 : 336. Specim. vis. : *Kotschy* 33 (Perse); *Meyers & Dinsmore* 9116 (Palestine).

Le genre est nettement défini : par ses tépales externes non accrus alors que les internes se modifient et généralement de façon très spectaculaire. Il y a toujours 3 tépales dans chacun de ces deux verticilles du périanthe. Les tépales internes autour du fruit mûr peuvent être largement aliformes ou profondément dentés ; ils sont relativement peu accrus dans une seule espèce (principale) : *R. acetosella*. Pratiquement, les *Rumex* ne peuvent être confondus avec les autres genres de Polygonacées ; ce sont des sous-arbrisseaux herbacés, mineurs et graciles, alors prostrés ou ascendants, sinon robustes et parfois même pseudobuissonnantes. Il en a été décrit d'innombrables espèces. Nous en admettons ici neuf, dont quatre sont principales, têtes classiques des sections ou sous-genres. Trois autres constituent avec l'une des précitées des jalons, plutôt que des coupures, dans une variation morphologique très étendue mais probablement continue, portant sur la forme des tépales internes autour du fruit mûr. Enfin deux sont de « petites » espèces mais, nous semble-t-il, nettement isolées. La clef ci-après conduit à ces unités dont nous-mêmes venons de signaler l'inégale ampleur :

Fleurs toutes fertiles :

Hypanthe fortement accrescent, devenant ± hippocampiforme (.8 = *Platypodium*)
R. bucephalophorus

Hypanthe non accrescent, demeurant ± minime (.9 = *Rumex*)

Marges des tépales accrus non ou étroitement aliformes et membraneuses

Sous-arbrisseaux ± graciles et prostrés ; fleurs en verticilles réguliers (parfois ± contigus vers le sommet des rameaux)

Marges des tépales accrus profondément et finement divisées . . .	R. maritimus
Marges des tépales accrus entières ou brièvement dentées	
Verticilles pluriflores et à pédicelles assez courts	R. pulcher
Verticilles multiflores et à pédicelles très longs (plus de 12 mm en deçà du fruit)	
R. verticillatus	
Sous-arbrisseaux ± robustes et dressés ; fleurs en racèmes irréguliers ; marges des tépales accrus entières et alairement arrondies	R. patientia
Marges des tépales accrus toujours et largement (plus de 12 mm de diamètre) aliformes et membraneuses	
Fleurs en fausses grappes, assez denses	R. venosus
Fleurs en grappes vraies, très brèves (2 à 3 fleurs, rarement plus, par pédoncule)	
R. vesicarius	
Fleurs partiellement stériles (mâles)	
Tépales internes alairement accrescents (10 = <i>Acetosa</i>)	
Arbrisseaux buissonnants	R. lunaria
Sous-arbrisseaux herbacés	R. acetosa
Tépales internes non accrescents (11 = <i>Acetosella</i>)	R. acetosella

Les valeurs adaptatives prises en compte traduisent :

l'absence de fleurs stériles = 1 / 2 = leur présence;

la disposition des fleurs et fruits, sur un pédoncule commun = 0 / 1 = en fascicules ou solitaires sur les rameaux feuillus;

la disposition de ces pédoncules ou pédicelles, en fausses grappes, irrégulières et pseudo terminales = 0 / 2 = en verticilles axillaires et réguliers;

la présence de pédicelles très allongés = 0 / 1 = leur absence;

la présence d'un hypanthe alourdi = 0 / 1 = son absence;

une accrescence des tépales internes, large = 0 / 2 = nulle;

une découpage profonde et fine des tépales accrus = 0 / 2 = leur élargissement alairement arrondi;

une texture papyracée des tépales accrus aliformes = 1 / 2 = cette texture membraneuse.

Le résultat obtenu n'est pas satisfaisant et nous ne chercherons pas à le dissimuler. D'une part les *Rumex* ont été classiquement divisés en sous-groupes trop souvent fondés sur des caractéristiques fluctuantes; ainsi le port dressé ou nutant des tépales externes autour ou en deçà du fruit mûr, et encore le développement des callosités souvent présentes sur la partie centrale de 1, 2 ou tous les tépales accrus; ceci en complique presque inextricablement l'analyse. D'autre part, il est certain que ces plantes rudérales ou, dans une espèce, potagères, sont assez indifférentes aux conditions générales du climat.

.8 — La section *Platypodium* est monotypique. Le *R. bucephalophorus* est aisément reconnaissable à ses hypanthes, aplatis et incurvés, rappelant par leur forme générale un hippocampe. C'est un sous-arbrisseau gracile et prostré, à fleurs axillaires, en petits fascicules, à tépales accrus marginalement découpés en dents brèves mais aiguës. On le rencontre surtout dans le bassin méditerranéen mais aussi aux Canaries, à Madère et, plus au Nord, jusque vers l'embouchure de la Loire; toujours près du littoral.

.9 — Les *Rumex* proprement dits constituent un groupe largement et complexement diversifié, où les variations principales ne présentent que de faibles discontinuités.

R. maritimus peut être considéré comme la forme-type des « patientes » graciles et prostrées, à unités de propagation pseudo épineuses; on le rencontre dans toute l'Eurasie septentrionale et, malgré son épithète, le plus souvent fort loin de toute mer. *R. palustris* en diffère par des dents tépalaires légèrement plus crochues, en étend l'aire géographique jusque vers les climats méditerranéens. *R. brownii* en est une forme, elle aussi peu différenciée, d'Australie méridionale. *R. aegyptiacus* est plus original, avec des dents presque sétuleuses, très fines et rigides; on le trouve en Egypte. *R. nepalensis* est très ornemental, avec de longues dents élégamment recourbées, peu préhensiles et relativement peu profondes, ce qui situe cette forme vers la limite de ce groupe et du suivant; on la rencontre au Népal mais aussi dans les Balkans et en Afrique centrale, notamment dans le bassin du Congo.

R. pulcher est pris ici pour forme type d'un groupe, douteusement spécifique en soi, au port analogue à celui des *R. maritimus* mais à dents tépalaires rares, brèves ou nulles. *R. brasiliensis* en est une forme sud-américaine; *R. dentatus* une forme étendue depuis le bassin méditerranéen jusqu'en Asie tropicale, extrêmement variable quant à la grandeur et la dentelure de ses tépales accusés mais à verticilles floraux toujours espacés; *R. obtusifolius*, en revanche, a des verticilles voisins sinon contigus, c'est une forme commune sous climats tempérés, sur toute la Terre.

R. verticillatus est séparé du groupe précédent par des pédicelles toujours très allongés, gracieusement recourbés en deçà du fruit mûr; ses verticilles sont multiflores, ce qui peut être la cause de cette élongation anormale des pédicelles; on le trouve en Amérique septentrionale.

R. patientia se distingue des précédents par un port beaucoup plus robuste, dressé; les fleurs en sont généralement très nombreuses et les fruits, dont tous ne parviennent pas à mûrir, forment vers l'extrémité des rameaux des fausses grappes souvent surabondantes; les tépales accusés sont toujours aliformes et arrondis mais opaques. Parmi les innombrables « espèces » rattachables à ce groupe nous nous contenterons de citer: *R. alismaefolius*, d'Abyssinie, forme ripicole et pseudobuissonnante; assez voisine de *R. altissimus*, forme nord-américaine; *R. aquaticus*, forme paludicole, à tépales accusés particulièrement petits; *R. hydrolapathum* à feuilles longues et planes; *R. longifolius* à feuilles longues et gaufrées; *R. salicifolius* à feuilles longues, étroites et souvent incurvées...

R. venosus est une patience nord-américaine, naine mais pseudobuissonnante, à larges et membraneux tépales accusés.

R. vesicarius a ces mêmes et très caractéristiques tépales accusés; c'est une espèce méditerranéenne, nord-africaine surtout. Elle se distingue nettement dans le genre par des fleurs groupées sur un pédoncule commun, en grappe vraie mais très brève, par 2 ou 3, rarement plus. Classiquement cette espèce est rattachée au groupe *Acetosa*, probablement à cause de ses tépales externes nutants.

10 — Dans la section *Acetosa* nous avons maintenu deux espèces qui ne se ressemblent guère.

R. lunaria est une grande patience, ligneuse et buissonnante, endémique aux îles Canaries; certainement très voisine du *R. patientia* mais à fleurs en partie unisexuées.

R. acetosa, l'oseille de nos potagers, comme toute plante cultivée, présente de nombreuses formes. C'est, en moyenne, un sous-arbrisseau herbacé, ascendant parfois jusqu'à près d'un m de haut, à feuilles larges et ± sagittées; l'inflorescence en est longue et lâche, faite de verticilles pauvres et sous-tendus par des feuilles réduites sinon apparemment nulles. Parmi ses formes, il en est une qui s'élève très haut dans les montagnes et en devient ± naine: *R. nivalis*; d'autres sont remarquables par la forme de leurs feuilles ou encore par le fait que les tépales externes demeurent ± dressés (*R. scutatus*).

11 — La section *Acetosella* se réduit pratiquement à son espèce-type. *R. acetosella* est nettement isolée dans son genre par des tépales pratiquement non accrus; par toutes ses autres caractéristiques c'est une réduction de l'espèce précédente: une « petite oseille ».

1.5(1).7 = Cohors *Oxyriastreae* Roberty & Vautier cohors nov.

Rumicinarum cohors perianthio non accrescente, fructibus perfecte alatis.

1.5(1).7(.5) = ***Oxyria*** Hill 1765: 24. tab. 24, fig. 3 = *Oxylapathon* St.-Lager 1881: 159. Espèce type: *O. digyna*; autre espèce, de même section: *O. sinensis*.

O. digyna Hill 1768: 158 = *Rumex digynus* L. 1753: 337. Specim. vis.: *Mexia* 2177 (Alaska); *Nelson* 5918 (U.S.A. Wyoming); *Schneider* 2276 (Yun-Nan).

O. elatior R. Br. ex Meisn. in Wall. 1832: 64 = *O. digyna*.

O. mairei Léveillé 1913: 286 = *O. sinensis*. Specim. vis.: type, *Maire* s.n. [1912] (Yun-Nan).

O. reniformis Hook. 1821: 111 = *O. digyna*.

O. sinensis Hemsley 1892: 317. tab. 33. Specim. vis.: type, *Pratt* 779 (Seu-Tchouen); *Soulié* s.n. [1893] (Yun-Nan).

Le genre est nettement caractérisé par son fruit, à 2 carpelles seulement, dont les sutures largement évaginées forment autour de lui une auréole membraneuse. Le périanthe comporte 4 tépales, non accrescents et ± nutants.

Les *Oxyria* sont des sous-arbrisseaux herbacés, à feuilles basales disposées en rosette, leur pétiole long et mou, leur limbe largement et obtusément cordiforme.

Les deux espèces ici admises se distinguent comme il suit:

Tige réduite à une hampe florale, non feuillue, peu ramifiée; fruit mûr large de 4 à 6 mm	<i>O. digyna</i>
Tige développée, feuillue et ramifiée, fruit mûr large de 6 à 8 mm	<i>O. sinensis</i>

Les valeurs adaptatives prises en compte traduisent donc: le développement de la tige, feuillue = $I / 2$ = aphylle; et celui du fruit, mineur, donc moins largement ailé = $0 / 1$ = plus largement ailé.

Nos deux espèces peuvent n'être que des formes, l'une mineure et l'autre majeure. L'absence de formes transitionnelles à l'intérieur de l'aire qui leur est commune (Himalaya chinois) nous a conduit à les maintenir séparées.

O. digyna est commun dans les régions arctiques et dans les hautes montagnes de l'hémisphère Nord, Scandinavie, Extrême-Orient, Montagnes Rocheuses.

O. sinensis n'a été récolté que dans l'Himalaya central et oriental.

2 = Subfam. **Calligoideae** Roberty & Vautier subfam. nov.

Polygonacearum subfamilia, nec stipulis ochreaceis, nec floribus involucratis.

Nous définissons cette sous-famille, médiane et donc primitive, par l'absence, et d'ochréas stipulaires, et d'involucres ou involucelles. Pratiquement nos Calligoïdées sont des plantes ligneuses, arborescentes ou frutescentes, rarement suffrutescentes (*Muehlenbeckia*) ou lianescientes et ± herbacées (*Muehlenbeckia*, *Antigonon*). Certains *Coccoloba*, Polygoïdées, sont des arbres ou arbustes ayant donc un port de Triplaridées et dans une même région géographique; nous verrons ci-après que la fleur et le fruit en sont très différents. De même, les *Brunnichia* et *Antigonon* diffèrent à première vue, les uns par leur fruit ailé, les autres par leur fausse corolle large et rose, des Polygoïdées lianescientes. Enfin les *Calligonium* et *Pteropyrum* dont le port est assez voisin de celui des *Atrapaxis* et dans une aire géographique en partie commune, s'en distinguent à première vue par leur périanthe, mineur et non accrescent. Il ne peut donc y avoir doute quant aux limites subfamiliales que pour les *Muehlenbeckia*; nous y reviendrons en traitant de ce genre.

2.1 = Trib. **Triplarideae** C. A. Meyer 1840 : 147, emend.

2.1(1) = Subtrib. **Triplaridineae**

Triplaridearum subtribus unica, stigmatibus ad faciem internam stylorum elongatis integrisque.

Par définition, la tribu, adaptativement extrême, des Triplaridées ne peut comporter qu'une seule sous-tribu. Celle-ci est caractérisée par des stigmates adaxiaux, entiers, ± allongés. Elle comprend, partagés entre 3 cohortes, 5 genres, dont tous les représentants sont des arbres ou arbustes à périanthe composé de six tépales disposés en deux verticilles nettement distincts.

2.1(1).1 = Cohors **Symmeriastreæ** Roberty & Vautier cohors nov.

Triplaridinearum cohors tepalis interioribus fructu stricte inclusa.

2.1(1).1(.1) = **Symmeria** Benth. 1845 : 630. Espèce type : *S. paniculata*.

S. paniculata Benth. 1845 : 630. Specim. vis. : type, *Schomburgk* 138 (Guyane); *Roberty* 17952 (Sierra-Leone).

Le genre est localisé sur les côtes atlantiques d'Afrique et d'Amérique, entre les tropiques, en bordure de mangrove et, le long des fleuves, jusqu'à l'aval immédiat de leurs derniers rapides.

Il est constitué par une seule espèce d'arbustes à bois mou et cassant, à grandes feuilles au limbe largement et obtusément ovale à oblong ou cordiforme. Ces arbustes sont dioïques. Les plantes mâles ont leurs fleurs disposées en panicules terminales, abondantes et ramifiées. Les plantes femelles présentent aussi des panicules terminales

mais plus courtes et moins rameuses, souvent mal dégagées du feuillage; les fleurs sont petites, avec des styles très courts et dont le stigmate occupe toute l'étroite face adaxiale; l'achaine, assez gros et nuciforme, est très étroitement enclos dans les 3 tépales internes, seuls accrûs, devenus coriacés et en triangle ± allongé, avec leurs marges exactement contiguës.

2.1(1).3 = Cohors *Leptogonastreae* Roberty & Vautier cohors nov.

Triplaridinarum cohors fructu in tepalis omnibus inclusa.

2.1(1).3(.7) = *Leptogonium* Benth. in Benth. & Hook. 1880: 103. Espèce type : *L. domingense*.

L. buchii Urb. 1918: 168 = *L. domingense*. Specim. vis. : *Ekman* 5059 (Haïti).

L. domingense Benth. 1880: 104. Specim. vis. : *Ekman* 11290 (Haïti).

L. molle Urb. 1924: 338 = *L. domingense*. Specim. vis. : *Ekman* 15538 (Haïti).

Ce genre a un aspect général très voisin de celui des *Triplaris*; il en diffère toutefois nettement par ses fleurs, qui sont hermaphrodites, et par ses fruits inclus dans des tépales accrûs mais non pas modifiés.

Il est endémique dans l'île de Haïti et probablement assez rare; constitué par une seule espèce d'arbustes à bois mou et cassant, à feuilles groupées en pseudo-verticilles vers le sommet des rameaux. Ces feuilles peuvent être ± ovales ou oblongues et villuleuses ou glabrescentes; ceci, dans notre opinion, ne suffisant pas à distinguer dans la nature des « espèces », comme l'a fait URBAN, ni même des formes (héritaires). Les inflorescences, théoriquement axillaires et donc, de même que les feuilles, irrégulièrement pseudoterminalles, sont longues, graciles et simples. La fleur est petite, avec des styles étroitement et brièvement linguiformes et des stigmates occupant presque toute leur face adaxiale. L'achaine est assez petit, inclus dans les six tépales dont les trois externes deviennent nettement majeurs et imbriqués; l'unité de propagation ainsi constituée est, à maturité, petite, étroitement pyriforme, densément couverte d'une pubescence grisâtre et fine.

2.1(1).5 = Cohors *Triplaridastreae*

Triplaridinarum cohors media, tepalis exterioribus tantum accrescentibus et plus minusve alatis.

Nous réunissons dans cette cohorte trois genres, dont à vrai dire deux sont nettement opposables cependant que le troisième, qui les relie, constitue un groupe moyen plutôt que médian, passablement variable encore et donc peu nettement isolé.

Ces trois genres présentent en commun des achaines inclus ou contenus par les tépales externes, seuls et en général fortement accrûs. Chez tous trois, les caractéristiques tribales sont très nettes : styles allongés, étroitement linguiformes, stigmates adaxiaux, ± longuement décourants depuis le sommet du style; parfois étroitement ovales et rarement à marges ± ondulées chez les deux premiers genres, généralement plus longs et plus étroits chez le troisième, *Triplaris*.

2.1(1).5(10) = **Enneatypus** Herzog 1922 : 3 = *Ruprechtia* sectio *Pseudotriplaris* Benth. & Hook. 1880 : 105. Espèce type : *E. tenuiflorus*; autre espèce de même section : *E. ramiflorus*.

[*amentaceus*] *Ruprechtia amentacea* Meisn. 1855 : 56 = *E. tenuiflorus* s.s. Specim. vis. : Poeppig s.n. [1845] (Brésil).

[*apetalus*] *Ruprechtia apetala* Wedd. 1850 : 268 = *E. ramiflorus* s.l., e descr.

[*concinna*] *Ruprechtia concinna* Pittier 1927 : 75 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : type, Pittier 12209 (Vénézuela).

[*corylifolius*] *Ruprechtia corylifolia* Griseb. 1874 : 113 = *Triplaris corylifolia* O. Ktze. 1893 : 270 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Hyeronymus 629 (Argentine).

[*cruegeri*] *Ruprechtia cruegeri* Griseb. ex Lindau 1896 : 214 = *E. tenuiflorus* s.l. Specim. vis. : Broadway 2416 (Trinidad).

[*excelsus*] *Ruprechtia excelsa* Griseb. 1874 : 113 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Hyeronymus & Lorentz 1251 (Argentine).

[*fagifolius*] *Ruprechtia fagifolia* Meisn. 1855 : 58 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Blanchet 3277 (Brésil, Bahia); Cuénod s.n. [1914] (Tunis, cult. au J. Bot.).

[*hamanii*] *Ruprechtia hamanii* Blake 1918 : 31 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Pittier 12612 (Vénézuela).

[*jamesonii*] *Ruprechtia jamesonii* Meisn. 1856 : 179 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Spruce 6339 (Equateur, près du littoral).

[*laurifolius*] *Ruprechtia laurifolia* C. A. Mey. 1840 : 150 = *Triplaris laurifolia* Cham. & Schlecht. 1828 : 55 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Weddell 479 (Brésil, Rio de Janeiro).

[*laxiflorus*] *Ruprechtia laxiflora* Meisn. 1855 : 56 = *E. tenuiflorus* s.l. Specim. vis. : Hassler 7467 (Paraguay).

[*lundii*] *Ruprechtia lundii* Meisn. 1855 : 54 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Riedel 1374 (Paraguay).

[*macrocalyx*] *Ruprechtia macrocalyx* Huber 1909 : 345 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : type, Ducke 8540 (Brésil, Para).

E. nordjenskoldii Herzog 1922 : 3 = *E. tenuiflorus*. Specim. vis. : Fiebrig 211-b, specimen cité in Herzog l.c. (Paraguay).

[*obidensis*] *Ruprechtia obidensis* Huber 1909 : 344 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Ducke 19542 (Amazonie).

[*polystachyus*] *Ruprechtia polystachya* Griseb. 1879 : 90 = *Triplaris polystachya* O. Ktze. 1893 : 271 = *E. tenuiflorus* s.l. Specim. vis. : Pedersen 4350 (Paraguay).

E. ramiflorus Roberty & Vautier comb. nov. = *Ruprechtia ramiflora* C. A. Meyer 1840 : 150 = *Triplaris ramiflora* Jacq. 1763 : 14. Specim. vis. : Elias 1107. (Columbia)

[*splendens*] *Ruprechtia splendens* Standl. ex Cocucci 1961 : 249 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Hinton 3386 (Mexique).

E. tenuiflorus Roberty & Vautier comb. nov. = *Ruprechtia tenuiflora* Benth. 1845 : 629. Specim. vis. : Schomburgk s.n., s.d. (Guyane).

[*triflorus*] *Ruprechtia triflora* Griseb. 1879 : 89 = *Triplaris triflora* O. Ktze. 1893 : 271 = *E. ramiflorus* s.l. Specim. vis. : Pedersen 4073 (Paraguay).

[*viraru*] *Ruprechtia viraru* Griseb. 1879 : 90 = *E. tenuiflorus* s.l. Specim. vis. : Lorentz s.n. [1879] (Uruguay).

Pour Cocucci (1961), les représentants de la section *Pseudotriplaris*, c'est-à-dire nos *Enneatypus*, sont des *Ruprechtia* en raison d'une part de leurs fleurs mâles à périanthe profondément divisé en lobes aigus ; d'autre part, et surtout de leur branches et rameaux, durablement pleins d'une moelle ± dense et non pas promptement fistuleux. D'après leurs fruits, qui dans notre système définissent la totalité des caractéristiques du genre, les *Enneatypus* peuvent être considérés comme le résidu d'un ancêtre commun dont se sont ségrégés, par évolution, les *Ruprechtia* et *Triplaris*. Ces fruits d'*Enneatypus*, par voie de conséquence, demeurent beaucoup plus mal définis que ceux des deux autres genres : les tépales accrus comportent une partie inférieure, appliquée sur l'achaine, et un prolongement supérieur ± nettement différencié, en moyenne oblong, parfois étroit, parfois au contraire assez nettement obové, en aile de libellule.

Nous nous bornerons à distinguer deux espèces (principales), l'une plutôt triplaridoïde et l'autre plutôt ruprechtioïde, au moyen de la clef suivante :

Fruits groupés en fausses grappes, souvent ramifiées, néanmoins brèves et relativement denses ; partie supérieure des tépales accrus toujours et assez nettement aliforme **E. ramiflorus**

Fruits groupés en fausses grappes, généralement simples, toujours longues et très lâches ; partie supérieure des tépales accrus non ou peu nettement aliforme . . **E. tenuiflorus**

Les valeurs adaptatives prises en compte définissent la densité des fausses grappes, forte = 1 / 2 = faible ; et l'alature des unités de propagation, pratiquement nulle = 0 / 1 = assez nette.

E. ramiflorus s.s. présente des tépales accrus à prolongement bien développé mais oblong plutôt qu'aliforme, à base hautement soudée ; on le trouve en Colombie. Nous y rattachons, provisoirement, de nombreuses formes dont certaines assez nettement distinctes. *E. punctatus*, du haut Amazone, est remarquable par ses grosses unités de propagation (60/20 mm), les tépales externes submembraneux vers leur sommet. *E. triflorus* est très voisin de la forme-type, avec toutefois des tépales accrus séparés presque dès leur base, l'achaine étant masqué par les tépales internes, assez larges. *E. apetalus*, très près duquel peuvent être situés *E. corylifolius* et *E. fagifolius*, semble de taille mineure, avec des branches à la fois plus grêles et plus noueuses, des feuilles relativement petites.

E. tenuiflorus s.s. est une forme de la forêt guyanaise, retrouvée en Colombie, probablement rare sinon même accidentelle ; le prolongement des tépales accrus est très étroit.

Ce prolongement est obtusément obové chez *E. laxiflorus*, faisant suite à une base étroite et qui laisse visible une grande partie de l'achaine ; *E. polystachyus*, *E. viraru*, sont des formes très voisines ; le sous-ensemble ainsi constitué se rencontre sous climat subtropical dans les savanes des Antilles ainsi que dans celles qui s'étendent du Paraguay à l'Uruguay.

2.1(1).5(13) = **Ruprechtia** C. A. Meyer 1840 : 148, sensu restricto = *Magonia* Vell. 1825 : 165, non St.-Hil. 1824. Espèce type : *R. salicifolia*.

R. amentacea Meisn. = *Enneatypus tenuiflorus*.

R. apetala Wedd. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.

- R. brachysepala* Meisn. 1855 : 58 = *R. salicifolia* s.l. Specim. vis.: *Balansa* 2061 (Paraguay).
- R. brachystachya* Benth. 1845 : 630 = *Triplaris brachystachya* Endl. 1847 : 55 = *R. salicifolia* s.l. Specim. vis.: type, *Schomburgk* 345 (Brésil).
- R. concinna* Pittier = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. corylifolia* Griseb. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. cruegeri* Griseb. = *Enneatypus tenuifolius* s.l.
- R. excelsa* Griseb. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. fagifolius* Meisn. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. hamanii* Blake = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. jamesonii* Meisn. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. laurifolia* C. A. Meyer = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. laxiflora* Meisn. = *Enneatypus tenuiflorus* s.l.
- R. lundii* Meisn. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. macrocalyx* Huber = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. obidensis* Huber = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. polystachya* Griseb. = *Enneatypus tenuiflorus* s.l.
- R. ramiflora* C. A. Meyer = *Enneatypus ramiflorus*.
- R. salicifolia*** C. A. Meyer 1840 : 150 = *Triplaris salicifolia* Cham. & Schlecht. 1828 : 56. Specim. vis.: *Herter* 1079 (Uruguay).
- R. splendens* Standl. = *Enneatypus ramiflorus*.
- R. tenuiflora* Benth. = *Enneatypus tenuiflorus*.
- R. triflora* Griseb. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- R. viraru* Griseb. = *Enneatypus tenuiflorus* s.l.

Le genre, tel que nous le définissons, est très nettement isolé des autres Triplaridastrées par ses tépales externes à partie apicale brièvement accrue et très peu différenciée, plus courte que la partie basale et non pas nettement plus longue : en fait, les tépales en cause ne sont pas bipartites, le sommet prolongeant simplement la base sans étrécissement médian ni texture ou surface modifiée ; la base de ces tépales en s'écartant de celle de l'achaine s'élargit et s'arrondit en auricules obtuses et peu jointives, laissant l'achaine assez largement visible de part et d'autre des tépales internes qui sont très étroits. L'ensemble est à maturité coloré en rouge grenat ± vif.

Le genre ne contient qu'une seule espèce (principale) et qui nous semble assez peu variable ; d'arbres ou arbustes à rameaux pleins, à feuilles ± étroitement allongées, d'où l'épithète spécifique, *R. salicifolia* ; les inflorescences sont terminales mais peu dégagées des feuilles voisines légèrement réduites, elles se ramifient en cyme irrégulière, assez peu dense, plutôt étalée qu'allongée.

On rencontre cette espèce depuis la Guyane jusqu'au Paraguay, en savane ou dans les marges et clairières de la forêt dense.

2.1(1).5(14) = *Triplaris* Loefl. 1758 : 256 = *Velasquezia* Bertol. ex Pritzel 1855 : 1147 = *Vellaquezia* Bertol. ex Wittstein 1852 : 920 = *Vellasquezia* Bertol. 1840 : 39. Espèce type : *T. americana*.

- T. americana* L. 1759 : 881. Specim. vis. : *Allen* 4269 (Panama).
- T. baturitensis* Huber 1901 : 300 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : type, *Huber* 1600 (Brésil, Céara).
- T. boliviensis* Britton in Rusby 1900 : 130 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Bang* 1600 (Bolivie).
- T. brachystachya* Endl. = *Ruprechtia salicifolia* s.l.
- T. caracasana* Cham. 1833 : 137 = *T. americana* s.l. Specimen. vis. : *Baker* 2434 (Nicaragua); *Rojas* 13580 (Paraguay); *Weberbauer* 3586 (Pérou).
- T. corylifolia* O. Ktze. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- T. felipensis* Wedd. 1850 : 263 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Funck & Schlim* 657 (Vénézuela).
- T. gardneriana* Wedd. 1850 : 263 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : type, *Gardner* 1829 (Brésil).
- T. guayaquilensis* Wedd. 1850 : 263 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Stork & Eyer-* *dam* 8981 (Ecuador, Guayaquil).
- T. hispida* Britton ex Rusby 1896 : 111 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Bang* 1169 (Bolivie).
- T. laurifolia* Cham. & Schlecht. = *Enneatypus ramiflorus* s.l.
- T. lindeniana* Wedd. 1850 : 263 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : type, *Linden* 1648 (Colombie).
- T. macombii* Donn.-Smith 1894 : 257 = *T. melaenodendron*. Specim. vis. : type, *Donnell-Smith* 5064 (San-Salvador).
- T. martiana* Fisch. & Meyer ex Meyer 1840 : 148 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Claussen* s.n. [1839] (Brésil, Minas Geraes).
- T. melaenodendron* Standl. & Steyermark 1943 : 5 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Donnell-Smith* 6375 (Guatemala).
- T. pavonii* Meisn. 1856 : 172 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Huber* 4009 (Brésil, Para); *Woykotski* 35325 (Pérou).
- T. peruviana* Fisch. & Mey. ex Meyer 1840 : 149 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Woykotski* 34394 (Pérou).
- T. poeppigiana* Wedd. 1850 : 265 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Krukhoff* 10586 (Pérou).
- T. polystachya* O. Ktze. = *Enneatypus tenuiflorus* s.l.
- T. punctata* Standley 1937 : 468 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : type, *Krukhoff* 5277 (Pérou, haut Amazone).
- T. ramiflora* Jacq. = *Enneatypus ramiflorus*.
- T. salicifolia* Cham. & Schlecht. = *Ruprechtia salicifolia*.
- T. schomburgkiana* Benth. 1845 : 628 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Ule* 5259 (Amazonie).
- T. tomentosa* Wedd. 1850 : 265 = *T. americana* s.l. Specim. vis. : *Glaziou* 21976 (Brésil).

Sur le terrain, d'après divers spécialistes dont COCCUCCI (1961), les *Triplaris* s.s. peuvent être aisément identifiés par leurs branches et rameaux creux, très généralement infestés de fourmis arboricoles. En herbier, le fruit nous a paru constamment très caractéristique : les tépales nettement bipartites; leurs bases soudées autour

de l'achaine en cupule presque sphérique, souvent pubescente ou même velue; leurs prolongements écartés, alairement obovés, translucides sinon membraneux et toujours avec leurs nervures très apparentes, souvent d'un rouge écarlate à maturité. Ces unités de propagation forment ainsi des corbillons triptères et colorés, reliés aux cornets triédriques et colorés des *Ruprechtia* par les formes intermédiaires propres au genre *Enneatypus*.

Il n'est donc pas certain que le genre soit vraiment isolé. Une autre difficulté, elle aussi nomenclaturale plutôt que taxinomique, vient de ce que nul ne sait au juste ce qu'était le *Triplaris* premier nommé, *T. americana* de Linné; d'après les règles on devrait prendre, en conséquence, pour type du genre le *T. melaenodendron*.

Toutes les formes que nous réunissons ici dans une même espèce (principale) ont un port arborescent et parfois élevé, tout en étant à strictement parler des arbrisseaux herbacés; sans bois véritable puisque leurs branches et rameaux sont fistuleux. Les feuilles sont ovales à lancéolées, en général quelque peu réduites vers le sommet des branches. C'est là que se situent les inflorescences, pseudoterminales, longues et largement ramifiées mais à fleurs groupées vers le sommet de ces ramifications en faux épis très denses. Les fruits ont toujours un pédicelle très court.

T. caracasana, généralement considéré comme très voisin sinon synonyme du *T. americana* s.s., présente un fruit à base presque parfaitement sphérique, surmontée d'une collerette évasée et plissée d'où se dégagent les trois prolongations aliformes. *T. melaenodendron* en diffère par une collerette moins marquée surmontant une base obtusément ellipsoïde. Quant au *Triplaris punctata*, il est remarquable par la dimension de ses diaspores (60×20 mm), à cupule évasée et ailes larges. Dans d'autres formes, ainsi *T. felipensis* et *T. schomburgkiana*, les prolongations aliformes procèdent simplement d'un étrécissement ± prononcé de la base alors ovoïde; ceci faisant transition vers les fruits d'*Enneatypus*.

2.2 = Trib. **Brunnichieae** Roberty & Vautier trib. nov.

Calligonoidearum tribus mediocriter entomogama, subtribum unam includens.

2.2(2) = Subtrib. **Brunnichiineae**

Brunnichiearum subtribus stigmatis parvulis ad faciem internam stylorum plus minusve divisis.

2.2(2).9 = Cohors **Brunnichiastreæ**

Brunnichiinarum cohors hypanthio fructus in basi elato alatoque.

2.2(2).9(.1) = **Brunnichia** Banks ex Gaertn. 1788: 213 = *Brunichia* Banks ex Persoon 1805: 445 = *Rajania* Walt. 1788: 247, non L. 1753.

— 10 = Sectio **Brunnichia**. Espèce type: *B. cirrhosa*.

— 11 = Sectio **Afrobrunnichia** Roberty & Vautier sectio nov. = genus *Afrobrunnichia* Hutch. & Dalz. 1928: 28. Espèce type: *B. africana*.

B. africana Welw. 1869: 61 = *Afrobrunnichia africana* Hutch. & Dalz. 1928: 28 Specim. vis.: type, Welwitsch 1754 (Angola); Roberty 13640 (Côte d'Ivoire). Zenker 2823 (Cameroun).

cirrhosa Banks ex Gaertn. 1788 : 213. Specim. vis. : Tracy 8765 (U.S.A. Sud-Est).
erecta Aschers. 1881 : 334 = *Afrobrunnichia erecta* Hutch. & Dalz. 1928 : 28 = *B. africana* s.l. Specim. vis. : Andoh 5605 (Gold Coast, Ashanti).

La sous-tribu est caractérisée par des stigmates petits à très petits, indivis à bifides ou même plurilobulés, adaxialement terminaux sur des styles grêles et assez longs.

Le genre est très nettement caractérisé par une extrême élongation de l'hypanthe qui de surcroît devient membraneusement ailé. Il contient deux espèces (principales) géographiquement et morphologiquement bien distinctes :

- | | |
|---|--------------------|
| Hypanthe accru ailé unilatéralement ; inflorescences terminales bien dégagées ; fleurs et fruits en verticilles réguliers (10 = <i>Brunnichia</i>) | B. cirrhosa |
| Hypanthe accru bilatéralement ailé ; inflorescences toutes peu dégagées ; fleurs et fruits en fascicules irréguliers (11 = <i>Afrobrunnichia</i>) | B. africana |

Les valeurs adaptatives prises en compte définissent : non seulement le développement alaire de l'hypanthe, unilatéral = 1 / 2 = bilatéral; mais encore la localisation des inflorescences, en partie dégagées = 1 / 2 = toutes protégées; et la disposition des fleurs et fruits, irrégulière = 1 / 2 = pluriverticillée.

10 — La section *Brunnichia* comprend une seule espèce, localisée dans les Etats-Unis sud-orientaux, commune en Floride. Les *B. cirrhosa* sont des arbrisseaux lianescents, de forêt palustre ou de berge boisée; à feuilles, soit ± obtusément cordiformes, soit transformées en vrilles; à inflorescences axillaires ou terminales, ces dernières mieux développées et longuement dégagées du feuillage; toutes forment des grappes simples ou composées, à fleurs puis à fruits disposés en verticilles ± distants. Le périanthe comporte 5 tépales subaigus qui deviennent ± coriaces. L'hypanthe à maturité atteint 2 à 3 cm de longueur, avec sur un seul côté une expansion aliforme et membraneuse, large d'environ 10 mm au-dessous du fruit et progressivement quelque peu étrocie vers sa base.

11 — La section *Afrobrunnichia* comprend une seule espèce mais qui peut, aux deux extrêmes d'une variation éco-morphologique, se présenter sous la forme d'une haute liane (*B. africana* s.s.) dans la forêt dense africaine, de la Guinée à l'Angola, ou d'un arbrisseau lianescents (*B. erecta*) dans les marges et les clairières de cette même forêt.

Dans ces deux formes et toutes autres intermédiaires : les feuilles, parfois très grandes, sont elliptiques puis obtusément acuminées ou, vers le sommet des branches surtout, transformées en vrilles brièvement bifides; axillaires ou terminales, les inflorescences demeurent à l'abri du feuillage, en grappe simple, parfois longue, toujours avec des fleurs puis des fruits disposés irrégulièrement. Le périanthe comporte, comme dans l'espèce précédente, 5 tépales subaigus mais qui demeurent submembraneux. L'hypanthe à maturité peut atteindre 9 cm de longueur, est diamétriquement élargi par deux ailes opposées, membraneuses, larges chacune de 5 à 10 mm à leur sommet comme à leur base.

2.3 = Trib. **Antigoneae** Roberty & Vautier trib. nov.

Calligonoidearum tribus media, subtribus duas includens, stigmatibus vel variabilis-simis, vel terminalibus integrisque.

Nous réunissons ici deux sous-tribus : Muehlenbeckiinées, Antigoninées.

2.3(2) — Subtrib. **Muehlenbeckiineae** Roberty & Vautier subtrib. nov.

Antigonearum subtribus media, stigmatibus plus minusve ad faciem internam stylorum elongatis et divisus vel connatis.

2.3(2).2 = Cohors **Muehlenbeckiastreæ**

Muehlenbeckiinearum cohors genus unum includens, fructibus plus minusve carnosis.

2.3(2).2(.2) = **Muehlenbeckia** Meisn. 1840 : 316, nom. cons. = *Karkinetron* Raf. 1837 : 11, nom. rejic. : *Sarcogonum* G. Don in Sweet 1839 : 577, nom. rejic.

— .9 = Sectio **Muehlenbeckia**. Espèce type : *M. australis* ; autres espèces : *M. complexa*, *M. juncea*.

— 10 = Sectio **Homalocladium** Meisn. 1865 : 313 = *Polygonum* sectio *Homalocladium* F. v. M. 1858 : 73 = genus *Homalocladium* Bailey 1929 : 56. Espèce type : *M. platyclada*.

[*acetosifolia* :] *Polygonum acetosifolium* Vent. 1802 : 88. tab. 88 = *M. australis*. s.l.
M. adpressa Meisn. 1841 : 227 = *Polygonum adpressum* Labill. 1804 : 99. tab. 127
= *M. australis* s.l. Specim. vis. : type, *Labillardière s.n.*, s.d. (Australie); *Drummond* 704; *Pritzel* 241 (Australie).

M. australis Meisn. 1841 : 227 = *Coccoloba australis* Forst. 1786 : 29 = *Polygonum australe* A. Rich. 1832 : 178. Specim. vis. : *Leland & al.* 235 (Nouvelle-Zélande).

M. axillaris Hook. f. ex Walp. 1848-49 : 552 = *Polygonum axillare* Hook. f. 1847 : 278 = *M. complexa* s.l. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; *Helms* 70 (Nouvelle-Zélande).

M. chilensis Meisn. 1856 : 148 = *M. australis* s.l.

M. complexa Meisn. 1841 : 227 = *Polygonum complexum* A. Cunn. 1838 : 455. Specim. vis. : cult. J. Bot. Genève; *Leland & al.* 243 (Nouvelle-Zélande).

M. cunninghamii F. v. M. 1865 : 91 = *Polygonum cunninghamii* Meisn. 1853 : 364 = *M. juncea* s.s.

M. diclina Druce 1917 : 636; Black in Ewart 1930 : 434 = *Polygonum diclinum* F. v. M. 1855 : 23 = *M. australis* s.l. Specim. vis. : *Rohrlach* 10, 323 (Australie, New South Wales).

M. ephedroides Meisn. 1856 : 147 = *Polygonum ephedroides* Hook. f. 1853 : 211 = *M. juncea* s.l. Specim. vis. : *Anderson* 74 (Nouvelle-Zélande).

M. fruticulosa Standley 1937 : 453 = *Polygonum fruticosum* Walp. 1843 : 407 = *M. complexa* s.l. Specim. vis. : *Buchtien* 519, 8793 (Bolivie); *Dombey* 209 (Pérou).

M. hastulata Johnston 1928 : 88; Standley 1937 : 454 = *Rumex hastulatus* Smith in Rees 1819 : 29, fide Standley l.c. = *M. australis* s.l. Specim. vis. : *Fiebrig* 2650 (Pérou); *Weberbauer* 4914 (Bolivie); *Werdermann* 413 (Chili).

- M. juncea** Druce 1917 : 637 = *Polygonum junceum* A. Cunn. ex Lindl. in Mitch. 1848 : 85, non Ledeb. 1850. Specim. vis. : *Drummond* 218; *F. von Mueller* s.n. [1877]; *Rohrlach* 75 (Australie).
- M. leptobotrys** Meisn. 1856 : 149 = M. australis s.l.
- M. nummularia** Gross 1913 (2) : 346 = M. complexa s.l. Specim. vis. : type, *Weberbauer* 3172 (Pérou).
- M. platyclada** Meisn. 1865 : 313 = *Coccocloba platyclada* F. v. M. in Hook. 1863 : tab. 5382 = *Homalocladium platycladum* Bailey 1929 : 58 = *Polygonum platycladum* F. v. M. 1858 : 73. Specim. vis. : communément cultivé, surtout en pots.
- M. polybotrya** Meisn. in Lehmann 1845 : 623 = M. australis s.l. Specim. vis. : type, *Preiss* 1353 (Australie Ouest, Swan River).
- M. polygonoides** F. v. M. 1865 : 73 = M. australis s.l.
- M. rhyticarpa** F. v. M. 1865 : 92 = M. australis s.l. Specim. vis. : *W. Forsyth* s.n. [1901] (Australie, New South Wales).
- M. rupestris** Wedd. 1850 : 256 = M. complexa s.l.
- M. sagittifolia** Meisn. 1840 : 227 = *Coccocloba sagittifolia* Ortega 1798 : 60 = M. australis s.l. Specim. vis. : *Hassler* 7581 (Paraguay); *Herter* 234-B (Uruguay); *Lourteig* 373 (Argentine).
- M. stenophylla** F. v. M. 1859 : 138 = M. australis s.l.
- M. tannifolia** Meisn. 1840 : 227 = *Polygonum tannifolium* H. B. K. 1817 : 180 = M. australis s.l. Specim. vis. : *Fiebrig* 3370 (Bolivie); *Pittier* 276 (Venezuela); *Werdermann* 345 (Chili).
- M. tiliifolia** Wedd. 1850 : 255 = M. australis s.l. Specim. vis. : *W. H. & E. Camp* 3508 (Ecuador); *Weberbauer* 7777 (Pérou).
- M. volcanica** Endl. 1847 : 51 = *Polygonum volcanicum* Benth. 1841 : 81 = M. complexa s.l. Specim. vis. : type, *Hartweg* 562 (Mexique); *Asplund* 6382 (Ecuador); *McBride & Featherstone* 1834 (Pérou); *Skutch* 1511 (Guatemala); *Steinbach* 9860 (Bolivie).

La sous-tribu, réduite à son genre-type, est assez mal définie par des stigmates étendus jusqu'à la base des styles ou presque, ainsi adaxiaux ou subterminaux, de plus tantôt abrégés et tantôt allongés, souvent alors découpés, parfois soudés entre eux depuis leur base et ± longuement.

Cette variabilité, d'un caractère généralement bien fixé dans l'ensemble des Polygonacées, implique un assez haut degré d'archaïsme; ce qui est confirmé : d'une part, dans l'extrême variabilité du port; d'autre part, dans la présence ou l'absence d'une ébauche d'ochréa, toujours ± imparfaite ou friable, promptement déchirée par l'épaississement du rameau qu'elle entoure.

Le genre est bien caractérisé par ses fruits mais, là encore, peut s'observer une assez large variabilité : l'achaine, assez petit, peut être en effet ± complètement inclus, parfois totalement couvert, parfois en grande partie visible, dans l'ensemble, toujours très nettement charnu, formé par la concrescence de l'hypanthe et du périanthe; ce dernier constitué par 5 tépales qui peuvent à maturité se trouver complètement soudés ou, ± profondément, séparés.

Ces fruits sont toujours axillaires, solitaires ou pauvrement fasciculés, à l'aisselle de feuilles qui peuvent être bien développées ou minimes, voisines et subsessiles ou distantes et longuement pétioleées, persistantes ou fugaces. Toutefois certaines espèces ou formes peuvent comporter des fleurs stériles, mâles à ovaire nul ou abortif, et ces fleurs peuvent être disposées en grappes, lâchement spiciformes, axillaires mais généralement localisées vers le sommet des rameaux prenant ensemble, si les feuilles en sont réduites, une apparence d'inflorescence terminale et composée.

Dans une étude nécessairement sommaire, puisqu'elle a pour cadre la famille des Polygonacées et non pas le seul genre *Muehlenbeckia*, il est impossible d'apprécier correctement les éventuelles discontinuités d'une diversité aussi complexe. Nous nous sommes donc bornés à distinguer quatre espèces (principales), réparties en deux sections. La clef ci-dessous y conduit :

Tiges non ou très faiblement charnues (.9 = *Muehlenbeckia*)

Tiges prostrées ou grimpantes

Entrenœuds contractés, feuilles brièvement pétiolées, à limbe \pm brièvement obové
M. complexa

Entrenœuds allongés, feuilles longuement pétiolées, à limbe ± largement deltoïde
M. australis

Tiges dressées, entreœuds allongés, feuilles pratiquement sessiles, à limbe ± étroitement aciculaire. **M. juncea**

Tiges toujours et très nettement charnues (10 = *Homalocladium*), dressées puis retombantes, entreneuds aplatis, feuilles promptement caduques, à limbe + largement deltoïde

Les valeurs adaptatives prises en compte définissent : le port, volubile = 0 / 2 = dressé; l'aspect des entrenœuds, ligneux et trapu = 0 / 2 = charnu et large; la disposition des feuilles, lâche et fugace = 0 / 2 = dense et persistante; la forme de leur limbe, aciculaire = 0 / 2 = deltoïde.

.9 — La section type réunit ici trois espèces (principales) très différentes quant au port et au feuillage de leur forme type mais entre lesquelles existent des transitions qui peuvent former une séquence continue.

M. complexa typifie les *Muehlenbeckia* au port de myrtille, assez souvent cultivées comme plante de bordure à cause de la densité de leur feuillage toujours vert, émaillé la saison venue de fruits ± colorés. *M. complexa* s.s. présente souvent des grappes de fleurs stériles, ce qui le différencie de *M. axillaris*, forme la plus communément cultivée; toutes deux sont sauvages en Nouvelle-Zélande, Tasmanie et Australie; ce sont surtout des xérophytes. Les espèces ou formes sud-américaines sont des orophytes, parfois de haute montagne et alors caractéristiquement «en tabouret»; *M. volcanica* se rencontre du Mexique jusqu'en Bolivie; *M. nummularia*, du Pérou, aux feuilles très rondes, peut être le mieux différencié de ces sous-arbrisseaux à caractéristiques mineures passablement variées.

M. australis s.s. et *M. adpressa* se rencontrent en Australie et Nouvelle-Zélande, la seconde se différenciant par des feuilles à limbe arrondi et des grappes mâles flexueuses. En Amérique, *M. sagittifolia*, forme la plus commune sur les versants occidentaux des Andes, et *M. tannifolia*, forme mexicaine, ressemblent toutes deux

beaucoup à la forme-type. *M. hastulata*, forme étendue depuis le Pérou jusque vers le centre du Chili, s'en distingue par des feuilles sensiblement mineures; en revanche, *M. tiliifolia*, de l'Écuador et du Pérou, a des feuilles nettement majeures.

A la limite de cette espèce (principale) et de la suivante, peut être situé un sous-groupe centré sur *M. diclina*, australien, caractérisé par des tiges \pm ascendantes et à feuilles \pm réduites, au-delà d'une partie basale, toujours présente et prostrée sinon rampante.

M. juncea d'Australie et, plus caractérisé, *M. ephedroides* de Nouvelle Zélande, ont un port gracieusement dressé, des feuilles presque nulles.

10 — La section *Homalocladium* ne comprend qu'une seule espèce et forme, récoltée sauvage aux Iles Salomon. C'est un arbrisseau, parfois de belle taille, à branches et tige articulées en segments longs, larges et charnus, bilatéralement comprimés; ces articulations portent la saison venue des feuilles pétiolées, à limbe deltoïde, très fugaces; celles situées vers le sommet portent en outre des petits fascicules de fleurs, en partie stériles. Très rare dans la nature, *M. platyclada* en raison de son aspect curieux est cultivé, en pots surtout, ce qui le rend \pm nain.

2.3(3) = Subtrib. Antigonineae

Antigonearum subtribus stigmatibus ad apicem stylorum pervulis integrisque.

Cette sous-tribu est caractérisée par des stigmates terminaux, petits, globuleux ou étroitement capités : ceux des Polygoninées et des Eriogoninées. Nous lui rattachons 3 genres, partagés entre 2 cohortes.

2.3(3).5 = Cohors Antigonastreae

Antigoninearum cohors tepalis exterioribus tantum conspicue elatis.

Les 2 genres que nous rattachons à cette cohorte présentent des unités de propagation très ornementales : formées par l'accrescence des tépales externes en corbeille large et rose autour de l'achaine.

2.3(3).5(.9) = **Antigonon** Endl. 1837 : 410 non *Antigona* Vell. 1827, nom. rejic.
= *Antigonium* Endl. ex Juss. in Orbigny 1847 : 386 = *Antigonum* Endl. ex Reichenb. 1841 : 163 = *Corculum* Stuntz 1913, fide Duke 1960 : 334. Espèce type : *A. leptopus*.

A. cinerascens Mart. & Gal. 1843 : 14 = *A. leptopus* s.l. Specim. vis. : *Hinton 10870* (Mexique).

A. cordatum Mart. & Gal. 1843 : 14 = *A. leptopus* s.l. Specim. vis. : *Apollinaire s.n.* [1902] (Colombie, Bogota); *Eggers 706* (Antilles).

A. flavescens Wats. 1887 : 446 = *A. leptopus* s.l. Specim. vis. : *Palmer 722* (Mexique).

A. grandiflorum Robinson 1909 : 613 = *Polygonum grandiflorum* Bertol. 1840 : 12 = *A. leptopus*. s.l.

A. guatimalense Meisn. 1856 : 184 = *A. leptopus* s.l. Specim. vis. : *Heyde & Lux 6374* (Guatemala).

A. leptopus Hook. & Arn. 1838 : 308. Specim. vis. : communément cultivé dans les régions tropicales.

Le genre est caractérisé par un périanthe à 5 ou 6 tépales, subégalement accrescents mais dont les 3 externes deviennent obtusément cordiformes, avec leurs marges étroitement contiguës.

A. leptopus est une liane herbacée, prolifique et peu exigeante, à feuilles ± largement et obtusément cordiformes, à inflorescences axillaires, en grappe simple mais dont l'axe est généralement prolongé par une vrille ± ramifiée.

Cultivée ou subspontanée, cette plante, connue sous le nom de « liane-corail » est extrêmement commune dans tous les pays tropicaux. Il en a été décrit d'Amérique centrale, son probable berceau, plusieurs formes sauvages, peu différenciées et parfois retrouvées dans des peuplements très certainement évadés de culture.

2.3(3).5(12) = **Gymnopodium** Rolfe 1901 : tab. 2699 = *Millspaughia* Robinson ex Millsp. & Loes. 1905 : 13. Espèce type : *G. floribundum*.

G. antigenoides Blake 1921 : 83 = *Millspaughia antigenoides* Robinson ex Millsp. & Loes. 1905 : 14 = *G. floribundum* s.l. Specim. vis. : Gaumer 24130 (Mexique, Yucatan).

G. floribundum Rolfe 1901 : tab. 2699. Specim. vis. : Lundell 3516 (Guatemala).

[*leiophyllum*:] = *Millspaughia leiophylla* Blake 1917 : 62 = *G. floribundum* s.l. e descr.

G. ovalifolium Blake 1921 : 83 = *Millspaughia ovalifolia* Robinson ex Millsp & Loes. 1905 : 14 = *G. floribundum* s.l. e descr.

Le genre est caractérisé par un périanthe à 6 tépales en 2 verticilles bien distincts : les 3 internes étroitement lancéolés, les 3 externes devenant très semblables, autour du fruit mûr, à ceux des *Antigonon*.

G. floribundum est un arbuste à bois tendre, à feuilles ± largement et obtusément ovales ou obovées, à inflorescences terminales, grandes, racémeuses et ramifiées.

L'espèce est originaire d'Amérique centrale et il ne semble pas que la culture en ait été tentée, du moins avec succès. Les différentes « espèces » qui en ont été décrites, d'après la forme ou la texture des feuilles, nous semblent mériter tout au plus le rang de variété.

2.3(3).8 = Cohors **Podopterastreae** Roberty & Vautier cohors nov.

Antigoninarum cohors tepalis externis et hypanthio concrescentibus plus minusve alatis.

2.3(3).8(.1) = **Podopterus** Humb. & Bonpl. 1809 : 89. tab. 107 = *Podopteris* Humb. & Bonpl. ex Reichenb. 1828 : 163.

— .7 = sectio **Neomillspaughia** Roberty & Vautier sect. nov. = genus *Neomillspaughia* Blake 1921 : 84. Espèce type : *P. paniculatus*.

— 10 = sectio **Podopterus**. Espèce type : *P. mexicanus*.

P. cordifolius Rose & Standley in Standley 1920 : 66 = *P. mexicanus* s.l. e descr.

P. emarginatus Gross in Loesener 1913 : 218 = *Neomillspaughia emarginata* Blake 1921 : 84 = *P. paniculatus* s.l. Specim. vis. : type, *Gaumer* 750 (Mexique, Yucatan).

P. mexicanus Humb. & Bonpl. 1809 : 89. tab. 107. Specim. vis. : *Gaumer* & al. 23206-A (Yucatan) ; *Hinton* 3775 (Mexique septentrional) ; *Langlassé* 922 (Mexique central).

P. paniculatus Roberty & Vautier comb. nov. = *Campderia paniculata* Donnell-Smith 1899 : 440 = *Neomillspaughia paniculata* Blake 1921 : 84. Specim. vis. : type, *Donnell-Smith* 5604 (Honduras).

Le genre est caractérisé par des unités de propagation semblables à celles des *Bilderdykia* et *Reynoutria*: l'achaine étroitement inclus dans la concrescence du périanthe et de l'hypanthe, les 3 tépales externes pourvus d'une crête médiane évaginée en aile, membraneuse et longuement décurrente.

Les deux sections, chacune à une espèce (principale) admises ici diffèrent considérablement quant à la disposition de leurs fleurs et fruits, légèrement par ailleurs :

Inflorescences terminales et anarchiquement racémeuses (.7 = *Neomillspaughia*)

P. paniculatus

Inflorescences axillaires et densément fasciculées (10 = *Podopterus*). . . . *P. mexicanus*

Les valeurs adaptatives prises en compte dans la numérotation des sections portent sur la disposition des fleurs, terminales = 0 / 2 = axillaires, en grappes = 0 / 2 = en fascicules; ainsi que sur la principale caractéristique des tépales accrûs, nacrés = 0 / 1 = ternes.

.7 — La section *Neomillspaughia* comprend des arbustes à bois tendre mais souvent à port ± arborescent, à feuilles suborbiculaires ou obtusément elliptiques, arrondies ou cordées vers leur base et bilobées ou tout au moins émarginées à leur sommet, à inflorescences terminales, surabondantes, racémeuses et ramifiées mais non point paniculées au sens propre de ce mot. Les unités de propagation relativement à celles des *Podopterus* s.s. sont légèrement mineures, à ailes opaques et même ternes. Le *P. paniculatus* est rare en Amérique centrale, sous climat humide et chaud.

10 — La section *Podopterus* comprend des arbustes à port souvent ± buissonnant, à branches noueuses, feuilles obovées à elliptiques, fleurs longuement pédicellées, groupées en fascicules souvent surabondants qui peuvent être axillaires ou infra-axillaires. Les ailes des unités de propagation sont généralement translucides ou nacrées. Au plus près de ces fascicules, certains rameaux peuvent devenir abortifs et spinescents. Le *P. mexicanus* paraît assez commun au Mexique, depuis les déserts du Nord jusqu'aux forêts du Yucatan.

2.4 = Trib. **Calligoneae**

Calligonoidearum tribus mediocriter anemogama, subtribum unam includens.

2.4(2) = Subtrib. **Calligonineae**

Calligonearum subtribus stigmatibus ad stylorum apicem plus minusve elatis.

Nous rattachons à cette sous-tribu, la seule de sa tribu, 2 cohortes chacune à 1 seul genre. La sous-tribu est définie assez imparfaitement du point de vue théorique : par des stigmates ± largement capités au sommet des styles. Du point de vue pratique, en revanche, elle est très bien caractérisée : comprenant des arbrisseaux xérophytes, à feuilles réduites ou fugaces et même nulles, à fruit développé au-delà du périanthe non accru et présentant des évaginations spectaculaires de ses marges ou sutures carpellaires.

2.4(2).5 = Cohors *Calligonastreae*

Calligoninearum cohors media, perianthio non accrescente, fructibus diverse alatis, vesiculosis spinosisve.

2.4(2).5(17) = *Calligonum* L. 1753 : 530 = *Calogonum* L. ex Post & O. Ktze. 1903 : 91.

- .8 = Sectio *Calligonum*. Espèce type : *C. polygonoides*; autres espèces : *C. comosum*, *C. crispum*.
- .9 = Sectio *Pterococcus* Dammer 1893 : 25 = genus *Pterococcus* Pall. 1773 : 332, nom. rejic. = *Pallasia* L. f. 1781 : 252, nom. rejic. Espèce type : *C. aphyllum*.
- 10 = Sectio *Calliphysa* Endl. 1837 : 308 = genus *Calliphysa* Fisch. & Mey. 1835 : 24. Espèce type : *C. junceum*.

C. aphyllum Guerke in Richter 1897 : 111 = *Pterococcus aphyllus* Pall. 1773 : 332. Specim. vis. : *Androssow & Kelow* 1382 (Turkestan, Boukhara); *Sintenis* 48-b (Askhabad).

C. arborescens Litw. 1900 (in sched.) ex Komarov 1936 : 592 = *C. comosum* s.l. Specim. vis. : type, *Litwinow* 284 (Turkestan, Merv).

C. batiola Litw. 1913 : 56 = *C. aphyllum* s.l. Specim. vis. : *Korovine* 104 (Turkestan, Kizil-Koum).

C. caput-medusae Schrenk in Fischer & Meyer 1841 : 9 = *C. comosum* s.l. Specim. vis. : *Litwinow* 251 (Turkestan).

C. comosum L'Hérit. 1791 : 180. Specim. vis. : *Kaiser* 85 (Arabie, mont Sinaï); *Litwinow* 248 (Turkestan, Merv); *Maire* 1109 (Sahara, Mouydir).

C. crispum Bunge 1839 : 8. Specim. vis. : *Popova* s.n. [1921] (Sibérie Sud, Semi-palatinsk).

C. densum Borszcz. 1860 : 36 = *C. crispum* s.l. Specim. vis. : *Androssow* 1432 (Turkestan, Bokhara).

C. eriopodium Bunge 1851 : 486 = *C. comosum* s.l. Specim. vis. : *Korovin* 227 (Turkestan, Merv).

C. junceum Litw. 1922 (in sched.) ex Komarov 1936 : 594 = *Calliphysa juncea* Fisch. & Mey. 1835 : 24. Specim. vis. : *Bunge* s.n. [1859] (Perse).

C. leucocladum Bunge 1851 : 485 = *Pterococcus leucocladus* Schrenk 1845 : 211 fide Pavlov in Komarov 1936 : 545 = *C. aphyllum* s.l. Specim. vis. : *Regel* 409 (Turkestan).

- C. microcarpum* Borszcz. 1860: 41 = *C. comosum* s.l. Specim. vis.: *Litwinow* 44 (Turkestan, Askhabad).

C. murex Bunge 1851: 486 = *C. crispum* s.l. Specim. vis.: *Krascheninnikov* 88 (Turkestan, Turgai).

C. polygonoides L. 1753: 530. Specim. vis.: *Drummond* 15226 (Pakistan, Punjab); *Szovitz* 222 (Caucasie, Azerbaïdjan).

C. rotula Borszcz. 1860: 35 = *C. polygonoides* s.l. Specim. vis.: *Litwinow* 390 (Turkestan, Merv).

C. rubicundum Bunge 1839: 8 = *C. aphyllum* s.l. Specim. vis.: *Saposhnikov* s.n. [1904] (Turkestan, Semireczje).

C. setosum Litw. 1913: 57 = *C. crispum* s.l. Specim. vis.: *Korovin* 228 (Turkestan, Merv).

C. turkestanicum N. Pavl. 1933: 155 = *C. polygonoides* s.l. Specim. vis.: *Korovin* 226 (Turkestan, Merv).

Le genre est localisé dans les déserts de l'ancien monde, au nord du Tropique; il présente un maximum de variabilité en Asie centrale.

Toutes ses espèces et formes ont un port normal très caractéristique, éphédroïde à pseudo arborescent par émergence d'une souche le plus souvent hypogée ou hautement ensablée : les tiges en sont vertes, d'un vert généralement terne, peu ramifiées mais abondamment cespiteuses, hautes de 1 à 3 mètres; les feuilles sont très étroites, petites et fugaces. Les fleurs et fruits sont localisés, solitaires ou par 2 à 3, à l'aisselle de ces feuilles tôt disparues; ceci depuis la base des tiges ou presque.

Les *Calligonum* se distinguent des autres Polygonacées par des ovaires toujours à 4 carpelles ainsi que par un androcée très souvent tristémone; la fleur peut comporter 5 ou, plus rarement, 6 tépales et, corrélativement, elle pourra comporter 10 (2 fois 5) à 18 (3 fois 6) étamines.

Les pédicelles, articulés sur un hypanthium qui les prolonge et leur est semblable, sont toujours assez longs par eux-mêmes.

Dans cet ensemble, extrêmement homogène pour tant de ses caractéristiques, la diversité des fruits est en revanche extrême. Tous ont leurs deux marges carpellaires longuement et largement évaginées; la clef analytique donnée ci-après distingue, avec les 5 espèces (principales) ici admises, leurs 5 formes fondamentales dont l'on verra qu'elles se regroupent naturellement en 3 prototypes de développement.

Fruit non inclus dans un ballonnet vésiculeux

Fruit non en forme de toupie à 4 angles (.8 = *Calligonum*)

Marges carpellaires profondément divisées

C. polygonoides

C. comosum

Marges carpellaires brièvement dentelées C. crispum

Fruit toujours en forme de toupie à 4 angles (.9 = *Pterococcus*) C. **aphyllum**

Nous ne distinguons ainsi que des modalités différentes tendant toutes vers une anémochorie mais de roulage plutôt que de vol; sous ce rapport, la sphéricité

optimale; tandis que les hérissons, non préhensiles d'ailleurs, des fruits de *Calligonium* sensu stricto, bien que parfois presque parfaitement sphériques eux-mêmes, peuvent être considérés comme n'étant encore que de très imparfaites ébauches.

Les valeurs adaptatives prises en compte sont les suivantes :

fruit, côtelé = 0 / 2 = sphérique;
base des marges évaginées, multiplement divisée = 0 / 2 = indivise;
sommet de ces marges, qu'elles soient ou non divisées, spinescentes = 0 / 2
= membraneuses.

.8 — La section type comprend donc ici 3 espèces principales.

C. polygonoides, avec ses marges carpellaires laciniées et subcoriaces, peut être considéré comme le centre d'une variation qui relie \pm les deux autres espèces. Vers le *C. comosum* cette variation aura pour forme extrême le *C. turkestanicum* aux lanières non rigides mais très nombreuses et fines; vers le *C. crispum* la forme extrême peut être le *C. rotula* aux lanières \pm abrégées et divisées vers leur sommet en branches dont certaines peuvent être \pm spinescentes.

La forme type se rencontre depuis le Caucase jusqu'au Punjab; semble présenter un maximum de variabilité sur les confins de la Perse et du Turkestan.

C. crispum sous sa forme type est remarquable par des marges carpellaires fortement plissées dès leur base, onduleusement découpées sur leur crête avec des dents \pm distantes et spinescentes. *C. murex* en est une forme extrême à dents très peu nombreuses et largement aiguës; à l'extrême opposé peut être situé *C. setosum* dont, tout au contraire, les dents sont nombreuses et donc fines.

Cette espèce paraît n'avoir été, toutes variations incluses, récoltée qu'au Turkestan.

C. comosum a été subdivisé en innombrables « espèces » d'après l'abondance des épines en quoi se divisent les marges carpellaires, leur localisation si elle est faible ou leur division si elle est grande. Les épines sont souvent rares chez les individus vieillis qui se reconnaissent par ailleurs à leur souche désensablée; *C. arborescens* est dans ce cas. Elles sont nombreuses dans la forme-type et redivisées en branches étalées qui finissent par entourer le fruit d'une résille extérieurement sphérique; ainsi organisée cette boule peut atteindre plus de 6 cm de diamètre chez *C. caput-medusae* mais ne pas atteindre 2 cm chez *C. microcarpum*. Nous avons vu plus haut que la limite des *C. polygonoides* et *C. comosum* était statistique plutôt qu'absolue; parmi les *C. comosum* sensu lato qui se rapprochent le plus de cette limite peut être cité *C. eriopodum* dont les épines sont relativement souples et de surcroît élargies et soudées vers leur base en une crête ondulée.

.9 — La section *Pterococcus* dans son espèce type, *C. aphyllum*, est remarquable par des marges carpellaires indivises, souvent toutefois \pm plissées, toujours convergentes l'une vers l'autre avec leurs crêtes contiguës au-dessus de la paroi carpellaire dont elles procèdent. Ainsi le fruit proprement dit est caché par ces quatre paires convergentes dont l'ensemble paraît former une toupie tétraédriquement \pm hélicoïdale. Cette section n'a été signalée que du Turkestan et semble commune surtout dans sa partie septentrionale. Sa variation porte sur les dimensions du fruit et de ses ailes : très larges et accolées sur toute leur longueur chez *C. leucocladum*,

assez étroites et contiguës seulement vers leur base et leur sommet chez *C. batiola*. En outre les marges carpellaires peuvent être, chez *C. rubicundum* notamment, onduleusement dentelées; ceci constituant une liaison des *Pterococcus* vers les *Calligonum* sensu stricto d'espèce *C. crispum*.

10 — La section *Calliphysa* et son espèce unique, *C. junceum*, dérive très probablement du *C. comosum*. L'armature qui soutient le ballonnet vésiculeux est en effet identique à celle qui entoure les fruits de cette espèce de *Calligonum* sensu stricto; c'est sur cette armature, à l'extrémité de ses divisions les plus fines, que se développe une anastomose membraneuse. Nous n'avons pas trouvé, toutefois, ni en herbier, ni dans la littérature, de formes imparfaites à la limite de ces deux architectures. Le *C. junceum* a été récolté en Perse et dans le Turkestan méridional; paraît assez rare.

2.4(2).7 = Cohors *Pteropyrastreae* Roberty & Vautier cohors nov.

Calligoninarum cohors perianthio non accrescente, fructibus tripteris.

2.4(2).7(.6) = *Pteropyrum* Jaub. & Spach 1844: 7. Espèce type: *P. aucheri*.

P. aucheri Jaub. & Spach 1844: 8. tab. 107. Specim. vis.: *Aitchinson* 46-693 (Afghanistan); *Bornmüller* 4170 (Perse).

P. olivieri Jaub. & Spach 1844: 9. tab. 108 = *P. aucheri* s.l. Specim. vis.: *Aucher-Eloy* 5268; *Strauss* s.n. [1892] (Perse).

P. scoparium Jaub. & Spach 1844: 10. tab. 109 = *P. aucheri* s.l. Specim. vis.: *Aucher-Eloy* 5270 (Arabie, Mascate).

Les *Pteropyrum* sont des arbrisseaux très semblables par leur port et leur aspect général aux *Calligonum* et comme eux localisés dans les déserts du Vieux Continent mais avec un habitat plus méridional et restreint à la Perse plus quelques irradiations, vers l'Afghanistan au Nord-Est et, en Arabie, au Sud du Golfe Persique.

Le genre est toutefois nettement caractérisé: par des fruits à 3 carpelles, dont les évaginations sont soudées, c'est-à-dire suturales et non point marginales; en outre ces évaginations sont discontinues, avec une partie apicale affectant le tiers supérieur et une partie basale développée sur ses deux tiers inférieurs. Ces deux parties, également aliformes et membraneuses, peuvent être ou non dans le prolongement l'une de l'autre.

La forme-type, *P. aucheri*, apparemment localisée au Nord-Est de l'aire commune, a un fruit nettement hélicoïdal, des feuilles étroitement et obtusément lancéolées. En Perse méridionale se rencontre, exclusivement ou tout au moins principalement, *P. olivieri* au fruit hélicoïdal et aux feuilles obtusément spatulées. Quant à la forme d'Arabie sud-orientale, *P. scoparium*, elle a des fruits avec leurs trois ailes développées chacune dans un même plan, des feuilles charnues et boudinées.

3 = Subfam. *Eriogonoideae* Roberty & Vautier subfam. nov. = *Eriogoneae* Dammer 1891: 9, sensu restricto.

Polygonacearum subfamilia stipulis non ochraceis, floribus involucratis.

3.3 = Trib. *Eriogoneae*

3.3(3) = Subtrib. **Eriogonineae**

Eriogonearum subtribus stigmatibus ad apicem stylorum parvulis integrisque.

Dans la sous-famille des Eriogonoïdées, caractérisée par l'absence d'ochréas et la présence d'involucres, nous ne reconnaissions qu'une seule tribu, elle-même à une seule sous-tribu, caractérisée par des stigmates petits, globuleux ou capités, situés au sommet des styles; c'est-à-dire semblables à ceux des Polygoninées.

Dans cette sous-tribu, en revanche, peuvent être aisément distinguées 4 cohortes par leurs unités de propagation : épineuses, indifférenciées, ailées ou enfin vésiculeuses.

3.3(3).4 = Cohors **Chorizanthastreæ** Roberty & Vautier cohors nov.

Eriogonearum cohors fructibus in plus minusve spinescente involucro stricte inclusis.

Dans cette cohorte se situent 4 genres présentant en commun des unités de propagation complexement composées d'un involucre ou involucelle étroitement inclusif de l'achaine entouré par un périanthe persistant mais non ou peu modifié; cette enveloppe extérieure est très généralement composée de pièces à sommet spinescent. Ces pièces sont soudées entre elles dans 3 des genres, dont 2, *Eriogonella* et *Centrostegia* peuvent n'être que des spécialisations extrêmes de tendances déjà esquissées dans le troisième, *Chorizanthe*; alors les tépales sont ± profondément séparés. Dans le quatrième genre, *Lastariaea*, les pièces involucellantes sont libres entre elles mais, en compensation, le périanthe est utriculairement gamotépale.

Toutes les Chorizanthastrées sont des sous-arbrisseaux ± nains et secs, localisés sous climat désertique au Chili et surtout en Californie.

3.3(3).4(.1) = ***Eriogonella*** Goodman 1934: 90, sensu restricto. Espèce type : *E. membranacea*.

E. membranacea Goodman 1934: 91 = *Chorizanthe membranacea* Benth. 1837: 419. Specim. vis.: Heller 8597 (Californie).

E. spinosa Goodman = *Chorizanthe procumbens* s.l.

Nous restreignons ici ce genre en le définissant par un fruit ± complètement inclus dans la partie basale, ± étroitement utriculaire, d'un involucelle apicalement élargi en une collerette membraneuse et ± largement étalée entre les dents, finement crochues, qui terminent chacune de ses 6 pièces.

Ce genre ainsi défini est monotypique, la forme primitivement décrite par Bentham, du Chili, étant unanimement considérée comme identique à la forme californienne.

E. membranacea est un sous-arbrisseau herbacé, annuel, dressé, une ou deux fois dichotomiquement ramifié vers son sommet; les feuilles basales forment une touffe irrégulière et pauvre, les caulinaires sont alternes, les apicales abrégées et pauvrement subverticillées; leur pétiole est court, leur limbe étroitement et longuement lancéolé. Les involucres se réduisent généralement à des involucelles uniflores; solitaires ou presque au long de la tige, ils forment de petits fascicules à l'aisselle des ramifications et un capitule assez peu abondant à leur sommet. Ces capitules sont assez ornementaux, formant des boules petites mais apparemment nacrées.

L'espèce paraît assez rare. Elle prolonge évidemment la variation des *Chorizanthe* de section *Eriogonelopsis*; nous l'en avons maintenue génériquement séparée pour les raisons suivantes : a) le pseudolimbe qui termine l'involucelle s'étend sur 50 à 60% de sa profondeur totale, non pas 10 à 30%; b) le périanthe est lui-même toujours composé de 6 tépales subégaux et libres entre eux, non pas inégaux et longuement soudés comme chez les *Chorizanthe* en général et plus spécialement chez ceux de section *Eriogonelopsis*.

3.3(3).4(.4) = *Chorizanthe* R. Br. ex Benth. 1837: 416 = *Chorizantha* R. Br. ex Reichenb. 1841: 163. = *Trigonocarpus* Berter. ex Steud. 1841: 710, fide index Kew., non Vell. nec Wall.

— .7 = Sectio *Mucronea* Roberty & Vautier comb. nov. = genus *Mucronea* Benth. 1837: 419. tab. 20 = *Mucreneaa* Benth. ex Steud. 1840: 163. Espèce type : *C. californica*.

— .8 = Sectio *Acanthogonium* Roberty & Vautier comb. nov. = genus *Acanthogonium* Torr. 1857: 132, sensu elato. Espèce type : *C. rigida*.

— .9 = Sectio *Anisogonum* Roberty & Vautier sect. nov. Espèce type : *C. procumbens*.

Chorizanthe cum involucro plus minusve biverticillato, in basi non crasso, nec in apice latidentato.

10 = Sectio *Eriogonelopsis* Roberty & Vautier sect. nov. Espèce type : *C. pungens*.

Chorisanche cum involucro univerticillato et apice plus minusve latidentato.

— 11 = Sectio *Chorizanthe*. Espèce type : *C. virgata*.

C. brevicornu Torr. 1859: 177 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Kennedy* 1851 (Californie).

C. breweri Wats. 1877: 270 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *L. S. Rose* 92 (Californie).

C. californica A. Gray 1861: 149 = *Mucronea californica* Benth. 1837: 419. tab. 20. Specim. vis. : *Elmer* 3837, *Wheeler* 746 (Californie).

C. chilensis Goodman = *Lastariaea chilensis*.

C. clevelandii Parry 1884: 62 = *C. procumbens* s.l. Specim. vis. : *Elmer* 3245 (Californie).

C. commissuralis Rémy 1851-52: 287 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Werdermann* 860 (Chili).

C. coriacea Goodman = *Lastariaea chilensis* s.l.

C. corrugata Torr. & Gray 1870: 198 = *C. rigida* s.l. Specim. vis. : *Lemmon* s.n. [1884] (Californie); *Parish* 774 (Colorado).

C. cuspidata Wats. 1882: 378 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : type, *Jones* 2386 (Californie).

C. diffusa Benth. 1856: 26 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : topotype, *Heller* 14404 (Californie).

C. douglasii Benth. 1837: 418 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Elmer* 3253 (Californie).

- C. fimbriata* Nutt. 1848 : 168 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Abrams* 3426 (Californie).
- C. frankenoides* Rémy 1851-52 : 288 = *C. virgata* s.l. Specim. vis. : *Werdermann* 383 (Chili).
- C. glabrescens* Benth. 1837 : 418 = *C. virgata* s.l. Specim. vis. : *Werdermann* 118 (Chili).
- C. intricata* Phil. 1895 : 495 = *C. virgata* s.l. Specim. vis. : *Werdermann* 902 (Chili).
- C. lastarriaea* Parry = *Lastarriaea chilensis*.
- C. leptoceras* Wats. = *Centrostegia leptoceras*.
- C. leptotheca* Goodman 1934 : 61 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : type, *Abrams* 3777 (Californie).
- C. membranacea* Benth. = *Eriogonella membranacea*.
- C. obovata* Goodman 1934 : 70 = *C. procumbens* s.l. Specim. vis. : type, *Brandegee* 84 (Californie).
- C. orcuttiana* Parry 1884 : 54 = *C. rigida* s.l. Specim. vis. : *Brandegee* 218 (Californie).
- C. palmeri* Wats. 1877 : 271 = *C. procumbens* s.l. Specim. vis. : type, *Palmer* 464 (Arizona).
- C. paniculata* Benth. 1837 : 417 = *C. virgata* s.l. Specim. vis. : *Philippi* s.n. [1862] (Chili, Santiago).
- C. parryi* Wats. 1877 : 271 = *C. procumbens* s.l. Specim. vis. : *Parry* 269 (Californie).
- C. perfoliata* A. Gray 1861 : 148 = *Mucronea perfoliata* Heller 1905 : 23 = *C. californica* s.l. Specim. vis. : *Palmer* 468; *Pringle* s.n. [1882] (Californie).
- C. polygonoides* Torr. & Gray 1870 : 197 = *Acanthogonium polygonoides* Goodman 1934 : 91 = *C. rigida* s.l. Specim. vis. : *Brandegee* 3412 (Californie).
- C. procumbens** Nutt. 1848 : 167. Specim. vis. : *Parish* 3663 (Californie).
- C. pungens** Benth. 1837 : 419. Specim. vis. : *Parry* s.n. [1883] (Californie).
- C. ramosissima** Benth. 1837 : 417 = *C. virgata* s.l. Specim. vis. : *Germain* s.n. [1855-56] (Chili).
- C. rigida** Torr. & Gray 1870 : 198 = *Acanthogonium rigidum* Torr. 1857 : 132. Specim. vis. : *Reed* 508 (Nevada).
- C. robusta** Parry 1889 : 176 = *C. procumbens* s.l. Specim. vis. : *Greene* s.n. [1891] (Californie).
- C. spinosa** Wats. 1880 : 481 = *Eriogonella spinosa* Goodman 1934 : 91 = *C. procumbens* s.l. Specim. vis. : *Brandegee* 217 (Californie).
- C. staticoides** Benth. 1837 : 418 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Elmer* 3251 (Californie).
- C. stellulata** Benth. 1856 : 26 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Heller & Brown* 5568 (Californie).
- C. thurberi** Wats. = *Centrostegia thurberi*.
- C. umbellata** Phil. 1864-65 : 225 = *C. virgata* s.l. Specim. vis. : *Johnston* 16515 (Chili).
- C. uniaristata** Torr. & Gray 1870 : 195 = *C. procumbens* s.l. Specim. vis. : *Palmer* 446 (Arizona).
- C. vaginata** Benth. 1837 : 417 = *C. virgata* s.l. Specim. vis. : *Philippi* s.n. [1876] (Chili).

- C. valida* Wats. 1877 : 271 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Elmer* 4756 (Californie).
C. villosa Eastwood 1903 : 485 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Rose* 56128 (Californie).
C. virgata Benth. 1837 : 417. Specim. vis. : *Germain* s.n. [1855-56]; *Philippi* s.n. [1861] (Chili).
C. viridis Philippi 1895 : 498 = *C. virgata* s.l. Specim. vis. : *Werdermann* 218 (Chili).
C. watsonii Torr. & Gray 1870 : 199 = *C. procumbens* s.l. Specim. vis. : *Elmer* 470 (Californie).
C. wheeleri Wats. 1877 : 272 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Lemmon herbarium* s.n. [1876] (Californie).
C. xantii Wats. 1877 : 272 = *C. pungens* s.l. Specim. vis. : *Heller* 7797 (Californie).

Le genre est bien défini et délimité, dans l'ampleur que nous lui accordons ici : par un involucre pauciflore ou même uniflore (et qui devient alors à strictement parler un involucelle), étroitement clos et persistant autour des fruits ou plus souvent d'un fruit unique, non épineux à sa base, non ou peu nettement élargi et membraneux à son sommet.

Il en a été décrit un très grand nombre d'espèces. N'ayant aucune connaissance directe du genre à l'état vivant, il nous est malaisé d'apprécier la validité taxinomique des caractéristiques différentielles utilisées à cette fin. Nous avons donc distribué les spécimens d'herbier examinés par nous (dont les précités, ici comme ailleurs, ne constituent qu'une minorité choisie) en 5 sections, chacune symbolisée plutôt que typifiée par une seule espèce. La clef ci-après y conduit :

Feuilles au plus près des involucres largement pseudobractéaires (.7 = <i>Mucronea</i>)	C. californica
Feuilles au plus près des involucres non pseudobractéaires	
Feuilles à base ± longuement pétiolée	
Pièces internes de l'involucre toujours et complètement encloses par ses pièces externes (.8 = <i>Acanthogonum</i>)	C. rigida
Pièces internes de l'involucre non ou incomplètement encloses par ses pièces externes	
Involucre à pièces inégales, biverticillées à ± imbriquées (.9 = <i>Anisogonum</i>)	C. procumbens
Involucre à pièces subégales, valvaire et ± utriculaire (10 = <i>Eriogonellopsis</i>)	C. pungens
Feuilles à base ± longuement engainante (11 = <i>Chorizanthe</i>)	C. virgata

Les valeurs adaptatives prises en compte sont :

a) quant au port général de la plante et au port particulier de ses parties fructifères :

feuilles, non engainantes = 1 / 2 = engainantes;
 feuilles pseudobractéaires, présentes = 0 / 1 = absentes;

b) quant à l'involucre, anisophylle et biverticillé = 0 / 2 = isophylle et valvaire.

Une étude plus poussée devrait certainement mettre en œuvre la totalité des 8 caractéristiques théoriques d'espèce, pour préciser notamment :

a) le port, la ramification, son ampleur et sa densité, la dimension des feuilles et leur spinescence au plus près des fleurs;

b) l'architecture de l'involucré, son épaississement basal, son éventuel amincissement apical et sa spinescence.

Les spécialistes de ce genre, très diversifié sans nul doute dans la nature, ont aussi pris en compte des caractéristiques du périanthe; celui-ci n'a aucun rôle adaptatif et en herbier son exacte analyse est souvent malaisée, statistiquement impossible; néanmoins très certainement cette diversité du périanthe possède une signification taxinomique non négligeable (possiblement générique plutôt que spécifique).

.7 — La section *Mucronea* ne comprend qu'une seule espèce, *C. californica*. Elle a été récoltée en Californie et au Chili. Dans les deux localisations, les feuilles pseudobractéaires sont toujours verticillées par trois et largement soudées entre elles; en résulte une collerette, située juste en dessous des petits fascicules d'involucres; cette collerette peut être unilatérale et profondément trilobée (*C. californica* s.s.) ou omnilitérale, traversée par la tige, et alors brièvement tricuspidée (*C. perfoliata*). Ces deux formes extrêmes sont, même en herbier, reliées par une transition continue dont nous avons ci-dessus cité quatre jalons :

C. californica s.s. = Wheeler 746 → Elmer 3837 → Pringle s.n. [1882] → Palmer 468 = *C. perfoliata* s.s.

Nous ne citerons de façon précise que cet exemple de telles transitions entre formes apparemment bien distinctes. Il en existe beaucoup d'autres dans le genre et, notamment, entre ses trois sections médianes.

Les *Mucronea* sont des sous-arbrisseaux sèchement herbacés, annuels, à feuilles normales toutes en rosette basale, à branches fructifères peu ramifiées. Leur involucré est biverticillé; leur périanthe isodialytépale.

.8 — La section *Acanthogonum* peut être définie par ses involucres biverticillés, aux pièces internes ± réduites et cachées. Le périanthe y est isogamotépale.

C. corrugata est remarquable par les plis épais que porte la base soudée de ses pièces externes; ce même plissement s'observe mais moins prononcé chez *C. rigida* s.s. Ce sont là des sous-arbrisseaux ± nains, à feuilles longuement pétiolées.

C. orcuttiana présente un involucré à pièces externes assez hautement soudées, non plissées; chez *C. polygonoides* ces pièces externes demeurent épaisses mais sont séparées presque dès leur base, laissant bien visibles des pièces internes mineures mais non pas minimes; dans les deux cas, les pièces externes se terminent par une pointe longue, dure et crochue. Ce sont là des sous-arbrisseaux herbacés, à feuilles caulinaires promptement réduites.

.9 — La section *Anisogonum* occupe dans le genre une position moyenne plutôt que médiane. Elle se relie à la section précédente aussi bien qu'à la suivante par des transitions ± continues. Le périanthe y est généralement isogamotépale; sinon terminé par des dents alternativement majeures et mineures.

C. procumbens s.s. se relie assez continûment aux *Acanthogonum*, notamment par le *C. parryi*: les pièces externes sont assez nettement majeures, subégalement acuminées et spinescentes. Les plantes rattachables à ce sous-ensemble sont en général des sous-arbrisseaux à feuilles en rosette basale, à tiges ascendantes et peu ramifiées, à involucres disposés en petits fascicules successifs, assez peu distants.

Dans un second sous-ensemble, dont *C. palmeri* pourrait être le type, se présente un maximum de diversité ou de variabilité. Les six pièces de l'involucré sont assez obscurément biverticillées, \pm inégales dans les deux rangs; parfois les trois pièces externes sont subégalement dentées, parfois une seule dent se développe beaucoup plus que les cinq autres; ces dents majeures sont longuement indurées et pour finir pointues, les dents mineures sont généralement crochues. Ce sont là des sous-arbrisseaux à feuilles en touffe ou rosette basale mais d'où procède une tige vraie, dressée, à ramification dichotome, à feuilles promptement réduites à leur nervure médiane et \pm abrégée, rigide sinon spinescente. Parmi les formes ou espèces que nous situons ici, sont particulièrement remarquables: *C. obovata* par des involucres apicalement réunis en masses \pm sphériques, cette forme étant reliée au type moyen, à involucres irrégulièrement distribués, par *C. robusta* dont les involucres apicaux se rejoignent \pm pour former des masses oblongues. Dans cette dernière forme et aussi dans quelques autres peut être observé parfois un élargissement \pm membraneux des dents involucrales; ceci reliant la variation des *Anisogonum* à celle des *Eriogonellopsis*.

C. spinosa, à première vue bien individualisé par des feuilles géminées, durement et longuement spinescentes, à la base des fascicules d'involucres, n'est très probablement qu'une spécialisation extrême du sous-ensemble précédent; toutefois l'involucré semble n'en développer jamais qu'une seule dent majeure, ce qui relie aussi cette forme au sous-ensemble suivant.

Les *Anisogonum* à une seule dent involucrale majeure peuvent être symbolisés sinon typifiés par le *C. uniaristata*; les pièces internes de l'involucré sont imbriquées sous les externes plutôt que disposées sur un verticille distinct; les cinq dents mineures sont subégales et crochues. Entre ce type et celui du premier sous-ensemble existe certainement une transition continue, jalonnée par des formes \pm variables, ainsi le *C. clevelandii*. Du point de vue végétatif, les *Chorizanthe* uniaristés sont généralement des sous-arbrisseaux herbacés à tiges prostrées, procédant d'une rosette basale de feuilles majeures; les feuilles caulinaires sont réduites et souvent spinescentes; les involucres sont groupés en fascicules pauvres et voisins ou denses et \pm capitulés mais alors distants.

Cette section paraît n'exister que dans l'hémisphère Nord, sous climat désertique, au Sud-Ouest des Etats-Unis.

A sa limite avec la section suivante, peut se situer une forme ou espèce bien individualisée par son port et ses involucres mais ceux-ci parfois sont assez variables. *C. watsonii* est un sous-arbrisseau à rosette basale peu développée, à tiges ascendantes et peu ramifiées; les rares feuilles inférieures sont très longuement pétiolées, les supérieures deviennent promptement minimes; les involucres présentent, généralement mais non pas toujours, une dent très nettement majeure, à base subfoliacée, à sommet long, dur et crochu; les deux autres dents externes peuvent être majeures ou subégales relativement aux trois dents internes; l'imbrication des dents est généralement très peu marquée.

10 — La section *Eriogonellopsis*, nous l'avons dit ci-avant, représente à l'intérieur des *Chorizanthe* une tendance pleinement actualisée dans le petit genre *Eriogonella*. Il nous semble exister une coupure franche entre cet achèvement et cette

ébauche qui, en revanche, est reliée aux formes moyennes de son genre par une transition à peu près continue.

C. staticoides peut être pris pour type du sous-ensemble intérieur au *C. pungens* s.l. mais en reliant la forme centrale à celle des *Anisogonium*; l'involucré est valvaire mais souvent à dents alternativement majeure et mineure; la base de ces dents peut être membraneusement élargie ou banalement deltoïde et subcoriace. Ce sous-ensemble comprend des sous-arbrisseaux dressés ou ascendants, assez peu rameux, à rosette basale bien fournie et feuilles caulinaires nulles ou minimes. Les involucres sont solitaires et subégalement distants dans la seule forme chilienne d'*Eriogonellopsis*, qui est donc imparfaite, *C. commissuralis*; ils sont groupés en pseudo-capitules terminaux, assez volumineux dans l'une des formes californiennes, *C. wheeleri*. Le périanthe est en général anisogamotépale, avec des lobes majeurs \pm étroits, entiers; fait exception *C. fimbriata* dont le périanthe est profondément divisé en lobes subégaux et chacun apicalement découpé en lanières \pm fines, alors que par ses autres caractéristiques cette forme est pratiquement identique au type moyen du *C. staticoides*.

Les autres formes classées ici dans la section *Eriogonellopsis* ont un périanthe généralement découpé en lobes courts et entiers, inégaux mais toujours plutôt larges. Ce sont des sous-arbrisseaux, soit dressés et à ramifications dichotomes, soit ascendants et irrégulièrement ramifiés; toujours à feuilles basales majeures, mais en touffe plutôt qu'en véritable rosette, et à feuilles caulinaires progressivement réduites. La disposition des involucres, comme dans l'ensemble du genre, varie depuis un extrême à pauvres fascicules subéquidistants, *C. diffusa*, vers un extrême opposé à pseudocapitules terminaux largement sphériques, *C. valida*. L'apparence des involucres varie également: *C. pungens* s.s., a des dents dures et droites prolongeant une base nettement amincie mais deltoïde, se situe ainsi assez près du *C. staticoides*; à l'extrême opposé peut être situé *C. douglasii* dont les involucres sont nettement utriculaires, avec des dents basalement élargies par un double arrondi membraneux, apicalement courtes et recourbées en croc.

Toutes ces formes se rencontrent dans le Sud-Ouest des Etats-Unis, à la seule exception, chilienne et déjà signalée, du *C. commissuralis*.

11 — La section *Chorizanthe*, nominalement type, semble nettement isolée des précédentes par ses feuilles à base engainante; il peut être bon de souligner ici que cette gaine n'est jamais prolongée au delà de l'insertion du limbe, c'est-à-dire en formant un ochréa. Elle paraît n'exister que dans l'hémisphère Sud, au Chili, alors que les précédentes sont surtout représentées dans l'hémisphère Nord.

Il a été décrit un très grand nombre d'espèces de ces *Chorizanthe* sensu stricto. Toutes semblent avoir un périanthe analogue à celui des *Eriogonellopsis*: peu profondément découpé en lobes larges mais ces lobes ici sont généralement égaux ou subégaux. L'involucré est lui-même composé de pièces égales ou presque, en disposition valvaire, terminées en dent aiguë plutôt que pointue ou acuminée. En revanche, le port est très divers sinon très variable; nous nous bornerons à en citer les formes les plus marquées: rameaux fructifères en cymes pauvres mais plusieurs fois dichotomes, *C. paniculata*; en cymes plus denses et à involucres solitaires et

subéquidistants, *C. ramosissima*; involucres terminaux, groupés en apparentes ombellules, *C. umbellata*; ou en capitules, *C. virgata* s.s.

3.3(3).4(.5) = ***Centrostegia*** A. Gray ex Benth. 1856: 27¹.

— .9 = Sectio ***Centrostegia***. Espèce type : *C. thurberi*.

— 10 = Sectio ***Diplostegia*** Roberty & Vautier sect. nov. Espèce type : *C. leptoceras*.

Centrostegiae sectio cum involucri base sex-dentata.

C. leptoceras A. Gray in Torr. & Gray 1870: 192 = *Chorizanthe leptoceras* Wats. 1877: 269. Specim. vis. : Parry & Lemon 367 (Californie).

C. thurberi A. Gray ex Benth. 1856: 27 = *Chorizanthe thurberi* Wats. 1877: 269. Specim. vis. : Heller 8206 (Californie).

Ce genre est localisé en Californie méridionale et, probablement, très rare. Il est nettement défini, dans notre système, par des unités de propagation à fruit inclus dans un involucre basalement pourvu d'évaginations spinescentes. Ce fruit est généralement solitaire mais l'involucré peut contenir plus d'une fleur, six au maximum.

Les deux espèces connues sont nettement différentes, ce pourquoi nous les avons séparées au niveau de la section, d'après la clef analytique suivante :

Involucré à 3 évaginations basales, massives puis pointues, et 6 dents apicales brièvement aiguës (.9 = *Centrostegia*) ***C. thurberi***

Involucré à 6 évaginations basales, aplatis puis recourbées, et 6 dents apicales longuement acuminées (10 = *Diplostegia*) ***C. leptoceras***

Les valeurs adaptatives prises en compte considèrent la soudure deux à deux des évaginations basales comme étant la forme primitive = 1 / 2 = forme évoluée par isolement dont résulte secondairement une spinescence moins fonctionnelle.

Par ailleurs, tous les *Centrostegia* sont des sous-arbrisseaux annuels, à feuilles toutes en rosette basale, à tige fructifère sèchement herbacée, peu rameuse et peu élevée, aux involucres irrégulièrement épars.

.9 — *C. thurberi* présente des involucres inélégants mais très fonctionnellement piquants et préhensiles.

— 10 — *C. leptoceras* qui semble plus rare encore que l'espèce précédente, a des involucres très élégants, dans un style évoquant la ferronnerie d'art : évaginations basales gracieusement incurvées à partir d'une base longitudinale, large et plate; dents apicales allongées et marginalement dentelées; il demeure incertain que ces fioritures soient très fonctionnellement préhensiles.

¹ Faute d'en avoir vu des spécimens authentiques, il nous est impossible de redistribuer les « *Centrostegia* » sans épines ni éperons à la base de l'involucré signalés par Goodman (1957:127); d'après leur description, qui n'est pas très précise, ce seraient là probablement pour nous des *Eriogonum* de section *Oxytheca*.

3.3(3).4(.9) = **Lastariaea** Rémy in Gay 1851-52: 289. Espèce type : *L. chilensis*.

L. chilensis Rémy in Gay 1851-52: 290. tab. 58 = *Chorizanthe chilensis* Goodman 1943: 230 = *Chorizanthe lastariaea* Parry 1884: 63. Specim. vis. : type, *Bertero* 228 (Chili).

[*coriacea* :] *Chorizanthe coriacea* Goodman 1943: 230 = *L. chilensis* s.l. Specim. vis. : *Parry & Lemon* 371 (Californie).

Ce genre est caractérisé par un achaine inclus dans le périanthe accrescent, utriculairement gamotépale, à lobes ± membraneux sur leurs marges et médianement spinescents. Tout en appartenant sans nul doute à l'unité adaptative que constituent les Chorizanthastrées, il procède d'un niveau évolutif différent, plus tardif, le périanthe ayant ici pris le rôle ailleurs tenu par un involucré. Il y existe d'ailleurs un involucré mais non caduc et en outre composé de pièces libres entre elles.

L. chilensis est un sous-arbrisseau annuel, sèchement herbacé, à feuilles basales étroitement allongées et formant une rosette irrégulière. Les feuilles caulinaires, progressivement réduites, se transforment dans la partie supérieure de la tige, peu ramifiée, en bractées apicalement spinescentes et ± crochues, libres entre elles mais par ailleurs assez semblables aux pièces soudées du périanthe qu'elles entourent et aussi longues que lui.

La forme type ne se rencontrerait qu'au Chili. La forme californienne, *L. coriacea*, est en moyenne quelque peu majeure, avec des bractées finement et non pas rèchemen pubescentes, un périanthe à lobes légèrement plus étroits.

3.3(3).5 = Cohors **Eriogonastreae** Roberty & Vautier cohors nov.

Eriogoninarum cohors media perianthio plus minusve accrescente.

3.3(3).5(10) = **Eriogonum** Michx. 1803: 246.

- .7 = sectio **Oxytheca** Roberty & Vautier sectio nov. = genus *Oxytheca* Nutt. 1848: 169 = *Acanthoscyphus* Small 1898: 25 = *Briseagnoa* Rémy in C. Gay 1851-52: 291 = *Gymnogonum* Parry 1883: 23. Espèce type : *E. dendroideum*.
- .8 = sectio **Oregonium** Wats. 1877: 262, sensu elato = sectio *Ganysma* Wats. 1877: 259 = subgen. *Clastomyelon* Coville & Morton 1936: 304 = *Sanmartinia* Buch. 1950: 5. Espèce type : *E. vimineum*.
- .9 = sectio **Eriogonum** = *Espinosa* Lag. 1816: 14 = *Eucycla* Nutt. 1848: 166. = *Trachytheca* Nutt. 1848: 168. Espèce type : *E. tomentosum*; autres espèces : *E. gossypinum*, *E. abertianum*.
- 10 = sectio **Nemacaulis** Roberty & Vautier sectio nov. = genus *Nemacaulis* Nutt. 1848: 169. Espèce type : *E. nemacaulis*.
- 11 = sectio **Stenogonum** Roberty & Vautier sectio nov. = genus *Stenogonum* Nutt. 1848: 170 = *Gilmania* Coville 1936: 209 = *Phyllogonum* Coville 1893: 190. Espèce type : *E. salsuginosum*.
- 12 = sectio **Hollisteria** Roberty & Vautier sectio nov. = genus *Hollisteria* Wats. 1879: 296. Espèce type : *E. lanatum*.

- E. abertianum* Torr. 1848 : 151. Specim. vis. : *Jones* 3738 (Texas); *Pringle* 681 (Mexique Nord).
- E. abramsii* Stokes 1936 : 28 = *Oxytheca abramsii* McGregor 1909 : 605 = *E. dendroideum* s.l. Specim. vis. : type, *Abrams & McGregor* 72 (Californie).
- E. acetoselloides* Torr. ex Benth. 1856 : 16 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Wolf* 4251 (Californie).
- E. agninum* Greene 1891 : 165 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Rose* 41437 (Californie).
- E. alatum* Torr. = *Pterogonum atrorubens* s.l.
- E. allenii* Wats. in A. Gray 1890 : 734 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Mackenzie* 394 (Western Virginia).
- E. ameghinoi* Spegazz. 1902 : 156 = *Sanmartinia ameghinoi* Buch. 1950 : 5 = *E. vimineum* s.l. e descr.
- E. angulosum* Benth. 1837 : 406. tab. 18 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Rose* 46253 (Californie).
- E. apiculatum* Wats. 1882 : 378 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Parish* 971 (Californie).
- E. arborescens* Greene 1884 : 11 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : topotype, *Greene* s.n. [1886] (Californie).
- E. arcuatum* Greene 1901 : 319 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Baker* 284 (Colorado Sud).
- E. atrorubens* Engelm. = *Pterogonum atrorubens*.
- E. azaleastrum* Greene 1902 : 67 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Heller* 10623 (Nevada).
- E. baileyi* Wats. 1875 : 348 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Wolf* 4288 (Californie).
- E. bakeri* Greene 1901 : 15 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Baker* 691 (Colorado Sud-Ouest).
- E. baratum* Elmer 1905 : 52 = *E. watsonii* Torr. & Gray. Specim. vis. : type, *Elmer* 3593 (Californie).
- E. batemani* Jones 1903, fide Stokes 1936 : 70 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Jones* s.n. [1903] (Utah).
- E. bicolor* Jones 1893 : 281 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Garrett* 7-g-33 (Utah).
- E. bloomeri* Parish 1898 : 87 = *E. saxatile*. Specim. vis. : *Abrams* 2941 (Californie).
- E. brachyanthum* Coville 1893 : 185 = *E. baileyi*. Specim. vis. : *Wheeler* 2005 (Californie).
- E. brachypodium* Torr. & Gray 1870 : 180 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Heller* 10975 (Nevada).
- E. brevicaule* Nutt. 1848 : 163 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Goodman* 1876 (Utah).
- E. caespitosum* Nutt. 1834 : 50 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Rollins* 1629 (Wyoming).
- E. campanulatum* Nutt. 1848 : 163 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Goodding* 1662 (Colorado).
- E. capitatum* Heller 1905 : 27 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Heller* 8099 (Californie).
- E. caryophylloides* Stokes 1936 : 28 = *Oxytheca caryophylloides* Parry 1876 : 175, fide Stokes 1936 : 28 = *E. dendroideum* s.l. Specim. vis. : *Parish* 3705 (Californie).

- E. cernuum* Nutt. 1848 : 162 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Jones 2063* (Utah).
 [*chilense*] *Briseagnoa chilensis* Rémy in C. Gay 1851-52 : 292. tab. 58, fig. 2 =
E. dendroideum. Specim. vis. : type? *s. coll.*, P; *Werdermann 194* (Chili).
- E. chloranthum* Greene 1901 : 15 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Baker 853* (Colorado Ouest).
- E. chryscephalum* A. Gray 1876 : 101 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Nelson 7* (Idaho).
- E. ciliatum* Torr. ex Benth. 1856 : 20 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Pringle 2379* (Mexique).
- E. cinereum* Benth. 1844 : 45 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Bracelin 570* (Californie).
- E. clavatum* Small 1898 : 50 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Heller 7693* (Californie).
- E. cognatum* Greene 1897 : 201 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *McDougal 310* (Arizona).
- E. commixtum* Greene ex Tidest. 1923 : 181 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : type, *Baker 1402* (Nevada).
- E. compositum* Dougl. ex Benth. 1837 : 410 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Peck 24287* (Oregon).
- E. copelandi* Greene in sched. = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Baker 3813* (Californie).
- E. coriaceum* Coul. & Fisch. in Coul. 1894 : 375 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Tracy 8307* (Texas).
- E. corymbosum* Benth. 1856 : 17 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Nelson & McBride 1199* (Idaho).
- E. crassifolium* Benth. 1837 : 408 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Lunell s.n.* [1909] (North Dakota).
- E. croceum* Small 1898 : 43 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Heller 3414* (Californie).
- E. cuspidatum* Stokes 1936 : 27 = *E. dendroideum* s.l. Specim. vis. : *Parish 1241* (Californie).
- E. dasyanthemum* Torr. & Gray 1870 : 177 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Stokes 91* (Californie).
- E. davidsonii* Greene 1892 : 295 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Abrams 2592* (Californie Sud).
- E. deductum* Greene 1902 : 71 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Baker 1239* (Nevada).
- E. deflexum* Torr. in Ives 1860 : 24 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Lemmon s.n.* [1884] (Arizona).
- E. dendroideum* Stokes 1936 : 37 = *Oxytheca dendroidea* Nutt. 1848 : 169. Specim. vis. : *Rose 50202* (Californie); *Wagenknecht 18116* (Chili); *Wilczek 373* (Argentine).
- E. denudatum* Curran 1886 : 274 = *Nemacaulis denudata* Nutt. 1848 : 169 = *E. nemacaulis*.
- E. denudatum* Nutt. 1848 : 161 : e descriptione incertissimae sedis.

- E. deserticolum* Wats. 1891 : 125 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Wolf* 4347 (Californie).
- E. dichotomum* Dougl. ex Benth. 1837 : 414 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Howell* s.n. [1882] (Oregon).
- E. douglasii* Benth. 1856 : 9 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Cronquist* 7148 (Oregon).
- E. effusum* Nutt. 1848 : 164 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Rollins* 1072 (Wyoming).
- E. elatum* Dougl. ex Benth. 1837 : 413 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Krucksberg* 2759 (Washington).
- E. elegans* Greene 1891 : 173 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Rose* 41432 (Californie).
- E. elongatum* Benth. 1844 : 45 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Stokes* 22 (Californie).
- E. esmeraldense* Wats. 1889 : 85 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Howell* 27459 (Californie).
- E. fasciculatum* Benth. 1837 : 411 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Abrams* 3519 (Californie Sud).
- E. fendlerianum* Small 1906 : 55 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Rollins* 1860 (Colorado).
- E. flexum* Jones 1891 : 15 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : type, *Jones* s.n. [1890] (Arizona).
- E. floridanum* Small 1903 : 367 = *E. longifolium*. Specim. vis. : *Palmer* 27426 (Floride). [*foliosum*] *Nemacaulis foliosa* Nutt. 1848 : 169 = *E. nemacaulis*.
- E. foliosum* Wats. 1885 : 371 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Elmer* 3690 (Californie).
- E. giganteum* Wats. 1885 : 371 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Palmer* 250 (Californie Sud).
- E. glandulosum* Nutt. ex Benth. 1856 : 21 = *Oxytheca glandulosa* Nutt. 1848 : 170 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Jones* s.n. [1891] (Utah).
- E. gnaphalodes* Benth. ex Hook. 1853 : 263 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Goodding* 354 (Wyoming).
- E. gordoni* Benth. 1856 : 20 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Jones* 5452 (Californie).
- E. gossypinum* Curran 1886 : 274. Specim. vis. : *Rose* 58035 (Californie).
- E. gracile* Benth. 1844 : 46 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Baker* 1629 (Californie).
- E. gracillimum* Wats. 1880 : 480 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Howell* 30141 (Californie).
- E. harfordii* Small 1898 : 47 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Hitchcock* 20213 (Californie).
- E. havardii* Wats. 1883 : 194 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Earle* 371 (New Mexico).
- E. heermannii* Dur. & Hilg. 1855 : 14. tab. 17 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Duran* 3545 (Californie).
- E. heracleoides* Nutt. 1834 : 49 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Rose* 48157 (Washington).
- E. hieracifolium* Benth. = *Pterogonum atrorubens* s.l.
- E. hirtiflorum* A. Gray ex Watson 1877 : 259 = *Oxytheca hirtiflora*. Greene 1891 : 153 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Lemmon* s.n. [1878] (Californie).
- E. incanum* Torr. & Gray 1870 : 161 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Dress* 3685 (Californie).

- E. inflatum* Torr. & Frem. in Frem. 1845: 317 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Reed* 706 (Californie).
- E. intrafractum* Coville & Morton 1936: 303 = *E. vimineum* s.l. e descr.
- E. jamesii* Benth. 1856: 7 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Pringle* 680 (Mexique Nord); *id. s.n.* [1881] (Arizona).
- E. jonesii* Wats. 1886: 454 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: type, *Jones* 4050 (Arizona).
- E. junceum* Greene 1904: 77 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: type, *Culbertson* 4396 (Californie).
- E. kennedyi* Porter ex Wats. 1877: 263 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Parish* 3736 (Californie Sud).
- E. lanatum* Roberty & Vautier comb. nov. = *Hollisteria lanata* Wats. 1879: 296. Specim. vis.: type, *Lemmon* s.n. s.d. (Californie).
- E. latens* Jepson 1914: 427 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Howell* 25281 (Californie).
- E. latifolium* Smith in Rees 1819, fide Stokes 1936: 63 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Rose* 49148 (Californie).
- E. leptophyllum* Woot. & Standley 1913: 118 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Arsène* 19433 (New Mexico).
- E. lobbii* Torr. & Gray 1870: 162 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: topotype, *Heller* 7011 (Californie).
- E. lonchophyllum* Torr. & Gray 1870: 173 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Baker* & al. 492 (Colorado Sud).
- E. longifolium* Nutt. 1837, fide Stokes 1936: 119 = *Trachytheca longifolia* Nutt. 1848: 168 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Curtiss* 5954 (Floride); *Heller* 1877 (Texas).
- [*luteolum* :] *Oxytheca luteola* Parry 1883: 23 = *E. dendroideum* s.l.
- E. luteolum* Greene 1897: 200 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Howell* 28290 (Californie).
- E. luteolum* Jones 1903, fide Abrams 1944: 2 = *Gilmania luteola* Coville 1936: 209 = *Phyllogonium luteolum* Coville 1893: 190. tab. 21 = *E. salsuginosum* (? cf 106). Specim. vis.: topotype, *Clokey* 5852 (Californie, Death Valley).
- E. maculatum* Heller 1906: 188 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: type, *Heller* 8233 (Californie).
- E. marifolium* Torr. & Gray 1870: 161 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Dress* 3803 (Californie).
- E. microthecum* Nutt. 1848: 162 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Beach* 807 (Nevada).
- E. mohavense* Wats. 1877: 266 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Duran* 3416 (Californie).
- E. molestum* Wats. 1882: 379 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Stokes* 30 (Californie).
- E. multiceps* Nees 1841, fide Stokes 1936: 93 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Moldenke* 7689 (South Dakota).
- E. multiflorum* Benth. 1837: 413 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Reverchon* 794 (Texas).

- E. nemacaulis* Stokes 1936 : 39. Specim. vis. : *Pringle s.n.* [1864] (Californie).
- E. nidularium* Coville 1893 : 186 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Beach 973* (Nevada).
- E. niveum* Dougl. ex Benth. 1837 : 414 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *McBride 1637* (Idaho).
- E. nortonii* Greene 1891 : 165 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Elmer 4309* (Californie).
- E. nudicaule* Small 1906 : 54 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Rollins 1540* (Colorado).
- E. nudum* Dougl. ex Benth. 1837 : 413 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Balls 15782* (Californie).
- E. nutans* Torr. & Gray ex Wats. 1871 : 181. tab. 33 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Hall & Harbour 503* (Nebraska).
- [*nuttallii* :] *Nemacaulis nuttallii* Benth. 1856 : 23 = *E. nemacaulis*. Specim. vis. : *Stokes 55* (Californie).
- E. oblongifolium* Benth. 1837 : 412 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Elmer 391* (Washington).
- E. ochrocephalum* Wats. 1880 : 480 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Lemmon s.n.* [1880] (Nevada).
- E. ochroleucum* Small ex Rydb. 1900 : 123 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Rydberg & Bessey 5344* (Montana).
- E. ordii* Wats. 1886 : 468 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Benson 8116* (Californie).
- E. orendense* Nelson 1902 : 21 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Goodding 535* (Wyoming).
- E. ovalifolium* Nutt. 1834 : 50 = *Eucycla ovalifolia* Nutt. 1848 : 166 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Williams 3599* (Montana).
- E. ovatum* Greene 1902 : 69 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Heller 12854* (Californie).
- E. palmeri* Wats. 1877 : 267 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Parish 1513* (Californie).
- E. panduratum* Wats. 1880 : 480 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : type, *Lemmon s.n.* [1880] (Californie).
- E. parishii* Wats. 1882 : 379 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Wheeler 1265* (Californie).
- [*parishii* :] *Acanthoscyphus parishii* Small 1898 : 25 = *Oxytheca parishii* Parry 1882 : 176, fide Stokes 1936 : 29 = *E. dendroideum*. Specim. vis. : type, *Parish 993* (Californie).
- E. parryi* A. Gray 1874 : 77 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : type, *Parry 239* (Utah).
- E. pauciflorum* Pursh 1814 : 735 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Goodding 1924* (Colorado).
- E. perfoliatum* Stokes 1936 : 28 = *Oxytheca perfoliata* Torr. & Gray 1870 : 191 = *E. dendroideum* s.l. Specim. vis. : *Duran 3478* (Californie).
- E. pharnaceoides* Torr. 1853 : 167 = *E. abertianum* s.l. Specim. vis. : *Lemmon s.n.* [1883] (Californie).
- E. pinetorum* Greene 1910 : 3 = *E. abertianum* s.l. Specim. vis. : type, *Metcalf 1328* (New Mexico).
- E. piperi* Greene 1898 : 263 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Thompson 13924* (Idaho).

- E. plumatella* Dur. & Hilg. 1855 : 14. tab. 16 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Wheeler* 2069 (Californie).
- E. polifolium* Benth. 1856 : 12 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Duran* 3213 (Californie).
- E. polyanthum* Benth. 1856 : 12 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Heller* 8008 (Californie).
- E. polycladon* Benth. 1856 : 16 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Pringle* 644 (Mexique Nord).
- E. polyphyllum* Small ex Rydberg 1900 : 119 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Cronquist* 8076 (Montana).
- E. pondii* Greene 1889 : 267 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : topotype, *Haines & Hale* s.n. [1939] (Mexique Nord-Ouest).
- E. pringlei* Coulter. & Fisch. 1892 : 351 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Wolf* 4284 (Californie).
- E. proliferum* Torr. & Gray 1870 : 164 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Howell* s.n. [1875] (Oregon).
- E. pusillum* Torr. & Gray 1870 : 184 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Kennedy* 1325 (Nevada).
- E. pyrolifolium* Hook. 1853 : 395 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Dress* 3738 (Californie).
- E. racemosum* Nutt. 1848 : 161 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Rollins* 1923 (Colorado).
- E. reclinatum* Greene 1902 : 67 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Baker* 1026 (Nevada).
- E. reliquum* Stokes 1937 : 52 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : type, *Clokey* 7491 (Nevada).
- E. reniforme* Torr. & Frem. in Frem. 1845 : 317 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Parish* 1202 (Californie).
- E. revolutum* Gooodding 1904 : 54 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Gooodding* 753 (Nevada).
- E. robustum* Greene 1885 : 126 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : topotype, *Kennedy* 3001 (Nevada).
- E. roseum* Dur. & Hilg. 1855 : 14. tab. 15 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Greene* s.n. [1889] (Californie).
- E. rotundifolium* Benth. 1856 : 21 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Jones* 4134 (New Mexico).
- E. rubescens* Greene 1887 : 39 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Greene* s.n. [1886] (Californie).
- E. rubiflorum* Jones 1893 : 281 = *E. vimineum*. Specim. vis. : type, *Jones* s.n. [1891] (Utah).
- E. salicinum* Greene 1901 : 16 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : type, *Baker* 375 (Colorado).
- E. salsuginosum* Hook. 1853 : 264 = *Stenogonium salsuginosum* Nutt. 1848 : 170. Specim. vis. : *Rollins* 1728 (Wyoming).
- E. saxatile* Wats. 1877 : 267 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Duran* 3538 (Californie).

- E. saxicolum* Heller 1906 : 191 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Heller* 8298 (Californie).
- E. shockleyi* Wats. 1883 : 194 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Rollins* 1737 (Utah).
- E. shoshonense* Nelson 1912 : 137 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : type, *Nelson & McBride* 1186 (Idaho).
- E. simpsonii* Benth. 1856 : 18 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Arsène* 16610 (New Mexico).
- E. spathulatum* A. Gray 1874 : 76 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : type, *Parry* 245 (Utah Sud).
- E. spergulinum* A. Gray 1868 : 389 = *Oxytheca spergulina* Greene 1891 : 153 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Ferris & Lorraine* 12285 (Californie).
- E. sphaerocephalum* Dougl. ex Benth. 1837 : 407 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Nelson & MacBride* 1091 (Idaho).
- E. spinescens* Stokes 1936 : 35 = *Gymnogonium spinescens* Parry 1883 : 23 = *E. dendroideum* s.l. Specim. vis. : type, *Pringle* s.n. [1882] (Californie, Mojave desert).
- E. stellatum* Benth. 1837 : 409 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Jones* 3986 (Arizona).
- E. strictum* Benth. 1837 : 414 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Cusick* 2406 (Oregon).
- E. subalpinum* Greene 1896 : 18 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Goodding* 1287 (Utah).
- E. subreniforme* Wats. 1877 : 260 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Jones* 3762 (Texas).
- E. sulcatum* Wats. 1879 : 296 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Heller* 10613 (Nevada).
- E. sulphureum* Greene 1902 : 70 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : topotype, *Heller* 14443 (Californie).
- E. tenellum* Torr. 1828 : 241 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Arsène* 17458 (New Mexico).
- E. tenué* Small 1898 : 41 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Gandoger* s.n. [1906] (Washington).
- E. ternatum* Howell 1903 : 570 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Parks* 24031 (Californie).
- E. thomasii* Torr. 1857 : 364 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Stokes* 50 (Californie).
- E. thurberi* Torr. 1859 : 176 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Pringle* s.n. [1884] (Arizona).
- E. thymoides* Benth. 1856 : 9 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis. : *Ward* 318 (Washington).
- E. tomentosum* Michx. 1803 : 246. tab. 24. Specim. vis. : *Wilbur & Webster* 2724 (Géorgie).
- E. trachygonum* Torr. ex Benth. 1856 : 15 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *Rose* 51185 (Californie).
- E. trichopæs* Torr. 1848 : 151 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis. : *McVaugh* 8110 (New Mexico).
- E. trilobatum* Stokes 1936 : 27 = *Oxytheca trilobata* A. Gray ex Wats. 1877 : 83 = *E. dendroideum* s.l. Specim. vis. : *Elmer* 3695 (Californie).

- E. tripodum* Greene 1887: 39 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Rose* 48134 (Washington).
- E. truncatum* Torr. & Gray 1870: 173 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Baker* 2833 (Californie).
- E. umbellatum* Torr. 1828: 241 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Parry* 504 (Colorado).
- E. undulatum* Benth. 1856: 7 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Pringle* 6922 (Mexique Nord).
- E. ursinum* Wats. 1875: 347 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: topotype, *Ames* s.n. [1875] (Californie).
- E. varabile* Heller 1905: 24 = *E. gracillimum*. Specim. vis.: type, *Heller* 7756 (Californie).
- E. vegetius* Nelson 1904: 239 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Wooton* 319 (New Mexico).
- E. venustum* Eastwood in sched. = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: type, *Brown* 816 (Californie).
- [*verticillatum*:] *Espinosa verticillata* Lag. 1816: 14 = *E. tomentosum*, e descr. et fide Index Kewensis.
- E. vestitum* Howell 1937: 42 = *vimineum* s.l. Specim. vis.: topotype, *Rose* 75-1939 (Californie).
- E. villiflorum* A. Gray 1873: 630 = *E. tomentosum* s.l. Specim. vis.: *Parry* 243 (Utah Sud).
- E. vimineum* Dougl. ex Benth. 1837: 416. Specim. vis.: *Reed* 165 (Californie).
- E. virgatum* Benth. 1856: 16 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Culbertson* 4404 (Californie).
- E. viridescens* Heller 1905: 25 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: type, *Heller* 7733 (Californie).
- [*watsonii*:] *Oxytheca watsonii* Torr. & Gray 1870: 311. tab. 34 = *E. dendroideum* s.l.
- E. watsonii* Torr. & Gray 1870: 182 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Beach* 862-a (Nevada).
- E. wrightii* Torr. ex Benth. 1856: 15 = *E. vimineum* s.l. Specim. vis.: *Townsend* & *Barber* 366 (Mexique Nord).

Le genre, dans l'ampleur que nous lui assignons ici, est défini par défaut : par absence de toute caractéristique adaptativement spécialisée dans l'architecture générale de ses unités de propagation. En effet, ces unités se réduisent au fruit proprement dit et au périanthe dialytépale qui l'accompagne, toujours peu accusé et peu modifiés. Les involucres, souvent très particuliers, peuvent contenir 1 à 60 fleurs ou plus mais ces fleurs en sont toujours ± exsertes, avec chacune un pédicelle articulé. Ainsi nos Eriogonastrées diffèrent des Chorizanthastrées, à involucré, involucelle ou périanthe clos, accompagnant et protégeant le fruit dans sa chute.

En revanche, la limite des Eriogonastrées avec les Pterogonastrées dont nous traitons ci-après est passablement ténue ; nous avons rattaché au genre *Pterogonium* toutes les formes à fruit ailé ou seulement subailé par évagination de ses sutures carpellaires. Le processus de spécialisation est ici comparable à celui qui mène des

Polygonum aux *Pleuropteropyrum*, avec toutefois une moindre ampleur et donc une moindre discontinuité.

Comme toutes les Eriogonoïdées, les *Eriogonum* sont des plantes américaines; toutefois elles débordent largement l'aire des *Chorizanthe* vers le Nord et vers l'Est des Etats-Unis, s'étendant ainsi jusqu'à la frontière canadienne d'une part et d'autre part à la côte atlantique.

Il en a été décrit un nombre extrêmement élevé d'espèces, dont presque toutes ont effectivement un type nettement individualisé par telle ou telle de ses caractéristiques. Pour les raisons déjà exposées à propos des *Chorizanthe*, notamment à cause de notre ignorance du comportement naturel de ces plantes dans leur habitat normal, nous nous sommes ici bornés à y définir des sections, dont la liste peut être estimée complète, mais chacune symbolisée par une à trois espèces, ce qui, sans aucun doute, est très insuffisant. Voici la clef analytique de ces 8 espèces (fondamentales) :

Lobes de l'involucre spinescents : chacun d'eux contenant 2-8 fleurs (.7 <i>Oxytheca</i>)	E. dendroideum
Lobes de l'involucre inermes	
Involucres contenant 6 à 60 fleurs	
Leur base cupulairement soudée	
Feuilles, radicales ou caulinaires toujours et très abruptement différencierées (.8 = <i>Oregonium</i>)	E. vimineum
Feuilles, supérieures et inférieures, non ou progressivement différencierées (.9 = <i>Eriogonum</i>)	
Involucres toujours et très nettement laineux ; feuilles majeures abondamment pseudoverticillées.	E. gossypinum
Involucres non ou modérément laineux ; feuilles inférieures non ou peu différencierées	
Tépales externes peu modifiés à maturité ; feuilles supérieures réduites ou modifiées en deçà des involucres pédonculés	E. tomentosum
Tépales externes marginalement élargis à maturité ; feuilles supérieures banales sinon majeures à côté des involucres subsessiles	E. abertianum
Leurs pièces profondément séparées	
Ces pièces intérieurement laineuses ; les feuilles caulinaires minimes ou nulles en deçà des involucres pédonculés (10 = <i>Nemacaulis</i>)	E. nemacaulis
Ces pièces non laineuses ; les feuilles supérieures banales sinon majeures à côté des involucres subsessiles (11 = <i>Stenogonum</i>)	E. salsuginosum
Involucres contenant de 1 à 3 fleurs, leurs pièces profondément séparées, leurs fleurs laineuses (12 = <i>Hollisteria</i>)	E. lanatum

Les valeurs adaptatives prises en compte définissent :

- a) la localisation des involucres relativement aux feuilles, différencierées en radicales et caulinaires, les premières en rosette, les secondes minimes ou nettement modifiées = 0 / 2 = non ou progressivement différencierées en inférieures et supérieures;
- b) l'involucre,
quant au nombre de fleurs qu'il contient, 60 à 6 = 1 / 2 = 1 à 3;
quant à sa soudure basale, infundibuliforme ou cupulaire = 1 / 2 = pratiquement nulle;

quant à la présence éventuelle, d'épines apicales = 0 / 2 = d'un revêtement intérieur abondamment laineux;

c) le périanthe, seul accompagnant, nettement biverticillé avec les tépales externes membraneusement élargis = 0 / 1 = spiralé ou biverticillé mais à tépales tous à peu près semblables.

Il est évident que, dans le cadre d'un *Species* et non pas d'un simple *Genera Plantarum*, les 8 caractéristiques d'espèce devraient être mises en œuvre et toutes avec 3 valeurs et non pas 2 seulement comme trois fois sur cinq ci-dessus. Nous reviendrons dans les pages suivantes, sommairement descriptives, sur certaines valeurs ou caractéristiques volontairement omises : soit générales, comme celles définissant plus précisément le port et le périanthe; soit particulières, telles que la réduction des tépales à leur triangle médian épais et velu chez *E. longifolium* (*E. tomentosum*) ou l'apparence d'un double involucre chez *E. vimineum* sensu stricto.

Quant à la signification adaptative des valeurs ici utilisées, nous admettons volontiers qu'elle peut paraître faible. Ainsi les épines apicales des involucres, qui écartent les animaux, comme le développement d'un duvet involucral laineux, qui freine au lieu de la favoriser l'action du vent (ni ces épines, ni ce duvet n'accompagnent les fruits mûrs) correspondent à deux modalités différentes de spécialisation xérophile. On admettra, toutefois, que ces deux modalités puissent effectivement être opposées, de part et d'autre, d'un groupe médian qui est, conformément à la théorie, de beaucoup le plus amplement variable. Dans ce cas particulier, le choix des valeurs nous a été dicté par le simple souci d'aboutir, dans ce qui n'est encore qu'une ébauche d'analyse intragénérique, à des compartiments aussi homogènes que possible. Dans les autres cas, nous avons donné, notamment à la position des involucres relativement au feuillage, les valeurs, à première vue inversées, précédemment admises pour les autres grands genres; ceci revenant à opposer des sciaphytes héliotropes (= 0) à des héliophytes sciatropes (= 2).

—.7 La section *Oxytheca* comprend un très grand nombre de formes ayant pour caractère commun d'être annuelles, avec leur feuillage normal tout entier réuni dans une rosette radicale. La soudure basale des involucres est passablement variable, de même que l'est le développement de leurs épines apicales. Très généralement le périanthe est isotépale; toutefois les tépales externes, dans certaines formes, sont à la fois plus larges et plus courts que les internes mais alors hirsutes et dépourvus de marge membraneuse.

L'aire de la section se superpose à peu près exactement à celle du genre *Chorizanthe*, mais il n'en est connu qu'une seule forme sud-américaine.

Nous avons réuni sous une seule épithète spécifique, *E. dendroideum*: d'une part, quelques formes aberrantes ou extrêmes, apparemment rares ou très rares; d'autre part deux sous-ensembles morphologiques à type central bien défini mais, nous semble-t-il, à limites très imprécises sinon même indéfinissables.

Voici, entre autres, trois formes très particulières.

E. abramsii est caractérisée par un involucre à base, cupulaire, membraneuse et brève, dont procède un grand nombre d'épines subégalement dures et fines.

E. perfoliatum a des bractées caulinaires, soudées par trois, mais étalées en une large collerette, très semblable à celle du *Chorizanthe (Mucronea) californica* et comme elle, soit symétriquement disposée autour du rameau qui alors la transperce, soit ± étroitement latérale.

E. spinescens est remarquable par des feuilles caulinaires très semblables aux pièces de l'involucre, qui est souvent subsessile, et parfois surinvolucrantes, longuement et très durement épineuses.

Toutes ces formes aberrantes, dont certaines peuvent être simplement accidentelles et non pas héréditairement durables, se situent assez près de la limite des *Eriogonum* avec les *Chorizanthe*.

Dans le sous-ensemble dont *E. dendroideum*, espèce nominalement type de la section, peut être la forme centrale, les feuilles caulinaires forment généralement des pseudoinvolucres bien définis, découpés en 3 lobes aigus, séparés par de longs et grêles pédoncules des involucres véritables, toujours nettement épineux à leur sommet et soudés à leur base.

Dans un second sous-ensemble, se remarque surtout une double tendance plutôt qu'une double spécialisation : des feuilles caulinaires à s'élargir et se souder en faux involucres, généralement plus larges et moins découpés que dans le sous-ensemble précédent ; des involucres proprement dits à se diviser profondément. Chez *E. cuspidatum* cette double tendance est exprimée par des résultats homogènes et moyens. Chez *E. caryophylloides*, en revanche, ses achèvements sur une même plante sont extrêmement variables, pratiquement nuls à presque parfaits. Chez *E. trilobatum*, les lobes finement spinescents de l'involucre sont peu profondément soudés, les bractées caulinaires moyennes, les pédoncules très longs, les tépales découpés en segments assez profonds.

.8 — Dans notre section *Oregonium* peuvent, à première vue, être distingués six sous-ensembles principaux, d'ampleur d'ailleurs très inégale, à type central bien défini, à limites souvent très floues.

E. vimineum, dont l'aire est à peu près celle du genre, peut être considéré comme le type central des *Oregonium* tels que les comprenait WATSON (1877). Nous lui rattacherons ici un grand nombre de formes : annuelles, à branches fructifères régulièrement ramifiées, à involucres surinvolucrés, à tépales apicalement translucides ou colorés, gracieusement recourbés en dehors de la cupule involucrale. A l'intérieur du sous-ensemble ainsi défini existent plusieurs variations, dont certaines paraissent échapper à toute analyse : ainsi celle portant sur le développement du « surinvolucre », qui est généralement constitué par 2 feuilles opposées, mineures à minimes, libres ou soudées. La variation du port comporte, en revanche, deux extrêmes bien définis : *E. baileyi*, qui évoque les *Boerhaavia* avec une ramification largement trichotome ; *E. virgatum*, polygonelloïdal avec une ramification étroitement dichotome. Quant à la pubescence des organes végétatifs : *E. vimineum* sensu strictissimo est glabre, *E. commixtum* densément cotonneux.

Les *Oregonium* orophytes constituent un groupe complexe et qui semble continûment relié, d'une part, aux *E. vimineum* sensu stricto, d'autre part, à la section type. Ce sont des sous-arbrisseaux à tiges annuelles et souche pérennante. Les feuilles basales constituent des touffes généralement bien définies mais peu régulières ; elles

sont allongées si les touffes sont voisines ainsi chez *E. effusum*, élargies si les touffes sont distantes ainsi chez *E. racemosum*. Les feuilles caulinaires peuvent être bien développées. Les involucres sont caractéristiquement étroits.

E. angulosum peut être donné comme exemple des formes situées \pm exactement sur la limite des *Oregonium* et des *Ganysma*, sensu WATSON (1877). Ces formes présentent en commun : des involucres subsessiles ou gracieusement pédonculés, lâchement disposés au long de branches fructifères irrégulièrement et en général pauvrement ramifiées. Une variation continue semble relier, dans ce sous-ensemble, les formes boerhaavioïdales à rosette large et rameaux secs, aux formes ephedroïdales à rosette réduite et rameaux verts.

E. intrafractum, type du sous-genre *Clastomyelon* de COVILLE & MORTON (1936), nous paraît d'après sa description, très complète, pouvoir être situé au plus près du sous-ensemble précédent.

E. cernuum est caractérisé par des pédoncules peu nombreux, très longs et grêles, recourbés vers le sol et ceci peut-être sous la seule action du poids de leur involucre. *E. nutans* en est une forme extrême. En principe, ce sont là des « *Ganysma* » à très petites fleurs. Toutefois le port en est généralement semblable à celui des *E. vimineum* boerhaavioïdaux ; en outre, la forme des tépales varie : très voisine, à la moindre dimension près, de celle propre aux *E. vimineum* sensu stricto chez, notamment, *E. pusillum* ; étroitement oblongue comme dans le sous-ensemble suivant chez, notamment, *E. reniforme*.

E. inflatum peut être considéré comme le type des *Ganysma* : le port en est très caractéristique, avec des branches involucrifères hautement dressées, les entre-nœuds supérieurs, longs et grêles, pauvrement et très largement ramifiés, l'entre-nœud inférieur souvent renflé en fuseau. Les tépales, nous l'avons dit, sont très petits ; en outre souvent réduits à leur partie médiane, obtusément deltoïde et pubescente à hirsute. Ce sont là des plantes caractéristiques du désert central des Montagnes Rocheuses.

.9 — Nous avons maintenu dans la section type trois espèces bien différentes entre elles mais que tous les auteurs considèrent comme des *Eriogonum* sensu stricto. De ces trois espèces, deux ont une importance réduite ; nous en traiterons tout d'abord.

E. gossypinum est un sous-arbrisseau herbacé, mineur ou même parfois nain, à port prostré, à feuilles inférieures formant apparemment une rosette basale mais en réalité semblables aux supérieures, évidemment caulinaires, qui n'en diffèrent que par leurs dimensions, assez promptement mais progressivement réduites. La tige est assez abondamment ramifiée, presque dès sa base. Les involucres sont localisés vers le sommet de ses branches, gamophylles et intérieurement couverts d'une villosité cotonneuse, exubérante, dense et longue où les fruits, assez peu nombreux, demeurent durablement noyés. C'est là une espèce endémique et rare en Californie, monotypique, reconnaissable à première vue par ses involucres, mais quant à ses autres caractéristiques très voisine des *E. angulosum* (= *E. vimineum*).

E. abertianum auquel se rattache un petit nombre de formes très voisines, érigées en espèces d'après des critères à notre avis peu significatifs, est un sous-arbrisseau herbacé, touffu, ascendant, à branches peu rameuses, à feuilles variablement spatulées ou subulées, non ou faiblement réduites vers le sommet des branches ;

à involucres subsessiles et ainsi en grande partie protégés et masqués par la feuille qui les sous-tend; à périanthe nettement biverticillé, ses tépales externes majeurs, marginalement élargis et membraneux, souvent obtusément auriculés. Cette espèce est assez commune du Texas à l'Arizona et dans le Nord-Est du Mexique.

Nous rattachons ici, à l'espèce-type, *E. tomentosum*, un nombre très grand de formes ou espèces \pm nettement délimitées mais à type central bien défini, notamment par son port. Ce sont toujours des sous-arbrisseaux pérennans, parfois d'assez haute taille, à feuilles supérieures progressivement réduites, à involucres gamophylles et pluri- à multiflores.

En première analyse on peut reconnaître, dans l'ensemble très large ainsi très sommairement défini, huit sous-ensembles, biogéographiques plutôt que morphologiques.

E. tomentosum sensu stricto est une plante commune en Virginie et Géorgie, soit dans la région atlantique et tempérée des Etats-Unis. C'est un sous-arbrisseau à port buissonnant et parfois élevé (*E. allenii*). Au sommet des portions végétatives se développe un verticille de feuilles \pm pseudobractéaires, généralement 3 et libres entre elles; les involucres sont localisés immédiatement ou presque au-delà de ces feuilles. Entre l'aire de l'espèce-type et celle du genre, dans les plaines du « middle-west », se rencontrent quelques *Eriogonum* de forme \pm voisine quant à leur port et la disposition de leurs involucres, ainsi *E. vegetius*.

E. longifolium peut être considéré comme une autre de ces formes. Son aire s'étend de la Floride au Texas. C'est un sous-arbrisseau herbacé mais à port buissonnant et parfois élevé, non ou peu branchu toutefois en deçà des ramifications involucrifères qui composent une fausse ombelle \pm irrégulière et lâche. Cette plante, sous sa forme-type, est nettement individualisée par des tépales réduits à leur partie médiane, deltoïde et très densément tomenteuse; il est toutefois aisé de constater que cette apparence extrême est reliée par des transitions continues à celle, banale, des tépales de l'*E. tomentosum* sensu stricto, qui comportent ce même delta tomenteux mais \pm largement doté d'une double marge membraneuse. En outre, *E. longifolium* semble relié aux *Oregonium*.

E. arborescens est une troisième forme suffrutescente mais souvent de taille élevée, endémique et peu variable en Californie. Les rameaux involucrifères, irrégulièrement mais très abondamment fleuris, s'y développent au-delà du feuillage normal.

E. microthecum, dont *E. multiflorum* est une forme majeure, se situe près de la limite des *Eriogonum* sensu stricto et des *Oregonium*. C'est un sous-arbrisseau dressé, à feuilles caulinaires nombreuses et généralement verticillées, étroites.

Près de cette même limite, *E. caespitosum*, *E. latifolium*, *E. ovalifolium* et *E. umbellatum* peuvent être pris pour type des quatre sous-ensembles entre lesquels se distinguent, très peu discontinument, les orophytes appartenant aux *Eriogonum* sensu stricto.

E. caespitosum est remarquable par une souche prostrée dont naissent de petites touffes, \pm denses et voisines, de feuilles généralement petites, épaisses et cotonneusement velues. Chacune de ces touffes engendre un seul pédoncule involucrifère, dressé, assez élevé. A l'intérieur de cette définition se situe un très grand nombre de formes dont l'aspect général varie depuis celui de l'edelweiss vers celui de la

myrtille. *E. tripodum*, à pédoncule parfois divisé vers sa mi-hauteur, en 2 ou 3 branches et au-delà d'un petit verticille foliaire, peut-être considéré comme jalonnant la liaison de ces *E. caespitosum* avec les *E. umbellatum*.

E. latifolium, parfois très robuste (*E. robustum*), présente des rameaux involucriformes généralement assez bien dégagés de la masse feuillue, irrégulièrement et pauvrement redécouverts; les involucres sont en général densément groupés et chacun sessile sur 2 feuilles pseudobractéaires, ± minimes.

E. ovalifolium est pris ici pour type d'un autre groupe de formes « en tabouret », dans lequel chaque rameau se prolonge par un pseudopédoncule simple, au sommet duquel sont localisés les involucres, généralement peu nombreux et subsessiles au-delà d'un verticille de feuilles pseudobractéaires, mineures à minimes.

E. umbellatum correspond à un maximum de spécialisation. La souche est vigoureuse mais brève et prostrée, peu ramifiée. S'en dégage un feuillage abondant et dense, chaque feuille en général longuement pseudopétiolée en deçà d'une partie apicale ± largement spatulée. Les branches involucriformes sont dressées, longues, divisées, vers leur mi-hauteur et au-delà d'un verticille de feuilles ± réduites, en plusieurs branches qui forment une ombelle bien définie, chaque branche terminée par un seul involucre, souvent multiflore. A l'intérieur de cette définition se situe un nombre assez grand de formes dont : *E. polyanthum* remarquable par des tépales majeurs et d'un jaune vif; *E. spathulatum* à tiges et feuilles blanchâtrement cotonneuses; *E. subalpinum* qui, par ses ombelles pauvres et contractées ébauche une liaison vers les *E. latifolium*; *E. undulatum* qui pour sa part ébauche une liaison vers les *E. tomentosum* sensu stricto, avec des ombelles ± définies, lâches, parfois subterminales.

10 — La section *Nemacaulis* n'est représentée que par une espèce monotypique, endémique et assez rare semble-t-il en Californie, près du littoral. *E. nemacaulis* est un sous-arbrisseau herbacé, aux feuilles en rosette basale, aux branches involucriformes ascendantes et peu ramifiées. Chaque involucre forme une petite boule abondamment laineuse; cette laine est portée par les bractées involucrales, qui sont au nombre de 3 et libres entre elles, ainsi que par les bractéoles intérieures, peu différencierées, très nombreuses et dont chacune sous-tend une fleur à pédicelle assez court, à tépales petits et glabres.

11 — La section *Stenogonium* ne comprend qu'une seule véritable espèce, *E. salsuginosum*: sous-arbrisseau herbacé, prostré, à branches peu rameuses, à feuilles progressivement réduites, nombreuses à chaque nœud mais fasciculées plutôt que verticillées. Dans ces fascicules, les feuilles intérieures, mineures, sont très brièvement soudées à leur base, formant ainsi un involucre qui contient plusieurs fleurs les unes très brièvement et les autres assez longuement pédicellées. Cette espèce est assez commune depuis le Wyoming jusqu'en Arizona. Les *E. abertianum* peuvent être un jalon dans l'ancienne liaison, maintenant rompue, de cette section avec la section-type.

Le rarissime « *Gilmania* », endémique dans le Death Valley en Californie, peut être un *Stenogonium* profondément modifié, notamment par des involucres multiflores et largement étalés, par des pédicelles très longs et avant maturité repliés en spirale.

12 — La section *Hollisteria* se relie aux *Nemacaulis* et, par eux, au reste des *Eriogonum*. Son espèce unique, monotypique, endémique et rare en Californie, peut toutefois être considérée comme intermédiaire entre les *Eriogonum* et les *Chorizanthe*. Dans notre système, elle pourrait encore être le reliquat d'une variation primitive étendue à ces deux genres. *E. lanatum* est un sous-arbrisseau herbacé, prostré, à branches peu rameuses, à feuilles toutes alternes, les supérieures progressivement réduites. Chaque feuille supérieure sous-tend un involucre subsessile, à 3 pièces étroites et brièvement soudées, contenant généralement 2 fleurs, dont 1 sessile et 1 pédicellée; ces fleurs émergent d'une surabondance de poils laineux, intérieurs à l'involucré mais qui se prolongent, ± abrégés, sur les tépales très étroitement aigus, mucronés mais non pas vraiment spinescents.

3.3(3).6 = Cohors *Pteragonastreae* Roberty & Vautier cohors nov.

Eriogoninarum cohors perianthio non vel paulum accrescente, fructibus plus minusve late perfecteque alatis.

3.3(3).6(11) = *Pterogonum* Gross 1913 (1) : 239. Espèce type : *P. atrorubens*. *P. alatum* Gross 1913 (1) : 239 = *Eriogonum alatum* Torr. 1853 : 168 = *P. atrorubens* s.l. Specim. vis. : *Stokes* 205-A (Colorado).

P. atrorubens Gross 1913 (1) : 239 = *Eriogonum atrorubens* Engelm. in Wisl. 1848 : 108 (note 43). Specim. vis. : *Townsend & Barber* 72 (Mexique Nord).

P. hieracifolium Gross 1913 (1) : 239 = *Eriogonum hieracifolium* Benth. 1856 : 6 = *P. atrorubens* s.l. Specim. vis. : *Earle* 187 (New Mexico).

La validité taxinomique de ce genre, certaine quant à sa forme-type, est néanmoins discutable car entre cette forme et les *Eriogonum*, à tépales accrûs et sutures carpellaires non évaginées; paraît bien exister une transition continue. Nous avons, suivant GROSS (l.c.) rattaché au genre *Pterogonum* toutes les formes de transition dont ses trois espèces définissent, dans un discontinu très probablement arbitraire, les statuts successifs. Toutefois il pourrait être logique de situer également ici l'*Eriogonum ciliatum* (*E. tomentosum*), indiscutablement très voisin par l'ensemble de ses caractéristiques du *Pterogonum atrorubens*. Chez cet *Eriogonum*, les sutures carpellaires sont évaginées en crête épaisse. Chez les *Pterogonum*, les évaginations suturales, en effet, sont : localisées au sommet de l'achaine et ± larges chez *P. hieracifolium*; étroites mais étendues à toute la longueur de l'achaine chez *P. atrorubens* s.s.; larges sur toute cette même longueur chez *P. alatum*. Ces «espèces» pourraient être en outre différenciées par la couleur du périanthe à la floraison, respectivement d'un rouge brun, d'un jaune chaud, d'un jaune verdâtre; cette caractéristique ne peut être correctement appréciée en herbier; sa corrélation avec le développement des évaginations suturales ne nous paraît pas certaine.

Par ailleurs les *Pterogonum* sont des sous-arbrisseaux pérennans, assez hautement dressés. Leurs feuilles inférieures constituent une sorte de touffe pseudoradicale; les supérieures sont progressivement réduites au long d'une tige à ramifications axillaires peu développées, ± pauvrement mais régulièrement redivisées en branches involucrifères. En général assez longuement pédonculés, les involucres sont cupulaires avec un sommet onduleusement 5-lobé; chacun contient un assez grand nombre de fleurs, à périanthe isotépale.

Des trois formes précitées, la plus achevée, *P. alatum*, est de beaucoup la plus commune. On la rencontre, ainsi que les deux autres, dans le Nord du Mexique, l'Ouest et le Sud-Ouest des Etats-Unis.

3.3(3).7 = Cohors **Pterostegiastreae** Roberty & Vautier cohors nov.

Eriogoninearum cohors bracteolis ambabus in vesiculum laxe coalitis et fructus includens.

3.3(3).7(.8) = **Pterostegia** Fisch. & Mey. 1835 : 48.

— .9 = Sectio **Pterostegia**. Espèce type : *P. drymariooides*.

— 10 = Sectio **Harfordia** Roberty & Vautier sectio nov. = genus *Harfordia* Greene & Parry in Parry 1886 : 27. Espèce type : *P. macroptera*.

P. drymariooides Fisch. & Mey. 1835 : 48. Specim. vis. : type, *Fischer s.n.* « portu Bodegae »; *Jones* 2239 (Californie); *Pringle s.n.* [1881] (Arizona).

P. macroptera Benth. 1844 : 44 = *Harfordia macroptera* Parry 1886 : 28. Specim. vis. : *Orcutt s.n.* [1886] (Californie).

Le genre est nettement individualisé, dans l'ensemble des Polygonacées, par ses fruits au périanthe faiblement accru, chacun à maturité complètement inclus dans un involucelle diphylle et végétaleux.

Les deux espèces connues, jadis redéfinies mais en formes identifiées depuis comme accidentnelles ou même saisonnières, sont considérées par certains auteurs comme appartenant à deux genres distincts. Dans notre système il est, tout au plus, possible de les séparer au niveau de la section :

Bractéoles à maturité colorées et profondément dentées (.9 = *Pterostegia* **P. drymariooides**)
Bractéoles à maturité translucides et marginalement ondulées (10 = *Harfordia*)

P. macroptera

.9 — *P. drymariooides* est un sous-arbrisseau herbacé, annuel, à tiges grêles et rampantes ou prostrées, à feuilles opposées et pétiolées, à involucelles colorés et dentés sur leurs marges conjointes. On le trouve dans l'Ouest et le Sud-Ouest des Etats-Unis, assez rare sauf près du littoral californien.

10 — *P. macroptera* est un sous-arbrisseau crassuleux, pérennant, à branches diffusément ascendantes ou dressées, à feuilles sessiles, charnues et verticillées, à involucelles pâles et translucides, non ou très obtusément et ondulueusement découpés sur leurs marges conjointes. On le trouve, endémique et rare, sur quelques points du littoral californien.