

Noronhia jeremii

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **70 (2016)**

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

39. *Noronhia jeremii* Hong-Wa & Callm. in *Candollea* 64: 199. 2009 (Fig. 28A).

Typus: MADAGASCAR. **Prov. Antsiranana:** Ambanja, Beramanja, massif du Kalabenono, 13°38'38"S 48°40'07"E, 520 m, 25.XI.2007, *Callmander & Razafitsalama 740* (holo-: MO-6406809!; iso-: G [G00165767]!, K!, P [P00727210]!, TAN!, WAG!).

Description *Shrubs* to 4 m tall, trunk to 2 cm diameter; young twigs cylindrical, 1.3-2.6 mm diameter, glabrous; bark medium to light gray, smooth. *Leaves* opposite, persistent; bud scales deciduous; blades medium green above, lighter below, linear to oblong, 10.5-27 × 2-7 cm, subcoriaceous, glabrous, domatia absent, base rounded to cordate, margin slightly undulate, apex acuminate, the acumen 6-23 mm long, midrib flat to slightly sunken above, raised below, secondary veins conspicuous, 10-21 per side, 6-22 mm apart, looping 1.5-5 mm from the margin; petiole light gray to brownish, 6-16 × 2-4 mm, entirely woody, glabrous. *Thyraxes* solitary, pauciflorous, diffuse; peduncle 11-16 mm long, glabrous; pedicel 11-20 mm long, glabrous; calyx glabrous on both sides, lobes deltate, 2-2.6 × 1.4-1.7 mm; corolla yellowish, cupuliform, 5-6 mm long, glabrous on both sides, the tube 2-2.5 mm long, lobes triangular, apex acute; corona absent; stamens 2.2-2.5 mm long, anthers widely obovate, 1.5-1.6 mm long; pistil 2.3-3 mm long, stigma capitate. *Fruiting* pedicel 11-25 × 1-2 mm; young fruits green, brownish when mature, ampulliform to subglobose, 15.5-20 × 11-19 mm, surface smooth, apex apiculate; dry pericarp 0.3-1.1 mm thick; endocarp subcrustaceous; seed 9.5 × 11.5 mm.

Etymology *Noronhia jeremii* is named after Jérémie "Jimmy" Razafitsalama, a botanist working for the Missouri Botanical Garden in Madagascar, who collected the type material with the second author of this species. Jimmy was part of a team that undertook botanical inventories between 2005 and 2008 to explore the flora and vegetation in a long-neglected region of low- to high-elevation humid forest in northern Madagascar. These field expeditions led to the discovery of at least 20 new species in various families (CALLMANDER et al., 2008, 2009, 2012; WAHLERT, 2016).

Distribution, ecology and phenology *Noronhia jeremii* occurs in low- to mid-elevation humid forests on sandstones and basement rocks in northern Madagascar, from Makira in the east to Kalobinono [previously called Kalabenono] in the west (Fig. 27). It produces flowers and fruits from August to November.

Conservation status The assessment, which was based on six collections representing six localities, resulted in an EOO of 796 km², an AOO of 16 km², and three subpopulations representing two locations, of which only one occurs within a protected area (Galoko). The third location sits outside the new protected area of Makira, where

forests are potentially subject to exploitation leading to a reduction in habitat quality. Therefore, *N. jeremii* is assigned a preliminary status of “Endangered” [EN B1ab(iii)+2ab(iii)].

Notes *Noronhia jeremii* can be recognized by its long, broadly linear leaf blades, petioles that are attached to the lower surface of the leaf blades, flowers lacking a corona, and apiculate fruits. It differs from *N. capuronii* by its glabrous (vs. pubescent) petioles, linear to oblong (vs. ovate) leaf blades, and woodier endocarp.

Additional specimens examined **MADAGASCAR. Prov. Antsiranana:** Ambilobe, Beramanja, Anketrabe, forêt de Kalabenono, 13°38'20"S 48°40'16"E, 374 m, 19.XI.2006, *Callmander et al.* 537 (G, K, MO, P, TAN); *ibid. loc.*, 13°38'23"S 48°40'24"E, 550 m, 28.IX.2013, *Randriantsivery & Manjato* 396 (MO, TAN); *ibid. loc.*, forêt de Galoko, 13°35'28"S 48°43'14"E, 3.X.2013, *Randriantsivery et al.* 419 (G, MO, P, TAN); *ibid. loc.*, forêt de Kalabenono, 13°38'40"S 48°40'26"E, 700 m, 28.IX.2013, *Ratovoson* 2040 (G, MO, P, TAN). **Prov. Toamasina:** Maroantsetra, Ambinanitelo, Marovovonana, 15°19'42"S 49°31'49"E, 150 m, 29.VIII.2004, *Antilahimena* 2618 (G, MO, P).



Fig. 28. Photographs of *Noronhia* Stadtm. ex Thouars.

A. *Noronhia jeremii* Hong-Wa & Callm. [Callmander 740]; **B.** *Noronhia lanceolata* H. Perrier [Ratovoson 1475].

Photos: taken by respective collectors.