

Noronhia sambiranensis

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **70 (2016)**

PDF erstellt am: **20.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

74. *Noronhia sambiranensis* H. Perrier in Mém. Inst. Sci. Madagascar, Sér. B, Biol. Vég. 2: 289. 1949 (Fig. 56C).

Lectotypus (designated here): **MADAGASCAR. Prov. Antsiranana:** forêt de la vallée du Sambirano, [13°54'30"S 48°37'30"E], s.d., *Perrier de la Bâthie* 8826 (P [P00418092]!).
Syntypus: **MADAGASCAR. Prov. Antsiranana:** Diégo-Suarez, forêt d'Antsakoakely, *Ursch* 146 (P [P03559317]!).

Description *Trees* to 15 m tall, trunk to 15 cm diameter; young twigs cylindrical, 0.8-2.4 mm diameter, glabrous; bark medium to light gray, smooth. *Leaves* opposite, semi-deciduous; bud scales persistent; blades medium green above, lighter below, oblong to lanceolate, 8-14.5 × 2.5-5 cm, chartaceous, glabrous, domatia rare, base acute to attenuate, margin flat to slightly undulate, apex acuminate, the acumen 2-22 mm long, midrib flat to slightly sunken above, raised below, secondary veins conspicuous, 7-14 per side, 9-26 mm apart, looping 1.5-7 mm from the margin; petiole light gray to yellowish, 5-16 × 1.3-2.2 mm, partially to entirely woody, glabrous. *Thyraxes* solitary to geminate, pauciflorous, diffuse; peduncle 5-7 mm long, moderately pubescent; pedicel 2-14.5 mm long, moderately pubescent; calyx moderately pubescent outside, glabrous inside, lobes triangular to deltate, 1.3-2.5 × 0.9-2.2 mm; corolla red, cupuliform, 3.5-5 mm long, glabrous on both sides, the tube 1-3 mm long, lobes ovate slightly acute; corona absent; stamens 1.5-2.8 mm long, anthers oblate to orbicular, 1.1-1.9 mm long; pistil 2-3 mm long, stigma capitate. *Fruiting* pedicel 6-38 × 0.8-1.7 mm; young fruits greenish, purplish somewhat glaucous when mature, subglobose, 14-26.5 × 12-24 mm, surface smooth, apex flat, style persistent; dry pericarp 0.3-1.1 mm thick; endocarp crustaceous; seed 8.5-13.5 × 8-12 mm.

Distribution, ecology and phenology *Noronhia sambiranensis* occurs in low- to high-elevation humid forests on basement rocks and lavas in the northwest (Fig. 49). It produces flowers and fruits from November to June.

Conservation status Based on 21 collections representing 19 localities, the assessment resulted in an EOO of 11,043 km², an AOO of 72 km², and 12 subpopulations representing 12 locations, of which 10 occur within protected areas (Galoko, Lokobe, Manongarivo, Montagne d'Ambre, and Tsaratanana). Decline in habitat quality resulting from wood harvesting and forest exploitation will continue to affect the subpopulations that are outside and on the edge of protected areas. *Noronhia sambiranensis* is thus assigned a preliminary status of "Near Threatened".

Notes *Noronhia sambiranensis* can be recognized by its chartaceous, oblong to lanceolate leaf blades, cupuliform, red flowers, and subglobose, crustaceous fruits. It differs from *N. urceolata* by its semi-deciduous (vs. persistent) leaves, cupuliform (vs. urceolate) flow-

ers, and ovate to acute (vs. widely ovate rounded) corolla lobes. This species was based on two syntypes (*Perrier de la Bâthie* 8826 and *Ursch* 146), the first of which bears both flowers and fruits, and has thus been chosen here as the lectotype.

**Additional specimens
examined**

MADAGASCAR. Prov. Antsiranana: Ampasindava, forêt de Betsitsika, 13°45'36"S 48°04'21"E, 436 m, 3.XII.2008, *Ammann et al.* 129 (G, MO, TEF); *ibid loc.*, 13°45'53"S 48°04'22"E, 470 m, 12.XII.2008, *Ammann et al.* 191 (G, MO, P, TEF); Nosy Be, Lokobe RNI, 13°25'S 48°19'E, 30-100 m, 14.VII.1994, *Antilahimena* 142 (K, MO, TAN); Tsaratanana RNI, Beangona, 14°01'S 48°47'E, 1200-1400 m, 31.VII.2000, *Antilahimena et al.* 530 (G, K, MO, P, TAN); Ambilobe, Beramanja, Anketrabe, forêt de Kalabenono, 13°38'20"S 48°40'16"E, 374 m, 19.XI.2006, *Callmander et al.* 535 (G, MO, P, TAN); Manongarivo RS, Ambahatra, 13°59'S 48°26'E, 600 m, 8.VI.2000, *Gautier* 3766 (G, MO, P); Ampasindava, forêt de Bongomihiravavy, 13°45'38"S 48°05'29"E, 430 m, 24.XI.2008, *Madiomanana et al.* 149 (G, MO, P, TEF); Montagne d'Ambre, 12°28'36"S 49°10'51"E, 687 m, 18.XII.2011, *Ramandimbimanana et al.* 173 (G, MO); Tsaratanana RNI, Mandrizavona, 13°50'33"S 48°46'35"E, 545 m, 10.X.1998, *Randrianaivo* 267 (G, MO, P, TAN); Montagne d'Ambre, station des Roussettes, [12°28'S 49°10'E], 12.XI.1954, *Service Forestier* 11033 (P, TEF); Ambahatra, cours moyen, 13°57'40"S 48°26'40"E, 350 m, 21.VI.1999, *Wohlhauser* 60168 (G, MO, P, TEF); Ambahatra, cours supérieur, 13°59'S 48°26'E, 330 m, 4.VI.2000, *Wohlhauser* 60289 (G, MO, P). **Prov. Mahajanga:** Tsaratanana massif, N of Mangindrano, 14°10'24"S 48°56'43"E, 1675 m, 21.X.2001, *Lowry et al.* 5449 (MO, P).