

Abrahamia lecomtei

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **71 (2017)**

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

16. *Abrahamia lecomtei* (H. Perrier) Randrian. & Lowry, **comb. nova** (Fig. 13).

≡ *Protorhus lecomtei* H. Perrier in Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. 18: 262. 1944.

Lectotypus (designated here): **MADAGASCAR. Prov. Toamasina:** Rég. Atsinanana, Vatomandry, bois littoraux en arrière des lagunes, fl., IX.1921, *Perrier de la Bâthie 14301* (P [P00722658]!; isolecto-: MO-6684135!, P [P00722659]!).

Description *Trees* 5-15 m tall, 5-20 cm DBH, bark with white latex; young twigs glabrous, waxy, with lenticels, white or pale brown, spongy, sometimes the very tip with sericeous red brown indument. *Leaves* alternate, closely spaced, more so toward the branch ends; blades, oblanceolate, rarely widely elliptic, 5.3-17.5 × 1.5-5 cm, subcoriaceous, apex shortly acuminate, acuminate or rarely rounded, margin entire, base acute or cuneate to obtuse, adaxial surface glabrous, abaxial surface sericeous on midvein, sometimes sparsely so, venation semicraspedodromous, midvein prominent abaxially, secondary veins 20-30 pairs, more or less parallel, 2-8 mm apart, rather prominent abaxially, tertiary veins often obscure on adaxial surface, fairly visible on abaxial surface; petiole 5-8-(10) mm long, shallowly canaliculate on adaxial surface, red-brown pubescent when young, glabrescent. *Inflorescence* axillary, a panicle, 1-5 cm long, axes regular, red-brown pubescent; bracts triangular, 1-2 × 0.5-1 mm, abaxial surface red-brown pubescent outside. *Male* and *female flowers* 5-(or 6)-merous; pedicel c. 0.3-0.5 mm long, red-brown pubescent; calyx lobes ovate to deltate, 1-1.2 × 0.8-1.5 mm, imbricate (valvate in female flowers), adaxial surface glabrous, abaxial surface glabrescent or with red brown indument; corolla lobes ovate or oblong, 2-3 × 1-1.5 mm, imbricate, adaxial surface glabrous, abaxial surface glabrous or with sparse reddish indument, yellow green; stamens 5. *Male flowers* with filaments 0.5-0.7 mm long, glabrous, anthers 0.5-0.6 mm long, obloid to slightly ovoid, white, glabrous; disk cupuliform, c. 1 mm in diam., glabrous; ovary completely absent. *Female flowers* with filaments c. 0.8 mm long, glabrous, anthers c. 0.5 mm long, ovoid to obloid, sterile, yellow, glabrous and pubescent; disk c. 1-1.5 mm in diam., glabrous; ovary very widely ovoid, c. 1 × 1 mm, glabrous, placentation subapical (nearly apical); style simple, subapically to apically inserted, 1 mm long, glabrous, stigmas capitate. *Fruits* c. 1.7 × 1 cm, ellipsoid, symmetrical, glabrous, with weakly visible longitudinal striations.

Vernacular names “Ditimena”, “Hazombarorana”, “Tavolo malamatra”, “Tsiramiramy mena”.

Distribution, ecology and phenology *Abrahamia lecomtei* occurs in eastern rainforest from coastal areas to elevations as high as 950 m (Map 4). It has been recorded in flower between September and December, and fruits have been collected in December and January.

Conservation status With an EOO of 7,413 km², a minimum AOO of 32 km² but an estimated AOO > 500 km², and 7 recorded localities, only some of which are in protected areas (Ambalabe, Betampona, and Zahamena), *A. lecomtei* is assigned a preliminary conservation status of “Vulnerable” [VU B1ab(iii)+2ab(iii)] using the IUCN Red List Categories and Criteria (IUCN, 2012).

Notes *Abrahamia lecomtei* can be distinguished from all other members of the genus by the presence of spongy, pale or white bark on the twigs and small branches, its leaves with semicraspedodromous venation and a short petiole (5-8 mm long), and its male flowers with short filaments (not exceeding 0.8 mm) and a disk that lacks a rudimentary ovary.

Perrier de la Bathie 5283 (P) was cited in the protologue of *Protorhus lecomtei* and thus represents a syntype, but it is clearly referable to *Abrahamia thouvenotii*.

Additional material examined

MADAGASCAR. **Prov. Toamasina:** Zahamena PN, W d’Ampasimaventy, 17°44’42”S 48°58’26”E, 300-350 m, 9.VII.2003, fl., *Andrianjafy* 396 (CNARP, MO, P); Ambaton-drazaka, Sahalampy, Onibe, [17°45’S 48°51’E], 700 m, XI.1938, bud, *Cours 1171* (P [2 sheets]); RNI Betampona, 17°51’55”S 49°12’15”E, 275-650 m, 19-25.VIII.1990, ster., *Carlson* 364 (MO, P, TAN); Ambodimangavolo, 3 km W d’Ambatoharanana, 17°34’17”S 48°53’49”E, 950 m, 30.IV.2003, fl., *Rakotondrajaona* 266 (CNARP, G, K, MO, P, TEF); Vatomaniry, Ambalabe, forêt de Vohibe, 19°09’07”S 48°34’33”E, 704 m, 20.I.2012, fr., *Rakotoarivelo* 608 (G, K, MO, P, TAN); *ibid. loco*, 19°09’42”S 48°34’41”E, 667 m, 20.XI.2013, y. fr., *A. Randrianasolo* 1456 (G, K, MO, P, TAN); Zahamena PN, Ihofika, 17°39’13”S 48°57’50”E, 550 m, 22.X.2002, fl., *S. Randrianasolo* 335 (CNARP, MO, P); Ambalabe, forêt de Vohibe, 19°09’32”S 48°34’39”E, 617 m, 16.X.2008, fl., *Razanatsima* 629 (G, K, MO, P, TAN); *ibid. loco*, 624 m, 1.XII.2008, y. fr. & fl., *Razanatsima & Celestin* 635 (MO, P, TAN); Betampona RNI, [17°55’S 49°13’E], 22.XII.1950, fl., *Réserves Naturelles* 2656 (MO, P [2 sheets]); Betampona RNI, Betavoana, [17°56’S 49°17’E], 12.XI.1957, fl., *Réserves Naturelles* 9156 (P, TEF). **Sine loco:** 19.XII.1938, y. fr., *Lam & Meeuse* 6022 (P).



Fig. 13. *Abrahamia lecomtei* (H. Perrier) Randrian. & Lowry. Fruits, from side [*Razanatsima & Celestin* 635].

Photo: A. Razanatsima