

Abrahamia sambiranensis

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Boissiera : mémoires de botanique systématique**

Band (Jahr): **71 (2017)**

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

29. *Abrahamia sambiranensis* Randrian. & Lowry, *spec. nova* (Fig. 26).

Typus: MADAGASCAR. **Prov. Mahajanga:** Rég. Diana, Ambato forêt classée, c. 40 km N d'Ambanja, 13°26'S 48°33'E, 90-459 m, 23.XI.1996, fr., *Randrianaivo et al.* 29 (holo-: MO-6671436!; iso-: G!, MO-6671435!, P [P06775160]!, TAN [TAN001998]!).

Diagnosis *Abrahamia sambiranensis* Randrian. & Lowry can be distinguished from other members of the genus by the combination of large (10-19 × 2.5-5.6 cm), coriaceous leaves with numerous (50-60) distinctly raised secondary veins and a folded apex in dry material, its long petiole (30-65 mm), and its large, glabrous fruits (2.5-3 cm long).

Description Trees 10-15 m tall, 15-18 cm DBH, bark with white latex; young twigs pubescent towards the tips. Leaves alternate, clustered toward the branch ends; blade oblanceolate or narrowly elliptic to lanceolate, 10-19.4 × 3.2-5.5 cm, coriaceous, apex acuminate, folded in dry material, margin undulate, base cuneate to broadly cuneate, adaxial surface glabrous, often glaucous, abaxial surface sparsely sericeous, more so on midvein, venation craspedodromous, midvein prominent abaxially, secondary veins 50-60 pairs, more or less parallel, 2-4 mm apart, raised on both surfaces, tertiary veins not visible on both surfaces; petiole (20)-25-58 mm long, 2-3.5 mm in diam., canaliculate on adaxial surface, tomentose. Inflorescence axillary, a panicle, 2-9.5 cm long, very few flowers reaching maturity, axes pubescent. Male flowers 5-merous; pedicel c. 0.5-1 mm long, pubescent; calyx lobes triangular to ovate, 1 × 1 mm, connate at base, adaxial surface glabrous, abaxial surface pubescent; corolla lobes ovate, 2.5 × 1.5 mm, imbricate, adaxial surface glabrous, abaxial surface pubescent; stamens 5, filaments 1 mm long, anthers c. 1 × 1 mm, obloid to ovoid; disk cupuliform, glabrous; rudimentary ovary absent. Female flowers unknown. Fruits 2.5-3 × 1.5-1.8 cm, ellipsoid, pubescent when young, glabrescent, with fine longitudinal striations.

Distribution, ecology and phenology *Abrahamia sambiranensis* is restricted to humid forests in the Sambirano region of NW Madagascar and extends into the northern part of the island (Map 9). It flowers in July and August, and fruits have been collected in October and November.

Conservation status With an EOO of 1,717 km², a minimum AOO of 28 km², and seven localities, with only a single subpopulation within a protected area (Galoko), *A. sambiranensis* exists at 7 locations, six of which are subjected to pressure from forest exploitation and land clearing; it is therefore assigned a preliminary conservation status of "Vulnerable" [VU B1ab(iii)+2ab(iii)] using the IUCN Red List Categories and Criteria (IUCN, 2012).

Notes *Abrahamia sambiranensis* vegetatively resembles *A. elongata*, but differs by having leaves that lack tertiary venation (vs present and raised on both surfaces in *A. elongata*) and whose apex is usually folded in pressed material (vs flat), and by its fruits that are glabrescent when mature (vs glabrous in *A. elongata*).

Paratypes MADAGASCAR. Prov. Antsiranana: Rég. Diana, Ambilomangodra, 13°02'42"S 49°09'11"E, 50 m, 14.VII.2005, fl., *Randrianaivo et al.* 1201 (CNARP, MO, P, TAN); forêt de Kalabenono, 13°37'27"S 48°40'05"E, 369 m, 10.XI.2006, fr., *Razafitsalama et al.* 1064 (G, MO, P, TAN); Galoko, [13°33'45"S 48°45'00"E], 29.VII.1955, y. fr., *Service Forestier* 15748 (P, TEF); forêts à l'E d'Ampondrabe, 28.X.1954, fr., *Service Forestier* 18931 (MO, P [2 sheets]); massif de l'Andavakoera, N d'Angodromena, [13°06'30"S 49°18'30"E], 1.X.1958, fr., *Service Forestier* 18947 (G, MO, P [2 sheets], TEF); Ampandrikoera, 12.X.1951, ster., *Service Forestier* 181-R-64 (P).

