Zeitschrift: Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel

Herausgeber: Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel

**Band:** 6 (1861-1864)

**Artikel:** Tableau des formations géologiques du canton de Neuchâtel

Autor: Desor, Ed.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-88010

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 25.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## **TABLEAU**

# DES FORMATIONS GÉOLOGIQUES

## DU CANTON DE NEUCHATEL

PAR ED. DESOR.

Une première édition du tableau ci-contre, a paru dans les Mémoires de la Société des sciences de Neuchâtel, tome IV, 1859, comme partie intégrante des Études sur le Jura neuchâtelois. Depuis lors, la connaissance de notre sol a fait des progrès. L'exécution des deux tunnels des Loges et du Mont-Sagne, tout en confirmant d'une manière très-satisfaisante notre coupe théorique, a jeté un nouveau jour sur divers points demeurés douteux. Des progrès notables ont aussi été faits dans l'étude de certains groupes d'un classement difficile, à cause de leur uniformité. Le sous-étage Virgulien, entre autres, qui passait pour le plus inextricable, est aujourd'hui l'un des mieux connus, grâce à l'étude spéciale qu'en a faite M. Aug. Jaccard.

J'ai pensé qu'il pourrait être de quelque utilité de résumer ces résultats dans un nouveau tableau, on y ajoutant, sous une rubrique particulière, les principales localités du canton où les terrains affleurent et où se trouvent les gîtes des fossiles caractéristiques. Enfin, pour empêcher la confusion dans l'esprit des commençants, on a indiqué, à leur place respective, les terrains qui font défaut dans notre canton. On aura ainsi une idée des lacunes qui existent dans la série des dépôts du Jura et des péripéties que notre sol a subies avant le soulèvement des montagnes. Ces lacunes correspondent surtout à la fin de l'époque crétacée et au commencement de l'époque tertiaire.

Neuchâtel, 1 mai 1864.

*		TERRAINS.	Mètr.	CARACTÈRES PÉTROGRAPHIQUES.
SÉRIE ÉCENTE	1	Terrain alluvien.	Var.	Humus, tourbes, tufs, alluvions, deltas.
SÉRIE ÉCENT	2	Terrain erratique.	Var.	Limons, sables, argiles, galets, blocs erratiq
<b>&amp;</b>	/ 3	Marnes bleues de Plaisance et sables jaunes d'Asti, Étages Astien et Plaisantien.		Manque.
	4	Terrain d'eau douce supérieur.	60	Calcaire marneux ou siliceux avec lignites scl
	5	Molasse marine, Ét. helvétien	40	Sables marneux; grès verdâtres.
ш	6	Molasse d'eau douce, Étage mayencien.	40	Grès marneux avec lignites, intercallé de be de calcaire et de marnes avec gypse.
SÉRIE TERTIAIRE		Calcaire et marne d'eau douce inférieur, Ét. aquitanien?	20	Calcaire compacte, alternant avec des ma roses et lie de vin.
s TER	7	Conglom. marin, Ét. tongrien	1-5	Marne jaune et conglomérat calcaire.
	8	Gypse de Montmartre, Étage Ligurien.		Manque.
	9	Calcaire grossier, Ét. Parisien		Manque.
	10	Argile de Londres, Étage Londonien.		Manque.
	111	Calcaire nummulitiq. et flysch, Étage Suessonnien.	3 .74	Manque.
	12	Calc. pisolitique, Ét. Danien.	72.5	Manque.
	13	Craie blanche, Ét. Sénonien.		Manque.
	14	Craie jaune, Étage Turonien.		Manque.
ÉE.	15	Craie marneuse, Ét. Cénoma- nien.	6	Calcaire bigarré ou blanc marneux.
CRETACÉE	16	Gault, Étage Albien.	12	Marne argileuse bigarrée de bleu et de roi sables jaunes avec fossiles phosphatés.
	<b>(17</b>	Grès vert infér., Ét. Aptien.	18	Grès lumachellique verdât.; marne et argile ja
FORMATION	18	Galc. à caprotines, Ét. Urgon.	40	Calcaire blanc et jaune cristallin, avec im gnation d'asphalte.
FORM	19	Pierre jaune et marne de Hau- terive, Étage <b>Néocomien</b> .	40	Calcaire jaune sub-oolitique à lumachelle et s Marnes bleues (de Hauterive) à la base.
	20	Marbre bâtard et limonite, Et. Valangien.	60	Calcaire compacte blanc et jaune; oolite ferr neuse (limonite) en haut; marne grise en
	21	Marne lacustre, Étage Pur- beckien.	5	Marne grise et noire, avec bancs de calc. fé

.

FOSSILES.	LOCALITÉS.
ris d'animaux de l'époque actuelle.	Bords du lac et fond des vallées.
uilles terrestres; Eléphant, Ours.	Cortaillod, Pierre-à-Bot, Hts-Genevey
ices, Lymnées, Dinother. gigant., Plantes d'Oeningen.	Gare du Locle, Chaux-de-Fonds.
ea crassissima, Pect. scabellus, Lamna cuspidata.	Chaux-de-Fonds, Locle, Verrières.
ix Ramondi, Melania Escheri.	Boudry, Préfargier.
ses, Poludines	Trois-Rods, gare de Saint-Blaise.
rea callifera.	Tunnel des Brenets.
	10 St
monites varians, Holaster Trecensis.	Joratel, Souaillon.
monites latidorsatus, Amm. Milletianus, Avellana icrassata.	Gorges de la Reuse.
atula placunea, Toxaster oblongus.	La Presta, Boveresse.
rotina, Hemicidaris clunifera.	Bôle, Vaumarcus, La Presta.
. complanatus, Gryphæa Couloni, Rhynchonella de- ressa.	Neuchâtel, Couvet, Hauterive.
. granosus, Pygurus rostratus, Natica lobata, Nerinea idanceti.	Valangin, Landeron.
norbis Loryi, Physa Bristowi, Chara Purbeckensis.	Tunnel de la Luche, Combe-Varin.

	1		TERRAINS.	Mètr.	CARACTÈRES PÉTROGRAPHIQUES.
JURASSIQUE.	jurassique supérieur	22	Sous-étage Virgulien. Jaluze, calcaire spathique et calcaire blanc crayeux. Roc dolomitique ou à soufflures (calc. âpre). Marne avec Ostrea virgula.	42	Bancs de dolomie (Jaluze). Calc. blanc sacharoïde dans le haut, avec dél de poissons. Calcaire spathique jaunâtre. Calcaire blanc crayeux. Marne jaune avec Exogyres.
	Terrain jura	23	Sous-étage <i>Ptérocérien</i> .  Roc compacte, parfois crayeux ou oolitique, alternant avec des bancs marneux et submarneux.	140	Calcaire blanc crayeux ou compacte, dans le h rempli de Bryozoaires, quelquefois oolitiq fomant de grands massifs séparés par des a ses moins dures, sub-marneuses, dans lesque se trouvent les fossiles.
	moyen.	24	Sous-étage Astartien. Calc. rouge, marne à astartes supér., oolite astartienne et marne à astartes inférieure.	140	Calc. massif très-puissant, souvent oolitique, q quefois à très-grosses oolites. Marnes feui tées, à rognons. Oolite sub-ferrugineuse forme de dalles. Marne grise avec bancs de ş fin et micacé.
	rassiqu	25	Terrain à chaille. Étage Co- rallien. (Sous-étage Glyp- ticien de M. Étallan.)		Calc. marneux et marne ocreuse avec rogn calcareo-siliceux.
	<	26	Calcaire à ploladomyes. Calc. et marnes hydrauliques. Cal. à scyphies. Ét. <b>Argovien</b> .	100	Calc. marno-schisteux en bancs très-réguliers Calc. rognoneux avec marne terreuse. Calc. esquilleux, à taches jaunes et roses.
FORMATION	Te	27	Marnes d'Oxford et de Kello- way. Étages Oxfordien et Callovien réunis.		Marne grise feuilletée, avec oolites ferrugineu
	brun.	28	Dalle nacrée.	35	Oolite fauve en dalles lumachelliques, pétries fossiles d'un éclat nacré.
	. ou Jura brun	29	Marnes à discoïdées ou à ostrea acuminata et calcaire roux sableux. Ét. Bradfordien	20	Marne terreuse. Dalles calcaires brunes et grises.
	infér.	30	Grande oolite et marne à ho- momyes. Étage Bathonien		Calc. oolitique blanc et compacte. Marne et calcaire marneux jaune.
	sique	31	Calcaire sub-compacte. Étage Lédonien.	40	Calc. brun, quelquefois oolitique, souvent s thique.
	juras	32	Marlysandstone et oolite fer- rugineuse.	35	Grès calcaire, micacé, plus ou moins marneu oolite ferrugineuse.
	Terrain jurassique infér.	35	Marnes à Ammon. opalinus e couches sableuses à Ammo- nites Murchisonae.		Marnes bleues micacées et bancs calcaire sphérites.
	ŲĒ.	(3/	Lias supérieur. Ét. <b>Toarcien</b>		Manque.
	ŠIĎ	38	Schiste à Posidonies. Ét. <b>Lias</b>	. 1	Marne noire, feuilletée.
	F. LIASIQUE	36	Calc. à Gryphea Cymbium e calc. à Gryph. Macullochii Ét. Sinémurien.	. 12	Calcaire marneux avec blocs sphéritiques.  Calcaire dalliforme.

FOSSILES.	LOCALITÉS.
lébris de Sauriens, de Tortues. lents et écailles de poissons, Lepidotus, Pycradus, Strophodus, Nérinées, Natices. lygurus Jurensis. lygurus, Nérinées, Diceras. lxogyra virgula.	La Sagne, Hauts-Geneveys, Chaumont Les Brenets, Chaux-du-milieu. Lac de Brenets. Montagne des Loges, mont Sagne. Chemin du Saut du Doubs.
téroceras oceani, Ostrea solitaria, Mytilus jurensis, Te- rebratula subtella, Tellina Studeri, spécialement dans les bancs marneux. De nombreux Bryozoaires et coraux, surtout dans les assises supérieures.	Longeaignes Rosières Chaux-de-Eds
ossiles rares dans les calcaires massifs, triturés dans l'oolite corallienne; assez abondants dans les marnes. On trouve: Terebratula humeralis, Pertes rigidus, dans les marnes supér.; Natica macrostoma, Ostrea gregarea dans les marnes infér. Des astartes dans les deux.	des grosses oolites), Brot-dessous,
erebratula trigonella, Cidaris Blumenbachii.	Combe de St-Sulpice, ds les tranchées du chemin de fer, Longeaigue, Ro- sières, Chatelu.
pongiaires, Pholadomya acuminata. ragos, Pentacrinus subteres (très-abondant).	Creux-du-Vent, Trémont, Fretreules.
ollyrites castanea, Ammonites cordatus (Lamberti).	Col-des-Roches, Fretreules, Pouillerel.
uantité de débris de coquilles et d'échinodermes. Pen- tacrinus Nicoleti.	Furcil, route du Locle aux Brenets.
olectypus (Discoïdea) depressus, Collyrites analis, Ostrea acuminata, Amm. wurtembergicus, Clypeus Osterwaldi, et Belemnites giganteus, dans les calcaires.	Chaux-de-Fonds, Furcil.
eu de fossiles. omomya (Lutraria) gibbosa, Pholadomya Burcardium.	Furcil. Montperreux.
olypiers nombreux, Lima proposeidea, Ammonites gigantesques.	Montperreux.
acoïdes charbonneux, Pecten personnatus et disciformis.	Combe aux Auges.
mmonites opalinus, Belemnites breviformis. mmonites Murchisonae. ocules Hammeri, Astarte lirida.	Combe aux Auges. Au pied du Montperreux. Tunnel des Loges.
uelques petites Posidonies.	Tunnel des Loges.
yphea Cymbium, Rhynchonella tetraedra, Belemnites paxillosus. yphea Macullochii, Terebratula nummismalis.	Tunnel des Loges.