

**Zeitschrift:** Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  
**Herausgeber:** Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  
**Band:** 36 (1908-1909)

**Artikel:** Quelques mots sur la géologie du Hahnenmoos (Alpes bernoises)  
**Autor:** Roessinger, G.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-88553>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 10.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# QUELQUES MOTS

SUR LA

## GÉOLOGIE DU HAHNENMOOS (Alpes bernoises)

PAR G. ROESSINGER

---

Le col du Hahnenmoos, qui réunit la Lenk et Adelboden, a joué un certain rôle dans un débat de MM. Sarasin et Rothpletz touchant la géologie des Préalpes internes.

M. Sarasin et son élève, M. Collet, voient au Hahnenmoos, sous le Flysch dit du Niesen, une série renversée comprenant le Trias, le Lias, le Dogger et le Crétacé<sup>1</sup>. M. Rothpletz admet l'existence de ce Trias; il envisage comme du Malm le Crétacé de MM. Sarasin et Collet et remplit l'intervalle des deux terrains avec du Flysch<sup>2</sup>. Les auteurs ne sont pas d'accord non plus sur le prolongement des affleurements dans la vallée de la Lenk. MM. Sarasin et Collet font passer le Trias de la base du Flysch du Niesen au sud de Seiten, tandis que M. Rothpletz l'indique au nord de cette localité.

Nous avons nous-même exploré certaines parties de la région en 1902 et nous désirons exposer aujourd'hui ce que nous avons constaté en deux endroits, à savoir:

1<sup>o</sup> Le long d'une ligne qui passe sur le terrain à peu près où devrait se trouver, d'après MM. Sarasin et Collet, la limite du Lias supérieur et du Dogger du col, autrement dit en plein Flysch de M. Rothpletz.

2<sup>o</sup> Au nord-est de Seiten, où M. Rothpletz marque du Trias et du Flysch, et MM. Sarasin et Collet seulement du Flysch.

Nous examinerons ensuite la manière dont les faits exposés s'accordent avec les conceptions des trois géologues.

<sup>1</sup> C. SARASIN et L. COLLET. « La zone des cols dans la région de la Lenk », *Arch. des sc. phys. et nat. de Genève*, t. XXI, 1906.

<sup>2</sup> A. ROTHPLETZ. *Geologische Alpenforschungen*, III. « Die Nord- und Süd-Uberschiebungen in den Freiburger Alpen », Lindauersche Buchhandlung, Munich, 1908.

Voici les observations faites dans la première région :

1<sup>o</sup> Autour des chalets de la cote 1900 affleurent le calcaire dolomitique et la cargneule du Trias, plus une brèche calcaire peut-être liasique.

2<sup>o</sup> De ce point, en passant au sud de la cote 1937 et en marchant ensuite vers l'ouest, on peut suivre une série de blocs ou d'affleurements de cargneule.

3<sup>o</sup> Sur l'arête, immédiatement au sud du Trias, s'étale un complexe de calcaire, de marno-calcaire blanc et de brèche polygénique. Ce calcaire rappelle celui du flanc est du Metschstand dont MM. Sarasin et Collet font du Crétacé et M. Rothpletz du Malm, et qui est accompagné lui aussi, nous l'avons constaté, de brèches polygéniques.

Au nord-est de Seiten, au pied de l'escarpement du Flysch du Niesen, pointent plusieurs rochers, dont l'un a été dessiné par le topographe sur la carte de la Lenk au 1:50 000. Nous avons vu, entre autres, dans cette région :

1<sup>o</sup> Des calcaires dolomitiques en contact avec des schistes verts et violacés (Trias).

2<sup>o</sup> Des brèches calcaires à *Pentacrinus*.

3<sup>o</sup> Des calcaires foncés, contenant souvent des concrétions siliceuses, et qui ont livré des Pentacrinides, des Bélemnites et des Ammonites (probablement *Aegoceras*).

On peut tirer des faits cités les conclusions suivantes :

Les divers terrains qui affleurent au sud de la cote 1937 du Hahnenmoos trahissent la présence d'une dislocation importante et encore insoupçonnée, probablement d'un chevauchement.

Les brèches polygéniques du Hahnenmoos et du Metschstand, en contact avec des calcaires jurassiques ou crétacés, rendent plausible l'opinion de M. Rothpletz sur l'existence du Flysch dans ce territoire.

Cependant, les fossiles de Seiten témoignent en faveur de MM. Sarasin et Collet, d'après lesquels le Trias à la base du Flysch du Niesen serait accompagné de Lias.

Enfin, le Trias en question affleure sur le flanc est du Simmenthal avec un tracé conforme aux levers de M. Rothpletz, au moins à Seiten.