

**Zeitschrift:** Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  
**Herausgeber:** Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles  
**Band:** 39 (1911-1912)

**Artikel:** Supplément au catalogue des mollusques du canton de Neuchâtel  
**Autor:** Piaget, Jean  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-88575>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 18.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# SUPPLÉMENT AU CATALOGUE

des

## MOLLUSQUES DU CANTON DE NEUCHÂTEL<sup>1</sup>

PAR JEAN PIAGET

---

M. Paul GODET faisait remarquer en 1907, dans son *Catalogue*, qu'il ne faut en aucun cas considérer comme complète sa liste de stations pour chaque espèce, et que de nouvelles recherches amèneraient certainement la découverte, sur plusieurs points, de mollusques qui n'avaient été signalés que sur un seul. Depuis cette époque, M. GODET lui même a repris le genre *Crystallus*, dans le *Bulletin* de notre société, en 1908 (XXXV, p. 106) et l'*Unio Consentaneus* en 1911 (XXXVIII, pp. 33-38, 2 pl.); M. MEYLAN, de Sainte-Croix, a poursuivi ses explorations dans le Jura vaudois; M. le Dr KAMPMANN, de Vallorbes, s'est livré à quelques recherches dans diverses régions rentrant dans le cadre du catalogue, ainsi que M. le Prof. JAQUET, mes amis M. REICHEL, M. ROMY, et M. le Dr G. BOLINGER qui a publié en 1909 un ouvrage intitulé « *Zur Gastropodenfauna von Basel und Umgebung, Basel 1909* », où il cite plusieurs localités du canton, ou très voisines. Le *Journal de Conchyliologie* de Paris publiera prochainement quelques observations sur les Limnées de nos trois lacs. La faune malacologique du lac de Saint-Blaise vient également d'être étudiée par le club des *Amis de la Nature*, d'abord en 1907<sup>2</sup>, et dernièrement plus à fond<sup>3</sup>; elle avait déjà été inventoriée assez sommairement par M. le Dr THIÉBAUD<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> *Catalogue des mollusques du canton de Neuchâtel et des régions limitrophes des cantons de Berne, Vaud et Fribourg*, par Paul GODET, prof. — Voir *Bull. Soc. neuch. Sc. nat.*, t. XXXIV, 1907, pp. 97-158, pl. I et II.

<sup>2</sup> *Le lac de Saint-Blaise*, par le Club des Amis de la Nature de Neuchâtel. *Bull. de la Soc. neuch. de Géographie*, t. XVIII, 1907, Moll., p. 44-46.

<sup>3</sup> *Catalogue des mollusques du lac de Saint-Blaise*, par Jean PIAGET et Marcel ROMY. *Loc. cit.*, 1912.

<sup>4</sup> *Contribution à la Biologie du lac de Saint-Blaise*, par Maurice THIÉBAUD. *Annales de Biologie lacustre*, III, 1908, Mollusques, pp. 110-111 (63-64 du tiré à part).

Enfin, depuis quelque temps, j'ai eu l'occasion de relever un certain nombre de nouvelles stations, que je crois utile de publier pour compléter le précieux catalogue de M. Paul GODET. J'adresse tous mes remerciements à M. le Dr KAMP-MANN, à M. le Prof. JAQUET et à MM. Ch. MEYLAN, M. REICHEL et M. ROMY, qui ont bien voulu me communiquer l'intéressant résultat de leurs recherches.

Page 113<sup>1</sup>.

1. LIMAX MAXIMUS L.

Var. *cinereo-niger* Wolff. — Le Pâquier (Val-de-Ruz), gorges de l'Areuse, La Côte-aux-Fées, Les Rasses.

2. LIMAX TENELLUS Nils.

Fréquente dans les montagnes: Chaumont, Lignièrès, La Côte-aux-Fées, La Brévine, Les Ponts.

3. LIMAX VARIEGATUS Drap.

M. MEYLAN m'écrit qu'il l'a découverte à Sainte-Croix.

4. AGRIOLIMAX AGRESTIS (L.).

Répondue également dans les montagnes: La Côte-aux-Fées, La Brévine, Les Ponts, etc.

6. VITRINA PELLUCIDA (Müll).

Epagnier, Chaumont, Vaumarcus, Verrières.

M. MEYLAN a découvert à Sainte-Croix une forme que j'ai retrouvée près de Valangin et qui est voisine des *Vitrina pellucida* typique, *V. elliptica*, et de la forme intermédiaire que BOLLINGER (fig. 1, p. 44) appelle *pellucida f. major*, sans cependant appartenir à aucune de ces trois variétés. Elle diffère de la *V. pellucida* par son dernier tour de spire passablement dilaté, de l'*elliptica* par sa petite taille et son ouverture moins ample et de la *f. major* de BOLLINGER, par son ouverture relativement plus ample, moins échancrée au point d'insertion du bord droit, ainsi que par la taille générale, plus petite. M. MEYLAN m'écrit que c'est sans doute une forme alpine de la *V. pellucida*, mais il est à remarquer que les formes alpines de cette espèce, qu'on trouve au Valais (var. *alpina* Stenz, par exemple à la Tour

<sup>1</sup> Ce chiffre et les suivants se rapportent à la pagination du Catalogue Godet.

de Bavon, 2481 m.) ont au contraire une toute petite taille et un dernier tour de spire plutôt rétréci que dilaté. M. GODET ne l'a pas déterminée, n'ayant mis dans ses notes que « *V. pellucida*, var. ? » Cette variété est donc nouvelle :

Var. DUBIA *nov. var.*

*Testa intermedia, ultimo anfractu plus minusve dilatato, apertura satis ampla, margine dextro normali.*

Coquille moyenne, très légèrement plus grande que le type et passablement plus petite que les *V. elliptica* et *f. major* de Boll.; dernier tour de spire assez dilaté, intermédiaire entre ceux de la *V. elliptica* et de la *f. major*. Spire élevée, formée de quatre tours. Bord supérieur de l'ouverture s'insérant normalement à la paroi aperturale, sans présenter d'échancrure profonde, quand on la regarde de dessous, comme parfois le type et la *f. major*.

Long. 5<sup>mm</sup>,5. Lat. 3<sup>mm</sup>,5 . Alt. 3 mm.

Page 114.            7. VITRINA DIAPHANA Drap.

M. MEYLAN m'écrit qu'elle est commune à Sainte-Croix jusqu'à 1200 m. Je l'ai trouvée plus haut, sur les flancs du Chasseron; La Côte-aux-Fées, La Brévine.

#### 9. HYALINA CELLARIA (Müll.).

Cudrefin, Provence sur Vaumarcus, combe de Lignièrès, gorges de l'Areuse, La Côte-aux-Fées.

#### 10. HYALINA DRAPARNALDI Beck.

Cerlier, Saint-Blaise.

#### 11. HYALINA SEPTENTRIONALIS Brgt.

Environs de Neuchâtel: Zigzags, Poudrières, etc. — Auvernier (Romy).

#### 13. HYALINA NITENS (Mich.).

var. *Dutaillyana* (Mab.).

Variété nouvelle pour le Jura neuchâtelois; elle est assez répandue dans les montagnes, en compagnie du type: gorges de l'Areuse, La Brévine, Les Ponts, La Côte-aux-Fées, Creux-du-Van, Val-de-Ruz, Tête-de-Ran. — Chaumont (Romy).

14. HYALINA PURA (Ald.).

Sainte-Croix (Meylan), gorges de l'Areuse, gorges de Douanne et combe de Lignièrès.

15. HYALINA RADIATULA Gray.

La Chaux-de-Fonds, Maison-Monsieur (Kampmann).

16. ZONITOIDES NITIDUS (Müll.).

Grand marais, bords du lac entre Auvernier et Colombier, lac des Taillères.

*f. minor.* Au-dessus de Colombier.

Page 115. 18. CRYSTALLUS DIAPHANUS (Stud.).

Chaumont (versants de Neuchâtel et de Fenin), Pierrabot, combe de Lignièrès, gorges de l'Areuse, La Brévine, La Côte-aux-Fées. — La Chaux-de-Fonds, Maison-Monsieur (Kampmann).

Suppl. 1908, p. 106.

CRYSTALLUS SUBRIMATUS (Reinh.).

Gorges de l'Areuse, Valangin.

Suppl. 1908, p. 106.

CRYSTALLUS ANDREÆI (Bttg.).

Gorges de l'Areuse, Val-de-Ruz (Valangin, La Jonchère, Le Pâquier), Chaumont, gorges de Douanne, Bôle.

Page 115. 19. EUCONULUS FULVUS (Müll.).

Neuchâtel (donjon du Château), La Tène (près Marin-Epagnier), Cerlier, La Brévine, La Côte-aux-Fées.

20. ARION HORTENSIS Fér.

Aussi dans la montagne: La Brévine et La Côte-aux-Fées.

21. ARION EMPIRICORUM Fér.

*Mut. aurantiaca*: Epagnier, Cerlier.

J'ai trouvé aux environs de Lignières, à Chaumont, au Creux-du-Van et à La Côte-aux-Fées, une espèce qui n'a été jusqu'à présent que peu signalée en Suisse (Schwarzenberg, Mellingen, Weissenstein, Pilate) et qui est pourtant commune au Valais et dans les Alpes vaudoises (Château d'Œx, leg. Godet; Les Plans de Frenières), l'*Arion subfuscus* (Drap.). Cette espèce, nouvelle pour la région, est sans doute plus largement répandue dans le Jura. STERKI le mentionne entre le Jura et la Forêt-Noire (pas commun).

22. PUNCTUM PYGMÆUM (Drap.).

La Chaux-de-Fonds et Maison-Monsieur (Kampmann). — La Tène (près Marin), Colombier, gorges du Seyon, Montmollin, La Côte-aux-Fées.

Page 116. 23. SPHYRADIUM EDENTULUM (Drap.).

La Côte-aux-Fées, Creux-du-Van.

25. PATULA ROTUNDATA (Müll.).

Landeron, Jolimont, Grand Marais, etc.

26. PATULA RUDERATA (Stud.).

M. MEYLAN m'écrit qu'il l'a retrouvée dans plusieurs stations aux environs de Sainte-Croix ainsi qu'à la Pouëta Raisse.

27. PYRAMIDULA RUPESTRIS (Drap.).

Gorges de Douanne, La Brévine, La Côte-aux-Fées, Creux-du-Van, au sommet du Chasseron.

Page 117. 28. EULOTA FRUTICUM (Müll.).

Cerlier, Le Landeron, à Douanne même et à l'entrée des gorges, Colombier, Valangin, Champ-du-Moulin.

*mut. rubella*. Cudrefin.

*mut. fasciata, alba*. Cudrefin.

*mut. fasciata, rubella*. Vully.

Page 118. 30. VALLONIA PULCHELLA (Müll.).

Combe de Lignières, Noiraigue et Les Bayards.

32. HELICODONTA OBVOLUTA (Müll.).

Landeron et Jolimont.

34. FRUTICICOLA EDENTULA (Drap.).

Forêts de La Côte-aux-Fées et du Creux-du-Van.

Page 119. 38. FRUTICICOLA RUFESCENS (Penn.).

var. *albina* Godet.

Chasseron (versant de Sainte-Croix) jusqu'au sommet.

var. *montana* (Stud.).

Provence au-dessus de Vaumarcus, Chaumont, gorges de l'Areuse, La Côte-aux-Fées, Les Ponts-de-Martels, La Joux, La Brévine. M. Kampmann l'a recueillie à Maison-Monsieur et au Taubenloch.

f. *minor*. La Chaux-de-Fonds (Kampmann).

Page 120. var. *cœlomphala* (Loc.).

Taubenloch (Kampmann).

41. FRUTICICOLA INCARNATA (Müll.).

Cudrefin, combe de Lignièrès, gorges de Douanne, Vaumarcus-Provence, Chaumont, La Côte-aux-Fées.

42. FRUTICICOLA STRIGELLA (Drap.).

Elle dépasse parfois 600 m. d'altitude : combe de Lignièrès, pentes de Chaumont (jusqu'à 650 m. environ), Champ-du-Moulin.

Page 121. 43. ARIANTA ARBUSTORUM (L.).

var. *alpicola* Charp.

La Côte-aux-Fées, La Brévine, Les Ponts-de-Martel.

44. CHILOTREMA LAPICIDA (L.).

*Mut. albina*. Sainte-Croix (Meylan).

M. Meylan y a aussi récolté des f. *minor*, à spire très élevée.

Page 122. 45. ISOGNOMOSTOMA PERSONATUM (Lam.).

Vallon de Vaumarcus à Provence.

46. HELIX ASPERSA (Müll.).

L'*Helix aspersa* peut être actuellement considérée comme faisant partie de la faune neuchâteloise, étant définitivement acclimatée. J'en ai rapporté en 1908 une cinquantaine d'individus provenant de Binic (Bretagne), qui se sont multipliés aux Poudrières, au-dessus de Neuchâtel. J'en ai, en outre, observé toute une station sur les rochers couverts de végétation, en face du hangar des tramways, à l'Evole. Elle se rencontre plus loin, dans les jardins de Champ-Bougin (Reichel); M. Matthey-Dupraz en signalait en 1911 (*Rameau de sapin*, p. 8), un grand nombre recueillis à Colombier, en octobre et novembre 1910. J'en ai trouvé un jeune exemplaire vivant, au Pertuis du Sault, à la lisière de la forêt de Chaumont, ainsi qu'un individu adulte, qui avait dû mourir une ou deux semaines auparavant, vu la décomposition avancée de l'animal, à Monruz, au bord du lac. Cette dernière station a dû être fondée par l'apparition dans cette localité d'un grand nombre de plantes méridionales, signalées par M. Auguste DUBOIS dans le *Rameau de sapin* de 1912 (p. 37): *Vicia augustifolia*, *V. dasycarpa*, *V. narbonnensis*, *Coriandrum sativum*, *Anchusa italica* et *A. officinale*.

On la rencontre en outre de temps en temps à Neuchâtel même: *Rameau de sapin*, 1910, p. 32 (à la place du Marché), p. 43-44 (Faubourg du Crêt).

47. HELIX POMATIA L.

f. *elevata*. Répandue au pied du Vully.

Page 124. 48. TACHEA SYLVATICA (Drap.).

Gorges de Douanne.

var. *montana*, Stud.

Vallanvron, Mont-Racine, Bec à l'Oiseau.

49. TACHEA HORTENSIS (Müll.).

On la trouve, mais rarement, plus bas que 600 m., à Cerlier, au bord du lac (436 m.); à Neuchâtel, près des Zigzags (450 m. environ).

*Mut. albina* à Pouillerel (*Testa lutea, fasciis translucentibus, peristomate albino*).

Page 125. 50. *TACHEA NEMORALIS* (L.).

M. MEYLAN m'écrit de Sainte-Croix: « *Tachea nemoralis* existe ici près à l'Auberson dans un jardin à 1100 m. J'ai été très étonné de le rencontrer si haut et je doute qu'il dépasse cette altitude où il est d'ailleurs sûrement fort rare et peut-être importé. »

*Mut. roseo labiata*. Neuchâtel (Poudrières); rare.

Page 126. 51. *XEROPHILA ERICETORUM* (Müll.).

Cerlier, Thielle, sommet du Chasseron.

Page 127. *XEROPHILA OBVIA* (Htm.).

Ainsi que l'*Helix aspersa*, la *Xerophila obvia* est définitivement acclimatée, mais sur une bien plus grande surface: la colonie du Chanet a singulièrement prospéré et s'est étendue jusque près de Peseux; quelques exemplaires provenant de là se sont établis aux Poudrières où je les avais placés. En outre cette espèce est largement disséminée dans toute l'extrémité orientale du canton: en 1910 (*Rameau de sapin*, p. 4), j'ai relevé la localité du Pont de Thielle (rive bernoise) et j'ai reconnu depuis que les exemplaires que j'y avais trouvés avaient très probablement passé la Thielle par le pont du chemin de fer, partant d'un champ situé à quelques centaines de mètres de là, sur rive neuchâteloise, où cette espèce est extrêmement abondante. J'ai ensuite observé une nouvelle station à Bethléhem, au pied du Jolimont, puis entre Cerlier et Le Landeron, au bord du lac. En outre, elle est très répandue au-dessus du Landeron, sur la route de Lignièrès.

Il est probable qu'elle suivra ce chemin jusqu'à Lignièrès, comme elle a l'habitude de le faire en Valais, sans doute au moyen de chars de fourrage: route de Martigny à Sembrancher et à Châbles; de Sembrancher à Orsières, Som la Proz, Praz de Fort et presque jusqu'au fond du Val Ferret; dans la vallée d'Isérable; sur la nouvelle route de Sion à Salins et à Baar, et de Sion à Euseigne.

53. *XEROPHILA CANDIDULA* (Stud.).

Cerlier, Souaillon, Thielle, sommets du Chasseron et de Chaumont.

var. *thymorum* (v. Alt).

Neuchâtel (Poudrières), Boudevilliers et Champ du Moulin.

54. XEROPHILA CARTHUSIANA (Müll.).

Grand marais, du côté du Vully (leg. G. de Dardel) Cudrefin (Reichel).

Page 128. 55. BULIMINUS DETRITUS (Müll.).

Douanne, Colombier (Planeyse), Boudevilliers, Champ-du-Moulin.

56. BULIMINUS MONTANUS (Drap.).

Gorges de Douanne, combe de Lignièrès.

J'en ai trouvé dans la combe de Lignièrès un exemplaire monstrueux, gigantesque, corné par places et blanc sale à d'autres, c'est-à-dire ayant tout à fait la coloration d'un *B. detritus* non radié avec certaines formes duquel (*B. Locardi* Cless.) on pourrait facilement le confondre s'il n'avait pas été recueilli dans des forêts très humides, au milieu de *B. montanus* normaux, sans qu'il y ait nulle part trace de *B. detritus*.

Long. 18 mm., larg. 8 mm., au lieu de 13-14 mm. de long et 5-6 de large.

57. BULIMINUS OBSCURUS (Müll.).

Auvernier, combe de Lignièrès, gorges de Douanne.

Page 129. 58. CHONDRULA TRIDENS (Müll.).

Deux nouvelles stations de cette espèce rare chez nous : un peu au-dessus de Vaumarcus, sur le chemin de Provence, et à Lugnorres, sur le flanc sud du Vully.

59. CHONDRULA QUADRIDENS (Müll.).

Montmollin, Montezillon, Champ-du-Moulin.

60. ACANTHINULA ACULEATA (Müll.).

La Tène près Marin, combe de Lignièrès, gorges du Seyon, au-dessus de Fenin, Montmollin, La Côte-aux-Fées.

61. COCHLICOPA LUBRICA (Müll.).

Cerlier, marais de Montmirail, Vully, gorges de l'Areuse et sommet du Chasseron.

Page 130. Var. *columna* Cless.

Cerlier.

62. CÆCILIANELLA ACICULA (Müll.).

Neuchâtel (Poudrières, Pertuis du Sault), Serrières, Saint-Blaise, Montezillon, Les Bayards, gorges de Douanne.

63. ORCULA DOLIUM (Drap.).

f. *cylindracea-producta*: sommet du Chasseron.

var. *uniplicata* (Pot. et Mich.).

Gorges de l'Areuse.

64. ORCULA DOLIOLUM (Brug.).

Pierrabot, Lugnorres sur le Vully.

65. PUPA FRUMENTUM Drap.

Vaumarcus, Saint-Blaise.

Page 131. 68. PUPILLA MUSCORUM (C. Pfr.).

Serrières, gorges de Douanne, La Côte-aux-Fées.

69. PUPILLA TRIPLICATA Stud.

Serrières, Neuchâtel (Poudrières), gorges du Seyon.

70. VERTIGO ANTIVERTIGO (Drap.).

Cerlier, au bord du lac.

71. VERTIGO PYGMÆA (Drap.).

La Sauge, au bord du lac (Reichel).

Page 132. 72. VERTIGO ALPESTRIS (Ald.).

Chaumont (près du sommet, sur le versant de Neuchâtel, et sur le versant de Fenin, disséminée du sommet jusqu'au-

dessus de Valangin), Lignières, Montmollin, La Côte-aux-Fées.

74. *ISTHMIA MUSCORUM* (Drap.).

Gorges du Seyon.

75. *BALEA PERVERSA* (L.).

On trouve aussi la forme normale, très fréquemment: M. MEYLAN me la signale à Sainte-Croix, assez commune sur les hêtres. Gorges de Douanne, Fenin, Montmollin, Colombier, La Côte-aux-Fées.

76. *CLAUSILIA LAMINATA* (Mtg.).

Taubenloch (Kampmann), Vully.

Page 133. 77. *CLAUSILIA FIMBRIATA* Rossm.

M. JAQUET l'a recueillie au Chasseral, sur le versant de Saint-Imier, à environ 900 m. — Pouëta Raisse, La Brévine, Les Verrières.

78. *CLAUSILIA ORTHOSTOMA* Mke.

M. JAQUET l'a découverte au-dessus de Saint-Imier, en compagnie de l'espèce précédente.

79. *CLAUSILIA PLICATA* Drap.

Il en existe dans la collection Charpentier (Lausanne) des exemplaires provenant de Guévaux (Lac de Morat).

Page 134. 80. *CLAUSILIA PARVULA* Stud.

J'ai trouvé au Pâquier (Val-de-Ruz) un exemplaire monstrueux de *Cl. parvula*, à deux ouvertures. La première, normale, au dernier tour de spire, était déjà bordée d'un péristome blanc, quand elle s'est obstruée d'un caillou amené par l'animal rentrant brusquement dans sa coquille. Le caillou, qui a sans doute changé de position par les mouvements de l'animal cherchant à l'expulser et à ressortir, s'est calé entre les lamelles de l'ouverture, de sorte qu'il a été impossible pendant longtemps à la malheureuse Clausilie de dégager son unique sortie. Mais avec un instrument aussi parfait qu'une radula et un estomac qui supporte facilement une année de jeûne (j'ai fait l'expérience sur des Clausilies mal préparées

de ma collection, qui ne donnaient pas signe de vie pendant des mois puis déployaient tout à coup une grande énergie pour s'enfuir) cet animal aiguillonné par la faim a pratiqué une seconde ouverture au-dessus de la première, à l'avant de l'avant-dernier tour de spire, et l'a bordée d'un péristome parfait; mais elle ne présente pas d'autre pli que la lamelle pariétale, tout à fait normale, qui n'apparaît pas jusqu'à la première ouverture, sans dents. Dans la suite, le caillou s'est dégagé, mais l'ouverture qui l'enchassait est resté inachevée, soit à cause de l'inutilité de ce passage et par conséquent des plis, soit à cause de la mort de l'animal.

81. CLAUSILIA DUBIA Drap.

et var. *obsoleta* A. Schm.

Gorges du Taubenloch et Maison-Monsieur (Kampmann).

Page 135. 82. CLAUSILIA BIDENTATA (Ström.).

La *Cl. bidentata*, signalée en Suisse jusqu'ici seulement au Bois Rond, près de Cornaux, doit certainement avoir une distribution bien plus étendue, probablement de Chaumont à Cudrefin: j'en ai rencontré toute une station très riche en individus, à la Tène, près de Marin. Dans des notes inédites de M. GODET, un dessin de Clausilie recueillie à Chaumont ne peut se rapporter qu'à la *Clausilia bidentata* typique, ainsi qu'une des figures de ses admirables planches manuscrites, intitulée à l'encre *Cl. parvula* f. *strigillata*, de Cudrefin, au-dessous de laquelle il a ajouté très indistinctement, au crayon: « *an bidentata?* » Il n'a sans doute pas osé la déterminer comme *Cl. bidentata* parce que l'exemplaire était unique et qu'il ne connaissait pas la station intermédiaire de la Tène.

83. CLAUSILIA CRUCIATA Stud.

var. *triplicata* Htm.

Gorges du Taubenloch (Kampmann). Chaumont (Romy).  
— Gorges de l'Areuse et Creux-du-Van.

Page 136. 85. CLAUSILIA LINEOLATA Held.

La Chaux-de-Fonds et Maison-Monsieur (Kampmann) var.?

var. *subcruda* Bttg.

Pied de Chaumont (leg. Romy).

86. CLAUSILIA VENTRICOSA Drap.

Gorges de l'Areuse et montagne de Boudry, sur le chemin du Creux-du-Van, Vaumarcus.

87. CLAUSILIA CORYNODES Held.

Cette espèce a été découverte au Taubenloch par M. Kampmann et retrouvée depuis par M. Meylan.

Page 137. 90. SUCCINEA ELEGANS Risso.

Valangin.

91. SUCCINEA OBLONGA Drap.

var. *elongata* Kob.

Gorges de l'Areuse.

Page 138. 92. CARYCHIUM MINIMUM Müll.

La Sauge (Reichel), Grand Marais, La Tène près Marin, au bas des gorges de l'Areuse.

Page 143. 103. PHYSA FONTINALIS (L.)

La Tène, près Marin.

104. PHYSA HYPNORUM (L.).

Montilier, près de Morat.

Page 144. 108. PLANORBIS ROTUNDATUS Poir

Bords du lac (Estavayer); Bethléhem, au pied du Jolimont.

109. PLANORBIS CONTORTUS (L.).

Cerlier.

Page 145. 112. PLANORBIS NAUTILEUS (L.).

var. *imbricatus* (Dr.). — Pont de Thielle.

var. *cristatus* (Dr.). — Lac d'Etailières.

113. PLANORBIS COMPLANATUS (L.).

Lac d'Etailières.

115. ANCYLUS FLUVIATILIS Müll.

Dans l'Areuse à Grandchamp.

Page 146. 120. ERICIA ELEGANS (Müll.).

Gorges de Douanne, Bevaix.

Pages 147-148.

123-124. VALVATA PISCINALIS Müll.

M. BOLLINGER rassemble dans son ouvrage les deux *Valvata alpestris* et *antiqua* comme des variétés de la *V. piscinalis*. Je n'ai recueilli le type de cette espèce qu'au Loclat et à Noirai-gue, dans l'Areuse. Dans cette dernière station, j'ai trouvé une très curieuse nouvelle variété, reliée au type par une chaîne d'intermédiaires :

var. SUBNATICINA *nov. var.*

*Ab typo differt testa depressa et apertura permagna. Umbilicus typicus, idem operculum.*

Coquille globuleuse, déprimée, assez étroitement ombiliquée, comme le type, très finement striée, mince, presque transparente, de couleur jaune verdâtre très pâle, très brillante. Quatre tours de spire s'accroissant très rapidement, arrondis, le dernier très grand, tout autant que celui de la *V. naticina* mais paraissant plus petit à cause de la forme générale plus déprimée. Ouverture très grande, arrondie, légèrement ovale, assez semblable à celle de la *V. naticina*. Péristome tranchant, semblable à celui de cette même espèce. Opercule formé de cinq tours.

Diam. 4<sup>mm</sup>,5. Haut. 3<sup>mm</sup>,5.

Cette variété très intéressante est une forme de *V. piscinalis* évoluée dans les eaux très courantes de l'Areuse à cette localité, comme la *V. naticina*, du Danube et du Memelstrom, est certainement une *V. piscinalis* profondément transformée par son habitat.

La var. *subnaticina* se distingue très facilement de toutes les formes déprimées d'*alpestris*, par son ombilic étroit et sa grande ouverture, et de l'*antiqua* par sa forme déprimée et son dernier tour de spire.

Page 148. 125. VALVATA DEPRESSA C. Pfr.

La Tène, près de Marin.

126. VALVATA CRISTATA Müll.

Cerlier, Marin (La Tène), Colombier, lac d'Etailières.

1911, XXXVIII, p. 35 et fig. 2:

127. UNIO CONSENTANEUS Qgl.

f. *elongata* God. A la Tène on trouve des individus atteignant jusqu'à 80 mm. de longueur (Reichel).

Page 150. 128. UNIO TUMIDUS Retz.

f. *typica*. Cette forme atteint jusqu'à 95 mm. à la Tène, près Marin (Reichel).

Page 153. 129. ANODONTA MUTABILIS Cless.

var. *piscinalis* (Nils.).

F. C. *rhomboidalis*. J'ai trouvé une forme semblable dans l'étang situé à côté du pont de la Directe, à Thielle (rive bernoise).

Page 155. 130. SPHÆRIUM CORNEUM (L.).

Tête-de-Ran.

var. *nucleus* (Stud.). La Sauge.

Page 156. 131. SPHÆRIUM DRAPAMALDI Cl.

Tête-de-Ran.

133. PISIDIUM AMNICUM (Müll.).

La forme normale vit en grande abondance à Cudrefin, elle doit sans doute vivre ailleurs dans le lac, à côté de la var. *elongata*.

134. PISIDIUM OBTUSALE C. Pfr.


Epagnier, Borcarderie, lac d'Etailières.

Page 157. 135. PISIDIUM PUSILLUM (Gm.).

Bethléhem, Cerlier, Colombier, lac d'Etailières.

136. PISIDIUM MILIUM Held.

Lac d'Etailières.



#### EXPLICATION DES FIGURES

1-3. *Vitrina pellucida* var. *dubia* Piag., d'après des dessins de M. Paul GODET.

4. f. *major*, Boll. (p. 44, fig. 1).

5. var. *elliptica* (Brown.). (CLESSIN, fig. 26, p. 70.)

6 et 9. *Valvata piscinalis* var. *subnaticina* Piag.

7. *Valvata naticina* Menke (CLESSIN, fig. 316, p. 459).

8. *Valvata piscinalis* du Loclat (d'après un dessin de M. GODET).