

Zeitschrift: Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Band: 65 (1940)

Artikel: Curculionides nouveaux de l'Angola
Autor: Hustache, A.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-88751>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CURCULIONIDES NOUVEAUX DE L'ANGOLA

Troisième contribution

par

A. HUSTACHE

Faustiella immixta n. sp. ♂.

Ovale noir, mat, orné d'un dessin d'un rouge d'ocre pâle, rosé composé de poils squamuleux serrés, appliqués, les poils ocrés entremêlés de nombreux poils blancs, formant: sur le prothorax deux bandes dorsales, interrompues dans leur milieu, reliées en avant par une large bande apicale d'un rouge plus foncé, la partie discale noire en ovale transversal et dépassant peu le milieu; sur les élytres deux bandes transversales, la 1^{re} basale, large, triangulaire dilatée en son milieu, reliée à la 2^{me} par une courte bande suturale, la 2^{me} bande médiane, droite, dentelée sur ses bords. Pattes revêtues d'une fine pubescence cendrée, entremêlée sur les fémurs postérieurs de pubescence brune. Dessous revêtu d'une pubescence peu dense, fine, cendrée et ocrée.

Rostre aussi long que le prothorax, épais, arqué, peu dilaté à la base, densément ponctué jusqu'au sommet, en arrière avec trois fines carènes, pubescent, rouge. Tête convexe, à ponctuation fine et serrée, en arrière glabre, les yeux linéairement séparés. Antennes courtes et fines, les trois derniers articles du funicule transversaux, la massue ovale, petite.

Prothorax transversal, en avant largement resserré et transversalement impressionné, les côtés peu obliquement arqués dans leur tiers postérieur, la base très légèrement sinuée; en arrière fortement convexe, la ponctuation très fine, subgranuleuse et serrée.

Elytres peu plus longs que larges ensemble, subtriangulaires, assez fortement rétrécis en arrière, le calus huméral petit et élevé; fortement convexes, transversalement impressionnés derrière la base; stries ponctuées fines, interstries plans, leurs parties dénudées densément et finement ponctuées granulées. Ecusson pubescent.

Tous les fémurs brièvement et finement dentés, les postérieurs atteignant l'apex et unicarénés.

Abdomen avec le 5^{me} segment pourvu à son sommet d'une large et profonde fovéole échançant son sommet.

Longueur: 5,3 mm.

Angola: Kuvangu, 1939, 1 ♂ (D^r Monard).

Cette espèce est voisine de *F. ventralis* m. dont elle se distingue par sa coloration, le prothorax moins convexe, les élytres plus rétrécis en arrière, les stries plus fines, le calus huméral plus petit et plus élevé.

Metialma vicina n. sp. ♀.

Rhomboïdal, noir, mat, le rostre et les antennes d'un roux jaune, les tibias et les tarses ferrugineux. Revêtement dorsal peu dense, formé de squamules sétiformes assez allongées, blanches et d'un brun ocré, sur le prothorax éparses, devant l'écusson avec une tache ovale (squamulée) partiellement jaune; sur les élytres avec une tache scutellaire (squamuleuse) jaune, sur la suture jaunes, peu serrées, au sommet plus longues formant une touffe d'un jaune plus clair, sur le reste du disque en majeure partie blanches, les jaunes plus nombreuses le long de la base; élytres ornés en avant de deux taches noires (pubescence squamuleuse d'un noir velouté), triangulaires séparées par l'écusson et la suture. Dessous densément squamulé, cendré, les 3^{me} et 4^{me} segments ventraux squamulés sur les bords et avec un point blanc sur le milieu, le 5^{me} revêtu d'une dense pubescence squamuleuse jaunâtre, en son milieu triangulairement échanquée.

Rostre aussi long que le prothorax, dans sa moitié antérieure rétréci, lisse et luisant, en arrière coriacé pointillé et tricaréné, les carènes latérales très fines et courtes. Yeux séparés par une ligne de squamules.

Prothorax fortement transversal, sur le disque régulièrement et modérément convexe, impressionné sous la tache basale.

Elytres peu plus longs que larges, les points des stries peu gros mais très serrés, derrière la base indistincts, les interstries étroits, vers leur milieu à peine du double de la largeur des stries, les dorsaux subplans, les latéraux convexes.

Dent des fémurs aiguë, celle des antérieurs forte, triangulaire.

Longueur: 4 mm.

Angola: Kalukembe, 1932-1933. Mission scientifique suisse.

Cette espèce est très voisine de *M. neptis* Heller, dont elle diffère par les caractères ci-dessus, les autres caractères étant communs.

Apion (Catapion) bimbiense n. sp. ♂.

Oblong, brun-noir, les antennes en entier, les pattes, hanches exceptées, les élytres en partie d'un rouge brique, les élytres avec la suture, une bande transversale submédiane, étroite dans le milieu, fortement dilatée en triangle et atteignant les bords de chaque côté, une bande transversale apicale, rembrunies. Pubes-

cence dorsale cendrée, très fine et très courte, visible seulement sur les côtés du prothorax et des élytres et dans les stries, plus épaisse mais éparse sur les pattes, sur le dessous blanche, squamuleuse, assez serrée, très serrée formant une tache sur les côtés du mésosternum.

Tête conique, aussi longue que large, fortement impressionnée, sillonnée transversalement derrière les yeux, coriacée ponctuée sur le vertex, le front de la largeur des yeux, densément ponctué rugueux et légèrement impressionné de chaque côté de la carène médiane, les yeux presque plats. Rostre aussi long que la tête et le prothorax, très légèrement courbé, cylindrique, assez épais, à sa base formant avec le front une légère inflexion, densément ponctué rugueux, mat en arrière avec une faible carène, obtuse, courte. Antennes médianes, fines, courtes; scape assez court; funicule avec le 1^{er} article oblong, deux fois et demie aussi long qu'épais et peu plus long que les 2^{me} et 3^{me} ensemble, le 2^{me} subconique et un peu plus long que large, le 3^{me} aussi long que large, les suivants plus courts, les derniers arrondis, la massue faible, ovale et à peine aussi longue que les 3 articles précédents ensemble.

Prothorax cylindrique, à peine d'un quart plus long que large, en avant très légèrement rétréci dans son quart antérieur, les côtés à peine arqués dans le milieu, la base légèrement bisinuée et assez fortement rebordée, les angles postérieurs faiblement aigus; convexe, avec un profond sillon médian entier, la ponctuation assez grosse, moyennement profonde, serrée.

Ecusson triangulaire en avant, en arrière prolongé en lame étroite, lisse, luisante.

Elytres d'un quart plus longs que larges, s'élargissant assez fortement jusqu'au tiers postérieur, modérément rétrécis en arrière et largement arrondis au sommet; épaules obliquement arrondies; convexes, profondément sillonnés ponctués, caténulés, les interstries peu plus larges que les sillons, transversalement, finement, régulièrement ridés, pourvus d'une série de petits points espacés.

Pattes assez courtes, robustes, les tibias droits, graduellement élargis, les tarses courts, le 2^{me} article des antérieurs transversal, les ongles à la base épaissis et dentés.

Longueur: 3 mm. (rostre non compris).

Angola: Bimbi, oct. 1932. Mission scientifique suisse. Un exemplaire.

La coloration des élytres est probablement variable, les bandes sombres plus ou moins larges.